

ARCHIV

FÜR

NATURGESCHICHTE.

GEGRÜNDET VON A. F. A. WIEGMANN,
FORTGESETZT VON W. F. ERICHSON.

IN VERBINDUNG MIT

PROF. DR. LEUCKART IN GIESSEN.

HERAUSGEGEBEN

VON

DR. F. H. TROSCHEL,

PROFESSOR AN DER FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT ZU BONN.


VIER UND ZWANZIGSTER JAHRGANG.

Zweiter Band.

Berlin,
Nicolaische Verlagsbuchhandlung.

(G. Parthey,)

1858.



ALBANY

1851

NATURAL HISTORY

CONTAINING
A DESCRIPTION OF THE
NATURAL HISTORY OF THE STATE OF NEW YORK

IN TWO VOLUMES

THE FIRST VOLUME

OF THE

OF THE STATE OF NEW YORK

BY J. D. DODGE, ESQ.

THE SECOND VOLUME

OF THE

OF THE STATE OF NEW YORK

BY J. D. DODGE, ESQ.

1851

Inhalt des zweiten Bandes.

	Seite
Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Vögel während des Jahres 1857. Von Dr. G. Hartlaub .	1
Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Säugethiere während des Jahres 1857. Vom Herausgeber .	30
Bericht über die Leistungen in der Herpetologie während des Jahres 1857. Vom Herausgeber	58
Bericht über die Leistungen in der Ichthyologie während des Jahres 1857. Vom Herausgeber	70
Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der niedern Thiere während des Jahres 1857. Von Prof. Leuckart	93
Vermes	96
Chaetopodes	98
Nematodes	103
Acanthocephala	108
Hirudinei	110
Trematodes	110
Cestodes	123
Turbellarii	129
Rotiferi	138
Bryozoa	140
Echinodermata	146
Coelenterata	153
Ctenophora	154
Hydrasmedusae	155
Polypi	164
Porifera	175
Protozoa	178
Infusoria	181
Rhizopoda	190
Gregarinae	192

**Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der
Entomologie während des Jahres 1857. Von Dr. A. Ger-
staecker.**

Insekten	193
Myriapoden	443
Crustaceen	443
Arachniden	473

**Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Mol-
lusken während des Jahres 1857. Vom Herausgeber** 481

Cephalopoden	498
Cephalophoren	500
Acephalen	525

Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Vögel während des Jahres 1857.

Von

Dr. G. Hartlaub

in

Bremen.

In die kleine aber stattliche Phalanx der Männer, welche uns seit einer Reihe von Jahren gerechte Würdigung und Gewohnheit als die Zierden und Säulen des ornithologischen Forums zu verehren gelehrt haben, hat seit Abfassung unseres letzten Jahresberichtes der unerbittliche Tod Lücken gerissen, welche auszufüllen wohl noch lange der fromme Wunsch der Nachgeborenen bleiben wird. Bonaparte, Lichtenstein, Naumann, Temmink! Scheint es nicht, als knüpfte sich an diese vier Namen die ganze neuere Entwicklungsgeschichte der Ornithologie, als schliesse mit ihnen eine grosse und glänzende, vielleicht die grösste und glänzendste Epoche derselben ab? Wohl ist hier nicht der Ort, auch nur einigermaassen erschöpfend alles dessen zu gedenken, was diese Forscher, jeder in seiner Weise und nach sehr verschiedenem Maasstabe zur Förderung unserer Wissenschaft beigetragen haben. Noch weniger kann es in unserer Absicht liegen, die Erinnerung an ihre Namen durch ein sogenanntes „Eloge“ zu verunglimpfen. Wohl aber ist es eine der Aufgaben, welche sich dieser Jahresbericht gestellt hat, mit einigen Worten der Anerkennung die Dahingeschiedenen zu ehren, welchen es zu irgend einer Zeit ihres Lebens um die Förderung der Ornithologie Ernst gewesen ist.

Naumann's grossartige Stellung zu der vaterländischen Vögelkunde allseitig und ihrem vollen Gewichte nach zu beleuchten, überlasse ich geübteren und berechtigteren Federn, als es die meinige ist. Aber etwas rein menschliches mag ich nicht zurückhalten, dass nämlich mir, wie wohl Jedem, der das Glück hatte, Naumann persönlich zu kennen, die Erscheinung dieses ächt deutschen und bei aller Tüchtigkeit so anspruchlosen Gelehrten unvergesslich bleiben wird. — Lichtenstein's Verdienste um die Ornithologie scheinen mir der Hauptsache nach darin zu liegen, dass er zu einer Zeit, wo der famose Stossseufzer Temmink's „tout le monde s'en mêle“ noch keine Geltung hatte, eifrig und erfolgreich schriftstellerisch für dieselbe thätig war; dass er Azara's ausgezeichnetes Werk über die Vögel Paraguay's zuerst nach Verdienst gewürdigt und wissenschaftlich ausgebeutet hat; dass er ferner das fast in Vergessenheit gerathene und doch so wichtige Manuscript der beiden Forster über die von ihnen während ihrer Weltfahrt mit Cook beobachteten Thiere in geeigneter Form zur Veröffentlichung brachte; mehr noch aber darin, dass er viele Jahre hindurch vom Lehrstuhle herab durch gehaltvolle und anziehende Vorträge Theilnahme für das Studium der Vögel zu erwecken gewusst hat, und endlich darin, dass die unvergleichliche Sammlung, welche wir heutzutage in Berlin bewundern, einen grossen Theil ihres Glanzes seinem Eifer, seiner Sachkenntniss, seiner umsichtigen Leitung verdankt. Bleibt nun auch die Summe dessen, was Lichtenstein schriftstellerisch für die Ornithologie gethan, sehr gering gegenüber der reichen Fülle unverarbeiteten Materials, welche ihn umgab, so hat doch derselbe diese Unterlassungssünde dadurch abzubüssen gesucht, dass er die Benutzung jener Schätze Anderen mit grösster Liberalität gestattete, ja dieselbe in jeder Weise zu erleichtern suchte. — Temmink's Verdienste um die exotische Vögelkunde sind so unbestritten, so ganz allgemein anerkannt, dass es hier eben nur der Hindeutung auf dieselben bedarf. Aber seine grösste That war und bleibt das „Manuel d'Ornithologie,“ und dieses Buch ist es, welches den Namen seines Verfassers über die bewohnte Erde getragen, und in beispiellos seltenem Grade populär

gemacht hat. Und doch war die Gestalt des alten reichen und vornehmen Mynheer selbst so wenig populär! Mit autokratischer Willkühr beherrschte er das grossartige unter seine Leitung gestellte Institut, das Reichsmuseum zu Leiden, und wohl mochte einer von Glück sagen, wenn es ihm gelungen, die während mehrerer Monate im Jahre hermetisch verschlossenen Schränke für seine Zwecke geöffnet zu erhalten! Obgleich mit eifersüchtiger Strenge über dem Mein und Dein in litterarischen Beziehungen wachend, und des eigenen Werthes sich nur zu wohl bewusst, war Temmink doch jeder Zeit willig und gerechtführend genug, fremdes Verdienst anzuerkennen, eine Wahrheit, mit welcher die von ihm so bekannt gewordene atrabiläre Aeusserung, es mische sich heutigen Tages ein Jeder darein, nur scheinbar in Widerspruch steht. Hochgeehrt und den Besten beigezählt bleibe der Name eines Mannes, dessen nahezu 40jähriger schriftstellerischer Thätigkeit neben anderen Zweigen des Wissens die Ornithologie einen Theil ihrer schönsten Erfolge dankt. — Schwer ist es, für die Beurtheilung einer so ausserordentlich angelegten Persönlichkeit, wie die Bonaparte's es war, den richtigen Maasstab zu finden. Uns hier nothgedrungen darauf beschränkend, seiner als Ornithologen zu gedenken, möchten wir sagen, dass Bonaparte in dieser Hinsicht geleistet hat, was ein unablässiges enthusiastisches Interesse für die Sache, eine Arbeitslust und Arbeitskraft sonder Gleichen, die ungewöhnlichste und umfassendste Specialkenntniss und ein hervorragendes Talent für Systematik, dies Alles aber im Verein mit den Vorzügen der reichsten geistigen Ausstattung sowohl als auch glänzender äusserer Verhältnisse, während eines Zeitraums von länger als 30 Jahren eben nur zu leisten vermochten. Das heisst viel — ist aber nicht zu viel gesagt. Vor der Grösse oder den Schwierigkeiten einer wissenschaftlichen Arbeit zurück zu schrecken, lag nicht in Bonaparte's Character, mochten diese immerhin jedem Andern unüberwindlich erscheinen. Und so konnte denn auch nur von ihm ausgehen, was längst in Aller Wünschen gelegen, ein kritisches Specialwerk über sämtliche bekannte Vögelarten. Dieses Werk, mehr bescheiden als zutreffend, „*Conspectus generum avium*“ betitelt, bildet,

wenngleich nicht frei von zahlreichen Irrthümern und die erstrebte Vollständigkeit nicht völlig erreichend, doch ganz eigentlich den Gipfelpunkt von Bonaparte's litterarischer Thätigkeit. Dass es ihm nicht vergönnt gewesen, dasselbe zu vollenden, ist um so mehr zu beklagen, als gerade die jüngsten Abschnitte des Werkes jene gleichartig sichere Behandlung und Durchführung zeigen, deren Mangel dem ersten Theile desselben wesentlichen Abbruch thut. Der Vorwurf der Flüchtigkeit, von welchem die späteren Arbeiten Bonaparte's nicht freizusprechen sind, findet seine Erklärung zum Theil wenigstens in der Natur der furchtbaren Krankheit, welcher dieser riesige Organismus erlag. Sie liess ihr Opfer während der letzten Lebensjahre zu keiner Ruhe, weder körperlicher noch geistiger mehr gelangen; mit unheimlicher Hast von kaum begonnenen Arbeiten ab zu anderen treibend, hetzte sie dasselbe trotz colossalen Widerstandes qualvoll zu Tode. „Je mehr ich auszuhalten habe, desto mehr arbeite ich,“ sagte Bonaparte, als ich ihn bei einem meiner letzten Besuche im Bade schreibend antraf.

Eine nicht geringe Anzahl nützlicher Beiträge bezeichnet im verflossenen Jahre den fortschreitenden Entwicklungsgang der Ornithologie. Als von hervorragender Wichtigkeit heben wir hervor die stetig weiter geführten Arbeiten P. L. Selater's über die Vögel Südamerika's; Arbeiten, welche schon jetzt einen so imposanten Umfang gewonnen haben, dass sie die Hoffnung auf ein kritisches Gesamtwerk über die Ornithologie dieses so ausgedehnten Theiles unserer Erde zu rechtfertigen scheinen. Dass ein solches in der bestimmten Absicht Selater's liegt, ja, dass der Zeitpunkt des Zustandekommens desselben keineswegs in weiter Ferne zu suchen, können wir unsern Lesern als gewiss mittheilen. Von ungewöhnlichem Interesse sind ferner die zoologischen Forschungen des geübten und sehr befähigten englischen Reisenden Wallace in Neuguinea und auf den benachbarten Gruppen der Ke- und Arruinseln. Hoffentlich wird es diesem gelingen, das noch von keines Europäers Fusse betretene Innere des Papualandes zu erreichen. Seine Absicht

geht dahin, volle drei Jahre auf die Bereisung desselben zu verwenden. Was bis jetzt von Wallace's Sammlungen nach Europa gelangt ist, berechtigt zu den grössten Erwartungen.

Ref. versuchte die Ergebnisse seiner Studien über die Ornithologie Westafrika's, d. h. Senegambiens und Guinea's im älteren und weitesten Sinne des Wortes, in einem Specialwerke zusammengefasst, zum Abschluss zu bringen. Noch immer giebt es Ornithologen, welche auf neue systematische Versuche Zeit verwenden.

Von L. Reichenbach's „Handbuch der Ornithologie“ erschienen zahlreiche Tafeln, Trochiliden abbildend, und eine die Spechte behandelnde Abtheilung des Textes. Der Verleger verspricht rasche Förderung dieses grossartigen und im hohen Grade verdienstlichen Unternehmens. Die grosse Mehrzahl der Abbildungen verdient in sofern Lob, als sich ein Vogel danach leicht und mit Sicherheit bestimmen lässt; der Text ist mit einer gewissenhaften Ausführlichkeit behandelt, und verdient der Flüchtigkeit ähnlicher Arbeiten gegenüber besondere Anerkennung. Möchte doch das zoologische Publikum den ebenso gelehrten als unermüdlich fleissigen Verfasser zur Fortsetzung des so nützlichen und doch so wenig kostspieligen Werkes ermuthigen!

J. Cabanis „Journal für Ornithologie“ wurde ohne erhebliche Unterbrechung weiter gefördert.

Es enthält von hier zu Erwähnendem: 1) Systematisches von Fr. Boie. 2) Zur Nahrungsmittellehre der Vögel, von Pfarrer F. H. Suehl, p. 181. 3) Das Wandern der Vögel über Wasser, von C. Gloger. Es seien allerdings lange Wanderungen möglich, da ja der Vogel auf dem Meere ruhen, unter gewissen Umständen eine wenn auch kurze Zeit schwimmen und sich wieder erheben könne. Wir möchten auch glauben, dass es so ist. 4) Ueber P. H. G. Möhring's Vogelnamen in „Avium genera“ von C. Sundevall. Sehr interessante lateinisch geschriebene Arbeit des gelehrten Verfassers p. 242. 5) Ueber das periodische Verschwinden vieler Vögel zur Herbstzeit von Dr. Hieronymus in Treysa p. 385. In dieser hübschen Arbeit des leider verstorbenen Verfassers werden alle Motive jener noch immer nicht vollständig erklärten Erscheinung scharfsinnig beleuchtet und wird schliesslich der Wärme die Hauptrolle dabei

eingedrängt. 6) „Das Leben der Vögel“ von A. Brehm. Auszug daraus: Liebe und Ehe.

Auch unser zweites vaterländisches Organ für Ornithologie, die „Naumannia“, hält sich in gutem Gedeihen und bringt werthvolle Beiträge. Als solche heben wir hervor von hierher Gehörigem:

1) Baldamus „Ueber die Präparation der Vogeleier und über die Einrichtung von Eiersammlungen.“ 2) Leon Olph-Gaillard „Versuch eines natürlichen Systems der Vögel.“ Der Verfasser möchte, von der Ansicht ausgehend, dass die weniger vollkommenen Wesen zuerst erschaffen wurden, mit den Schwimmvögeln beginnen. Ausführliche Arbeit. 3) J. H. Blasius „Aphorismen über den Bau des Vogelflügels“ p. 266—305. 4) J. Hoffmann „Ueber fossile Eier“ p. 305.

P. L. Selater „Notes on the birds in the Museum of the Academy of Natural Sciences at Philadelphia and other collections of the United states. Proc. Z. S. 1817, p. 1.“

Selater berichtet hier über seinen ornithologischen Ausflug nach Nordamerika, und giebt kritische Bemerkungen über verschiedene seltene Arten. Sein *Thryothorus albigularis* sei *T. fasciaticentris* Lafr.; *Turdus naevius* sei keineswegs den *Taeniopterinen* beizuzählen, sondern gehöre als ächte Drossel neben *T. migratorius*; Audubon's *Alauda Spraguei* sei Typus einer eigenen Gattung: *Neocorys*; *Pastor nigrocinctus*, Cass. sei gleich *Sericulus anais*, Less.; *Emberiza Bellii* und *bilineata* Cass. seien beide *Poospizae*; *Struthus caniceps* Woodh. sei gleich Wagler's *Junco cinereus*; *St. atrimentalis*, Couch, sei = *Spinites atrigularis*, Cab.; *Grus hoyiana* sei eine gute Art. (was ich nach wie vor auf das entschiedenste bezweifle) u. s. w.

E. Crisp „Ueber das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Luft in den Vogelknochen.“ Proc. Zool. Soc. p. 9 und 215. Nur wenige Knochen enthalten Luft, die meisten, von denen dies angenommen wurde, Mark. Bei den meisten brittischen Vögeln seien keine Luftbehälter mit den Lungen in Verbindung. Selbst bei den weitest fliegenden Vögeln sei das Vorhandensein von Luft in den Knochen nicht erforderlich. Die einzigen Knochen, in welchen Crisp überhaupt Luft fand, waren humerus und femur.

M. T. Hardy „Note sur la forme des oeufs des oiseaux.“ Rev. et Mag. de Zool. p. 253. Die Alten berücksichtigten die Form der Eier fast mehr als die Neuere. Der

Verfasser geht die verschiedenen Klassen der Vögel in Bezug auf sein Thema durch, und gelangt zu dem Schlusssatz: *La position de l'oiseau dans le repos ou dans l'action détermine, avant tout, la forme de son oeuf.* Was sagen dazu unsere Oologen?

. E. Blanchard „*De la détermination de quelques oiseaux fossiles et des caractères osteologiques des Gallinacées.*“ Acad. des Sc. natur. Juli 27. Wichtig, aber keines Auszugs fähig.

Georg Buist in Bombay sprach in der Royal Society über die Ursachen und Erscheinungen der Repulsion des Wassers von den Federn der Wasservögel und den Blättern der Pflanzen: Ann. and Mag. Nat. Hist. p. 148. Man schreibe dies mit Unrecht der Anwesenheit von Fett oder Oel in den Federn zu. Wie bei gewissen Wasserpflanzen, so sei es beim Vogel eine dünne Luftschicht, welche das Wasser so zurückhalte oder abstosse, dass es gar nicht mit den Federn in Berührung komme. Das Ordnen und Putzen des Gefieders, wie man es bei Wasservögeln bemerke, geschehe vermuthlich in der Absicht, durch die Application von Oel oder Fett die kleinen Fibern der Federn geschickt zu machen „to entangle the air.“

A. Bogdanoff „*Note sur le pigment des plumes d'oiseaux.*“ Bullet. Soc. J. Nat. Mosc. Tome 29, p. 459—62.

C. Giebel „*Ueber den Sclerotikalring, den Fächer und die Hardersche Drüse im Auge der Vögel.*“ Zeitschr. für die gesammten Naturwissenschaften, 1857, p. 388. mit zahlreichen Abbildungen auf Tafel 7—12. Sehr fleissige ausführliche Arbeit, aber keines Auszugs fähig. Giebel untersuchte zahlreiche Arten aus allen Ordnungen. Es scheint, dass die Functionen dieser drei Theile physiologisch noch keineswegs völlig aufgeheilt sind.

Victor Chatel „*Nouvelles observations sur l'utilité de la conservation des oiseaux dans l'intérêt de l'agriculture.*“ 8. Brochure von 8 Seiten. Paris.“

Ch. Joubert „*La chasse aux oiseaux. Manuel de l'oiseleur ou l'art de prendre, d'élever, d'instruire les oiseaux, soit en volière, en cage ou en liberté, suivi de l'art*

d'empailer les oiseaux et de la loi sur la chasse. Paris. 16.“
Mit Kupfern.

J. Michellet „l'Oiseau.“ Dritte vermehrte und verbesserte Ausgabe. Paris. 331 S. (ins Holländische und Deutsche übersetzt).

Mss. Wright „What is a bird? the forms of birds, their instincts and use in creation considered. London. 18.“
320 S.

L. Brehm „Ueber den Instinct der Vögel.“ Mittheilungen aus der Werkstätte der Natur. I. p. 26.

Cassell „Natural History of the feathered tribes. With woodcuts. London.“ Selbstverlag. Kenne ich nicht.

Ch. Giraud „Etudes ornithologiques. Angers. 18.“
214 S.

„Scripture Birds containing a description of the Birds mentioned in the Bible. With col. illustrations. London. 16.“ 62 S.

E u r o p a .

Cabanis „Journal für Ornithologie“ bringt: 1) Wiese „Beiträge zur Ornithologie Pommerns.“ 2) „Uebersicht der europäischen Vögel in Bezug auf ihr Herbst- und Frühlingskleid, von Past. L. Brehm.“ 3) W. Hintz „Tabellarische Uebersicht der Ankunft und des Wegzuges der Vögel Pommerns.“ 4) „Beobachtungen über ziehende und brütende Vögel in Anhalt im Frühjahr 1857“ von W. Pässler.

Und die „Naumannia“: 1) W. Hintz „Beobachtungen über den Wegzug der Zugvögel im Jahre 1855.“ 2) Dr. Th. Krüper „Der Myvatn und seine Umgebung“ (Island). Sehr hübsche ausführliche Arbeit, mit zahlreichen und wichtigen Bemerkungen über Lebensweise und Verbreitung der einzelnen Arten. 3) Dr. Rohnert „Notizen über südeuropäische Vögel.“ 4) A. Thiele „Nidologische und oologische Beobachtungen.“ 5) Th. Holland „Vögelfauna der Umgegend Stettins.“ 6) A. Rafn „Brutvögel der Insel Syll.“ 7) v. Preen „Beobachtungen über den Zug der Vögel in der Umgegend Schwerins.“ 8) Guido v. Gonzenbach „Auszüge aus meinem ornithologischen Tagebuche.“ 9) C. F. Wiepken „Notizen über den Herbst- und Frühlingszug

der Zugvögel in Oldenburg.“ 10) v. Münchhausen „Excursion auf die Meklenburgischen Binnenwässer.“ 11) Luigi Althammer „Vögel Tyrols.“ u. s. w.

„Catalogue des oiseaux d'Europe offert en 1856 aux Ornithologistes par M. E. Parzudaki, suivie d'une énumération supplémentaire des espèces algériennes, non européennes, d'une liste des espèces acclimatées, et d'une autre de celles données à tort comme d'Europe; rédigé après la dernière classification de S. A. le Prince Ch. Bonaparte.“ Rev. et Mag. de Zool. p. 117. Auch separat erschienen. Nützliche Zusammenstellung.

C. T. Keitel „Verzeichniss der europäischen Vögel nach den neuesten Ermittlungen und Prüfungen mit Angaben der wichtigsten Synonymen und deutschen Namen.“ Berlin. Brochüre von 16 Seiten. Ebenfalls ganz brauchbar, aber ziemlich überflüssig.

„Oiseaux d'Europe et d'Algérie, par le Prince Ch. L. Bonaparte.“ Rev. et Mag. de Zool. p. 55. Critische Bemerkungen über zahlreiche Arten.

L. Brehm „Characterbilder europäischer Vögel“ in Mittheil. aus der Werkstätte der Natur. I. p. 24.

Moquin Tandon „Notes ornithologiques.“ Rev. et Mag. de Zool. p. 489. Eine interessante, namentlich die Eier und Nester der Vögel Südfrankreichs behandelnde ausführliche Arbeit. Mit Vergnügen werden unsere Oologen lesen, was über *Neophron perenopterus*, *Circaetos gallicus*, *Accipiter nisus*, *Strix flammea* und *Scops europaeus* beigebracht ist. Hoffentlich wird die Arbeit fortgesetzt.

Anatole Docteur „Catalogue des Oiseaux du département de la Gironde.“ Bordeaux. 47 S. (Aus den Actes de la Soc. Linnéenne de Bordeaux abgedruckt.)

British Land Birds „Religious tract. Society.“ London. 282 S. 12.

H. G. Adams „Nests and Eggs of familiar British Birds, described and illustrated, with an account of the haunts and habits of the feathered architects etc., second series.“ 16. 60 S. (Young naturalist's library).

R. Laishley „A popular history of British Birds Eggs.“ 16. London. 310 S.

J. G. Wood „My feathered friends.“ London. 12. 400 S.

Blasius Hanf „Verzeichniss der in der Umgebung des Furtteiches bei Mariahoff in Obersteiermark vorkommenden Vögel, mit Bemerkungen über die Lebensweise, Fortpflanzung und Jagd derselben.“ Verhandl. des zool. botan. Vereins in Wien, Band 6, p. 671—700.

G. A. Kornhuber „Die Vögel Ungarns in systematischer Uebersicht, nebst kurzen Angaben über ihre unterscheidenden Charaktere.“ Ein Beitrag zu einer künftigen ornithologischen Fauna des Landes. Presburg 1856. 36 S.

H. Schlegel „Fauna van Nederland. Vogels.“ Leiden. Von diesem hübschen Kupferwerke erschienen zahlreiche neue Lieferungen, und es unterliegt kaum einem Zweifel, dass dasselbe in ununterbrochener Folge zum Schlusse gelangen wird. Auch der Text, leider holländisch, schreitet fort.

C. Sundevall „Svenska Foglarna“ med Text. Stockholm. Querfolio. Erste Lieferung. Die von Akerlund gezeichneten und in Farbendruck recht gut colorirten Abbildungen zählen jedenfalls zu den gelungenen, wenigstens die grosse Mehrzahl derselben. Der Text ist populär, aber doch nicht unwissenschaftlich gehalten. Die Figuren sind häufig in Lebensgrösse. Die erste uns vorliegende Lieferung enthält Fringilliden, und zwar fünf bis sechs Figuren auf einer Tafel. Wir meinen, dieses neue Werk des berühmten Verfassers verdiene die volle Aufmerksamkeit der Sachkundigen.

T. Hammargren „Bemerkungen über Wermlands Vögelfauna.“ Naum. p. 221—28.

J. F. Brandt „Bemerkungen über die Wirbelthiere des nördlichen europäischen Russlands, besonders des nördlichen Ural“ in dem Werke: Der nördliche Ural und das Küstengebirge Pai-Choi, untersucht und beschrieben von einer in 1847—50 durch die Kaiserl. geograph. Gesellschaft ausgerüsteten Expedition. 2 vol. 4. — Jedenfalls einer der wichtigeren Beiträge, deren dieser Jahresbericht zu gedenken hat.

A. Mejakoff „Catalogue des oiseaux observés dans le gouvernement de Wologda.“ in Bullet. Soc. Imp. Natur. Mosc. tome 29, p. 625—35.

„Catalogue raisonné de la collection d'Oiseaux d'Europe

de Maquet-Degland, acquise par la ville de Lille.“ avec 5 pl. Lille 8. 390 S.

Capt. Watkins „The Birds of Andalusia,“ in: The Zoologist, Nov. 1856—57.

Lieut. Thomas Blackiston „Birds of Crimea“ in: The Zoologist 1857, p. 5348 u. s. w.

Lieut. L. H. Irby „List of Birds observed in the Crimea“, ib. p. 5353 u. s. w.

A s i e n.

Von Gould's „The Birds of Asia“ erschien das 9. Heft.

Es enthält die schönen Abbildungen von *Phasianus versicolor*, *Perdix Hodgsoniae*, *Pericrocotus speciosus*, *P. flammeus*, *P. peregrinus*, *P. roseus*, *P. cinereus*, *Cissa venatoria*, *Niphorhamphus superciliosus*, *Picus Cabanisii*, *Palaeornis Luciani*, *P. caniceps*, *P. nicobariensis*, *Parus xanthogenys*, *P. spilonotus*, *P. Jerdoni*. — Es ist wahrhaft zu bedauern, dass das Fortschreiten dieses grossartigen Prachtwerkes ein so langsames ist.

Rev. T. Phillips „Notes on the habits of some birds observed in the plains of Northern India.“ Proceed. Zool. Soc. p. 85.

Diese von Frederik Moore mitgetheilte Arbeit bereichert in anziehender Weise unsere Kenntniss von den Sitten indischer Vögel. Ausführlicher wird von *Halcyon smyrnensis*, *Dicurus macrocerus*, *Lanius lahtora*, *Malacocercus caudatus*, *Pycnonotus pygæus*, *Ploceus baja*, *Corvus splendens*, *Endynamis orientalis* etc. berichtet. Zahlreiche Angaben des Verfassers sind neu, und verrathen den geübten Beobachter.

Capt. H. W. Hadfield „Notes and remarks on a few Birds, in Southern India“ in The Zoologist. 1857, p. 5745. Weniger wichtig.

C. Blyth „British Birds in India“ in Calcutta Review Nr. 55, p. 120. Ohne Widerspruch eine der besten Arbeiten, deren dieser Bericht zu gedenken hat, und sicher auch eine der besten aus der Feder des um die Ornithologie Indiens so hochverdienten Verfassers.

Es lehnt sich dieselbe an den Catalog britischer Vögel in der dritten Ausgabe von Yarrell's History of British Bird, indem jede

Art besonders aufgeführt und mit Bemerkungen über ihr Vorkommen oder ihre Verbreitung in Indien und den angrenzenden Ländern ausgestattet wird. Eine nicht ganz geringe Anzahl britischer Vögel ist östlich bis Afganistan verbreitet, aber nicht darüber hinaus, oder höchstens noch bis zum Thale von Pesháwur und dessen Umgebung. Dies gilt z. B. von *Corvus cornix* und *corone*, von *Monedula turrim*, von *Cypselus apus*, *Coracias garrula* und *Merops apiaster* (beide in Sindh und dem Punjab), von *Pterocles alchata*, von *Rallus aquaticus*, von *Sturnus vulgaris* etc. Der Versuch, eine statistische Uebersicht der zugleich in Europa und Indien vorkommenden Arten zu geben, wird für jetzt dadurch fast unmöglich, dass über die Feststellung der Begriffs der Art noch immer die widersprechendsten Ansichten bestehen. Blyth unterscheidet hier scharf die bestrittene und die allgemein angenommene Gleichartigkeit. Wir mussten dabei der Thatsache gedenken, dass kaum eine Vogelart der britischen Inseln, den Sperling nicht ausgenommen, in der Färbung mit Continentalen ganz übereinstimmt. Blyth stimmt übrigens sehr entschieden mit der augenblicklich von Blasius so siegreich vertheidigten Ansicht von einer weiter zu umgrenzenden Fassung der Art überein. — Dann berührt aber diese Arbeit von Blyth eine Menge anderer auf die Ornithologie Indiens bezüglicher Fragen, so die ausserordentliche vertikale Verbreitung mancher Arten, die Brütcolonien von *Grus antigone*, und zahllosen Wasservögeln auf den Höhen des Tibet, den Gesang der indischen Vögel, das Wandern und Streichen derselben, die Falkuerei der asiatischen Höfe u. s. w. Wie bei uns Schwalben, so sieht man in Indien *Coracias indica* und *Edolus macrocerus* auf den Drähten der electrischen Telegraphen hocken.

E. Eversmann „Kurze Bemerkungen über das Vorkommen und die Verbreitung einiger Säugthiere und Vögel in den wolgo-uralischen Gegenden, und den Steppen der Kirgisen jenseits des Uralflusses.“ Mem. Soc. Imper. Natur. Mosc. tome X, p. 265—81.

A f r i k a.

Th. v. Heuglin's „Reisen in Nordostafrika. Tagebuch einer Reise von Chartum nach Abyssinien mit besonderer Rücksicht auf Zoologie und Geographie.“ 1. B. Gotha. Der bekannte Verfasser zählt in diesem Werkchen die Vögel auf, welche er an den verschiedenen Hauptstationen seiner Reise erlegte. An Mittheilungen über die Lebensweise derselben fehlt es leider gänzlich. Nur für die geographische Verbreitung der einzelnen Arten ist durch diese Arbeit etwas

gewonnen, indem mehrere der berührten Lokalitäten bis jetzt zoologisch unausgebeutet waren.

Dr. L. Buvry's „Streifzüge in Algerien“ in brieflichen Mittheilungen an C. Cabanis. Journ. f. Ornith. p. 62 und 120.

Die erste derselben behandelt in der anziehendsten Weise eine wissenschaftliche Excursion des Verfassers auf das höchst aufsteigende Gebirge der Provinz Constantine, den Djebel Edugh, und insbesondere die Thierwelt dieses reichen Gebietes, die zweite, eben so ansprechend geschrieben, den Fetzarasee in derselben Provinz. Trotz der ausserordentlichen Hindernisse, welche dem Jäger in jenen Gegenden das Vordringen erschweren, gelang es Buvry doch, manche hübsche Beobachtung zu sammeln, so über *Merops apiaster*, *Ibis falcinellus*, *Cygnus olor* und *musicus*, *Erismatura mersa*, *Glareola torquata*, *Carbo pygmaeus* n. s. w. Wir sehen mit Ungeduld den versprochenen weiteren Mittheilungen des Verfassers über seine Jagden im alten Lambessa entgegen.

Auch die „Mittheilungen aus Algerien“ desselben Verfassers in der Zeitschrift für allgemeine Erdkunde, April 1857, p. 308 sind ornithologisch wichtig.

Es wird eine Uebersicht der Vögel der algerischen Sahara gegeben. Sehr zahlreich an Individuen sind gewisse Gallinaceen. Man trifft Ketten von 3—400 Stück. Von Saxicolen werden namhaft gemacht: *oenanthe*, *stapazina*, *leucura*, *saltatrix*, *monacha*, *lugens* und *gutturalis*.

A. Brehm's ornithologisches Tagebuch wird in Cabanis Journal für Ornithologie in weiteren Auszügen mitgetheilt. Wir bedauern, dass es nicht möglich geworden ist, die zoologischen Früchte seiner Reisen im nordöstlichen Afrika, also die Arbeiten Brehm's, Vierthaler's und von Müller's in einem Gesamtwerke vor das Publikum zu bringen.

„Catalogue of Birds collected at Cap Lopez in Western Africa, by P. B. du Chaillu, with notes and descriptions of new species by J. Cassin.“ Proceed. Acad. Nat. Sc. of Philad.

Dieses Verzeichniss ist schon darum besonders zu beachten, weil es über die ornithologische Ausbeute auf einem bisher unerforschten Terrain berichtet. Ausser verschiedenen neuen Arten begegnen wir darin manchen bekannten, deren Vorkommen hier unter dem Aequator befremdlich genug erscheint, so z. B. unserem Nacht-

reier, der nordöstlichen *Sylvietta micronra*, dem südlichen *Merops bullockioides*, der indischen *Cisticola cursitans*, der *Fringillaria tahapisi*, u. s. w.

Livingstone's berühmtes Werk „Missionary travels in South - Africa“ enthält ornithologische Bemerkungen von grossem Interesse eingestreut.

Als solche möchten hervorzuheben sein die Angaben über das Brüten des Korwé-Vogels (*Buceros erythrorhynchus*), über die ausserordentliche Mannigfaltigkeit der befiederten Bewohner des Zambese; über den Gesang der südafrikanischen Vögel, an verschiedenen Stellen des Werkes; über den Strauss in sehr ausführlicher Weise; über ein wunderbar kunstvoll gearbeitetes Nest, u. s. w.

Dr. G. Hartlaub „System der Ornithologie Westafrika's“ 1. B. 8, Bremen. Ref. hofft in diesem Buche, zu dessen Herausgabe ihn mehrjährige Vorarbeiten und Studien ermuthigen konnten, die Summe unserer Kenntnisse von den Vögeln des westlichen Afrika, d. h. des Küstengebietes von Senegal bis Benguela, gehoben zu haben. Die Zahl der beschriebenen Arten beträgt 758, mit wenigen Ausnahmen von uns selbst untersucht, beschrieben und gemessen. Mit besonderer Vorliebe wurde der die geographische Verbreitung behandelnde Theil des Werkes gearbeitet. An 80 Arten europäischer Vögel kommen häufiger oder seltener auch in Westafrika vor. Tabellarische Zusammenstellungen erläutern das Verhältniss der westlichen Arifauna zu der Südafrika's und der nordöstlichen Provinzen. Der synonymische Theil der Arbeit ist eclecticisch behandelt. Zu einer Ueberarbeitung des Buches liegen bereits zahlreiche und wichtige Materialien vor.

Dr. C. Bolle „Mein zweiter Beitrag zur Vogelkunde der canarischen Inseln“ in Caban. Journ. für Ornithol. p. 258 und 305. Nicht minder anziehend geschrieben, als die früher besprochenen Mittheilungen des Verfassers über denselben Gegenstand, enthält dieser zweite Beitrag zahlreiche Zusätze und Berichtigungen von grossem Interesse. Wir wünschten sehr diese schönen Arbeiten Bolle's in zusammenhängender Gestalt zu besitzen, und gedenken gern nochmals des Vergnügens, mit welchem wir dieselben gelesen haben.

„Verzeichniss centralafrikanischer und nordafrikanischer Vögel, abgebildet in des Herzog Paul Wilh. von Württemberg's

Icones ineditae und im Jahre 1842 aufgestellt.“ Bald. Naum. 1857. Heft 6, p. 432—35. 73 Arten mit grösstentheils unpublicirten neuen Namen, aber sämmtlich inzwischen beschrieben von Anderen und natürlich unter anderen jetzt allein gültigen Namen. Es war in der That eine höchst unglückliche Idee, dieses uns seit langer Zeit wohlbekannte ziemlich werthlos gewordene Verzeichniss zu publiciren, und wir möchten dem Herausgeber der Naumannia den wohlgemeinten Rath ertheilen, in solchen Fällen eigener Incompetenz Sachverständige zu consultiren.

A m e r i k a.

„Naturhistoriske Bidrag til en Beskrivelse af Grønland.“ Besonders abgedruckt aus Rink's Werk über Grønland. Darin die Vögel von J. Reinhardt. 1 Vol. Kopenhagen 1857. Ein Namenscatalog mit Anmerkungen zu einzelnen Arten. Reinhardt kennt 111 Vögel als in Grønland erlegt; unter ihnen ist etwa der 4te Theil amerikanisch. Jedenfalls ein wichtiger Beitrag.

„Liste complete des espèces d'oiseaux recueillies par l'expédition du Prince Napoleon Bonaparte vers les régions extrêmes du nord de l'Europe, par E. Fairmaire. Edinb. new Phil. Journ. 6, p. 191. Nur die bekannten Arten.

Dr. T. M. Brewer „North American Oology“ being an account of the geographical distribution of the birds of North America, during their breeding season, with figures and descriptions of their eggs. Part 1. Rapaces and Fissirostres. 1 vol. 4. Ein treffliches Originalwerk, höchst wissenschaftlich und ausführlich behandelt, und, wie zu erwarten stand, des Neuen viel bietend. Kupfertafeln sahen wir noch nicht. Die Smithsonianische Institution in Washington giebt dieses Werk heraus, welches sich in würdigster Weise an Baird's umfassende Arbeit über die Vögel Nordamerika's schliesst.

Dr. Rufus H a y m o n d „Birds of South-eastern Indiana.“ Proceed. Acad. Nat. Sc. of Philadelphia, 1856, p. 286. Ganz angemessen aber kurz behandelt.

Fr. Brendel „Vögel der Umgegend Peoria's in Illinois“ in Giebel Zeitschr. für Naturk. p. 420. Mit Messungen

an frischen Exemplaren. Von *Grus cinerea* will der Verfasser Männchen und Weibchen erlegt haben!! Kein amerikanischer Autor erwähnt dieses Vögel.

Dr. F. A. L. Thienemann „Ueber die von Dr. Gundlach eingesendeten Eier und Nester cubanischer Vögel.“ Caban. Journ. f. Ornith.

Dr. Gundlach's „Beiträge zur Ornithologie Cuba's, mitgetheilt und mit Anmerkungen von Dr. J. Cabanis.“ Journ. für Ornithol. Es werden in dieser ungemein wichtigen Arbeit nicht weniger als 251 Arten kritisch behandelt. Natürlich ist der die Feststellung der Art umfassende systematische Theil Cabanis Verdienst; aber zahlreiche und zum Theil sehr interessante Beobachtungen Gundlach's über das Leben der Vögel Cuba's verleihen dieser Zusammenstellung besonderen Reiz. Jedenfalls zu den besten Documenten über westindische Ornithologie zählend.

Dr. G. Hartlaub „Zur Ornithologie Südamerika's“ in Cabanis Journ. p. 36. Diese Zusammenstellung stützt sich zunächst auf Burmeister's Werk über die Vögel Brasiliens, auf Cassin's Bearbeitung des ornithologischen Theils der Chileexpedition der vereinigten Staaten, auf Desmur's Bearbeitung der Vögel Castelnau's und auf P. L. Selater's immer mächtiger anwachsende Arbeiten über die Vögel Südamerika's.

P. L. Selater fährt fort uns mit wichtigen Beiträgen zu unserer Kenntniss der Vögel Südamerika's zu beschenken. Sein Verzeichniss der Vögel St. Fe de Bogota's erfährt fortwährend Nachträge und Berichtigungen und ist jetzt auf 510 Arten angewachsen; unter diesen figuriren die Colibri's mit mehr als 70 Arten. Proceed. Zool. Soc. p. 15.

P. L. Selater „List of Birds collected by Th. Bridges in the valley of St. Jose in California.“ Proceed. Zool. Soc. p. 121.

Es werden hier 33 Arten aufgeführt, unter diesen *Glaucidium californicum* Sch. (infuscatum Cass.), *Lanius excubitorides*, *Toxostoma redivivum*, *Sitta aculeata* Cass., *Pipilo oregonus*, *Picus Gairdneri*, *Picus Nuttallii* (Wilsoni, Malb.), *Callipepla picta* u. s. w.

P. L. Selater „List of additional species of Mexican

Birds, obtained by A. Sallé from the environs of Jalappa and St. Andres Tuxtla.“ Proceed. p. 201.

Noch 22 Arten. Neu ist nur *Comptosoma imberbe* mit fig. cap. (Unserem Ornithion inermis verwandt, wie es scheint). Auch der von C. pumilio ganz verschiedene *Cyanocorax nanus* ist dabei.

P. L. Sclater „On a collection of Birds made by Signor Matteo Botteri in the vicinity of Orizaba in South Mexico.“ Proc. Zool. Soc. p. 210.

Zählt 38 Arten auf, darunter den sehr seltenen *Vireolanus melitophrys*, *Spiza versicolor*, *Picus iardinei*, *Cotyle flavigaster*, *Neochloe rufipennis* n. sp., *Zonotrichia Botterii* u. s. w.

P. L. Sclater „On a collection of Birds received by M. Sallé from Southern Mexico“ ib. p. 226.

Behandelt 80 von Ad. Boncard gesammelte Arten. Unter diesen erscheint zum ersten Male als mexicanisch *Sarcorhamphus papa*; ferner *Ciccaba torquata*, *Buteo Ghiesbrechtii*, *Attila citreopygia*, *Ocyalus Waglerii*, *Goniaphea concreta*, *Euphonia Gouldii*, *Diplopterus excellens* n. sp., *Conurus Petzii*, *Canceroma cochlearia* von Cateman u. s. w.

P. L. Sclater „On a collection of Birds transmitted by Mr. H. W. Bates from the Upper Amazon.“ Proceed. p. 261.

Die Mehrzahl dieser Vögel wurde am Rio Javarri gesammelt, so *Chiroxiphia regina*, *Jodopleura Isabella*, *Eubucco aurantiicollis* u. s. w. Das Gebiet des oberen Amazonenflusses zählt, ornithologisch betrachtet, zu den reichsten der Erde.

A. Sallé „Liste des Oiseaux rapportés et observés dans la republique Dominicaine (ancienne partie espagnole de l'ile St. Domingo).“ Proceed. p. 230.

Die grosse Mehrzahl dieser namhaft gemachten 61 Arten bewohnt zugleich Nordamerika. *Spindalis multicolor* ist selten, ebenso *Loxigilla violacea* (sehr verschieden von *L. portoricensis*). *Numida meleagris* wird als völlig verwildert mit aufgeführt. Sehr werthvolle Beobachtungen über die Lebensweise einzelner Arten, so über *Todus dominicensis*, welchen Sallé für gleichartig mit *subulatus* und *angustirostris* hält, über *Columba leucocephala* und *Geotrygon montana*; über *Trogon roseigaster*, *Conurus chloropterus* u. s. w.

Ch. L. Bonaparte „Catalogue des Oiseaux recueillis à Cajenne par M. Desplanches.“

In dieser namentlich in Hinsicht auf geographische Verbreitung und Sicherheit des Fundortes wichtigen Arbeit werden 130 Ar-

ten aufgezählt, unter ihnen *Accipiter tinus*, *Sylvicola chryseola* n. sp. von Bonaparte als specifisch verschieden von der aestiva Nord-america's betrachtet, *Planchesia fuliginosa* (Gm.), *Ortygometra Schomburgkii* u. s. w. — Von allen Abhandlungen Bonaparte's im Separatabdruck die seltenste!

A u s t r a l i e n .

M. Elsey „Brief an Gould vom Victoriaflusse in Nord-australien datirt und viel Interessantes enthaltend.“ Proceed. Zool. Soc. p. 23. Hübsch über die Lebensweise von *Plotus*.

Samuel Hannaford „Jottings in Australia or notes on the Flora and Fauna of Victoria.“ 1 vol. in 8. 100 S. Melbourne 1856. Hauptsächlich botanisch, aber mit eingestreuten Bemerkungen über einzelne Vögel, so über *Petroica multicolor*, über *Malurus cyaneus*, über den Fairy Martin u. s. w. Ziemlich unbedeutendes Büchlein von einem frommen und gefühlvollen Naturfreunde geschrieben.

H. Wallace „On the Natural History of the Aru-islands.“ Ann. and Mag. of Nat. Hist. p. 475. Wir machten bereits aufmerksam auf die hervorragende Wichtigkeit der endlichen naturwissenschaftlichen Durchforschung der Papualänder durch einen Reisenden von so bewährter Tüchtigkeit, als Wallace es ist.

Von Macassar aus erreichte dieser als erste Station seiner Unternehmung, die Gruppe der kleinen Ke-Inseln, wo ihm bereits die Gattungen *Megapodius*, *Carpophaga*, *Ptilinopus*, *Macropygia*, *Dicrurus*, *Tropidorhynchus*, *Zosterops*, *Nectarinia*, *Rhipidura* und *Lorius* begegnen. Aber eine ungleich reichere ornithologische Fauna erwartete ihn auf den grösseren Aru-Inseln. Hier wurden 116 Arten gesammelt, nämlich 11 Alcediniden, 13 Muscicapiden, 10 Psittaciden, 9 Meliphagiden, 2 Paradiseae und 12 Tauben. Weder Piciden noch Bucerotiden. Viele Arten nicht verschieden von schon bekannten Neuguinea's. Eurylaimiden und Meropiden scheinen ebenfalls zu fehlen. Der Casuar ist häufig. Phonygama wurde beobachtet. Ein Rabe mit blauer Iris wird neu sein. Von interessanten Neuguinea-Vögeln fand Wallace auf den Aru-Inseln z. B. noch *Microglossus aterrimus*, *Ardes chrysomela* und *telescophthalma*.

Accipitres.

Geler. Nitzsch „Beobachtungen zur Naturgeschichte des

fahlen Geiers“ (*Vultur fulvus*) in Giebel Zeitschr. für die ges. Naturk. 1857. p. 364.

Dr. C. Bolle „Der californische Condor,“ nach Taylor aus dem Zoologist übersetzt. Ein prachtvolles Weibchen wurde am Strande bei Monterey erlegt. Bei dieser Art ist das Weibchen entschieden kleiner als das Männchen.

P. L. Selater erklärt sich für die spezifische Verschiedenheit von *Cathartes burrowianus*. Proceed. Z. S. p. 3.

Falken. Ueber die Archibuteo-Arten Nordamerika's schreibt ausführlich J. Cassin: Proceed. Acad. N. Sc. Philad. p. 211. *A. lagopus* und *A. St. Iohannis* sind östliche Arten, während *A. ferrugineus* der Westküste angehört.

„Aphorismen über Falken,“ von J. H. Blasius. Naum. p. 266—305.

J. H. Blasius „Die Weihen Europa's.“ Naum. p. 307—324.

Ausführlich über *Aster palumbarius* Pfarrer Snell. Jahrb. des Vereins für Naturk. im Herzogth. Nassau. Heft 12.

„Der Jagdfalke und die Falkenbeize“ von Baron v. Müller. Cab. Journ. für Ornith. V. p. 169.

Ueber *Buteo rufinus* schreibt A. v. Pelzel. Sitzungsber. mathem.-naturw. Klass. Wien. Acad. Wissensch. Bd. 24. p. 380.

P. L. Selater erklärt *Cymindis Wilsoni*, nach Untersuchung des Original-exemplars für eine gute von *uncinata* spezifisch verschiedene Art. Gundlach soll kürzlich neue Exemplare erhalten haben. Proceed. Z. S. p. 3.

Neue Arten: *Spilonis rufpectus* Gould. Von Wallace aus Celebes eingesandt. Proceed. Z. S. p. 222. — *Aquila Desmurei*, Verr. Hartl. Syst. Westafr. p. 4. Bissao. — *Circaetus melanotis*, Verr. Hartl. ib. p. 7. Bissao. — *Nisus Hartlaubii*, Verr. ib. p. 16. Casamance.

Eulen. John Wolley über Nest und Eier von *Strix lapponica* in Lappland. Proceed. Z. S. p. 56.

Für die kleine, unserer passerina ähnliche, von Cassin irrtümlich für Temminck's *Str. infusata* gehaltene Eule Californiens schlägt Selater den Namen *Glaucidium californicum* vor. Proceed. p. 4.

Passeres.

„Observations sur les Passereaux“ par Mons. Pucheran. Extr. du Bullet. Soc. philom. de Paris. 1856. p. 40.

Nicht unwichtige kritische Berichtigungen über *Pachyrhamphus Spixii* Sw., über *Dryocopus eburneirostris*, welchen Pucheran für nicht gleichartig mit *Xiphorh. flavigaster* Sw. hält; ferner über *Nyctibius leucopterus*, welches der Urutau Azara's, also *N. cornutus*

Vieill. sein soll; über Azara's Ibijou, der mit *Nyctidromus grallarius* gleichartig erklärt wird; *Caprimulgus ocellatus* Tschudi's sei gleich *C. brasilianus* Pr. Wied u. s. w. Cassin's Ansichten über die genannten Caprimulgiden lauten bekanntlich abweichend.

C. L. Bonaparte „Parallelismo fra la tribu dei cantori fissirostri e quella dei voluceri hianti e dei notturni o vero insidenti.“ (Estratto dalle Rivista Contemporanea. Febr. 1857). Fleissige Arbeit, wie wir deren verschiedene ähnliche des Verfassers besitzen.

Dr. Th. Forster „On the irregularity of the return of swallows and other vernal migratory tribes in 1857.“ Journ. Linn. Soc. Proceed. vol. I. p. 40.

Caprimulgidae. Neu ist: *Caprimulgus Fossii*, Verr. von Gabon. Hartl. Syst. Westafr. p. 23.

Cypselidae. W. A. Bernstein „Beiträge zur Kenntniss der Gattung *Collocalia*.“ Separatabdruck aus den Verh. Kais. Leopold. Acad. Naturf. 21 S. Behandelt *Collocalia esculenta* und *idifica*.

Zur Anatomie der Mauerschwalbe (*Cypselus apus*). Nach Chr. L. Nitzsch Untersuchungen. Gieb. Zeitschr. für die ges. Naturw. 1857. p. 237.

Neu ist: *Cypselus borealis* Kennerly. Proc. Ac. N. Sc. Philad. 1857. p. 202 von Puget Sound. Auch *C. Fauzi* wurde dort erlegt.

Hirundinidae. *Hirundo ciris* Pall. wurde nach Brandt am Amur wiedergefunden.

Pässler berichtet über Nest und Eier von *Hirundo rufula*, welche Schrader in Griechenland beobachtete, und zwar in den Gebirgen um Missolounghi. Das Nest ist geformt wie bei *Sitta syriaca*. Eier schneeweiss. Caban. Journ. f. Ornith. p. 116.

Neu ist: *Atticora nitens* Cass. Proc. Ac. Philad. p. 28. Munifluss.

Coraciidae. Zur Anatomie der Blauracke (*Coracias garula*). Nach Chr. L. Nitzsch Untersuchungen in Gieb. Zeitschr. ges. Naturw. 1857. p. 318. Taf. 3.

Trogonidae. Neu: *Trogon Eytoni*, Fras. Proc. Zool. Soc. p. 368. Vielleicht nur Varietät von *T. collaris*.

Meropidae. Neu ist *Meropiscus Mülleri* Cass. Proc. Ac. Philad. p. 37. Munifluss.

Alcedinidae. Neu: *Halcyon fulgidus* Gould. Insel Lombok. Proc. Z. Soc. 1857. p. 65. — *Ispidina ruficeps* Hartl. Syst. Westafr. p. 262. Aguapim.

Momotidae. Selater gab eine sehr hübsche monographische Uebersicht der bis jetzt bekannten Arten dieser Familie in den Proceed. Zool. Soc. p. 248. Er unterscheidet die Gattungen *Momotus*

mit den 12 Arten *brasiliensis*, *aequatorialis*, *microstephanus*, *Nattereri*, *subrufescens*, *bahamensis*, *Lessonii*, *caeruleiceps*, *mexicanus*, *castaneiceps*, *semirufus* und *cyanogaster*; dann die Gattung *Hylomanes* mit den Arten *momotula* und *gularis*; ferner die Gattung *Prionirhynchus* mit den Arten *platyrhynchus* und *carinatus*, und endlich die Gattung *Eumomota* mit der schönen Art *superciliaris*. — Levaillant's *Motmot Dombé* hält Sclater für nicht wissenschaftlich begründet, und *M. psalurus* Pucher. für wahrscheinlich gleichartig mit *Lessonii*. Eine beigelegte tabellarische Uebersicht erläutert die geographische Verbreitung dieser specifisch südamerikanischen Form. Proc. Zool. Soc. p. 248.

Neu sind: *Momotus aequatorialis* Gould. Proc. Z. Soc. p. 223. Rio Napo. — *M. semirufus* Jardine. Edinb. New Philos. Journ. V. p. 256. Quito. — *M. microstephanus* Sclat. l. c. Neugranada. — *M. Nattereri* Sclat. l. c. Yungas-Gojaz in Brasilien.

Abgebildet: *Prionirhynchus carinatus* in Proc. Zool. Soc. 1857. pl. 128.

Bucconidae. Ueber die Lebensweise von *Tetragonops rhamphastinus* vergl. Jardine nach Jameson Edinb. N. Ph. Journ. p. 255.

Rhamphastidae. Neu ist: *Selenidera spectabilis* Cass. Proc. Ac. Philad. 1857. p. 214. Cocujos de Veragua.

Tenuirostres.

Upupidae. C. Giebel zur Anatomie von *Upupa epops*. nach Chr. L. Nitzsch Untersuchungen mitgetheilt. Zeitschr. f. ges. Naturwiss. p. 236.

Nectariniadac. Neu: *N. Jardinei* Verr. Hartl. Syst. Westafr. p. 47. Gabon. — *N. Hartlaubii* Verr. ib. p. 50. Angola. — *N. Reichenbachii* Hartl. ib. Gabon.

Trochilidae. Ueber das Nest von *Trochilus gigas* schreibt Sir W. Jardine. New Edinb. Phil. Journ. p. 257.

Neu sind: *Phaetornis viridicaudata* Gould. Proc. Z. S. p. 14. Rio Janeiro. — *Ph. episcopus* G. ib. Demerara. — *Ph. obscura* G. Rio de Janeiro.

Gould's Prachtwerk über die Colibri's nimmt einen wenn auch langsamen Fortgang.

Certhidae. Oratio Antinori „Ueber das Nest von *Sitta syriaca*. Naum. p. 429.

Eine monographische Notiz über *Campylorhynchus* giebt P. L. Sclater. Proc. Ac. Phil. 56. p. 263. Er kennt 13 Arten.

Neu sind: *Campylorhynchus humilis* Sel. Mazatlan. — *C. stria-*

icollis Sel. Neugranada. — *C. pardus* Sel. ib. Proc. Zool. Soc. pl. 130. St. Martha. — *A. guttulatus* Sel. Proc. Zool. Soc. pl. 130.

Weitere Beiträge zur Fortpflanzungsgeschichte von *Maenura superba* giebt L. Becker in Melbourne. Cab. Journ. V. p. 293. Nest, Ei und Junge werden beschrieben. Das Ei ist von der Grösse des Entenei's, hellaschgrau mit schwach bräunlicher Fleckung.

Dentirostres.

Lusciniaedae. Die Sylvien der Insel Sardinien von A. Hansmann n. Naum. p. 404—429. Sehr instructiv und anziehend geschrieben. 25 Arten.

W. Pässler schreibt sehr instructiv über Nest und Eier von *Sylvia cisticola*. Caban. Journ. Ornith. p. 115. Die Farbe der Eier scheint merkwürdig wechselnd zu sein.

Pastor L. Brehm „Die Mauser und die daraus hervorgehende Verfärbung der Bach- und Schaafstelzen.“ Cab. Journ. p. 25.

C. Käsermann „Einige Beobachtungen über *Anthus aquaticus*.“ Naum.

Ueber *Parus meridionalis* schreibt Selater Proceed. Zool. Soc. p. 421. El Jacale. Die Art ist unzweifelhaft verschieden von *P. atricapillus* Nordamerika's.

Neu sind: *Orthotomus Hägelii*. v. Pelzeln Sitzungsber. Wien. Acad. Wissensch. XXIV. p. 369. Steht *O. flavoviridis* zunächst. — *Prinia striolata* v. Pelzeln ib. Caschmir. — *Drymoeca naevia* nob. Syst. Ornith. Westafr. p. 56. Senegal. — *D. erythrops* nob. l. c. p. 58. Calabar. — *Eremomela pusilla* nob. ib. Senegambien. — *E. viridiflava* nob. ib. Senegambien. — *Chloropeta moesta* nob. ib. Gabon. *Bradyornis ruficauda* Verr. Hartl. Syst. Westafr. p. 66. Gabon. — *Parinia leucophaea* nob. ib. p. 71. Gabon. — *Malurus coronatus* Gould. Proceed. Z. Soc. p. 221. Victoriafluss in Nordaustralien.

Turdidae. Monographisch bearbeiteten die Gattung *Oreocinclu* Prinz C. L. Bonaparte Guér. Rev. et Mag. Zool. p. 204 und C. Sundevall Cab. Journ. p. 157. Ersterer unterscheidet als Arten: 1) *O. aurea* Bp. Nordasien, Europa. 2) *O. Horsfieldii* Bp. Java. 3) *O. lunulata* Gould. Australien. 4) *O. Heinei* Cab. Japan. 5) *O. dauma* Bl. Centralasien. 6) *O. mollissima* Centralasien und 7) *O. spiloptera* Bl. Ceylon. Letzterer dagegen 1) *raria* Pall. 2) *dauma*. 3) *malajana* Sund. (*Horsfieldii* Bp.) 4) *lunulata* Lath.

Als neu wurden beschrieben: *Pitta concinna* Gould. Insel Lombok (Wallace) (= *P. mathildae* J. Verr. Rev. et Mag. de Zool. p. 303. pl. 2. fig. med.) — *Turdus fulviventris* Selat. Proceed. Zool. Soc. p. 273. Neugranada. — *T. ignobilis* Sel. ib. Neugranada. — *Cinclus leuconotus* Sel. ib. Ecuador. Neugranada. — *Melanoptila glabrirostris*

Scl. ib. 275. Honduras c. fig. cap. Höchst interessante neue Form. Ganz schwarz. — *Crateropus apicalis* (Licht) Senegal Hartl. Syst. Westafr. p. 76. — *Cossypha pyrrhopygia* Hartl. Westafr. l. c. p. 78. — *Oriolus crassirostris* nob. ib. p. 266. Insel St. Thomé. — *Trichophorus canicapillus* nob. ib. p. 84. — *Xenorichla pallescens* nob. ib. p. 86. Gambia. — *Trichoph. tricolor* Cass. ib. 265. Munifluss. — *Andropadus virens* Cass. Proceed. Ac. Philad. 57. p. 34. Munifluss. — Ferner :

(Formicariinae.) *Formicarinus trivittatus* Scl. Proceed. Z. Soc. p. 46. Amazonas. — *Grallaria ferrugineiceps* Scl. ib. p. 126. pl. 126. Venezuela. — *G. loricala* Scl. ib. Caraccas. — *Conopophaga castaneiceps* Scl. ib. Neugranada. Ostperu (ardesiaca Tsch.) — *Hypocnemis elegans* Scl. ib. Bogota. — *H. melanopogon* Scl. ib. Chamicuros. — *Myrmeciza hemimelaena* Scl. ib. Bolivien. — *Formicivora haematonota* Scl. ib. Chamicuros. — *F. melaena* Scl. ib. Neugranada. — *F. urosticta* Scl. ib. pl. 126. fig. 1. Oestliches Brasilien. *F. Hauxwellii* Scl. ib. p. 131. pl. 126. fig. 2. — *F. cinerascens* Scl. ib. Chamicuros. — *Herpsilochmus pectoralis* Scl. ib. Patria? — *Thamophilus melanothorax* Scl. ib.

Vergleiche ebendas. Sclater über *Dasythamnus xanthopterus* Burmeist. Vög. Bras. III. p. 81. und über *Thamophilus melanocephus* Spix.

Tyrannidae. Die beste Arbeit, deren wir unter dieser Rubrik zu gedenken haben, ist Sclater's „Review of the species of South American subfamily Tityrinae.“ Proceed. Zool. Soc. p. 67—80. Sclater will die Tityrinen im System zwischen den Tyranniden und Cotingiden gestellt wissen. Er unterscheidet die Gattungen *Tityra* mit 6 Arten und *Pachyrhamphus* mit 16 Arten, welche in die Subgenera *Platypsaris*, *Pachyrhamphus*, *Callopsaris* und *Bathmidurus* vertheilt werden. Ein angehängtes Schema erläutert sehr zweckmässig die geographische Verbreitung.

Als neu wurden beschrieben: *Pachyrhamphus albo-griseus* Sclat. Proc. Z. Soc. p. 78. Neugranada. — *Tyrannus atrifrons* Sclat. ib. p. 274. Ecuador. — *Camptostoma imberbe* Scl. ib. p. 203. fig. capit. Steht meiner Form *Ornithion* nahe. — *Neochloe rufipennis* Scl. ib. p. 213. Orizaba (ob den Vireoninen beizuzählen?) — *Todirostrum calopterum* Scl. Proc. p. 82. pl. 125. fig. 1. Rio Napo. — *T. capitale* Scl. ib. fig. 2. Rio Napo. — *T. exile* Scl. ib. fig. 3. Neugranada. Sclater giebt dann eine Uebersicht der 22 ihm bekannten *Todirostrum*-Arten.

Muscicapidae. Neue Arten: *Petroica cerciniventris* Gould. Proceed. Z. Soc. p. 221. Victoriafluss in Nordaustralien. — *Schwaneria caeruleata* Bp. Rev. et Mag. de Zool. p. 49. pl. 5. — *Myiagra caledonica* Bonap. ib. Neucaledonien. — *Tchitrea melampyra* Verr.

Hartl. Syst. Orn. Westafr. p. 90 Gabon. — *Myiophila concreta* Temm.
Hartl. ib. p. 95. Guinea. — *Muscicapa Rüsi* Hartl. ib. 96. Aguapim
— *M. modesta* nob. ib. 96. Gabon. — *M. comitata* Cass. Proc. Ac.
Philad. März 1857. Munifluss.

Bonaparte über *Moquinus albicaudus* (Strickl.) Rev. zool.
p. 49. pl. 5. fig. bon.

Ampelidae. Ueber Nest und Eier von *Bombycilla garrula*
schrieb sehr instructiv John Wolley. Proceed. Zool. Soc. p. 95.
pl. 122. Er beobachtete die Fortpflanzung dieses Vogels in Lappland.

Neue Arten: *Cotinga amabilis* Gould. Proceed. Z. Soc. p. 64.
pl. 123. Guatemala. — *Lipauges rufescens* Sel. ib. p. 276. Coban.

Laniadae. John Cassin schreibt über die *Lanius*-Arten
Nordamerika's. Proceed. Ac. Nat. Sc. of Philad. p. 212. Er unter-
scheidet 1) *L. borealis* Vieill. Nördl. und Westl. 2) *septentrionalis*
Gm. Mittlere und nördl. Staaten. 3) *ludovicianus* L. Südl. Staaten.
4) *excubitorides* Sw. Westliche und nördl. Staaten. 5) *elegans* Sw.
Westlich und Nordwestl.

Als neu wurden beschrieben: *Fraseria cinerascens* (Temm.)
Hartl. Syst. Ornith. Westafr. p. 102. Ashantee. — *Dryoscopus cucul-
latus* (Temm.) Hartl. ib. p. 111. Senegal. — *D. bicolor* Verr. Hartl.
ib. p. 112. Gabon. — *Sigelus senegalensis* nob. ib. p. 112.

Conirostres.

Corvidae. Neu ist: *Garrulus minor* J. Verr. Rev. et Mag.
de Zool. p. 439. pl. 14. fig. bon. ist *G. obscurus* A. Brehm. Algerien.
Spanien. Allerdings kleiner und dunkler gefärbt als unser Heher.
Im übrigen kaum verschieden (♂ und ♀ in der Bremer Sammlung).

Paradiseidae. A. Wallace schreibt ungemein interes-
sant über den grossen Paradiesvogel der Arru-Inseln (*Paradisea apoda*).
Ann. and Mag. Nat. Hist. p. 411. Er ist der Burong-mati der Ma-
layen, der Fanchan der Arru-Bewohner. Am prachtvollsten erscheint
der Vogel bei verticaler Ausbreitung der Federzier über dem Rücken.
Wir hatten übrigens von dieser ausserordentlichen sonnenartigen Um-
hüllung des Vogels bereits Kenntniss durch eine Mittheilung La-
frenay's.

Sturnidae. Neu: *Irida Eytoni* Fraser. Proceed. Zool. Soc.
p. 368. Nordostafrika. — *Lamprocolius cupreocauda* (Temm.) Hartl.
Syst. Ornith. Westafr. p. 119.

Fringillidae. Neu sind: *Pyrrhula aurantiaca* Gould. Pro-
ceed. Zool. Soc. 1857. p. 222. Gebirge westlich von Cashmir. — *Zo-
notrichia Botteri* Selat. ib. p. 214. Orizaba. — *Sycobius Rachelliae*
Cass. Proc. Acad. Philad. 1857. p. 36. Munifluss (Du Chaillu). — *Hy-
phantornis magnirostris* Verr. Hartl. Westafr. p. 127. — *Estrelda vi-*

nacea Hartl. Westafr. p. 143. Casamause. — *Ortygospiza lunulata* (Temm.) Hartl. Westafr. p. 148. Senegal.

Nach Selater fällt Bonaparte's *Passerculus zonarius* mit *Peucaea Lincolni* -- und *Coturniculus Henslowii* mit *C. passerinus* zusammen.

C. Gloger „Ueber Schnabelabweichungen bei Körnerfressern.“ Cab. Journ.

Alaudinae. Neu dürfte sein: *Megalophonus occidentalis* Hartl. Westafr. p. 153. Gabon.

Emberizinae. Ueber verschiedene Ammern äussert sich Prinz C. L. Bonaparte in Rev. et Mag. de Zool. p. 160. *Plectrophanes Macounii*. Lawrence, aus dem westlichen Texas wird für der Gruppe der Montifringillen verwandt und Rhodopechys phoenicoptera nahe stehend erklärt. *Emberiza albida* Blyth sei ein junger Vogel von *E. pithyornis* und *E. scotata* Bononi, abgeb. pl. 7, sei ein jüngeres Männchen derselben Art (? wäre ein sehr ungewöhnliches Farbenkleid). Die Vermuthung, dass Strickland's *Emb. cinerea* (Smyrna) ein junger Hypocentor sei, scheint uns gänzlich falsch.

Neu ist wohl: *Emberiza Buchananii* Blyth. Rev. et Mag. de Zool. p. 163. Himalaja. Bonaparte vertheilt die ächten Ammern in die Gattungen Synchramus, Plectrophanes, Centrophanes, Onychospina, Hypocentor, Fringillaria, Hortulanus, Schoenicola, Emberiza und Buscarla.

Tanagridae. Von P. L. Selater's „Monograph of the Birds forming the genus Calliste“ erschien part 2, enthaltend die grösstentheils wohl gelungenen Abbildungen von *Calliste pulchra*, *C. Arthusi*, *C. vitriolina*, *C. cajana*, *C. flava*, *C. pretiosa*, *C. cyanoptera*, *C. Desmarestii*, *C. Schrankii*, *C. guttata*, *C. punctata* und *C. graminea*. Das Werk zählt, wie schon gesagt, zu den besten und gelungensten in seiner Art, und der Preis wurde so gestellt, dass dasselbe nicht bloss den grossen Bibliotheken zugänglich ist.

Neu: *Euphonia Gouldi* Selat. Proceed. Zool. Soc. 1857. p. 66. pl. 124 ♂ ♀. (Wir wollen hier bemerken, dass das Roth der Stirn in der Abbildung entschieden zu decidirt roth gerathen ist. Es ist vielmehr nur ein lebhaftes braunroth). Guatemala.

Scansores.

Bucerotidae. Neu ist: *Tockus camurus* Cass. Proceed. Acad. Nat. Sc. Philad. Dec. 1856. Cap Lopez. Ich sah diese kleinste Art der Nashornvögel kürzlich in London.

Psittacidae. Charles de Souancé „Iconographie des Perroquets non figurés dans les publications de Levaillant et de Bourjot St. Hilaire, avec la cooperation de s. A. le Prince Ch. L. Bo-

naparte et de M. E. Blanchard, livr. 1—5, 4to maj. Paris. (livr. à 16 fr.) Was wir bis jetzt von diesem Werke gesehen haben, scheint uns im hohen Grade Lob zu verdienen.

„Des caractères osteologiques chez les oiseaux de la famille de Psittacidae, par E. Blanchard,“ und

„Remarques à propos des observations de M. E. Blanchard, sur les char. osteol. chez les Psittacidae et tableau des genres des Perroquets etc. par S. A. le Prince Ch. L. Bonaparte, Acad. des Sc. de Paris. Mars 16. Rev. et Mag. de Zool. 1857. p. 113. — In der Sitzung der Academie vom 23. März legte Bonaparte ein „Tableau des genres de Perroquets disposé en séries parallèles“ vor.

Sehr ausführlich und instructiv schreibt Prinz Max zu Neuwied über den einzigen Papageien Nordamerika's *Conurus carolinensis*. Caban. Journ. für Ornith. p. 98.

P. S. Selater verbreitet sich kritisch über verschiedene Papageien. Proceed. Z. S. p. 224. Mit grossem Rechte, wie uns scheint, wird der weissstirnige Papagei Domingo's unter dem Namen *Chrysotis Sallaci* von dem ähnlichen Vogel Cuba's (*C. leucocephala*) getrennt. Cuba eigenthümlich ist: *Chr. leucocephala* und *Conurus gujanensis*, Jamaica besitzt *Chr. rinaceicollis* und *Con. nanus*, Portorico *Chr. vittata* und *Con. Maugaei* und Domingo *Chrys. Sallaci* und *Con. chloropterus*. Gewiss ein interessantes Verhältniss. — Bonaparte's *Bolborhynchus catharino* sei *M. lineola* Cass. — Für die ächten grünen Lori's (*sinensis*, *intermedius* und *Westermanni*) schlägt Selater die generische Benennung *Polychlorus* vor.

Neu sind: *Psephotus chrysopterygius* Gould. Proc. Zool. Soc. p. 220. Victoriafluss in Nordaustralien. — *Conurus astec* de Souancé. Rev. et Mag. Zool. p. 97. Mexico. — *Pyrhura haematotis* Id. ib. p. 96. Venezuela. — *Cyanorhamphus Malherbii* Id. ib. Vaterland? (im Museum zu Metz).

Abgeb. *Psittacodis Westermanni*. Illustr. Proceed. Zool. Soc. pl. 127. fig. opt.

Picidae. Reichenbach beschreibt als neu: *Campephilus leucopterylus*. Picid. p. 392. fig. 4319—20. Mexico. — *C. leucorhamphus* ib. p. 393. fig. 4527—28. Mexico. — *C. mesoleucus* (Lichtst.) ib. fig. 4329—30. Foem. Columbien. — *C. regius* (Lichtst.) ib. fig. 4331—32. Mexico. — *Brachypternus striaticeps* R. fig. 4351. p. 398. Centralasien. — *Chrysocolaptes bacha* R. fig. 4353—54. p. 399. Centralasien. — *Hemicercus cocometopus* R. fig. 4664—65. p. 401. Celebes, Sumatra. — *Meiglyptes sordidus* R. p. 402. Tenasserim. — *M. loricatus* R. fig. 4495—96. Pegu. — *Celeus semicinnamomeus* R. fig. 4397. p. 407. Südamerika. — *Centurus sulfuriventer* R. fig. 4411—12. Mexico. — *Colaptes cinereicapillus* R. fig. 4489—90. p. 416. Peru. — *Chrysoptilus peruvianus* R. fig. 4493—94. p. 419. ist *atricollis* Malh.

Chr. guttifer R. p. 420. Mexico. — *Chloronerpes Warsewiczii* R. fig. 4491—92. Peru. — *Campephilus albifrenatus* R. p. 431. Neugranada.

Malherbe wird diese sämtlichen Arten einer näheren Critik unterwerfen. Schwerlich wird ihr Bestehen unangefochten bleiben.

Der in meinem System der Ornithologie Westafrika's als neu beschriebene *Dendromus Meriani* hat sich Malherbe's Kennerblick als Artefact erwiesen, und *D. nigriguttatus* ist nach ihm *foem. von gabonensis*.

Cuculidae. Nach Graells legt *Oxylophus glandarius* in Spanien in die Nester von *Pica caudata* und die Eier beider Vögel zeigen in der Färbung auffallende Uebereinstimmung.

Musophagidae. E. Blanchard über die Osteologie der Musophagiden. Rev. et Mag. de Zool. p. 458. Deutliche Verwandtschaft zu den Trogoniden und Gallinaceen. Familie ganz für sich.

Columbae.

Reichenbach's „Handbuch der speciellen Ornithologie.“ behandelt auf Seite 1—64 den Anfang des den Tauben gewidmeten Theils.

C. L. Bonaparte „Iconographie des Pigeons non figurés par Madame Knip (de Courcelles) dans les deux volumes de Mss. Temminck et Fl. Prevost.“ 1—7 livr. fol. (à 20 fr.). Habe ich noch nicht gesehen.

E. Blyth „Bemerkungen über die Columbiden mit Beschreibung einer neuen indischen Taube.“ Journ. Asiat. Soc. of Bengal, Nr. 3. 1857. Die neue Art ist *Columba oenicapilla* Blyth (ob Eversmanni Bp.?). Gute Beschreibungen verschiedener indischer Tauben. Schliesslich über die grünen Tauben Ceylon's. Interessante Arbeit.

Chr. L. Brehm „Die Naturgeschichte und Zucht der Tauben.“ n. s. w. Weimar. 177 S. (für Taubenzüchter und Ornithologen.)

Gallinae.

Neu sind; *Cereornis Caboti* Gould. Proceed. Zool. Soc. p. 161. und Ann. and Mag. N. Hist. p. 521. China. Gute Art. — *Odontophorus hyperythrus* Gould. l. c. 223. St. Fe de Bogota. — *Tinamus castaneus* Sclat. Proceed. Z. S. p. 277. Neugranada.

„Observations on the wild Turkey or *Gallopavo sylvestris*“ by John Leconte. Unser zahmer Puter stamme keineswegs vom wilden ab. Dieser letztere sei niemals gezähmt worden.

Domink Geyer „Die Auerhahnsbalz.“ Wien 1856. 8.

J. Baily „Pheasant and Pheasantries.“ London 18. 290 S.

Martin Doyle „The illustrated book of domestic poultry.“ new edit. Routledge. 8. 100 S.

F. Dreessler „Nachrichten aus dem Verein für Hühnerzucht. Dresden. Mit 20 color. Abbild. 1 f.

H. Lichtenstein und E. Winkler „Die veredelte Hühnerzucht. Anleitung zur Behandlung u. s. w. nach den im zoologischen Garten gemachten Erfahrungen.“ Heft 1. Berlin.

Carl Löffler „Die Zucht der ausländischen Hühner in Deutschland.“ Berlin. 128 S. mit 25 Abbild. color.

Baron E. Peers „Oiseaux de Basse-cour.“ Les poules. avec 20 planches. Bruxelles.

Don Ramon Adame „Tratado de los gallos ingleses.“ Madrid. 8. 24 S.

W. Hamm „Die rationelle Zucht der Hühner u. s. w.“ Leipzig. 148 S. Mit vielen Holzschnitten.

C. F. Wiepken „Ein brütendes Männchen von *Callipepla californica*.“ in Baldam. Naum. p. 324—26.

Struthiones.

Eine neue Art Casuar von der Insel Neuirland (*C. Bennettii*) beschreibt Gould Proceed. Zool. Soc. Lond. p. 268. pl. 129. fig. opt. Diesen merkwürdigen Moruck genannten Vogel habe ich kürzlich lebend im zoologischen Garten in London gesehen und kann somit nach eigener Untersuchung dessen spezifische Verschiedenheit bestätigen. Auch die Farbe des Ei's weicht wesentlich von der des gewöhnlichen Casuar ab. — Auch der neuholländische Casuar von Cap York scheint eine gute Art zu sein. *C. australis* Gould.

Man vergleiche über den afrikanischen Strauss Livingstone Miss. Trav. in South Afr. pag. 153—56. und Andersson Reise See Ngami I. p. 272 bis 288.

Wallace traf *Casuarius galeatus* zahlreich auf den Aru-Inseln.

Grallae.

Ardeidae. Zwei neue *Psophia*-Arten beschreibt A. v. Pelzeln nach Exemplaren der Wiener Sammlung. Sitzungsber. der Wiener Acad. Wissensch. Bd. 24. p. 371. *Psophia ochroptera* J. Natterer.

Rio Negro, und *Ps. obscura* Natter. ib. p. 374. Inneres Brasilien. Mit handschr. Anmerkungen von Johann Natterer.

Scolopacidae. v. Benberg „Die Waldschnepfe und ihre Jagd.“ 8. 131 S. Berlin.

Neu ist: *Numenius haesitatus*. Hartl. Syst. Westafr. Orn. p. 233.

J. Jäckel Ueber das Meckern der Bekassine in Naumannia. 1857. Heft 1. Sehr ausführliche Mittheilung. Nach ihm wären es die Flügel, welche den sonderbaren Laut hervorbringen.

Rallidae. Neue Arten wären: *Zapornia umbrata* Cass. Proceed. Acad. Nat. Sc. Philad. Oct. 1856. Fejee-Inseln. — *Porzana marginalis* Hartl. Syst. Ornith. Westafr. p. 241. Gabon. — *Corethrura Bonapartei* Hartl. l. c. p. 242. Gabon.

Anseres.

Anas galericulata soll in wildem Zustande am Amur gefunden sein. Brandt.

P. L. Selater „Note on the Upland Goose“ in Proceed. Zool. Soc. pag. 128. Synonymische Auseinandersetzung von *Chloephaga magellanica* (Gm.) und *Chl. poliocephala* G. R. Gray (oder *inornata*). Diese beide sowie *Bernicla antarctica* und *B. melanoptera* befinden sich lebend im zoologischen Garten in London.

Leon Olph-Gaillard Ueber *Fuligula Homeyeri* gegen Gloger u. s. w. Naumannia 1857. Heft 1. — Unbegreiflich, wie man nur daran denken konnte, diesen Vogel für eine selbständige Art auszugeben.

Laridae. Einen Nachtrag zu seiner Revision der Lariden giebt Bruch Caban. Journ. für Ornithol. p. 23. *Larus columbinus* hält Bruch für eine neue Art. Ein zweiter Nachtrag steht auf Seite 113.

Pelecanidae. Sehr ausführlich und instructiv schreibt C. Gloger über *Haliastur Desmarestii* Payraud. und *H. leucogaster* Cara. Caban. Journ. 57. p. 4. Gloger liefert den Beweis, dass *H. Desmarestii* eine wirklich gute Art sei. Ob auch *H. leucogaster*, bleibt zunächst dahingestellt, da Gloger nicht selbst Exemplare untersuchen konnte. Ist indessen gar nicht unwahrscheinlich. Das Ganze ist eine sehr dankenswerthe kritische Erörterung.

Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Säugethiere während des Jahres 1857.

Vom

Herausgeber.

Beim Eingange in meinen diesjährigen Bericht will ich nicht versäumen eines grossartigen Unternehmens Erwähnung zu thun, welches Agassiz, zwar ohne Jahreszahl, aber wenn ich nicht sehr irre, im Jahre 1857, begonnen hat: „Contributions to the natural history of the united states of North-America.“ Von diesem Werke, das aus 12 Bänden bestehen wird, ist mir bisher nur der erste Theil des ersten Bandes bekannt geworden, der eine Einleitung enthält, und sich mit der Classification der Thiere im Allgemeinen beschäftigt. Ich enthalte mich eines näheren Eingehens, da bereits Leuckart im vorjährigen Bericht p. 167 Mittheilungen darüber gemacht hat.

Von Dahlboms „Zoologiska Studier“ (vergl. vor. Bericht p. 2) erschienen Lund 1857 Heft 2 und 3 und das erste Heft eines Atlas. Darin werden die Affen abgehandelt, und wir werden unten darauf zurückkommen.

Es ist mir bisher nicht möglich gewesen, auf die Bulletins, welche die Societé zoologique d'acclimation seit 1854 herausgibt, Rücksicht zu nehmen. Freilich ist der Inhalt nicht dazu bestimmt, von den Thieren, die darin besprochen werden, die wissenschaftliche Kunde zu vermehren, sondern er bezieht sich auf die Domesticirung und den Nutzen, den sie dem Menschen zu gewähren vermögen; indessen finden sich in den bisher vorliegenden Jahrgängen doch Schilderungen einzelner Arten oder Rassen vor, die wir als eine

Bereicherung der Wissenschaft begrüßen müssen, und auf die in diesem Berichte wenigstens kurz hingewiesen werden soll.

Im zweiten Bande 1855 sind es von Säugethieren besonders die Angora-Ziege und der Halbesel (*Equus hemionus*), welche geschildert wurden, der zahlreichen kleineren Besprechungen nicht zu gedenken. — Im 3ten Bande 1856 möchte eine Arbeit von Sacc über die Ziegen hervorzuheben sein. — Im vierten Bande 1857 ist die letztere fortgesetzt; Dareste handelt über die projectirte Einführung des Dromedars in Brasilien; Davin über die Verwendung der Kamelhaare; Dutronc über das normannische Rind ohne Hörner; Richard über die Pferde, Esel und Schweine Algeriens; Albert Geoffroy Saint-Hilaire über die Schafe und Ziegen Algeriens; Davelouis über den Büffel; Bourlier über die Angora-Ziege.

Owen hat seine Grundsätze für die Eintheilung der Klasse der Säugethiere auseinandergesetzt: *Journal of the proceedings of the Linnean society of London*. II. No. 5. p. 1—37.

Für den Charakter ersten Ranges nimmt Verf. das Gehirn, und unterscheidet darnach vier Unterklassen, die dann wieder in Ordnungen zerfallen, deren Namen bereits bekannt sind.

I. **Lyencephala.** Die unterste Gruppe, wo die Hemisphären so liegen, dass sie die olfactorischen Ganglien, das kleine Gehirn, und mehr oder weniger die optischen Lappen unbedeckt lassen; ihre Oberfläche ist im Allgemeinen glatt, die Windungen, wenn vorhanden, sind wenige und einfach.

II. **Lissancephala.** Das Corpus callosum ist vorhanden, aber verbindet die Hemisphären so wenig massig entwickelt, dass es kaum zu einem äusserlichen Charakter wird; das Gehirn lässt die olfactorischen Lappen und das Cerebellum unbedeckt und ist im Allgemeinen glatt oder mit wenigen und einfachen Windungen.

III. **Gyrencephala.** Das Gehirn ist so gross, dass es sich mehr oder weniger über das Cerebellum und die olfactorischen Lappen erstreckt. Mit Ausnahme der kleineren Formen von Quadrumanen sind mehr oder weniger zahlreiche Windungen vorhanden.

IV. **Archencephala.** Hier bedecken die Hemisphären nicht nur die olfactorischen Lappen und das kleine Gehirn, sondern sie überragen dieselben sogar; die Windungen sind aufs Höchste entwickelt.

Durch die Einreihung der Ordnungen in diese höheren Gruppen ergibt sich dann das folgende Schema.

Subclassis	Ordo	
Archencephala	Bimana	Homo
Gyrencephala	Unguiculata	{ Catarrhina
		{ Platyrrhina
		{ Strepsirhina
	Carnivora	{ Digitigrada
		{ Plantigrada
		{ Pinnigrada
	Artiodactyla	{ Omnivora
		{ Ruminantia
	Perissodactyla	{ Solidungula
		{ Multungula
Lissancephala	Proboscidea	{ Elephas
		{ Dinotherium
	Toxodontia	{ Toxodon
		{ Nesodon
	Sirenia	{ Manatus
		{ Halicore
	Cetacea	{ Delphinidae
		{ Balacnidae
	Bruta	{ Bradypodidae
		{ Dasypodidae
		{ Edentula
Lycencephala	Cheiroptera	{ Frugivora
		{ Insectivora
	Insectivora	{ Talpidae
		{ Erinaceidae
		{ Soricidae
	Rodentia	{ Non-claviculata
		{ Claviculata
	Marsupialia	{ Rhizophaga
		{ Poëphaga
	Monotremata	{ Carpophaga
		{ Entomophaga
		{ Echidna
		{ Ornithorhynchus

Nachträglich zu erwähnen sind:

Principes d'Ostéologie comparée ou recherches sur l'Archetype et les homologues du squelette vertébré. Par Richard Owen. Avec 15 planches et 3 tableaux. Paris 1855. 8.

The principal forms of the skeleton and the teeth as the basis for a system of natural history and comparative anatomy by Professor Owen. London 1855. Mit in den Text gedruckten Holzschnitten.

Huzard sucht durch Beispiele an Schafen, Rindern, Pferden, Schweinen und andern Hausthieren nachzuweisen, dass dieselben durch Befruchtungen in nächster Verwandtschaft keinesweges degeneriren, sondern dass dies das beste Mittel sei, die Rassen mit ihren Qualitäten und Formen zu erhalten, vorausgesetzt, dass man eine strenge Wahl treffe, und die Individuen von schwächlicher Constitution, und die von den gewünschten Qualitäten abweichen, entferne; so wie dass eine gute Gesundheitspflege gehandhabt werde. Ueberall dagegen, wo Sorgfalt fehlt, oder eine ungesunde oder unzureichende Nahrung, schlechte Wohnung oder übermässige Arbeiten stattfinden, sei Degeneration zu befürchten, oder es sei doch eine Amelioration unmöglich. Rev. et Mag. de Zool. 1857. p. 145.

Martin St. Ange hat seine Studien über den Geschlechtsapparat in den 5 Klassen der Wirbelthiere veröffentlicht. Mém. présentés par divers savants. Paris. 1856. p. 1. Mit 16 Tafeln Abbildungen.

Im ersten Kapitel beschreibt Verf. diese Organe vom Kaninchen, der Beutelratte, der Taube, der grünen Eidechse, der Natter, dem Wassermolch, dem Karpfen, dem Hai, der Lamprete und von Myxine. — Im zweiten Kapitel bespricht er die Analogie der Theile, welche die Geschlechtsorgane beider Geschlechter bei den Wirbelthieren zeigen, und zieht eine Parallele zwischen den männlichen und weiblichen Reproductionsapparaten, und den Gang ihrer Degradation. — Das dritte Kapitel ist überschrieben: Déductions anatomiques, physiologiques et zoologiques que l'on peut tirer de l'étude de l'appareil reproducteur dans les 5 classes d'animaux vertébrés.

Martins betrachtet den Humerus der Wirbelthiere als einen um seine Axe gedrehten Knochen, der beim Menschen,

den Quadrumanen, den Quadrupeden und Cetaceen um 180° , bei den Chiropteren, Vögeln und Reptilien nur um 90° gedreht ist (*Comptes rendus* XLIV. p. 144). In Verfolgung dieses Gegenstandes ist derselbe Verf. zu dem Resultate gekommen, dass der Anblick der Schulter und des Humerus eines Thieres über die Art seiner Bewegung und seine Stellung im System entscheiden könne. (ib. p. 1027). — Ebenda findet sich XLV. p. 65 eine Notiz: De la coalescence des têtes du radius et du cubitus pour former le chapiteau du tibia dans les Mammifères monodelphes. — Die ausführliche Abhandlung steht *Annales des sciences nat.* VIII. p. 45.

Hannover gab eine Uebersicht über seine Untersuchungen in Betreff der Entwicklung und den Bau der Zähne bei den Säugethieren mit in den Text eingedruckten Holzschnitten. Oversigt over det kongelige danske Videnskaberne Selskabs Forhandlinger i Aaret 1856. p. 53—88. Er behandelt im ersten Abschnitte die histologische Entwicklungsgeschichte der Säugethierzähne, im zweiten die Histologie derselben.

Mit Beziehung auf frühere Mittheilungen im 7. und 9. Jahrgange der Württembergischen naturwissenschaftlichen Jahreshefte machte v. Jaeger Bemerkungen über die Veränderung der Zähne von Säugethieren im Laufe ihrer Entwicklung, namentlich bei dem Narwhal (*Monodon monoceros*), und dem Cachalot (*Physeter macrocephalus*). *Bulletin de la soc. imp. des naturalistes de Moscou* 1857 p. 571.

Valenciennes und Fremy haben sich mit der Untersuchung der chemischen Zusammensetzung der Krystalllinse bei den Thieren beschäftigt, und ihre Resultate der Pariser Academie am 1. Juni 1857 vorgetragen (*Comptes rendus* XLIV. p. 1122; *Rev. et Mag. de Zool.* 1857. p. 284; *Atlantis* I. p. 229).

Wyman hatte eine Maus durch den Biss einer Klapferschlange tödten lassen. Der Tod erfolgte nach 2 Minuten. Bei der Section fand sich, dass es ein hochträchtiges Weibchen war, und dass die Jungen noch 14 Minuten nach dem Biss lebten. *Proc. Boston soc.* VI. p. 56.

Sonnenburg hat zoologisch-kritische Bemerkungen

zu Aristoteles Thiergeschichte in dem Programm des Gymnasiums zu Bonn geliefert. Er behauptet, dass in den Fällen, wo Aristoteles Falsches oder Unsinniges sagt, entweder eine Verfälschung des Textes vorliegt, meist aber ein blosses Missverstehen unsererseits. Um das Letztere zu beweisen erklärt er einige Stellen in sinnreicher und unzweifelhaft richtiger Weise; z. B. dass der Hinterkopf hohl und leer sei, wird auf die äussere Form des Nackens bezogen; dass die Zehen nur ein Gelenk haben, wird so gedeutet, dass sie alle gleichmässige Beugung haben, im Gegensatz zu den Fingern, unter denen der Daumen eine eigenthümliche Beugung hat u. s. w.

In Betreff der einzelnen Faunen sind die folgenden Schriften zu erwähnen.

Europa. Als erster Band der Fauna der Wirbelthiere Deutschlands erschien von Blasius die Naturgeschichte der Säugethiere Deutschlands und der angrenzenden Länder von Mitteleuropa; mit 200 Abbildungen im Texte. Braunschweig 1857. 8. Wir erhielten durch dasselbe eine auf gründlichster Sachkenntniss gestützte Bearbeitung der einheimischen Thiere. Dr. v. Martens hat bereits in unserem Archiv 1858 I. p. 111 sich ausführlich über dieses Werk geäussert, namentlich in Beziehung auf die geographische Begrenzung dieser Fauna. Ich will mich also hier darauf beschränken, hervorzuheben, dass durch dasselbe die sichere Unterscheidung der Arten gefördert ist und dass demjenigen, welcher die deutschen Säugethiere kennen lernen will, kein besseres Buch empfohlen werden kann.

Die Zahl der abgehandelten Arten beläuft sich auf 123. Es sind 4 *Rhinolophus*, 1 *Plecotus*, 1 *Synotis*, 1 *Miniopterus*, 9 *Vesperugo*, 8 *Vespertilio*, zusammen 24 Fledermäuse; — 2 *Talpa*, 1 *Crosopus*, 3 *Sorex*, 3 *Crocidura*, 1 *Erinaceus*, zusammen 10 Insectivoren; — 3 *Felis*, 4 *Canis*, 1 *Ursus*, 1 *Meles*, 1 *Gulo*, 2 *Mustela*, 5 *Foetorius*, 1 *Lutra*, zusammen 18 Carnivoren; — 1 *Pelagius*, 3 *Phoca*, 1 *Halichoerus*, 1 *Cystophora*, 1 *Trichechus*, zusammen 7 Pinnipedia; — 1 *Pteromys*, 1 *Sciurus*, 1 *Spermophilus*, 2 *Arctomys*, 4 *Myoxus*, 1 *Sminthus*, 1 *Cricetus*, 7 *Mus*, 9 *Arvicola*, 1 *Spalax*, 1 *Castor*, 3 *Lepus*, 1 *Cavia*, zusammen 33 Nager; — 1 *Alces*, 2 *Cervus*, 1 *Capreolus*, 1 *Ovis*, 2 *Capra*, 1 *Capella*, 3 *Bos*, zusammen 11 Wiederkäuer; — 2 Einhufer; — 1 Vielhufer; — 4 *Delphinus*, 5 *Pho-*

caena, 1 Ceratodon, 2 Hyperoodon, 1 Physeter, 3 Balaenoptera, 1 Balaena, zusammen 17 Wale.

Guido Sandberger hat in den Verhandl. des naturhist. Vereins der preuss. Rheinlande und Westphalens XIV. p. 69 über die Säugethiere und Vögel des Herzogthums Nassau geschrieben: „Vergleichender Beitrag zur Fauna der warmblütigen Wirbelthiere des Mittelrheins.“

Nach ihm finden sich mit Ausschluss der Hausthiere im Herzogthum Nassau mindestens 41 Säugethiere in 18 Gattungen, welche in sechs Ordnungen vertheilt sind, nämlich 10 Fledermäuse, 5 Insectivoren, 10 Carnivoren, 14 Nagethiere, 1 Dickhäuter, 2 Wiederkäuer.

Als Säugethiere, welche auf Gottland vorkommen, werden von Mewes, Öfversigt af kongl. Vetenskaps acad. Förhandl. Jahrg. 1856 p. 282 die folgenden angegeben:

Vespertilio auritus L., *V. pipistrellus* Danb., *Canis vulpes* L., *Mustela erminea* L., *Phoca vitulina* L., *Halichoerus grypus* Nills. Fabr., *Erinaceus europaeus* L., eine Art *Sorex*, *Lepus canescens* Nills., *Sciurus vulgaris* L., *Mus decumanus* Pall., *Mus musculus* L.

Assmuss schrieb Beobachtungen über die Mammiferen einiger Provinzen Russlands, namentlich der Gouvernements Moskau, Kaluga und Tambow. Allg. deutsche naturhist. Zeitung III. p. 180.

Das Verzeichniss enthält 2 *Hippocrepis*, 3 *Vesperugo*, 1 *Vespertilio*, 1 *Plecotus*, 1 *Synotis*, — 1 *Erinaceus*, 4 *Sorex*. 1 *Talpa*, — 1 *Ursus*, 1 *Meles*, 2 *Mustela*, 4 *Putorius*, 1 *Lutra*, 2 *Canis*, 1 *Felis*, 1 *Sciurus*, 1 *Spermophilus*, 6 *Mus* (wovon *Mus rattus* seit 5 Jahren verschwunden), 1 *Cricetus*, 3 *Hypudaeus*, 1 *Cavia*, 3 *Lepus*, 1 *Equus* (*asinus*), 1 *Cervus* (*Alces*).

Eversmann hat, wie hier nachträglich zu bemerken ist, in den *Nouveaux mémoires de la soc. imp. des Naturalistes de Moscou* Vol. X. 1855 p. 267 „kurze Bemerkungen über das Vorkommen und die Verbreitung einiger Säugethiere und Vögel in den Volgo-uralischen Gegenden und den Steppe der Kirgisen jenseit des Uralsflusses“ geliefert.

Soweit sie die Klasse der Säugethiere betreffen, werden daselbst zur Sprache gebracht: die Katzenarten, wilde Schweine, Wolf, *Canis melanotus*, *Corsac* und *aureus*, Dachs, *Erinaceus europaeus*, einige Fledermäuse, Hamster, Maulwurf, Wanderratte (*Mus rattus* in den Wolgagegenden nicht mehr zu finden), *Mus minutus*, *Arvicola amphibius*, *arvalis*, *Glareola* und *obscura*, *Lemmus luteus* Eversm. (wird als verschieden von *L. obensis* festgehalten), *Myodes lagurus* Pall., *Chtho-*

noergus talpinus Pall., *Spalax Typhlus* Pall., *Dipus Jaculus*, *Acontion*, *sagitta*, *lagopus* und *platurus* Licht. (dessen Schwanz nicht platt lanzettförmig, sondern rund kolbig ist), *Lepus variabilis* und *timidus*, *Lagomys pusillus*.

Africa. Marés hat im Süden der Provinz Oran folgende Säugethiere beobachtet: *Antilope addax*, die in Nubien lebt, *Lepus isabellinus* bisher nur in der Egyptischen Sahara bekannt, *Vulpes fennecus* und *Musimon musmon*. Rev. et mag. de zool. 1857. p. 330.

Brehm schilderte die Säugethierfauna der tropischen Wälder von Nordost-Africa in der Allg. deutschen naturh. Zeitung I. 1855. p. 234.

J. Th. v. Heuglin's Reisen in Nordost-Africa, Gotha 1857 ist p. 74 ein systematisches Verzeichniss der in Simén beobachteten Säugethiere und Vögel enthalten.

Von ersteren sind aufgeführt: *Macacus Gelada* Rüpp., *Antilope montana* Rüpp. (wahrscheinlich auch *A. Oreotragus*, *Medoqua* und andere Arten), *Ibex Waalia* Rüpp., *Rhizomys splendens* Rüpp., *Canis simensis* Rüpp., eine nicht näher bestimmte Hundeart, *Hyaena Crocuta*, eine kleine Katzenart, eine Ratte mit stachelähnlicher Bedeckung, eine kleine Fledermaus.

Reisen in Südwest-Afrika bis zum See Ngami in den Jahren 1850—54 von Anderson. Aus dem Schwedischen übersetzt von Lotze 2 Bände. Leipzig 1858. Dieses Werk darf hier genannt werden, weil Manches darin geschildert wird, was sich auf die Thierwelt Africa's bezieht. Lebensweise, Jagd und dergl. ist, wenn gleich nicht in streng wissenschaftlicher Weise, doch lebendig und belehrend in den Text eingestreut.

In Livingstone's Missionary travels and researches in south Africa London 1857. 8. sind manche auf Thierschilderung bezügliche Stellen enthalten, so über die Thiere von Kalahari p. 101, über den Löwen p. 137, über Schlangen p. 143, den Strauß p. 153, das Nilpferd p. 241, den Elephanten p. 560, das *Rhinoceros* p. 611 und viele andere. Natürlich kann hier nur darauf im Allgemeinen hingewiesen werden.

Asien. Horsfield lieferte ein Verzeichniss der Säugethiere von Nepal, Sikim und Tibet, welche von Hodg-

son der Ostindischen Compagnie eingesandt waren. Proc. zool. soc. 1856. p. 393.

Es enthält 103 Arten, nämlich 2 Affen, 13 Fledermäuse, 34 Raubthiere, 9 Insectenfresser, 23 Nager, 18 Wiederkäuer, 1 Einhufer, 2 Schweine und 1 Manis.

Rosenberg fordert auf, die Frage mit Sicherheit zu entscheiden, ob Elephanten und Tiger auf Borneo vorkommen. Natuurk. Tydschr. voor Nederlandsch Indie XIII. p. 469.

Australien. Von Gould's The Mammals of Australia erschien 1857 Part IX. Derselbe enthält in meisterhafter Ausführung die folgenden Arten abgebildet: *Macropus major* Shaw., *Halmaturus ualabatus* (Kangurus ualabatus Less. Garn.), *Halmaturus agilis* Gould, *Halmaturus dorsalis* Gray, *Halmaturus Thetidis* F. Cuv. et Geoffr., *Petrogale lateralis* Gould, *Hapalotis hirsutus* Gould, *Mus lineolatus* Gould, *Scotophilus pumilus* Gray.

Tancred, welcher in Jameson New Edinburgh Journal 60 p. 5 Nachrichten über die Naturgeschichte der Provinz Canterbury in der Mittel-Insel von Neu-Seeland veröffentlicht hat, hebt p. 13 hervor, dass von Land-Säugethiereu nur eine kleine Ratte vorkomme, die von der durch Schiffe eingeführten Norwegischen Ratte (Norway rat) verdrängt wird. Klima und Vegetation seien der Einführung von Wiederkäuern, Pferden, Hunden, Hasen u. s. w. günstig. Als Cook diese Insel entdeckte, waren die Einwohner bereits in Besitz von Hunden; Schweine hat er eingeführt.

Amerika. Spencer Baird hat einen Catalogue of North american mammals, chiefly in the museum of the Smithsonian institution. Washington 1857. 4. veröffentlicht, in welchem 256 Arten verzeichnet sind, die sich in 56 Genera vertheilen.

Im „Naturhistoriske Bidrag til en Beskrivelse af Grønland af Reinhardt, Schiödt, Mörch, Lütken, Lange, Rink“, besonderer Abdruck des Anhangs zu „Grønland, geographisch und statistisch beschrieben von Rink“ Kjöbenhavn 1857 findet sich p. 3 ein Verzeichniss der Säugethiere von Reinhardt.

Es enthält folgende 27 Arten: *Ursus maritimus* L., *Gulo borea-*

lis Retz, *Canis familiaris* L., *C. lagopus* L., *Trichechus rosmarus* L., *Cystophora cristata* Fabr., *Phoca barbata* Fabr., *Ph. vitulina* L., *Ph. groenlandica* Müll., *Ph. hispida* Exl., *Hypudaus groenlandicus* Tr., *Lepus glacialis* Leach, *Cervus tarandus* L., *Balaenoptera musculus* F. Cuv., *B. gigas* Eschr., *B. rostrata* Fabr., *B. boops* Fabr., *Balaena mysticetus* L., *Physeter macrocephalus* L., *Chaenocetus rostratus* Müll., *Monodon monoceros* L., *Delphinapterus leucas* Pall., *Delphinus globiceps* Cuv., *D. phocaena* L., *D. orca* L., *D. albirostris* Gray, *D. Höllii* Eschr. — also 4 Carnivora, 6 Pinnipedia, 2 Nager, 1 Wiederkäufer, 14 Cetaceen. Hierzu kommen noch *Felis domestica*, *Mus decumanus*, *M. musculus*, *Sus scrofa*, *Capra hircus*, *Ovis aries* und *Bos taurus* als eingeführte Hausthiere.

Quadrumana.

Dahlbom hat im 2. und 3. Hefte seiner Zoologiska studier die Ordnung der Affen bearbeitet, denen er auch die Gattung *Daubentonia* Geoffr. (*Chiromys* Cuv.) als besondere dritte Unterordnung zuzählt. Ein Heft eines Atlases mit 13 Tafeln gehört zu dieser Ordnung. Die Eintheilung des Verf. gründet sich theils auf die bekannten Charaktere, theils werden weniger gebräuchliche Merkmale herbeigezogen, um die ganze Ordnung in 12 Familien zu zerfallen.

Diese sind unter den Affen der alten Welt: *Anthropomorphae* (5 Arten), *Hylobatae* (8 Arten), *Semnopithecaceae* (21 Arten), *Pithecae* (32 Arten), *Cynocephalae* (9 Arten); unter den Affen der neuen Welt: *Prensilicaudae* (44 Arten), *Pitheciformes* (8 Arten), *Arctopithecaceae* (24 Arten); unter den Halbaffen *Brachytarsae* (3 Arten), *Isotarsae* (24 Arten), *Macrotarsae* (6 Arten). Die 12te Familie *Glirisimiae* bildet endlich die Gattung *Chiromys* mit 1 Art. — So hat Verf. die sämtlichen Affen des Pariser Museums bearbeitet, zum Theil beschrieben, zum Theil nur kurz charakterisirt. Es sind im Ganzen 186 Arten.

Bemerkt mag noch werden, dass *Hylobates hoolok* Mus. par. vom Verf. p. 76 als neue Art aufgeführt wird; — dass der Nasenaffe unter dem Namen *Rhynchopithecus larratus* als eigene Gattung behandelt wird, und tab. IV. abgebildet ist; — dass *Ceropithecus Erxlebeni* Dahlb. et Pucheran ausführlich beschrieben und tab. V. colorirt abgebildet ist. — Ferner trennt Verf. den *Galago Demidoffi* als eigene Gattung ab, die er *Hemigalago* nennt. Dieselbe würde sich von *Galago* durch kleinere Gestalt, sehr langen Schwanz, conische Schnauze, zarte Finger; von *Microcebus* durch grössere ab-

stehende Ohren und sparsam mit abstehenden Haaren behaarten Schwanz unterscheiden.

Wie im vorigen Jahre über die Delphine, so hat Pucheran im Jahre 1857 in der *Revue et Mag. de zool.* p. 193, 241, 289, 337 Bemerkungen über die Affen des Pariser Museums veröffentlicht. Er hat seine Aufmerksamkeit den verschiedenen Typen zugewendet, welche, neuerlich seiner Prüfung zugänglich, zum Theil die Zweifel beseitigen möchten, welche bei den Zoologen in Betreff der Artgültigkeit auftauchen könnten.

Von Affen der alten Welt beziehen sich die Bemerkungen auf folgende Arten: 1) *Colobus Satanas* Waterh. 2) *Miopithecus talapoin* [Geoffr. 3) *Cercopithecus cephus* Erxl. Ein junges Exemplar hatte einen regelmässig dreieckigen weissen Nasenfleck. 4) *C. samango* Wahlb. ist synonym mit *C. labiatus* Geoffr. 5) *C. Erxlebenii* Dahlbom et Puch. ist in zoologiska Studier des ersteren s. oben ausführlich beschrieben und abgebildet. 6) *C. pygerythrus* Geoffr. Ein neues Exemplar der Menagerie hält die Mitte zwischen *C. rufo-viridis* und *C. pygerythrus*, und Verf. stellt die Möglichkeit auf, dass diese beiden Arten Altersverschiedenheiten seien. 7) *Cercocebus albigena* Puch. Gray's *Presbytes albigena* konnte an einem jungen Exemplare untersucht werden, und wird wegen des einfachen Magens und der Schädelform zu *Cercocebus* gestellt. 8) *Cercocebus collaris* Gr. lebt jetzt in der Menagerie. 9) *Inuus pithecus* Geoffr. *Pseudo-Albino*. 10) *Theropithecus senex* Schimp. eine für neu gehaltene Art aus Abyssinien. 11) *Cynocephalus anubis* Fr. Cuv., gewöhnlich für Var. von *C. babouin* genommen, scheint doch selbstständige Art zu sein, wie an Färbung und Schädel gezeigt wird. 12) *Cynocephalus Doguera* Puch. et Schimp. (vergl. vor. Ber. p. 10) ist näher beschrieben und wird mit *C. porcarius* verglichen.

Die Unterscheidung der Arten unter den Affen der neuen Welt findet Verf. noch schwieriger als die der alten Welt, wofür die unsicheren Angaben über die Fundorte, so wie der oft schlechte Conservationszustand in den Sammlungen als Grund angegeben werden. — Unter den zehn Exemplaren der Gattung *Lagothrix* des Pariser Museums unterscheidet Verf. vier Arten: 1) *L. canus* Geoffr. von Brasilien, kurzhaarig, olivengrau mit röthlichgrauem Kopf und Händen; 2) *L. Humboldtii* Geoffr. von Neugranada, langhaarig, grau mit schwarzen Haarspitzen; 3) *L. Tschudii* Puch. von Peru, grau mit schwarzen Händen, und 4) *L. Geoffroyi* Pucher. von Cayenne, kurzhaarig, rothbraun, weiss gesprenkelt mit schwärzlichen Händen. — Von der Gattung *Cebus* Erxl. werden 7 Arten näher besprochen. — Eine neue Art *Nyctipithecus Spixii* wird beschrieben. Sie unter-

scheidet sich von *N. trivirgatus* dadurch, dass der Schwanz auf der unteren Endhälfte schwarz ist, und dass die seitlichen Kopfbinden gegen die mittlere convergiren; von *Oseryi* unterscheidet sie sich durch die graue Farbe. Das nähere Vaterland ist unbekannt. — Ueber die Lemuriden wird nur kurz bemerkt, dass das Pariser Museum *Perodicticus Potto*, *Galago Alleni* und *Otolienus Peli* von Gabon erhalten habe.

Owen lieferte einen fünften osteologischen Beitrag zur Naturgeschichte des Chimpanse (*Troglodytes*) und des Orangs (*Pithecus*), indem er eine Vergleichung des Unterkiefers und der Wirbelsäule von *Troglodytes Gorilla*, *Troglodytes niger*, *Pithecus Satyrus* und verschiedene Rassen des Menschen anstellte. *Transactions of the zoological society of London* Vol. IV. p.89—115 mit Tafel 31—36. Gelesen war die Abhandlung bereits im Jahre 1851.

Leconte beschrieb kurz in *Proc. Philadelphia* 1857 p.10 folgende drei Affen aus Westafrika als neu:

Semnopithecus anthracinus. Ganz schwarz, Haar etwas glänzend, 2 bis 3 Zoll lang, über den Augen und am Scheitel grob und borstig. Tragus breit. Daumen an den Vorderhänden bloss ein länglicher Höcker. Nägel, mit Ausnahme des hintern Daumens lang und schmal. Schwanz sehr lang, gegen die Spitze ein wenig verschmälert. Länge 2' 2'', Schwanz 2' 7''. Gleicht *Colobus satanas* Wat.

Cercopithecus buccalis. Haar oben und an den Seiten dunkelgrau, unten rothbraun geringelt, und an den inneren Theilen der Schenkel grau; am Kopfe schwarz, geringelt. Wangen mit grossem gelben Fleck, der sich bis hinter das Ohr erstreckt; hinter dem Auge erscheint dieser Fleck oben schwarz begrenzt. Arme und Hände schwarz, die Haare mehr oder weniger mit röthlichen Spitzen; unterhalb, ausser an den Händen sind sie grau. Schwanz auf ein Drittel seiner Länge oben wie der Rücken gefärbt, unten grau; der Rest des Schwanzes ist oben und unten hell rothbraun, nach dem Ende greller werdend. Nägel lang, schmal und comprimirt. (Wenn *no callosities on the rump* heissen soll, keine Gefässschwien, so ist diese Angabe jedenfalls irrthümlich) Länge 1' 8''; Schwanz 2' 5''.

Microcebus elegantulus. Haar weich, dunkelgrau, mit rothbraunem Gipfel, unten weisslichgrau; die letztere Farbe erstreckt sich etwas gegen den Rücken von den Achseln und den Weichen, und nach dem Vorderrande der Schenkel; Schwanz länger als der Körper, cylindrisch, buschig, das Haar mit grauen Spitzen, und an der Wurzel etwa einen Zoll lang röthlich. Nase ziemlich spitz. Ohren gross,

länglich, mit Ausnahme der Basis nackt; untere Vorderzähne fast horizontal; Nägel der Vorderhände rund mit einer Zuspitzung, an den hintern Daumen flach, an dem ersten Finger krallenartig und scharf; an den anderen Fingern gleich denen der Vorderhände. Länge 8" Schwanz 12".

Pycheran bezeichnet eine neue Art *Nyctipithecus Spixii*, welche in der Pariser Menagerie gelebt hat, durch folgende Diagnose: Simillimus N. Oseryi, sed pilis laterum griseo-argenteis. Rev. et mag. de zool. 1857 p. 335.

Volitantia.

Kolenati hat sich der Bearbeitung der Europäischen Chiropteren hingegeben. Allg. deutsche Naturhistorische Zeitung II. 1856 p. 121—133 und 161—192.

Den ersten Abschnitt nennt Verf. Synopsis der Europäischen Chiroptern. Es wird zunächst angegeben, dass Europa 27 (davon Deutschland 18), Astien 71, Afrika 45, Nordamerika 11, Südamerika 72 und Neuholland 5 wahrhaft constatirte Arten besitze, was eine Summe von 231 Arten ergibt. Nach einem alphabetischen Verzeichnisse der Schriften über Fledermäuse, worin natürlich die neuesten Werke, z. B. Castelnau's Reise noch fehlen, werden dann die Europäischen 27 Arten in einer synoptischen Tabelle zusammengestellt, und die durchschnittlichen Maasse (Körperlänge, Schwanzlänge und Flugweite) von denselben angegeben. — In dem zweiten Abschnitte werden dann die 27 Arten beschrieben. — Die Gattung *Vesperus* wird vom Verf. in zwei Untergattungen getheilt, je nachdem der Ohrdeckel die grösste Breite unter der Mitte des Aussenrandes erreicht *Cateorus* Kol. (*V. serotinus*), oder über der Mitte des Aussenrandes *Meteorus* Kol. (*V. Nilssonii*, *discolor*, *Savii*, *Leucippe*, *Aristippe*). — Die Gattung *Vesperugo* zerfällt in drei Untergattungen; das Plagiopotagium reicht bis zur Zehenwurzel, und dann erreicht der Tragus die grösste Breite in der Mitte *Hypsugo* Kol. (*V. Maurus*) oder unter der Mitte *Nannugo* Kol. (*V. Nathusii*, *pipistrellus*, *Kuhlii*) oder das Plagiopotagium reicht bis zur Fusswurzel und der Tragus erreicht die grösste Breite über der Mitte *Panugo* Kol. (*V. Leisleri* und *Noctula*). — Auch die Gattung *Vespertilio* wird in drei Untergattungen zerlegt; die Ohren sind kürzer als der Kopf *Brachyotus* Kol. (*V. mystacinus*, *Daubentonii*, *Dasyenemus*), oder ebensolang wie der Kopf *Isotus* Kol. (*V. Nattereri*, *ciliatus*), oder länger als der Kopf *Myotus* Gray (*V. Bechsteinii*, *murinus*). — Die übrigen Gattungen werden nicht weiter gespalten. *Miniopterus Schreibersii*, *Plecotus auritus*, *Dysopes Cestonii*, *Synotis barbastellus* und *Rhino-*

Urolophus clivosus, *Enryale*, *hippocrepis* und *ferrum equinum* sind die beschriebenen Arten. Die andersnamigen Arten verschiedener Schriftsteller sind als Synonyme untergebracht. — Bei den einzelnen Arten sind auch die Eingeweidewürmer und die Schmarotzer namhaft gemacht.

Im III. Bande der Allgemeinen deutschen Naturhistorischen Zeitung p. 1—24 und p. 41—68 hat Kolenati unter dem Titel: Beiträge zur Naturgeschichte der europäischen Chiropteren, den allgemeinen Theil der Naturgeschichte dieser Thiere, d. h. ihre Anatomie, Lebensweise und dergl. behandelt. Auf sechs Tafeln sind Skelet, Musculatur, Haare und Zähne abgebildet.

Ein Auszug der bereits im vorigen Berichte p. 11 besprochenen Arbeit von Gervais über die südamerikanischen Fledermäuse findet sich in den *Mémoires de l'acad. de Montpellier* III. p. 143—162.

Fairholme machte Bemerkungen über den *Pteropus* von Australien. *Proc. zool. soc.* 1856. p. 311; vergl. auch *Annals nat. hist.* XIX. p. 346, dessen Lebensweise er in der Gegend von Moreton Bay an der Südküste von Australien beobachtet hatte.

Man bemerkt sie beim Schwinden des Tageslichts an dem schwerfällig klappenden Geräusch ihrer Flügel, wenn sie in grossen Schaaren alle nach derselben Richtung hinfliegen. Diese Züge dauern oft stundenlang, und richten sich nach den Fressplätzen an den Flussufern, wo die unter dem Namen *Flooded-gum* bekannten Bäume wachsen, von deren Blättern sie sich nähren. Während der Tageshitze bringen sie alle miteinander zu. Verf. kannte zwei solche Sammelplätze. Der eine bestand aus Gestrüpp, überragt von riesigen *Araucaria Cunninghami*. An den Zweigen derselben, sowie im niedrigen Gestrüpp hingen die fliegenden Füchse in gewaltigen Mengen, die Köpfe nach abwärts gerichtet; ihr Geschrei wird dem junger Krähen verglichen, Alle die sich nicht verwickelt hatten und um Platz kämpften, fächelten sich mit halbausgebreiteten Flügeln. Bei der Annäherung flohen sie von Baum zu Baum. Nach einem Schuss wuchs das Getöse, und Verf. war froh, als er für die Eingebornen genug erlegt hatte, den Platz verlassen zu können. Diese Flucht kommt einige Tage auf denselben Platz, und verschwindet dann. Das Fleisch hat das Ansehen von Kaninchenfleisch. In den kälteren Monaten wandern sie in die tropischen Breiten.

Die bereits im vorigen Berichte p. 14 erwähnte Abhand-

lung von Peters über Mormops ist mit Abbildungen in den Abh. der Acad. zu Berlin p.287 erschienen.

Eine neue Art *Vampyrus auritus* ist daselbst beschrieben und abgebildet. Sie hat folgende Diagnose: V. maximus, cauda brevissima, prosthernate auriculisque longissimis; dentibus molaribus $\frac{3 \cdot 2}{3 \cdot 3} - \frac{2 \cdot 3}{3 \cdot 3}$, spurio inferiore secundo minutulo; patagiis lumbalibus digitorum basi affixis; supra fuscobrunneus, subtus cinereus. Long. corp. tot. 0,12; caudae 0,009; antibrachii 0,08; auriculae 0,042; prosthernatis 0,018; expans. alar. 0,55. — Hab. Mexico et Guiana.

Tomes hat Proc. zool. 1857 p. 34, Annals nat. hist. XX. p.215 die Arten der Gattung *Lasiurus* mit ihrer Synonymie auseinandergesetzt.

Er unterscheidet: 1) *L. noreboracensis* Erxl. mit zahlreichen Synonymen und drei Varietäten, deren zwei Nordamerika, eine Südamerika angehören; 2) *L. pruinus* Say; 3) *L. Grayi* n. sp. Nahe verwandt mit *pruinus*, aber kleiner und durch einige andere Charaktere unterschieden, namentlich erstrecken sich die Flughäute etwas über das Ende der Tibia, aber erreichen nicht die Hälfte der Fusslänge. Chili. 4) *L. caudatus* n. sp. Durch den sehr langen Schwanz, der Kopf und Körper übertrifft, und durch die beträchtliche Länge der Hinterbeine ausgezeichnet. Pernambuco und Chili. 5) *L. Aga*, *Nycticejus Aga* Gerv. vom Amazonenstrom bei Ega. Schliesslich ist noch von einigen minder sicheren Arten die Rede.

Tomes hat ferner vier neue Arten von Fledermäusen beschrieben, und durch folgende Diagnosen unterschieden. Proc. zool. soc. 1857 p. 50, Annals nat. hist. XX. p.227.

1. *Scotophilus pachyomus*, Schnauze ziemlich stumpf; Ohren eiförmig; Tragus kurz, fast gleich breit und am Ende abgerundet. Flughäute reichen bis zur Basis der Zehen. Haar zweifarbig. Etwas grösser als *S. noctula*. Indien.

2. *Scotophilus pumiloides*, Schnauze stumpf; Ohren klein, breit eiförmig, nicht ausgerandet, mit den Spitzen etwas nach auswärts gerichtet; Tragus fast gleich breit, am Ende rund und einwärts gekrümmt; Flughäute reichen zur Basis der Zehen. China.

3. *Vespertilio chinensis*, Scheitel des Kopfes sehr schwach erhaben; Schnauze ziemlich dick; Ohren schmal, eiförmig; Tragus schmal, fast gerade und spitz; Flughäute reichen bis zur Basis der Zehen; Zehen länger als der übrige Theil des Fusses. China.

4. *Vespertilio Blythii*, Ohren eiförmig, etwas spitz, mit den Enden etwas auswärts geneigt; Tragus schmal, und zu einer ziem-

lich spitzen Spitze verschmälert; Scheitel mässig erhaben; Füsse gross, ganz ausser der Flughaut. Nassenabad in Indien.

Ebenso hat T o m e s über drei Gattungen von Vespertilioniden, Furipterus, Natalus und Hyonycteris (Proc. zool. soc. p. 172; Annals nat. hist. XIX. p. 333) eine Abhandlung geliefert, und zwei neue Arten beschrieben.

Für die Gattung Furia F. Cuv. wird der vom Prinzen B o n a p a r t e vorgeschlagene Name Furipterus angenommen. Nachdem die generischen Merkmale festgestellt, wird neben *F. horrens* eine zweite Art *F. coerulescens* von St. Catharine in Brasilien beschrieben und abgebildet, und die Maasse beider verglichen. Diese neue Art hat einen sehr hohen Kopf, flaches, stark behaartes Gesicht, nur die Nasenspitze und die Lippenränder nackt. Ohren so breit wie hoch, rundlich mit winkligen Spitzen. Tragus kurz, gestützt auf einem schmalen Stiele, dicht über welchem jederseits ein absteigender Fortsatz ist; von da verschmälert er sich schnell zu einer schmalen aber rundlichen Spitze, welche ein wenig nach innen gerichtet ist. Die Behaarung ist überall lang und seidenartig; sie ist oberhalb schieferblau an der Basis mit dunkelbraunen Spitzen; Kopf etwas heller, Seiten dunkler und nicht so blau, Lippen aschfarbig, Kinn einförmig graubraun, Brust blaugrau mit weisslich grauen Spitzen; Bauch weisslichgrau. — Von Natalus Gray werden die Charaktere angegeben und *N. stramineus* beschrieben und abgebildet. — Von Hyonycteris Licht. Pet. wird eine zweite Art *H. albiventer* vom River Napo bei Quito beschrieben. Der Wirbel des Kopfes sehr hoch, Gesicht sehr concav, Schnauze etwas verlängert; Ohren kaum so breit wie hoch, Innenrand sehr gerundet, die Endspitze nach aussen geneigt; der Aussenrand ist beträchtlich ausgehöhlt fast in ganzer Länge, aber mit einem rundlichen Vorsprunge an der Basis; Gesicht sehr haarig, Oberlippe mit deutlichem Bart. Farbe oben rothbraun, unten rein weiss mit röthlichem Anflug an Schultern und Kinn.

T o m e s beschrieb (Proc. zool. soc. 1857. p. 134; Annals nat. hist. XX. p. 388) auch zwei Neu-Seeländische Fledermäuse ausführlich, die er als *Scotophilus tuberculatus* Forster und *Mystacina tuberculata* Gray bestimmte.

K r a u s s fand hinter einer Fensterlade eines vermaurerten Fensters 300 Stück Speckmäuse, *Vespertilio noctula*, die also gesellig zu leben scheinen, ohne andere Arten unter sich zu leiden. Württembergische naturw. Jahreshefte 1857. p. 109.

Eine Notiz über *Vespertilio Noctula* Schrb. von D e h n e s. Allg. deutsche Naturh. Zeitung. I. 1855. p. 240. — Eben

so über *Vespertilio* (*Vesperus*) *discolor* ib. p. 435, *Vesperugo* *Alcythoe* Bonap. p. 437 und *Vesperugo* *Savii* Bonap. p. 438.

Leconte stellte Proc. Philadelphia 1857 p. 10 eine neue Fledermaus von Westafrika auf.

Vespertilio pusillus, schwarz, unten etwas mit grau gemischt. Kopf kurz und klein. Vier obere Vorderzähne, paarweis getrennt, einfach; unten sechs dreilappige; Nase nicht ausgerandet. Ohren klein, oval, Ohrdeckel lanzettförmig und ziemlich stumpf. Schenkel-flughaut mit Ausnahme der Basis nackt; Schwanz ein wenig die Haut überragend. Länge 1, 3", Spannung 6, 9".

Insectivora.

Brandt hat Bemerkungen über die Verwandtschaften der biologischen Haupttypen der Kerffresser (*Mammalia insectivora*) und ihre Verbreitung, in besonderer Beziehung auf die Fauna des Russischen Reiches im Bulletin de l'Acad. de St. Petersbourg XVI. p. 17 niedergelegt.

Indem wir die Leser auf diese kleine Abhandlung, die nicht wohl eines kurzen Auszuges fähig ist, selbst verweisen, sei hier nur bemerkt, dass Verf. in Europa nur 12 sichere Arten annimmt (*Erinaceus europaeus* und *auritus*, *Talpa europaea*, *Crocidura leucodon*, *C. aranea*, *Pachyura etrusca*, *Sorex vulgaris*, *S. pygmaeus*, *S. alpinus*, *Crossopus fodiens*, *Myogale moschata* und *M. pyrenaica*), wogegen Russland nur 11 halbbare Arten besitze, indem ihm von oben genannten Arten *Pachyura etrusca*, *Sorex alpinus* und *Myogale pyrenaica* fehle, dagegen *Diplomesodon pulchellus* und *Erinaceus hypomelas* eigenthümlich zukomme. Zum Schluss werden noch „einige Worte über die Verbreitungsgrenzen der einzelnen Arten der Insektivoren Russlands“ beigefügt. *Crossopus fodiens*, *Sorex vulgaris* und auch der Maulwurf gehören zu den weitest verbreiteten Insektivoren, indem sie sich vom Süden bis in den äussersten Osten erstrecken; den beiden Igel *Erinaceus europaeus* und *auritus*, so wie *Crocidura aranea* und *leucodon* wird nur eine mittlere Verbreitungssphäre zugeschrieben; *Diplomesodon pulchellus* und *Erinaceus hypomelas* endlich werden als Thiere beschränkten Vorkommens bezeichnet.

Sorex chrysothorax Dehne n. sp. Allg. Deutsche Naturh. Zeitung I. 1855 p. 241 hält Reichenbach ib. p. 242 für *Crocidura thoracica* Bonap. Darüber hat sich Blasius in unserem Archiv 1856 I. p. 266 deutlich genug geäußert, und wird die vermeintliche Art nach letztgenanntem Forscher zu *S. leucodon* zu ziehen sein.

Sorex odoratus von Westafrika wurde von Leconte als neue Art in Proc. Philadelphia 1857 p.11 kurz beschrieben. Oben dunkel graubraun ins kastanienbraune, unten wenig heller. Schnauze rüssel-förmig, an der Spitze tief ausgerandet, und an der Unterseite gefurcht. Ohren gross, nackt, mit zwei ziemlich grossen Lappen darin, deren unterer der Antitragus zu sein scheint. Schwanz lang, dreieckig. Länge 5", Schwanz 2, 6". Riecht stark nach Moschus.

Dehne unterschied 5 Varietäten des Maulwurfs, *Talpa europaea* L. Allg. deutsche Naturh. Zeitung I. 1855 p. 239.

Carnivora.

Severtzow gab in der Rev. et mag. de zool. 1857. p. 387 und 433 (vergl. Comptes rendus XLIV. p. 707) den Anfang einer Notiz über die Classification der Carnivoren, welche in einem noch nicht veröffentlichten Werke *Recherches sur la classification naturelle et ses rapports avec la distribution géographique des Carnivores, spécialement des Félidés*, niedergelegt werden soll.

Verf. geht von dem Grundsatz aus, dass in den verschiedenen Erdgegenden analoge Reihen von Formen gefunden werden, wovon die Affen, Geier und Riesenschlangen der alten und neuen Welt als schlagende Beispiele angeführt werden, und dass eine gesetzmässige Beziehung zwischen der Organisation und der geographischen Verbreitung statt finde. Er sieht hierin ein Mittel zur Controle, ob die Classification eine natürliche sei oder nicht. In diesem Sinne betrachtet er die Säugethiere, und zunächst die Carnivoren. Wir müssen um so mehr unsere Leser auf die Abhandlung selbst verweisen, die auch auf den Begriff der Species u. dgl. eingeht, als sie theils nicht gut in der Kürze excerptirt werden kann, theils noch nicht beendigt ist.

Von dem Prinzen Max von Wied erhielten wir in Nova acta Acad. caes. Leopoldino-Carolinae naturae curiosorum XXVII. I. p. 33 den Nachweis über die Selbstständigkeit der Species des *Ursus ferox* Desm. Er unterscheidet sich von *U. arctos* vornehmlich durch kürzere Ohren und bogenförmige Krallen, die länger als an allen amerikanischen und europäischen Bären sind. Mehrere Exemplare sind ausführlich beschrieben. Mayer hat die Schädel und Skelete derselben untersucht und die Bemerkungen darüber ib. p. 52 bekannt gemacht. Es sind die Dimensionen des Schädels, der Extremitäten und des Beckens verglichen; die Oeffnun-

gen am Schädel beschrieben, die Geschlechtsdifferenzen an Schädel und Skelet hervorgehoben, so wie Beobachtungen über den innern Bau des Bären hinzugefügt. *Ursus ferox* ist abgebildet; ebenso Schädel und Penisknochen von *U. ferox* und *americanus*.

Reinhardt hat das unter dem Namen Jaratataca in den Provinzen Minas und Bahia vorkommende Stinkthier für eine neue noch unbeschriebene Art, die wie alle bekannten südamerikanischen Stinkthiere zu der Untergattung *Thiopus* gehört, erkannt. Verf. erhielt das Thier auf seiner Reise in Brasilien zu Lagoa Santa im November 1854. Er verglich den Gestank mit einer Mischung von ausserordentlich potenziertem Knoblauchs- und Moschus-Geruch, der Kopfschmerz erzeugte. Er giebt davon in Overs. over det kongelige danske Vidensp. Selskabs Forhandl. i Aaret 1856 p. 271 folgende Diagnose:

Mephitis Westermanni fusco-nigra, vittis duabus latis pallide isabellinis ad caudam usque productis, per dorsum stria media angustissima nigra sejunctis, in vertice et collo confluentibus; cauda pallide isabellina, basi subtus nigra. Longitudo corporis 332 Mm., caudae 310 Mm., stirpis caudae 200 Mm.

Hodgson stellte eine neue Art *Mustela Temon* aus dem Norden von Sikim auf. Journ. of the Asiatic Soc. of Bengal. Calcutta 1857. p. 207.

Sie ist $9\frac{1}{2}$ Zoll lang, der Schwanz ausserdem $6\frac{1}{2}$ Zoll. Die Behaarung ist kurz, weich, am Schwanze kaum länger als am Körper. Farbe oben, seitlich und am ganzen Schwanze rehfarbig, unten ganz blass rein gelb; Unterseite des Kopfes, Rand der Oberlippen und Schenkel weissgrau, letztere jedoch vorn und aussen mehr oder weniger mit einem bräunlichen Ton.

Nach Rainer ist der Nörz (*Foetorius Lutreola* L., *Lutreola minor* Erxl.) in den karpatischen Gewässern, wo er sich sonst nicht selten fand, gänzlich ausgerottet. Verh. des Vereins für Naturk. zu Presburg 1856. Sitzungsberichte p. 100.

In der Revue et mag. de zool. 1857 p. 385 ist von Loche eine neue Genettkatze von Algerien abgebildet und *Genetta Bonaparti* genannt. Sie soll am nächsten der *G. afra* stehen, sich jedoch von ihr und den Verwandten durch die Zeichnung unterscheiden, welche aus Linien und nicht aus Flecken besteht.

Belke hat sich, Bulletin de la soc. imp. des Naturalistes de Moscou 1857 p. 458, auf die Frage von der Abstammung der Hauskatze eingelassen, als deren Stammeltern er die *Felis maniculata* zwar annimmt, aber einige Varietäten für anderen Ursprunges hält. So sei *F. angorensis* Briss. zu *F. Manul* Pall., Temmink's Chat de Chypre oder Chat zèbre und *F. hispanica* Erxl. zu *F. Catus* gehörig. Demnach will er natürlich die *Felis domestica* als spezifische Bezeichnung nicht mehr gelten lassen. Er spricht dann von dem Vorkommen der wilden Katzen in Russland, und beschreibt ein in Podolien erlegtes Exemplar. Dasselbst sollen wilde Katzen seit undenklichen Zeiten nicht gesehen worden sein.

Ueber den Luchs und seine Jagd in Skandinavien finden sich einige Angaben in „Blätter über Pferde und Jagd 1857 p. 187.“ Das Fleisch soll Aehnlichkeit mit Kalbfleisch haben; sie lassen sich leicht zähmen.

Marsupialia.

Gervais hat *Didelphys derbiana* Waterh. in den Mémoires de l'acad. de Montpellier III. p. 249 abgebildet und beschrieben. Die Art zeichnet sich durch die geringe Grösse der Backenzähne und die eigenthümliche Gestalt des Schädels aus, und ist identisch mit *D. ornata* Tschudi.

Rodentia.

Dehne schrieb in der Allg. deutschen naturhist. Zeitung I. 1855 p. 169 fg. über mehrere deutsche Nagethiere und machte Mittheilungen über ihre Lebensweise.

Es sind: *Mus decumanus* Pall., *Mus musculus* L., *Arvicola subterraneus* Selys, *Myoxus speciosus* n. sp. (= *M. avellanarius* nach Blasius in diesem Archiv 1856. I. p. 275), *Mus sylvaticus* L. — Ferner ib. p. 237 und III. p. 35. *Micromys agilis* (= *Mus minutus* nach Blasius in diesem Archiv 1856. I. p. 272). — Ferner ib. p. 443 über *Musculus mollissimus* n. sp. (nach Blasius dies Archiv 1856. I. p. 277 sehr wahrscheinlich eine weisse Hausmaus). — Ferner ib. p. 476 über *Crocidura aranea* Wagl. und p. 478 *Crossopus fodiens* Wagl.

J. E. Gray beschrieb ein neues Eichhörnchen *Sciurus macrotis* von Borneo, welches durch Wallace von Sarawak eingesandt war. Proc. zool. soc. 1856 p. 341; Annals nat. hist. XIX. p. 411.

Es hat grosse Ohren mit langen Haarbüscheln; dunkel kastanienbraun mit hellen Haarspitzen; Steiss, Schenkel und Schwanzwurzel röthlicher; Spitze der Schenkel hellbraun; Füsse schwärzlich; oben an den Seiten ein breiter blasser Streifen; Wangen und Innenseite der Beine heller; Kinn, Kehle und Unterseite weiss; Schwanz sehr breit mit sehr langen weissspitzigen Haaren. Länge des Körpers 13, des Schwanzes 11 Zoll.

Von Leconte wurden drei Arten derselben Gattung von Westafrika, Proc. Philadelphia 1857 p. 11, aufgestellt.

Sciurus subviridescens, Oben schwarz, mit hellbraunen Haarspitzen, in gewisser Richtung grünlich; unten hellgelblich grau; Schwanz länger als der Körper; oben und unten von denselben Farben, nicht zweireihig. Kopf klein. Ohren rundlich und sehr kurz ohne Büschel. Länge 6, 7", Schwanz 7, 5".

Sciurus lemniscatus, Oben am Kopf, oberer Theil des Rückens und Schenkel röthlich braun, dunkler und schwarz gemischt. Rücken mit vier schwarzen Streifen von den Schultern zu den hinteren Körpertheilen, und zwei gelbliche und ein rother Streifen unter der Mitte des Rückens. Die Haare des Kopfes mit Schwarz geringelt, die der Seiten dunkelgrau mit hellrothen Spitzen. Unterseite des Kopfes, des Körpers und der Schenkel weiss. Kopf rundlich; Nase spitz; untere Vorderzähnedünn; Ohren klein und rund. Schwanz zweizeilig. Länge 7, 5"; Schwanz 6, 5".

Sciurus pumilio, Haare kurz und weich, dunkelgrau, mit röthlichbraunen Spitzen, an Kehle und Bauch viel heller. Kopf kurz, rundlich; Ohren klein, Schwanz kürzer als der Körper; zweizeilig; Haar röthlichbraun am Grunde und an der Spitze, schwarz in der Mitte, scheint daher braun gerandet; die vier Zehen an jedem Fuss gleich. Länge 5, 4", Schwanz 2, 3".

Kornhuber beobachtete ein im Winterschlafe befindliches Murmelthier (*Arctomys marmota* Schr.) und machte darüber eine kurze Mittheilung. Verhandl. des Vereins für Naturk. zu Presburg 1857. Sitzungsberichte p. 54.

Schlenzig veröffentlichte einige Actenstücke über einen 1774 zu Lindenau gefundenen Rattenkönig von 16 Stücken. Allg. deutsche naturhistorische Zeitung p. 453.

Gaskoin beschrieb eine Varietät von *Mus musculus* als Var.

nudo-plicatus. Proc. zool. soc. 1856 p. 38; vergl. Annals nat. hist. XIX. p. 93.

Peach schildert die Ernte-Mäuse (*Mus messorius* = *M. minutus* Pall.) als sehr häufig in Cornwall vorkommend. Annals nat. hist. XX. p. 77.

Ueber *Arvicola neglectus* Thompson vergl. Dehne in der Allg. deutschen naturhistorischen Zeitung II. p. 222.

Dehne beschrieb ein lebendes Männchen von *Psammomys obesus* Rüpp. Allg. deutsche Naturh. Zeitung I. 1855. p. 163. — Später (p. 432) fügte er Bemerkungen über die in der Gefangenschaft geborenen Jungen hinzu. Vier Stunden nach der Geburt ging das Weibchen einen Coitus ein, wurde dann abgesperrt, und gebar nach 36 Tagen wieder fünf Junge. — Vergl. ferner ib. II. p. 224.

In Edinburgh new philos. Journal New Series III. p. 1 ist der bereits im vorigen Berichte p. 21 erwähnte *Meriones acadicus* von Dawson auf Tafel I. abgebildet und beschrieben.

Bartlett beschrieb ein Kaninchen vom Himalaya, welches kleiner ist als das Hauskaninchen, und von weisser Farbe, mit Nase, Ohren, Beinen und Schwanz von dunkel braunschwarzer Farbe und mit dunkelrothen Augen. Sie sind seit längerer Zeit im Pelzhandel und gleichen sehr dem Hermelin. Für den Fall, dass die Untersuchung des Schädels eine specifische Differenz ergeben sollte, will ihr Verf. den Namen *Lepus nigripes* beilegen. Proc. zool. soc. 1857. p. 159; Annals nat. hist. XX. p. 520.

Lagomys Curzoniae ist eine neue Art von Hodgson. Journ. of the Asiatic Soc. of Bengal. Calcutta 1857. p. 207 aus dem District Chumbi im Norden von Sikim. 7½ Zoll von der Schnauze zum After; mäusefarbig, blasser und grauweiss auf der Unterseite und an den Extremitäten. Pelz ausserordentlich weich und voll, und zweierlei Art, wollig und haarig, aber beide seidenartig, innerlich schieferblau, äusserlich rehfarbig, mehr oder weniger durch die innere Farbe verdunkelt.

Edentata.

Alessandrini hat *Dasypus minimus* Desm. anatomisch untersucht: Cenni sull' anatomia del Dasipo minimo Desm., *Dasypus sexcinctus et octodecim-cinctus* Linn. Memorie della accademia delle scienze dell' istituto di Bologna Tomo VII. 1856. p. 285—340. Tav. 11—17. Eine schöne Arbeit, wovon ein Auszug hier nicht füglich gegeben werden kann.

J. E. Gray hat das Becken von *Chlamyphorus truncatus* untersuchen können. Das hintere Schild ist vermittelt zweier Paare hinterer Fortsätze und mitten durch die verlängerten Ränder des hintern Kreuzwirbels unbeweglich mit dem Becken verwachsen. Proc. zool. soc. 1857. p. 8; Annals nat. hist. XIX. p. 492. Mit Abbildung in Holzschnitt.

In den Transactions of the zoolog. soc. of London IV. p. 117—140 erschien der Anfang der Anatomie des grossen Ameisenbären (*Myrmecophaga jubata* L.) von Owen mit 4 Tafeln. Vergl. den Ber. über 1855 p. 54 und eine fernere Mittheilung Proc. zool. soc. 1857 p. 22; Annals nat. hist. XIX. p. 59.

Verf. hatte Gelegenheit ein weibliches und ein männliches Exemplar zu untersuchen; über das erstere hat er schon 1854 berichtet. Hier werden die Hautmuskeln, die allgemeine Lage der Eingeweide, die Speicheldrüsen, die Muskeln der Unterkiefer und der Zunge, die Muskeln der Nase, der Ohren und der Lippen abgehandelt.

Ruminantia.

Antinori erwähnt Bulletin de la soc. d'acclimatation III. 1856 p. 555, dass *Camelus dromedarius* in Anatolien von den Türken Loco genannt wird, und dass man dort das Weibchen desselben mit *C. bactrianus* kreuzt, wodurch eine sehr grosse kräftige Rasse mit einem Höcker, von den Türken Tuilhé genannt, erzeugt wird, die meist unfruchtbar ist. Diesen Bastard braucht man zum Transport im Winter, und er würde nach des Verf. Meinung sich zur Einführung in Frankreich eignen.

Jaeger machte Bemerkungen über die Hörner und Epiphysen, sowie über die Sinus des Schädels bei der Giraffe in Vergleichung mit anderen Wiederkäuern. Nova acta Acad. Leop. Carol. XXVII. I. p. 102. Ferner ib. p. 114 Bemerkungen über die Epiphysen und einige Theile des Skelets, insbesondere den von Eichwald beschriebenen Gesichtsknochen und den Uterus des Auers.

Nach einem alten Volksglauben soll die Ursache der einseitigen Verkümmern der Hirschgeweihe von der einseitigen Krankheit eines Hoden oder einer Niere herrühren. Gray hat solche Fälle untersucht und die genannten Organe völlig gesund gefunden, so dass der alte Volksglaube unberechtigt sei. Proc. zool. soc. 1856. p. 151.

Philippi bemerkt in diesem Archiv 1857 p. 135, dass der Guemul des Molina der *Cervus chilensis* von Gay und identisch mit *Cervus antisienensis* d'Orb. sei. Ihm muss also der ältere d'Orbigny'sche Name verbleiben.

Pucheran hat die Kenntniss des *Cervus philippinus* H. Smith (vergl. den Bericht über 1855 p. 56) vervollständigt und eine Abbildung von ihm geliefert. Rev. et mag. de zool. 1857. p. 481. pl. 15.

Nach Lichtenstein (Monatsberichte der Berliner Academie 1856. p. 617) sind *Cervus mexicanus* und *C. virginianus* nicht specifisch verschieden. Eine dritte Art, die nur dem äussersten Westen des Gebietes der vereinigten Staaten angehört, und unter dem Namen „the black-tailed deer“ bekannt ist, wird als eigene Art anerkannt, und wird als *C. Richardsonii* in den Verzeichnissen beizubehalten sein.

J. E. Gray hat in Proc. zool. soc. 1857. p. 157 pl. 55 eine neue Antilope *Oryx beatrix* beschrieben, welche die geraden Hörner von *O. gazella* und die volle Färbung von *A. leucoryx* hat und sich durch dunkle Schenkel und weisse Füsse von beiden unterscheidet. — Ihre Hörner sind schlank, gerade oder nur sehr schwach an der Spitze gekrümmt, weiss, mit einem Fleck mitten auf dem Gesicht, einem kleineren Fleck zwischen der Basis der Hörner, einem grossen Fleck an jeder Wange von den Augen bis unter die Kehle; die Knie und die Vorderseite der Vorder- und Hinterschenkel und ein grosser Fleck an der Brust dunkel schwarzbraun; Ende des Schwanzes schwarz. Fundort: Bombay, aber wahrscheinlich von den Küsten des rothen Meeres.

Sácc hat im Bulletin de la soc. imp. d'acclimatation III. 1856. p. 513 und 561, IV. p. 3, 137 und 227 eine Art Monographie der Ziegen geliefert, in welcher er diese Thiergruppe lebendig schildert, so wie die einzelnen Arten (7 Steinböcke und 2 Ziegen) bespricht, und die verschiedenen Varietäten der Hausziege abhandelt u. s. w.

Betrachtungen über die Angora-Ziege wurden von de Tchihatchef Bulletin de la soc. d'acclimatation II. 1855. p. 305 u. 411 veröffentlicht.

Bartlett beschrieb die chinesischen Schafe, welche dem Prinzen Albert von Shanghai durch den Viceconsul Alcock gesendet worden sind. Proc. zool. soc. 1857. p. 104; Annals nat. hist. XX. p. 386. Diese Schafe haben keine äusseren Ohren, grobe mit langen Haaren untermischte Wolle, keine Hörner, breiten kurzen an der Spitze aufgekrümmten Schwanz, und zeichnen sich durch grosse Fruchtbarkeit aus, denn sie werfen zweimal jährlich vier bis fünf Junge. Wegen ihrer Fruchtbarkeit möchte es zweckmässig sein, diese Varietät zu cultiviren und zu veredeln.

De Bray, welcher an der Expedition zur Auffindung von Franklin unter Kapitain Kellet Theil genommen, schilderte der Pariser Academie den *Bos moschatus* als ein schönes und wildes Thier. Comptes rendus XLV. p. 173; Rev. et mag. de zool. 1857. p. 362.

Davelouis hat die Büffel zum Gegenstande einer lebendigen Schilderung gewählt. Bulletin de la soc. d'acclimatation IV. 1857. p. 461, 519.

Solidungula.

Luigi Mucci berichtete über den Abortus einer Maulthierstute, welche von einem Esel belegt war, nach 5monatlicher Trächtigkeit. Annali civili del regno delle due sicilie. 1857 p. 63.

Eine Notiz über den Equus Hemionus von Dussumier findet sich im Bulletin de la soc. d'acclimation II. 1855. p. 260.

Multungula.

Owen beschrieb die Föthalhäute und die Placenta des Elephanten (*Elephas indicus* Cuv.) und machte Bemerkungen über den Werth der Charaktere der Placenta für die Classification der Säugethiere. Philosophical Transactions of the Royal Society of London for the Year 1857 Vol. 147. p. 347. — Vergl. auch Proc. Royal soc. May 1857, und Annals nat. hist. XX. p. 147.

Verf. hält die Combination zweier Formen der Placenta beim Elephanten, nämlich die ringförmige und die ausgebreitete (diffused), welche bei den anderen Säugethiern auf verschiedene Arten beschränkt sind, für entscheidend, dass die Modificationen der Placenta zur Charakterisirung der oberen Gruppen der Säugethiere nicht anwendbar seien.

Jaeger hat die Schneidezähne des *Rhinoceros javanicus* mit denen des fossilen *Acerotherium incisivum* Kaup und den abortiven Schneidezähnen des *Rhinoceros bicornis* vom Kap verglichen, sowie über die Ausdehnung der Sinus des letztern und einiger anderer Säugethiere Bemerkungen gemacht. Darauf folgen Bemerkungen über die Entwicklung der Zähne des *Hippopotamus amphibius*. Nova acta acad. Caes. Leop. Carol. XXVII. I. p. 118—134.

Bataille giebt von dem amerikanischen Tapir an, dass sein Fleisch gesund und von gutem Geschmacke sei, auch vielfach in den Handel käme. Das junge Männchen folgt der Mutter bis es erwachsen ist, während die jungen Weibchen sich bald von ihr trennen. Bulletin de la soc. imp. d'acclimatation IV. 1857. p. 1.

Pinnipedia.

Captain Belcher gab eine kurze Notiz über das Wallross, schilderte die Hülfe, welche die Jungen der verwundenen Mutter leisteten und die Art seiner Bewegung. Edinburgh new phil. Journ. New Series III. 1856. p. 360.

Cetacea.

Shaw theilte die Uebersetzung einer Beschreibung des Ajuh, einer Art Walle, welche Dr. Vogel in dem Fluss Benué oder Chadda in Centralafrika gefunden hatte, mit. Report of the 26 meeting of the british association for the advancement of science held at Cheltenham p. 98.

Das Individuum war 5 Fuss lang, hatte an jeder Flosse 3 Nägel, die Augen dicht hinter den halbmondförmigen Naslöchern; 5 sechsspitziqe dreiwurzelige Backenzähne, keine Vorderzähne; Farbe oben dunkelgrau, Bauch weisslich. Wird bis 10 Fuss lang. Owen urtheilt aus dieser unvollständigen Beschreibung, dass das Thier nahe verwandt mit *Manatus senegalensis* sei, sich jedoch von dieser Art, namentlich durch die geringe Entfernung der Augen von den Naslöchern unterscheide, und nennt die Art *Manatus Vogelii*.

Von derselben Species von Thieren, die er übrigens Ayu schreibt, untersuchte auch Balfour Baikie einen Schädel, und obgleich er nicht zur Ueberzeugung gekommen, neigt er doch zur Owen'schen Ansicht, es möge eine eigene Art sein, und die drei nun bekannten Arten würden sich geographisch so verhalten, dass *M. australis* Tiles. in Westindien und an der Nordostküste von Südamerika lebe, *M. senegalensis* Desm. in den Afrikanischen Flüssen vom Senegal bis Gambia, *M. Vogelii* Owen in den Flüssen, die sich in die Biafra-Bai münden. Die Individuen, welche zuweilen an den britischen Küsten sich gezeigt haben, glaubt er für *M. australis* halten zu müssen, die quer durch den Ocean gekommen seien, zumal sie immer an der Westküste beobachtet worden. Ueber die Artgültigkeit von *M. nasutus* Wyman und *M. latirostris* Harl. enthält er sich des Urtheils. Proc. zool. soc. 1857. p. 29; Annals nat. hist. XX. p. 66; vergl. auch Edinburgh new phil. Journ. N. S. IV. 1856. p. 345.

Derselbe Schädel veranlasste J. E. Gray (Proc. zool. soc. 1857. p. 59; Annals nat. hist. XX. p. 312) die Schädel der Manati's des Britisch Museums zu vergleichen. Auch er kommt nicht zu einer definitiven Entscheidung und will noch weitere Materialien erwarten, ob *M. australis* von Cayenne und *latirostris* von Ostflorida, Jamaica und Cuba, sowie *M. Senegalensis* Blainv. (nicht Cuv., welches *australis* sei) und *M. Vogelii* verschiedene Arten seien.

Jaeger konnte vier Schädel des amerikanischen Manati und das Skelet eines erwachsenen und eines jungen Thieres vergleichen. An einem derselben fand er in der etwas erhöhteren Mitte der Stirnbeine eine linsengrosse Oeffnung. Eine solche Oeffnung fand Verf. auch an dem Schädel eines jungen Dugong. Vergleichungshalber wird denn auch eine solche Oeffnung bei einer jungen Giraffe beschrieben. Nova acta Acad. Leop. Carol. XXVII. I. p. 91.

v. Rapp machte anatomische Untersuchungen über *Manatus latirostris* Harl. in den Württembergischen naturw. Jahreshften 1857 p. 87 bekannt. Die Untersuchungen beziehen sich auf die Zunge, Luftröhre, Lunge, Herz, Speiseröhre, Magen, Milz, weibliche Fortpflanzungswerkzeuge, Gehörknochen und Auge. Abgebildet sind Lunge, Magen und Gehörknochen.

Nach Fairholme ist *Halicore australis* in Moreton Bay in Südaustralien noch häufig, obgleich von den Eingeborenen auf sie stark Jagd gemacht wird. Sie lieben das Fleisch sehr, und schreiben dem Thran ähnliche Eigenschaften zu, wie dem Leberthran. Ihr Name ist Yungan. Sie wird 9—10 Fuss lang und hat 5—8 Gallonen Thran. Sie frisst Sectang. Früher wurden sie mit Netzen gefangen, jetzt mit Harpunen. Proc. zool. soc. 1856. p. 353.

Jonathan Couch hat die Wallfisch - Arten besprochen, welche an den Küsten von Cornwall beobachtet worden sind. Annals nat. hist. XX. p. 424.

Verf. schildert zunächst die Schwierigkeiten, welche die richtige Bestimmung der Exemplare verhindern, giebt Rathschläge, auf welche Punkte die Fischer achten, und die sie notiren möchten, und zählt dann die einzelnen Arten auf: *Balaenoptera musculus* Flem., *B. rostrata* Gray, *Megaptera longimana* Gray, *Physeter macrocephalus* L., *Ph. Tursio* Flem., *Hyperoodon rostratum* Gray, *Delphinus delphis* L., *D. Tursio* Bell, *D. Mongitori* Raf.?, *Phocaena Deductor* Scoresby, *Ph. orca* Bell, *Ph. communis* Bell, *Ph. albicans*, also im Ganzen 13 Arten.

Heddle berichtete über einen Wallfisch der Gattung *Physalus*, welcher an den Orkney - Inseln am 9. März 1856 strandete. Es war ein Weibchen und 50 Fuss lang. Zu derselben Zeit strandete auch ein anderes Exemplar, ein Männchen. Maasse sind genommen, und manche Organe beschrieben. Verf. fand, dass diese Wallfische zwischen *Physalus boops* und *antiquorum* ständen, beide Sectionen mit einander verbindend, aber näher an *boops*. Proc. zool. soc. 1856. p. 187.

Van Beneden beschrieb das Skelet des Wallfisches, welcher im Jahre 1851 bei der Insel Vlieland von Fischern der Insel Urk todt gefunden wurde, und welches nunmehr im zoologischen Garten zu

Antwerpen unter einem Zinkdach aufgestellt ist. Während der Wallfisch eine Länge von 22 Mètres hatte, misst das Skelet nur 21 Mètres, also ein Mètre weniger. Es besitzt 61 Wirbel und 14 Rippenpaare. Verf. bestimmt dasselbe als den gemeinen Finnfisch *Pterobaena communis* Eschricht, der an den Küsten von Grönland und Island lebt, und die Nordsee, den Kanal La Manche und das Mittelmeer besucht. *Bulletins de l'Académie royal de Belgique*. 2 Serie I. p. 390.

In der *Revue et Mag. de zoologie* 1857 p. 94 wird noch einmal auf die Frage über die Lage der Barten bei den Wallfischen eingegangen (vergl. den vor. Ber. p. 25) und auch durch einen Brief Eschricht's zu Gunsten E. Rousseau's entschieden.

Wyman hat das Auge des Kaschelots (*Sperm whale*) untersucht. *Proc. Boston Soc.* VI. p. 125.

Prosch erklärte sich für das Ausspritzen wirklicher Wassersäulen aus den Spritzlöchern bei den eigentlichen Wallfischen. *Förhandlingar vid de skand. Naturf. sjette möte*. Stockholm 1855. p. 145. übersetzt von Creplin in der *Zeitschrift für die allg. Naturw. von Giebel und Heintz*.

Bericht über die Leistungen in der Herpetologie während des Jahres 1857.

Vom

Herausgeber.

In Emile Blanchard's Prachtwerke „l'Organisation du règne animal“, von welchen seit 1852 bisher 23 Lieferungen erschienen sind, die ich leider für unsere Berichte bisher nicht benutzen konnte, sind sieben Lieferungen (3, 5, 8, 11, 14, 17, 19) den Reptilien gewidmet. Der Text in diesen Lieferungen enthält einen sehr ins Einzelne gehenden historischen Bericht über die bisherigen Leistungen in der Herpetologie, soweit sie sich auf die Organisationsverhältnisse beziehen. Der specielle Theil des Textes steht noch zu erwarten.

Die bereits erschienenen Abbildungen stellen die Skelete und osteologischen Details von *Testudo ibera* Pall., *Alligator mississippiensis* Daud, *Chamaeleo africanus*, *Phrynosoma cornutum*, *Varanus aegyptius*, *Gecko mauritanicus*, *Stellio vulgaris*, *Iguana tuberculata* und *Lacerta viridis* dar. Auf taf. 19 ist der Circulationsapparat von *Stellio vulgaris* abgebildet.

Jan hat ein Verzeichniss der im Museum zu Mailand aufbewahrten Reptilien veröffentlicht: *Cenni sul Museo civico di Milano ed indice sistematico dei Rettili ed Anfibi esposti nel medesimo*. Milano 1857. 8. Obgleich ein blosses Namenverzeichniss mit Angabe der Fundorte lässt es uns doch einen Blick in das System dieses Gelehrten, von dem wir hoffentlich bald ein Werk über die Schlangen erwarten dürfen, thun. Im Ganzen der Anordnung von Dumeril und Bibron folgend finden sich doch in der Begrenzung der Familien einige Aenderungen.

A. Dumeril machte eine kurze Anzeige von dem Cataloge der Reptilien des Pariser Museums, den er beim Antritte seiner Professur als Nachfolger seines Vaters angefertigt hat. Während 1790 von Laclepède 292 Arten, 1803 von Daudin 556 Arten, 1834 von Dumeril und Bibron 846 Arten, 1854 beim Schlusse von deren *Erpétologie générale* 1310 Arten aufgezählt wurden, enthält der gegenwärtige Catalog 1393 Arten; nämlich 126 Schildkröten, 504 Eidechsen, 523 Schlangen, 240 Batrachier. *Rev. et mag. de zoologie* 1857. p. 188.

Nach einer Angabe desselben Verfassers *ib.* p. 470 befinden sich in der Menagerie des Pariser Museums 3012 Reptilien in 174 Arten, nämlich 45 Schildkröten, 38 Eidechsen, 59 Schlangen, 32 Batrachier, darunter auch *Pipa americana*.

Als Amphibien, die der Fauna von Gottland angehören, führt Mewes in *Öfversigt af kongl. vetenskaps-akademiens Förhandlingar* Jahrg. 1856. p. 282 die folgenden an:

Lacerta vivipara Jacq., *Coluber natrix* L., *Vipera berus* L., *Rana temporaria* L., *Rana arvalis* Nils., *Pelobates fuscus* Wagl., *Bufo vulgaris* Laur., *Bufo variabilis* Merr., *Triton cristatus* Laur.

Mjakoff machte Bemerkungen über die Reptilien des Gouvernement Wologda. *Bulletin de la soc. imp. des naturalistes de Moscou* 1857 p. 581.

Während unter dem 40. Grade des südlichen Russland 3 Chelonier, 16 Saurier, 17 Ophidier und 4 Batrachier, also zusammen 40 Arten, unter dem 50. Grade 1 Chelonier, 6 Saurier, 6 Ophidier, 12 Batrachier, also zusammen 25 Arten vorkommen, leben nach der Angabe des Verf. unter dem 60. Grade, wo seine Untersuchungen angestellt wurden, nur 1 Saurier, 1 Ophidier und 3 Batrachier, also zusammen 5 Arten. Diese sind *Lacerta vivipara* Jacq., *Vipera berus*, *Rana temporaria* L., *Bufo vulgaris* Laur. und *Triton taeniatus*.

Ein Verzeichniss derjenigen Reptilien, welche Rabenhorst im Jahre 1847 in Italien gefunden hatte, lieferte Dehne in der *Allg. deutschen naturhistorischen Zeitung* II. p. 212.

In einer Schilderung der tropischen Wälder und ihrer Fauna aus Brehm's handschriftlichen Reiseskizzen aus Nordost-

afrika, Allg. deutsche naturh. Zeitung I. 1855, finden sich auch p. 220 Angaben über die Reptilien von Sudahn.

Hallowell machte Bemerkungen über eine Sammlung Reptilien von Gaboon in Westafrika, welche durch Dr. Ford der Academie zn Philadelphia geschenkt wurde. Am Schlusse ist ein Verzeichniss der Amphibien, welche von Liberia (18) und von Gaboon (36) bekannt sind. Proc. Philadelphia 1857 p. 48.

v. Baer¹⁾ hat in seinen Kaspischen Studien, Bulletin de l'Acad. de St. Petersburg XV. p. 193. einen Blick auf die Fauna der Naphtha-Insel geworfen, und erwähnt namentlich einige Arten der Gattung Phrynocephalus, unter denen ihm eine für die Caspische Fauna neu schien. Sie wird jedoch nur erwähnt.

Der durch seine ichthyologischen Arbeiten berühmte Bleeker in Batavia hat in diesem Jahre auch mehrere Beiträge über die Amphibien der Inseln des Indischen Archipels geliefert, die in der Naturkuundig Tydschrift voor Nederlandsch Indië abgedruckt sind.

Im 13. Bande dieser Zeitschrift p. 470 findet sich ein Bericht über einige Reptilien von Sumatra, Borneo, Batjan und Buru.

Das Verzeichniss der durch Ludeking von der Westküste Sumatra's gesammelten Reptilien enthält 16 Arten, von Sumatra kennt er im Ganzen 58 Arten. Eine kleine Sammlung von Batjan durch Bernelot Moens bestand aus 9 Arten. Durch Hoedt erhielt er 4 Arten von Buru. Durch Roelandt erhielt er 19 Arten Schlangen von der Westküste Borneo's, von welcher Insel er 55 Arten in seiner Sammlung besitzt (2 Schildkröten, 10 Eidechsen, 37 Schlangen und 6 Frösche), während die Zahl der von Borneo bekannten Amphibien etwa 78 betragen soll. Die neuen Arten sollen anderen Orts beschrieben werden.

Im 14. Bande derselben Zeitschrift, der mir noch nicht zu Händen gekommen, aber auch 1857 erschienen sein muss, sind höchst wahrscheinlich die folgenden mir in Separatabdrücken vom Verf. gütigst übersandten Abhandlungen erschienen, da sie vom Jahre 1857 datirt sind.

1. „Aufzählung der Reptilien, die bisher von der Insel Java bekannt geworden sind.“ Die Zahl dieser Arten ist 173, nämlich

12 Schildkröten, 34 Eidechsen, 102 Schlangen (63 giftlose, 18 verdächtige und 24 giftige; von letzteren 13 Land- und 11 Seeschlangen), 25 Batrachier.

2. „Ueber einige Reptilien von der Insel Banka.“ Hiernach kommen dort 34 Arten vor, nämlich 14 Eidechsen, 17 Schlangen und 3 Batrachier. Verf. vermuthet einen viel grösseren Reichthum.

3. „Ueber einige Reptilien von Celebes.“ Von da sind 3 Schildkröten, 9 Eidechsen, 31 Schlangen und 5 Batrachier, zusammen 48 Arten bekannt.

4. „Aufzählung der bis jetzt von der Insel Sumatra bekannt gewordenen Reptilien.“ Es enthält 12 Schildkröten, 27 Eidechsen, 61 Schlangen, 14 Batrachier, zusammen 114 Arten.

Tancred schildert die Amphibienfauna von der Provinz Canterbury in Neu-Seeland als beschränkt auf eine kleine Eidechse, und preist es als ein Glück, dass auch kaum schädliche Raubthiere dort vorkommen. Edinburgh New phil. Journ. New Series III. 1856. p. 17.

Hallowell erstattete Bericht über eine Sammlung von Reptilien von Kansas und Nebraska, welche der Academie zu Philadelphia durch Hammond eingesendet war, begleitete einige Arten mit Bemerkungen, und beschrieb eine neue Gattung und mehrere neue Arten. Proc. Philadelphia VIII. p. 238—255.

Ueber eine von Heermann in der Umgebung von San-Antonio in Texas zusammengebrachte und an die Academie zu Philadelphia eingesandte Sammlung von Reptilien, gab gleichfalls Hallowell Nachricht. Proc. Philadelphia VIII. p. 306. Darunter befindet sich ein neuer Laubfrosch.

Obgleich Fabricius in der Fauna groenlandica *Rana temporaria* als in Grönland vorkommend aufführt, zweifelt Reinhard an dem Vorkommen eines Frosches in jenem Lande. Rink's Groenland, Anhang p. 20.

Chelonia.

Von Agassiz grossartigem Werke Contributions to the natural history of the united states ist bereits der erste und zweite Band erschienen, in denen die Schildkröten behandelt worden sind. Das Werk selbst ist mir noch nicht zu Händen gekommen, daher theile ich hier den Auszug

einer Anzeige aus der Neuen Zeit, einer in New-York erscheinenden Zeitung mit, die von Dr. Weinland herrührt. Der letztere steht mit der Arbeit über Schildkröten, wie daraus hervorgeht, in sehr enger Beziehung. Es heisst daselbst:

In der Charakteristik der Ordnung der Schildkröten im Allgemeinen, die grossentheils von dem Schreiber dieser Zeilen herrührt, ist die vergleichende Anatomie der Schildkröten niedergelegt. Der Anatom wird hier nicht wenige neue Thatsachen von Interesse aufgezeichnet finden, so in Beziehung auf den Bau der Haut der Schildkröten, der genau mikroskopisch verfolgt wurde, namentlich mit Rücksicht auf die Scheidung der knöchernen Büchse dieser Thiere in das Hautskelet und in das eigentliche animalische Skelet. In dem Paragraphen über Respiration wird man genaue Messungen über die Capacität der Lungen der verschiedenen Arten finden, namentlich hat sich bei dieser Untersuchung herausgestellt, dass jene Capacität unendlich grösser ist bei den Landschildkröten als bei den Wasserschildkröten (*Trionyx*). Die amphibisch lebenden Sumpfschildkröten stehen in der Mitte zwischen ihnen. — Hierauf folgen die Schilderungen der verschiedenen Familien der nordamerikanischen Schildkröten, in deren Ausarbeitung Agassiz namentlich von seinem Schüler Mills unterstützt wurde. Nordamerika zeigt sich als das eigentliche Schildkrötenland, denn Agassiz zählt 51 Arten in 24 Gattungen. Eier und Junge der meisten sind abgebildet. Viele Arten sind neu, einige noch zweifelhaft. Ein schöner Artikel über die geographische Verbreitung der Schildkröten schliesst den ersten Band. Der zweite Band enthält die Embryologie der Schildkröten, worin Agassiz wesentlich von einem zweiten Schüler, James Clark, unterstützt wurde. Die schönen Zeichnungen rühren theils von dem Letzteren, theils von dem Künstler Sonrel her; es sind 35 Tafeln. Das Ei der Schildkröten entsteht als ein ausserordentlich kleines Bläschen im Eierstock, kleiner als die Zellen selbst, die das Gewebe des Eierstocks zusammensetzen. Wir finden in dem Werk eine vollständige Analyse des Dotter-Inhaltes des reiferen Eis mit Abbildungen. Der Act der Befruchtung für jedes Ei findet bei den Schildkröten nicht einmal (?), sondern mehreremal statt; von der ersten Begattung bis zum Legen des Eies verstreicht ein Zeitraum von nicht weniger als 4 Jahren, und in diesem Zeitraum finden 8 Begattungen statt. Die Eier werden nur einmal im Jahre gelegt; das ganze Ei, sagt Agassiz, ist der zukünftige Embryo, der ganze Entwicklungsprocess des Embryo ist ein continuirlicher; jedoch unterscheidet Agassiz der Uebersicht halber 31 Stufen der Entwicklung vom ersten Auftreten des Eies im Eierstock bis zum Ausschlüpfen des Embryo.

C. Müller schilderte das Leben der Schildkröten im

Nordosten der vereinigten Staaten und zählte 11 dort vorkommende Arten auf, denen Reichenbach einen Zusatz widmete. Allg. deutsche naturh. Zeitung I. 1855 p. 82.

Mills hat die Familiencharaktere der Schildkröten geprüft, und meint sieben Familien unter den Nordamerikanischen unterscheiden zu können, die in zwei natürliche Gruppen zerfallen, Seeschildkröten und Emyden; die ersteren bewegen sich vermittelst der Vorderfüsse wie die Vögel, die letzteren mittelst aller vier Gliedmassen, wie die Säugethiere. Proc. zool. soc. VI. p. 64.

J. E. Gray gab Notizen über einige Indische Schildkröten, mit Beschreibung einer neuen Art *Testudo elongata* Oldham. Proc. zool. soc. 1856. p. 181; Annals nat. hist. XIX. p. 342.

Miram hat im Bulletin de la soc. imp. des Naturalistes de Moscou 1857. p. 482 Beiträge zur Naturgeschichte der Sumpfschildkröte (*Emys europaea*) geliefert, und namentlich nach eigenen Beobachtungen die Art und Weise geschildert, wie diese Thiere ihre Eier legen und in die Erde einscharren. Er hat auch die eben ausgekrochenen Jungen drei Monate lang lebend erhalten, und findet, dass sie sehr langsam wachsen.

J. E. Gray stellte eine neue *Chelodina expansa* von Australien auf. Proc. zool. soc. 1856. p. 369 pl. XII; Annals nat. hist. XIX. p. 485.

Brandt unterscheidet zwei nahe verwandte Arten von *Trionyx javanicus* Geoffr. als *T. Maackii* n. sp. aus dem Amur und *T. Schlegelii* (*Trionyx stellatus* seu *javanicus* Var. *japonica* Schlegel Fauna jap.) aus dem nördlichen China und Japan. Bulletin de l'acad. de St. Petersbourg XVI. p. 110.

Saurii.

Crocodilini. Balfour Baikie beschrieb einen Schädel von *Mecistops* aus den Flüssen Binnë und Tsadda in Centralafrika, den er für *M. cataphractus* hält. Das Thier soll dort äusserst selten sein, und Verf. hält es für einen Repräsentanten der *Gaviale* in Afrika. Proc. zool. soc. 1857. p. 57; Annals nat. hist. XX. p. 312.

Derselbe hat aus dem Niger und Tsadda mehrere Krokodilschädel mitgebracht, die ihm von *C. vulgaris* und *marginatus* verschieden scheinen, und die er für den Fall, dass die Thiere sich als neu ergeben sollten, *Crocodilus binuensis* nennt. Proc. zool. soc. 1857 p. 48; Annals nat. hist. XX. p. 380.

Geckones. *Hemidactylus praesignis* Hallowell. Proc. Philadelphia VIII. p. 222 von Jamaica.

Ignanini. Hallowell beschrieb Proc. Philadelphia VIII. p. 222 folgende neue Arten dieser Familie: *Morops macrodactylus* von Neugranada, *Anolis* (Draconura) *tropidogaster* von Neugranada, *A. punctatissimus* von Jamaica, *A. leucocephalus* (= *Placopsis ocellata* Gosse) ebendaher, *A. sericeus* aus Mexico, *A. acutus*, *angusticeps* und *heterolepis* von Cuba, *Brachysaurus* (n. gen.) *erythrogaster* von Neugranada, *Proctotretus niger* von Quinquina Island. Schliesslich stellt Verf. die auf Cuba, Jamaica und Martinique vorkommenden Arten nach Dumeril und Bibron, Gray und Gosse zusammen, woraus eine grosse Verschiedenheit der Amphibienfauna dieser drei Inseln ersichtlich wird. (Vergl. auch Silliman Amer. Journ. XXVIII. p. 282).

Lacertini. Die schwarze Varietät von *Zootoca vivipara* ist bei Eastbourn in Sussex von Mackay gefunden worden, wo sie bisher nicht bekannt war. Annals nat. hist. XIX. p. 107.

Paulus hat Beobachtungen über die Verbreitung der *Lacerta muralis* in Württemberg angestellt. Württembergische naturw. Jahreshefte 1857 p. 54.

Tachydromus Fordii Hallowell von Gaboon. Proc. Philadelphia 1857 p. 48.

Ptychopleuri. *Gerrhosaurus nigrolineatus* Hallowell von Gaboon. Proc. Philadelphia 1857. p. 49.

Scincoidei. Notice of some new and rare species of Scincidae in the collection of the academy of natural sciences of Philadelphia. By Edward Hallowell Transactions of the Amer. phil. soc. held at Philadelphia for promoting useful knowledge. Vol. XI. Part. I. p. 71.

In diesem Ansätze sind folgende Arten beschrieben; *Enmece quadrilineatus* Hallow., *Euprepis striata* Hallow., *Euprepis Harlani* (*Plestiodon Harlani* Hall.), *Euprepis Blandigii* Hallow., *Euprepis longicaudata* n. sp. von Siam, *Euprepis dissimilis* n. sp. von Bengalen, *Euprepis microcephalus* Hall. (*Scincus ventralis* Peale et Green), *Euprepis swimanensis* n. sp. von Surinam, *Plestiodon sinense* Dum. Bibr. — *Euprepis striata* und *Harlani* sind abgebildet.

Plestiodon vittigerum Hallowell. Proc. Philadelphia VIII. p. 310 aus Michigan.

Euprepis frenatus von Liberia und *albilabris* Hallowell von Gaboon. Proc. Philadelphia 1857. p. 50.

Ranken schilderte den Bau und die Lebensweise der Blindschleiche (*Anguis fragilis*) in Edinburgh new phil. Journ. N. S. V. 1857.

p. 102—117. Namentlich wird die Form, die Farbe, die Hautbedeckung und ihre Häutung beschrieben. Ferner wird über ihre Zerbrechlichkeit und die Reproduction des abgebrochenen Schwanzes gehandelt. Wirbel werden nicht reproducirt. Die Tragezeit wird auf 4 Monate angenommen; über den Winterschlaf konnten keine Beobachtungen angestellt werden u. s. w.

In den Proc. Philadelphia 1857 p. 51 erklärt Hallowell die früher von ihm ib. VI. p. 616 beschriebene Art *Acontias elegans* für generisch verschieden, und schlägt für sie den Gattungsnamen *Sphenorhina* vor.

Ophidia.

Opoterodonta. Peters stellte vier neue amerikanische Schlangen aus der Familie der Typhlopinen auf, und las in der Academie über dieselben. Monatsberichte der Berliner Academie 1857. p. 402 und 508. Die vier neuen Arten heissen: *Rhinotyphlops albirostris* n. gen. von Veragua, *Typhlops flavoterminalis* von Caracas, *Stenostoma macrolepis* ebendaher und *Stenostoma fallax* von Laguna. — Von der neuen Gattung wird später p. 509 angegeben, der Unterschied von Typhlops bestehe nur in dem Vorhandensein doppelter Nasenschildchen, und *T. flavoterminalis* gehöre ebenfalls dahin.

Gervais bildete die Köpfe einiger Schlangen von Algier, welche von Paul Marés eingesendet waren, ab. Mém. de l'acad. de Montpellier III. p. 511 pl. V. Die abgebildeten Arten sind: *Heterodon diadema* Dum., *Lycognathus cucullatus* Dum., *Psammophis punctatus* Dum., *Zamenis florulentus* Dum., und eine neue Art *Coelopeltis productus*, welche zuerst in den Comptes rendus Juillet 1857 vom Verf. aufgestellt war.

Ueber die Structur der Knochen von Python hat Green Proc. Boston soc. VI. p. 55 eine Bemerkung gemacht.

Dehne beschrieb *Chilobothrus inornatus* Dum. Bibr., welche in der Höhlung eines Stückes Bauholz aus Valparaiso beim Durchsägen gefunden war. Allg. deutsche Naturh. Zeitung II. p. 221.

Im Verfolg seiner Beobachtungen über *Zamenis Aesculapii* (vgl. vor. Ber. p. 72) setzte Erber das Verzeichniss der Mahlzeiten seiner Thiere fort. Ein Exemplar hat 14 Monate hindurch keine Nahrung zu sich genommen, ohne besonders abgemagert zu sein. frass dann zwei Mäuse mit ihren sieben Jungen, später noch acht andere Mäuse, ist aber dann gestorben.

Wir haben hier ferner eine ganze Reihe von neuen Gattungen und Arten zu erwähnen, welche Hallowell aufgestellt hat. Da jedoch diese grössere Anzahl neuer Gattun-

gen wohl noch der Sichtung bedürfen wird, die den speciellen Studien eines Ophiologen zu überlassen ist, so verzichte ich auf die Angabe der meist längeren Gattungs-Diagnosen.

In der Familie Boidae ist *Notophis bicarinatus* von Cuba aufgestellt, Transactions of the American philosophical society, held at Philadelphia for promoting useful knowledge Vol. XI. Part I. p. 65.

Die Familie Calamaridae bereicherte er Proc. Philadelphia VIII. p. 240 um eine neue Gattung *Microps lineatus* von Kansas, die sich von Homalosoma durch die gekielten Schuppen, die spitze Schnauze und die Form des Stirnschildes unterscheiden soll.

Aus Rhinostoma occipitale wird ib. p. 310 eine neue Gattung *Lamprosoma* gebildet, die nahe mit Simotes verwandt sei, sich aber durch die Lage der Naslöcher in einer Platte und die gerundete Schnauze von ihr unterscheide; die Art lebt in Californien.

Tropidonotus obliquus wird ib. p. 248 als eine neue Art beschrieben.

Chlorophis heterodermus von Gaboon wird als Typus einer neuen Gattung angesehen. Proc. Philadelphia 1857 p. 53.

Ebenso gründet derselbe auf seine *Dendrophis flavigularis* eine neue Gattung *Thrasops* ib. p. 67. Desgleichen auf *Coronella triangularis* die Gattung *Heteronotus*.

In der Familie Lycodonta stellte Hallowell zwei neue Arten und eine neue Gattung auf, Proc. Philadelphia 1857. p. 54; *Boaedon quadrivittatum* von der Insel de Los. Die früher vom Verf. beschriebene *Coelopeltis virgata* wird zur Gattung *Boaedon* gezogen. — *Hormonotus* n. gen. soll sich durch die Gestalt des Kopfes, die verschiedenen Verhältnisse der Internasalia und Praefrontalia, sowie die Form des Frontale von *Lycognathus* unterscheiden. Die Art heisst *H. audax* von Gaboon. — *Lycophidion laterale* von Gaboon.

Opisthoglypha. Peters gründete auf *Calamaria microphthalma* Bianconi eine neue Schlangen-Gattung *Amblyodipsas* in der Ordnung Opisthoglypha, die ein Bindeglied zwischen den Familien Stenocephali und Platyrrhini bilden soll. Maxillae superiores subbreves, apice introrsum curvatae; dentes maxillares pauci laeves, recurvati, retrorsum longitudine crescentes, diastemate a dentibus duobus posticis juxtapositis sulcatis sejuncti. Dentes palatini recurvati, longitudine fere aequales, pterygoidei minores; dentes mandibulares recurvati, primores discreti, versus medium longitudine sensim crescentes; corpus teres; cauda brevis, conica; caput depressum, rostro brevi, obtuso; oculi minimi, superi; nares minimae, anticae, utrinque in scutelli nasalis medio apertae; scutella praefrontalia labialia tangentia; frenalia, internasalia et anteorbitalia nulla; postorbitalia sim-

placia; scuta abdominalia subangusta subeaudalia divisa; squamae laevissimae. A. microphthalma (Calamaria microphthalma Bianconi) von Inhambane. Monats-Berichte der Berliner Academie 1856 p. 593.

Hallowell erklärt Proc. Philadelphia 1857. p. 59 *Oxybelis Lecomptei* Dum. Bibr. für identisch mit seiner *Leptophis Kirtlandii*, die daher *Oxybelis Kirtlandii* heissen müsse. — Derselbe gründet daselbst auf *Dipsas Blandingii* eine neue Gattung *Toxicodryas*, die nur einen grossen Furchenzahn hinten im Oberkiefer hat, und dadurch von *Triglyphodon* unterschieden ist.

Batrachia.

Ueber Entwicklung der Muskelfasern der Batrachier vergl. Kölliker in der Zeitschr. für wissensch. Zoologie IX. p. 141.

Stricker, Untersuchungen über die Papillen in der Mundhöhle der Froschlarven. Mit 1 Tafel. Sitzungsberichte der Wiener Academie XXVI. p. 3.

Nachdem Oscar Schmidt in den Sitzungsberichten der Wiener Academie XXIV. p. 10 die Diagnosen von 17 neuen ungeschwänzten Batrachiern, die er, von Warszewicz in Neugranada und Bolivia gesammelt, für das Museum zu Krakau erworben, veröffentlicht hatte, ist die Abhandlung über denselben Gegenstand in den Denkschriften derselben Academie XIV. p. 237 unter dem Titel: „*Deliciae herpetologicae Musei zoologici Cracoviensis*“ erschienen. Dazu gehören drei Tafeln mit Abbildungen.

Die meisten dieser Frösche leben in bedeutenden Höhen, bis 8000 Fuss in milder und feuchter Temperatur. Ueber die Benutzung der Schwimmbäute und der Gaumenzähne zur Charakteristik hat sich Verf. in der Einleitung geäussert. Die neuen Arten sowie die zwei neuen Gattungen sind unten näher bezeichnet; ich citire dort bloss die Abhandlung in den Denkschriften.

Ranae. Schiess Versuch einer speciellen Neurologie der *Rana esculenta* mit 4 Tafeln 4. ist mir nicht zu Gesicht gekommen.

Hallowell stellte eine neue Gattung Proc. Philadelphia VIII p. 298 auf, welche mit *Ceratophrys* zunächst verwandt ist: *Trigonophrys*, Kopf sehr gross, deprimirt, oberes Augenlied dreieckig; Zunge gross, rundlich, vorn und hinten eingeschnitten, vorn angeheftet, seitlich und in der hintern Hälfte frei; obere Kieferzähne gross,

konisch, gekrümmt, scharfspitzig; zwei Gruppen Vomerzähne in einer Linie mit dem vorderen Rande der hinteren Naslöcher, näher diesen als einander; die hinteren Naslöcher gross, rundlich, die eustachischen Oeffnungen mässig, ziemlich gross; keine Stimmblasen; Trommelfell nicht sichtbar; vier völlig freie Finger; Zehen nur an der Basis mit Schwimmhäuten; das erste Os cuneiforme bildet einen äusseren Vorsprung; die Querfortsätze der Heiligen-Wirbel nicht erweitert. Die neue Art *T. rugiceps* lebt am Flusse Parana.

Desgleichen ib. 1857 p. 64 die Gattung *Heteroglossa*. Sie hat keine Gaumenzähne, und eine Zunge, die hinten tief eingeschnitten, und mittelst eines cylindrischen Stieles in der Mitte angeheftet und vorne in der Mittellinie durch Zellgewebe befestigt ist. *H. africana* n. sp. von Gaboon.

Leiuperus sagittifer O. Schmidt von Neugranada. Wiener Denkschriften XIV. p. 240.

Hylae. Oscar Schmidt stellte ib. p. 241 folgende neue Arten aus dieser Familie auf: *Ixalus Warschewitschii* Taf. I. Fig. 1—4 aus der Nähe des Vulkans Chiriqui zwischen 6000' und 7000' Höhe; *Hyla pugnax* Taf. I. Fig. 5—6, *H. splendens* ib. fig. 7, *H. molitor* fig. 8. 9, *H. molitor* Var. *marmorata* an nov. spec. Alle vier vom Chiriqui-Flusse unweit Bocca del toro; *Hylodes Fitzingeri* fig. 10 von den Cordilleren Neugranada's in einer Höhe von gegen 4000'.

Hyla semifasciata Hallowell Proc. Philadelphia VIII. p. 307.

Bufones. Unter den Kröten sind von Oscar Schmidt 10 neue Arten in den Wiener Denkschriften XIV. p. 248 beschrieben worden, unter denen 3 zwei neuen Gattungen angehören: *Dendrobates speciosus* Taf. I. Fig. 11, Taf. II. Fig. 12, *D. pumilio* Fig. 13, *D. lugubris* Fig. 14, alle drei auf Blättern und Blumen der immergrünen Regionen zwischen 5000 und 6000' Höhe auf dem Grenzgebiet zwischen Neu-Granada und Costa rica; *Bufo margaritifera* Daud.? (*Bufo nasutus* Schn. (an nova species?) Taf. II. Fig. 15. 16 auf dem Grenzgebiet von Bolivia gegen Peru in 3000' Höhe; *Bufo pleuropterus* Taf. II. Fig. 17. 18. 19, lebt mit dem Vorigen; *Bufo veraguensis* Taf. II. Fig. 20, Taf. III. Fig. 21. Provinz Veragua; *Bufo simus* Fig. 23. in Mengen an seichten Stellen des Chiriquiflusses; *Hylaemorphus Dumerilii* Fig. 23. 24 Provinz Veragua bis gegen 8000', *Hylaemorphus Bibronii* Fig. 25 unweit Panama zwischen 2000 und 3000', *Phirix pachydermus* Fig. 26. im Westen von Neu-Granada, bei Bonaventura in einer Höhe von 5000'. — Die beiden neuen Gattungen haben folgende Diagnosen:

Hylaemorphus. Fitzinger. Habitus corporis gracilior et qualis esse solet Hylarum; lingua elongata, angusta, integra, dimidia parte libera; dentes palatini nulli; tympanum non visibile; parotides nullae, digiti pedum anticorum fissi, posticorum semipalmati; planta

latis; protuberantiae in tarso nullae aut vix visibiles; processus transversus vertebrae sacralis dilatati. Dahin ausser den beiden oben genannten Arten, eine gleichfalls neue des Wiener Museums, die Fitzinger H. Pluto genannt hat.

Phirix. Habitus corporis robustus et qualis reperitur in Bufonibus; lingua, dentes palatini, membrana tympani, parotides, processus transversus vertebrae sacralis ut in Hylaemorpho; digiti pedum anteriorum fissi, posteriorum semipalmati et quidem conjuncti membrana crassa, quae a reliqui corporis integumentis non differt, qui fit ut plantae latiores reddantur et minus flexiles, quam solent esse in ceteris Batrachiiis ecaudatis; tubercula paulum elata et in carpo et in tarso obvia. Nur die eine obengenannte Art.

Engystoma olivaceum. Hallowell n. sp. Proc. Philadelphia VIII. p. 252.

Caudata. Matthes handelte in der Allg. deutschen naturhist. Zeitung I. 1855. p. 249—280 über die Hemibatrachier (Salamandrinen) im Allgemeinen, und beschrieb als in Nordamerika vorkommend 21 Arten Salamandra, unter denen *S. Texana* vom Rio Colorado und *S. phoca* von Kentucky als neu bezeichnet werden, und 4 Arten Triton.

Kneeland beschrieb als neue Art *Siredon hyemalis* aus dem Ober-See. Proc. Boston soc. VI. p. 152. Dieselbe soll sich nur während des Winters zeigen, und ist durch Pumpen aufgesogen worden.

Bericht über die Leistungen in der Ichthyologie während des Jahres 1857.

Vom

Herausgeber.

Dumeril hat im XXVII. Bande der Mémoires de l'academie des sciences Paris 1856 eine „Ichthyologie analytique ou essai d'une classification naturelle des poissons, a l'aide de tableaux synoptiques“ veröffentlicht. Diese grosse Arbeit nimmt den ganzen Band ein und umfasst 507 Seiten.

Verf. hat versucht seine analytische Methode auf die ganze Klasse der Fische auszudehnen, und beabsichtigt dadurch den Zweck zu erreichen, mit Leichtigkeit die Genera zu bestimmen, Ob dieser Zweck erreicht ist, darüber wird man erst urtheilen können, wenn man das Buch mehrfach für diesen Zweck versucht hat. Gegen die Natürlichkeit der Familien möchte sich hervorheben lassen, dass die anerkannt wichtigen Untersuchungen J. Müller's kaum berücksichtigt sind. So sind, um nur ein Beispiel anzuführen, in der Familie der Pomacentriden, die Gaumenzähne besitzen sollen, die Sciaenoiden mit einer Rückenflosse mit den Labroidei ctenoidei vereinigt. Verf. erkennt freilich selbst an, dass nur wegen der Leichtigkeit, die Cuvier'schen Gattungen zu unterscheiden, die Familie so aufgefasst sei. Ueberhaupt scheint das aufgestellte System, welches eine Menge neue Namen für die Ordnungen, Familien u. s. w. anführt, weniger dazu bestimmt, einen Ausdruck der Organisationsverhältnisse zu liefern, sondern ein Mittel zur leichten Bestimmung zu bieten. Da es nicht möglich ist, in diesem Berichte die Ansichten des Verf. bis ins Einzelne wiederzugeben, so begnüge ich mich mit der Angabe der Hauptabtheilungen.

- I. Zahlreiche Kiemenlöcher, ohne Kiemendeckel, *Polyclides*. 1. Unterklasse *Chondrichthes* oder *Trematopnés* (Fam. Endotrèmes, Exotrèmes, Hypotrèmes, Pleurotrèmes).
- II. Zwei Kiemenlöcher, Kiemendeckel *Diclides*.
 - A. Skelett fibro-cartilaginös. 2. Unterklasse *Chondrostichthes* oder *Chondrostés*. Fam. Hypostomates (Störe); Gymnognath-

thes, Pteropodes (Gobiesox, Lepadogaster, Cyclopterus und Cuvier's Pediculati), Lophobranches, Sclerodermes.

Zwischen diese und die folgende Unterklasse wird Lepidosiren gestellt.

B. Skelett knöchern. 3. Unterklasse *Ostichthes* oder *Ichthyostés*.

a. Bauchflossen fehlen oder sind verkümmert. 1. Ordnung *Apodes* oder *Acatopes*. Fam. Ophichtes, Pteroptères, Pantoptères.

b. Bauchflossen an der Kehle. 2. Ordnung *Propodes* oder *Anteropés*. Fam. Gadoides, Blennoides, Trachinoides.

c. Bauchflossen unter den Brustflossen. 3. Ordnung *Hemispodes* oder *Mediopodes*, diese zerfallen in 4 Gruppen.

α. Glyphopomes. Körper dick von gewöhnlicher Form mit gezähntem Kiemendeckel. Fam. Percoides, Anthiadides, Pomacentrides, Sciaenoides, Holocentrides.

β. Leiopomes. Ebenso aber mit glattem Kiemendeckel. Fam. Sarcodontes (Labroiden), Gymnodontes (Sparoiden), Osteodontes (Scarus).

γ. Omalotes. Körper sehr zusammengedrückt. Fam. Petalosomes (Bandfische), Leptosomes (Squamipennes, Teuthyes, Scomberoiden z. Th.) und Heterosomes (Schollen).

δ. Idiomorphes. Körper dick von absonderlicher Form oder eigenthümlichen Organen. Fam. Gongylosomes (Gobioiden), Atractosomes (Scomberoiden z. Th.), Lophionotes (z. B. Coryphaena, Agriopus), Hydrotamies (Labyrinthfische), Dactylés (Trigla), Cephalotes (Cottus, Scorpaena ct.).

d. Bauchflossen hinter den Brustflossen. 4. Ordnung *Opisthopeodes* oder *Postéropes*. Fam. Cyprinoides, Clupeides, Pogonophores (Cyprinoiden z. Th.), Opisthoptères (Lepidosteus, Belone, Esox, Sphyræna ct.), Lepidopomes (Mugil, Exocoetus, Polynemus, Hydrargyra ct.), Salmonides, Characins, Siluroides. Dipteronotes (Siluroiden z. Th.), Scutocéphales (Amia, Erythrinus, Osteoglossum, Butirinus, Mormyrus), Aphyostomes (Aulostoma, Fistularia, Centriscus ct.).

Dieser Auszug wird genügen, um die wunderliche Zusammensetzung der Familien nach künstlichen Charakteren zu zeigen.

A. Dumeril gab in der Rev. et mag. de zool. 1858. p. 370 Nachricht von dem Stande der Pariser ichthyologischen Sammlung beim Abtritte seines Vaters, der die Direction der Amphibien und Fische hatte. Hiernach besteht dieselbe aus 4145 Species.

Eine sehr gelehrte Abhandlung über die Fische, welche Töne von sich geben, und die Entstehung dieser Töne schrieb J. Müller, dessen zu frühen Verlust wir zu beweinen haben, in seinem Archiv für Anatomie 1857. p. 249.

Nach einer Aufzählung der aus dem Alterthum bekannten Pisces vocales, und einem Versuche, dieselben zu bestimmen, folgt eine systematische Uebersicht der bis jetzt bekannten Pisces vocales, deren Zahl eine ziemlich grosse ist. Die hier aufgezählten Arten gehören den Familien Cataphracti, Sciaenoidei, Scomberoidei, Pediculati, Gymnodontes, Sclerodermi, Siluroidei, Cyprinoidei an. Eine Beobachtung von Richard Schomburgk über Töne, welche von Hypostoma in der Tiefe des Wassers ausgehen, ist vergessen worden, obgleich sie in dessen Reisen in Britisch Guiana in dem vom Verfasser selbst in Verbindung mit dem Ref. gearbeiteten Abschnitte über die Fische vorkommt. — Endlich wird die Entstehung der Töne weiter erörtert, und in den meisten Fällen einem vibrirenden Reiben der Gelenkflächen der festen Kiemendeckelstücke oder Flossenstacheln zugeschrieben.

Nardo hat bereits 1844 eine Abhandlung über die Haut der Fische im Istituto Veneto gelesen; dieselbe ist im 5ten Bande der Memorie dell' J. R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia 1855. p. 243—276 erschienen: Sunto di alcune osservazioni anatomiche sull' intima struttura della cute de' pesci comparativamente considerata e sulle cause fisiologiche e fisico-chimiche della loro colorazione e decorazione.

Kölliker veröffentlichte Untersuchungen zur vergleichenden Gewebelehre in den Verhandl. der phys. med. Gesellschaft in Würzburg VIII. p. 1 und handelt darin, so weit es die Klasse der Fische betrifft:

1. „Ueber die Endigungen der Nerven im elektrischen Organe der Zitterrochen.“
2. „Ueber das Schwanzorgan der gewöhnlichen Rochen,“ dessen physiologische Bedeutung er zwar noch nicht für sicher entscheidbar hält, das er jedoch für ein electrisches Organ zu denken geneigt ist.
3. „Ueber das Schwanzorgan der Zitterrochen,“ welches dem Schwanzorgane der gewöhnlichen Rochen nicht paralisirt werden könne.
4. „Savi's appareil folliculaire nerveux,“ den er für ein Sinnesorgan betrachtet, dessen Function wahrscheinlich dem Tastsinne (Drucksinne) am nächsten verwandt sei.
5. „Nervenkörperchen in der Haut von Stomias barbatus,“ die sich an die vom Verf. beschriebenen Körperchen von Chauliodus anschliessen, und die er unter die so mannichfachen Sinnesapparate der Haut einreihet.

6. „Ausbreitung der Nerven in der Geruchsschleimhaut von Plagiostomen.“ — Ferner bezieht sich auch in der folgenden Abhandlung „über secundäre Zellmembranen, Cuticularbildungen und Porenkanäle in Zellmembranen“ ein Abschnitt p. 38 auf die Zellenausscheidungen und Cuticularbildungen im Darne der Fische. — Endlich p. 80 „über die porösen Eihüllen der Fische.“ Verf. bestätigt die Beobachtungen der Eier der *Scomberesoces* von Haeckel, zeigt aber, dass die Fasern nicht von der Innenfläche der Dotterhaut ausgehen, sondern aussen auf derselben sitzen. Es werden dann die Untersuchungen an den Eiern zahlreicher Süßwasserfische mitgetheilt.

Hyrtl schrieb über den Amphibienkreislauf von *Amphipnous* und *Monopterus* eine Abhandlung, welche in den Schriften der Wiener Academie zu erscheinen bestimmt ist. Eine vorläufige Anzeige des Inhalts findet sich Sitzungsberichte XXIV. p. 118.

John Davy hat Untersuchungen über die Harnabsonderung der Fische mit einigen Bemerkungen über diese Absonderung bei anderen Thierklassen veröffentlicht. *Transactions of the Royal society of Edinburgh* XXI. p. 543; *Edinburgh New phil. Journ.* N. S. VI. 1857. p. 152.

In dem *Bulletin mensuel de la soc. imp. zoologique d'acclimatation* finden sich ziemlich zahlreiche Artikel, die auf Fischzucht Bezug haben. Da ein Auszug derselben hier nicht gegeben werden kann, so erscheint es auch überflüssig, die besonderen Citate in den einzelnen Bänden aufzuzählen.

Jardine, Fleming und Ashworth berichteten über die Experimente, welche bei Stormontfield bei Perth für die künstliche Befruchtung der Lachse angestellt wurden. *Report of the 26. meeting of the British association held at Cheltenham* p. 451.

Baird sieht als eine hauptsächliche Nahrung der Süßwasserfische, namentlich der Vendace und der Forelle kleine Entomostraceen an. *Edinburgh new phil. Journ.* N. S. VI. 1857. p. 17.

In Betreff der einzelnen Faunen sind die folgenden Schriften zu erwähnen:

De Filippi und Verany haben eine Anzahl neuer oder wenig bekannter Fische des Mittelmeeres beschrieben. *Sopra alcuni pesci nuovi o poco noti del Mediterraneo.*

Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino serie II.
tom. XVIII.

Sie gehören den Gattungen *Notacanthus*, *Novarchus* n. gen. aus der Familie der Scomberoiden, *Clinus*, *Scyllium*, *Pelamys*, *Exocetus*, *Pteridium* an und sind meist abgebildet. Die einzelnen sind unten namhaft gemacht.

E. v. Martens schrieb in unserem Archiv p. 149 über einige Fische und Crustaceen der süßen Gewässer Italiens. Diese Abhandlung gewährt theils in geographischer Beziehung, theils für die Sicherstellung der Species ein Interesse. Wir enthalten uns des näheren Eingehens auf dieselbe, weil sie allen unseren Lesern vorliegt.

Die Süßwasserfische der österreichischen Monarchie mit Rücksicht auf die angrenzenden Länder bearbeitet von Jacob Heckel und Rudolf Kner. Mit 204 Holzschnitten. Leipzig 1858. 8.

Die beiden Verf., von denen der erstere das Erscheinen des vorliegenden Werkes leider nicht erlebt hat, haben mit langjährigem Fleisse die Fische des österreichischen Staates untersucht, und nun ein, wie es scheint, vollständiges Verzeichniss geliefert. Hervorzuheben ist, dass die Gattung *Abramis* dem Süden der Monarchie fehlt, während die Gattung *Leucos* nur diesem angehört. *Barbus*, *Scardinius*, *Squalius* sind zwar nord- und südwärts der Alpen, aber durch verschiedene Arten vertreten. *Salmo hucho* und *Pelecus cultratus* finden sich nur im Donaugebiete, dem wieder *Anguilla fluviatilis* und *Gasterosteus* fehlen. *Umbra Crameri* und *Coregonus acronius* sind auf bestimmte Localitäten beschränkt. Besonders interessant ist Dalmatien, welches eigenthümliche Arten, die jenseits der Bosnischen Grenze sich fortsetzend, nach Osten an Syrische Formen sich anschliessen, und durch diese den vermittelnden Uebergang zu den indischen finden. — Fast alle Arten sind in sehr hübschen Holzschnitten abgebildet, ausführlich beschrieben mit Angaben über Verbreitung, Lebensweise, Fang u. dgl. Vertreten sind unter den Acanthopteri die Familien Percoidei mit 1 *Perca*, 2 *Lucioperca*, 2 *Aspro*, 2 *Acerina*, 1 *Percarina*, — die Familie Cataphracti durch 4 *Cottus* mit einer neuen Art, — die Gattung *Gasterosteus*, vertreten durch 2 Arten, wird hier den Scomberoiden zugezählt, wobei namentlich die Schilder an der Seitenlinie, die sonst keiner Familie zukommen, hervorgehoben werden, — die Blennioiden durch 1 *Blennius*, die Gobioiden durch 1 *Gobius*. — Viel reicher vertreten sind die Malacopteri: die Cyprinoidei durch 4 *Cyprinus*, 1 *Carpio*. 4 *Carassius*, 1 *Tinca*, 5 *Barbus*, 2 *Gobio*, 1 *Aulopyge*, 1 *Rhodeus*, 7 *Abramis*, 2 *Blicca*, 1 *Pelecus*, 6 *Alburnus*, 1 *Aspius*, 1 *Leucaspilus*, 2 *Idus*, 5 *Scardinius*, 4 *Leucos*, 5 *Leuciscus*,

15 Squalius, 2 Telestes, 1 Phoxinus, 1 Phoxinellus, 5 Chondrostomus, — die Clupeoidei durch 1 Alausa, indem die Verf. fälschlich noch immer *Alausa vulgaris* und finta nur für Altersunterschiede halten, — die Salmonoidei durch 3 Coregonus, 1 Thymallus, 7 Salar, 2 Fario, 5 Salmo, — die Esocini durch 1 Esox, 1 Umbra, — die Acanthopsides, eine auf Cobitis gegründete eigene Familie (s. unten) durch 4 Cobitis, — die Siluroidei durch 1 Silurus, — die Gadoidei durch 1 Lota, — die Muraenoidei durch 2 Anguilla. — Aus der Ordnung Ganoidei kommen 12 Acipenser vor. — Von Cyclostomi endlich sind 3 Petromyzon und 1 Ammocetes aufgezählt.

Nach einer kurzen Notiz von Glatz, Verhandl. des Vereins für Naturkunde in Presburg 1857. Sitzungsberichte p. 47, sollen in Ungarn 65 Gattungen Süßwasserfische vorkommen. Von Knorpelfischen 2 Gattungen, Petromyzon in 2 Arten und Acipenser in 5 Arten. Von Grätenfischen erscheinen 63 Gattungen, unter denen Salmo mit 12 und Cyprinus mit 30 Arten. (Was Verf. hier Gattung nennt, wird wohl aus den zu erwartenden weiteren Mittheilungen klar werden). Aufmerksam gemacht wird noch darauf, dass das Männchen von Cyprinus Brama in der Laichzeit porenartige Auswüchse besitze, die sich vom Schwanze zu beiden Seiten bis zum Kopfe hinziehen, wo sie sich am Schädel zu einem kleinen Kranze vereinigen.

Kessler lieferte Bullet. de Moscou 1857. p. 453 Nachträge zur Ichthyologie des südwestlichen Russlands.

Verf. hat das Dnjestr-Gebiet untersucht, welches von dem des Dnjepr in mehrfacher Beziehung abweicht, namentlich darin, dass nirgends die Anschwemmung eines flachen Thalgrundes gestattet war, und keine Seen sich bilden konnten. So müssen Fische, die ruhige und klare Gewässer, oder schlammigen Boden lieben, den Dnjestr meiden. Barsche, Schleyen, Karauschen, Rothaugen, Rothfedern, Brachsen und Hechte sind daher nur spärlich vertreten oder fehlen ganz, wogegen der Döbel, Barbe und Sterlett in Menge im Dnjestr vorkommen. — Es werden dann 52 Arten aufgezählt mit Bemerkungen über das Vorkommen. Es sind 1 Perca, 1 Aspro, 2 Lucioperca, 2 Acerina, 1 Cottus, 5 Gobius unter denen zwei neu. 1 Lota, 1 Silurus, 3 Cobitis, 2 Gobio, 1 Barbus, 1 Tinca, 4 Cyprinus, 1 Rhodeus, 1 Chondrostoma, 5 Leuciscus, 4 Aspius, 1 Pelecus, 6 Abramis, 1 Salar, 1 Esox, 1 Clupea, 1 Anguilla, 5 Acipenser. — Zweitens werden zur Vervollständigung des Verzeichnisses des Dnjepr 31 Fische aufgezählt mit Angaben über die Verbreitung, Laichzeit und Grösse.

Czernay machte auf das Variiren der Artkennzeichen der Süßwasserfische in der Umgegend von Charkow aufmerksam, und führt namentlich die Verschiedenheiten in der Zahl der Flossenstrahlen, und in der Zahl der Schuppen in Tabellen-Form von 17 Arten der Karpfenfamilie aus. Er glaubt dadurch die sich widersprechenden Angaben der Ichthyologen erklären zu können. Bulletin de la soc. imp. de Moscou 1857. I. p. 227.

Richardson schrieb Proc. zool. soc. 1856. p. 37; Annals nat. hist. XIX. p. 486 über einige Fische aus Kleinasien und Palästina. Dasselbst ist von *Cyprinodon Hammonis* die Rede und ausserdem werden drei neue Cyprinoiden beschrieben.

Von Basilewsky erschien bereits im Jahre 1855 eine Ichthyographia Chinae borealis im Tome X. der Nouveaux Mémoires de la soc. imp. des Naturalistes de Moscou p. 215—263. Mit 9 Tafeln.

Zunächst werden 56 Fische verschiedener Familien beschrieben, von denen Verf. die meisten als neu anzusehen scheint. Dann folgt ein Verzeichniss der Fische aus einem chinesischen Werke Ben-zao-gan-mu; worin 31 Arten schuppige, 28 Arten nackte Fische beschrieben sind. Zu den nackten Fischen rechnen die Chinesen die Cetaccen, Crustaceen und Mollusken. In vorliegendem Verzeichnisse sind 19 Schuppenfische und 7 nackte Fische erwähnt, von denen einige auf die oben beschriebenen Fische zurückgeführt sind. — In einem Anhang endlich werden noch acht Fische beschrieben, wodurch sich die ganze Zahl auf 64 erhöht.

Bleeker setzte auch im Jahre 1857 seine ichthyologischen Studien mit Eifer fort. Von ihm erschienen in Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië uitgegeven door de natuurkundig vereeniging in nederlandsch Indië die folgenden Abhandlungen:

Deel XII. p. 291: Nieuwe Bijdrage tot de kennis der ichthyologische Fauna van Bali.

Nachdem Verf. die 29 Arten eines früheren Beitrages zur Fauna dieser Insel auf die seitdem von ihm angenommenen Namen zurückgeführt hat, folgt ein Verzeichniss von 78 Arten, die ihm neuerlich von dort durch Van Bloemen Waanders gesandt waren, wodurch die Zahl der von Bali bekannten Arten auf 106 stieg. Hierdurch wurde auch das erste Licht auf die Süßwasserfauna von Bali geworfen. Bisher war von den Inseln, welche östlich von den drei gros-

sen Sundainseln gelegen sind, noch keine einzige Karpfenart bekannt geworden, selbst nicht von Celebes, wo doch Flüsse von ansehnlicher Grösse vorhanden sind. Es finden sich nun zwei Cyprinoiden in der Sammlung von Bali, die auf Java sehr gemein sind; dadurch ist die Grenze der Cyprinoiden ein wenig mehr nach Osten geschoben. Es bleibt nun noch fraglich, ob auch auf Lombok, Sumbawa, Flores et. dergleichen vorkommen. Einige neue Arten und eine neue Gattung sind unten namhaft gemacht.

Deel XII. p. 508: Bericht über einige Fische, die neu für die Kenntniss der Fauna von der Insel Ceram sind. 22 Arten, wodurch die ganze Zahl auf 208 gebracht ist.

Deel XIII. p. 55. Tweede Bijdrage tot de kennis der ichthyologische Fauna van Boero.

Durch eine neue Zusendung wurde die Zahl der von Buro bekannten Fische auf 238 erhöht. Die darunter befindlichen 8 neuen Arten sind unten genannt.

Deel XIII. p. 283: Ueber einige Fische, die neu für die Fauna von Biliton sind. Die Zahl der Arten erhöht sich dadurch auf 61.

Deel XIII. p. 322: Descriptiones specierum piscium Javanensium novarum vel minus cognitarum diagnosticae. Ausser einer grösseren Zahl von Arten, welche bereits von anderen Ichthyologen aufgestellt, hier nochmals beschrieben werden, sind unten 18 neue Arten zu vermerken.

Deel XIII. p. 369: Bijdrage tot de kennis der ichthyologische Fauna van de Sangi-Eilanden.

Verf. erhielt von Jansen eine Sammlung von Fischen von den Sangi-Inseln, die sich im Norden von Celebes, zwischen dem 2ten und 4ten Grade nördlicher Breite erstrecken, und also zu den nördlichsten niederländischen Besitzungen gehören. Bisher war von der Fauna dieser Inseln noch nichts bekannt. Das Verzeichniss enthält 133 Arten, unter denen drei neue.

Deel XIII. p. 381. Bericht über eine neue Sammlung Fische von Batjan, die durch Moens eingesendet wurden. 113 Arten, so dass nunmehr von Batjan 218 Arten bekannt sind. Darunter keine neue.

Deel XIII. p. 387. Bericht über einige Fische von Timor-Koepang und Timor-Delhi. Verf. kennt nun von Timor 126 Arten. Keine neu.

Deel XIII. p. 475: Ueber einige Fischsammlungen von verschiedenen Theilen Java's.

Es sind hier verzeichnet: 1) 27 Süßwasserfische von Lebak, 2) 14 Süßwasserfische von Bantam, 3) 11 Süßwasserfische von Buitenzorg, 4) 6 Süßwasserfische von Tjikoppo, 5) 19 Süßwasserfische von Tjipannas, 6) 27 Süßwasserfische von Tjiandjoer. 7) 19 Seefische von Karangbollong an der Südküste, 8) 60 Fische ebendaher, 9) 73 Seefische von Prigi an der Südküste.

Im II. Bande der *Acta societatis scientiarum Indo-Neerlandicae* 1857 sind ferner die folgenden ichthyologischen Abhandlungen von Bleeker enthalten:

1. *Conspectus specierum piscium Molluccensium hucusque cognitarum.*

Von 906 hier aufgezählten Arten sind 44 ohne nähere Fundortsangabe; 87 sind von Halmaheira, 283 von Ternate, 146 von Batjan, 30 von Obi, 182 von Buro, 191 von Ceram, 639 von Amboina, 18 von Saparna, 172 von Banda, 55 von Wagen, 10 von Rawak bekannt, endlich kommen 746 auch ausserhalb des molukkischen Archipels vor.

2. *Tiende Bijdrage tot de kennis der ichthyologische Fauna van Borneo. Visschen van de Rivieren Barito, Kahajan en Kapoeas.*

Verf. erhielt Zusendungen aus dem Kapuas bei Sintang und bei Pontianak, aus dem Barito bei Bandjermasin und aus dem Kahajan. Dadurch sind jetzt von Borneo 258 Arten bekannt; davon sind 14 ohne näher bezeichneten Fundort, 65 von Sambas, 30 von Pamangkat, 73 von Pontianak, 11 von Sintang, 36 von Sampit, 8 von Kahajan, 126 von Bandjermasin, 23 von Pengaron und 10 von Prabukarta. Einige neue Arten s. unten.

3. *Achtste Bijdrage tot de kennis der Vischfauna van Amboina.*

Die Zahl der Arten von Amboina ist durch diesen Beitrag auf 782 gestiegen; darunter befinden sich 41 neue Arten, die unten verzeichnet sind.

Essai sur la faune de l'île de Woodlark ou Maiou par le P. Montrouzier, missionnaire. Partie ichthyologique, revue par M. Thiollière. 8. Lyon. Extrait de la soc. d'agriculture et d'histoire nat. de Lyon — ist mir noch nicht vor Augen gekommen.

Tancred bezeichnet (*Edinburgh new phil. Journal New Series* III. 1856. p. 17) die Fischfauna der süßen Gewässer von der Provinz Canterbury in Neu-Seeland als wenig zahlreich und erklärt dies durch die reissenden Ströme, in denen

weder Fische noch Nahrung für sie gedeihen können. In anderen Flüssen, die tiefer sind, giebt es viele Aale bis 20 Pfund schwer, welche von den Eingebornen gefangen und für den Winter getrocknet werden. Einige andere Fische werden nach ihren englischen Benennungen genannt.

Von Holbrook ist bereits seit dem Jahre 1855 eine „Ichthyology of South-Carolina“ erschienen. Ausser den bereits vorliegenden 10 Lieferungen von je drei schön illuminierten Tafeln und einigen Bogen Text, dürfen wir keine fernere mehr erwarten, da der Verfasser gestorben ist.

Bei den einzelnen Arten ist zuerst eine Diagnose gegeben, dann folgen die Synonyme, die weitere Beschreibung, Farbe, Dimensionen. Bemerkungen über die Eingeweide, Lebensweise, geographische Verbreitung und allgemeine Bemerkungen. Es ist dadurch die Kenntniss der besprochenen Arten wesentlich gefördert. Aufgeführt sind: 14 Percoiden, 3 Sparoiden, 11 Scomberoiden, 1 Echeneis, die Verf. zu den Scomberoiden zählt, 2 Squamipennen, 18 Sciaenoiden, 1 Elops. Mehrere neue Gattungen und Arten sind unten näher bezeichnet.

Richardson hat eine kleine Sammlung von Fischen beschrieben, welche von Wellington Sound durch Capt. Belcher, heimgebracht worden sind. The last of the arctic voyages, being a narrative of the expedition in H. M. S. Assistance unter Captain Sir Edward Belcher in search of Sir John Franklin during the years 1852—54. Vol. II. 1855. p. 347—376. Es sind 9 Arten, von denen acht abgebildet sind. Die 4 darunter befindlichen neuen Arten sind unten namhaft gemacht.

Eine Aufzählung der grönländischen Fische von Reinhardt in Rink's Groenland enthält 69 Arten.

Dipnoi.

Die Schilderung eines lebenden afrikanischen Lepidosiren, welcher im Krystallpalaste ausgestellt ist, von J. E. Gray Proc. zool. soc. 1856. p. 342, Annals nat. hist. XIX. p. 412, ist in unserem Archiv 1857. I. p. 330 in der Uebersetzung mitgetheilt, obgleich ich die Gründe des Verf., dieses Thier den Amphibien zuzuzählen, nicht ausreichend finde.

Teleostei.

Acanthopteri.

Percoidei. Auf *Serranus fasciolaris* hat Holbrook Ichthyology of South-Carolina p. 32 eine eigene Gattung *Diplectron* gegründet, die er so charakterisirt: Vordeckel mit zwei abgerundeten Gruppen strahliger Dornen, Suboperculum hinten mit häutiger Verlängerung, Kiefern ohne Schuppen, Kiefer-, Zwischenkiefer-, Gaumen- und Vomerzähne klein und sammetartig, einige grössere Zähne im Unter- und Zwischenkiefer, Körper langstreckig, comprimirt, eine sehr lange Rückenflosse, sieben Kiemenhautstrahlen.

Derselbe beschrieb ib. als neue Arten: *Serranus nigrinus* p. 173 und *Rypticus maculatus* p. 39.

Basilewski beschrieb l. c. *Perca Chua-tsi* tab. 1. fig. 1 und *Perca Chuan-tsi* tab. 2. fig. 1, die beide offenbar der Gattung *Serranus* angehören, ferner *Labrax Ly-ny*.

Bleeker stellte aus dieser Familie folgende neue Arten auf: *Apogon sangiensis* Natuurk. Tijdschr. Ned. Indie XIII. p. 375 von den Sangi-Inseln; *Bogoda macrolepis* Borneo 10. l. c. aus dem Flusse Kapuas; *Serranus Iansenii* Natuurk. Tijdschr. Ned. Indie XIII. p. 376 von den Sangi-Inseln: *Serranus amblycephalus* und *melanotaenia* Amboina 8. l. c. p. 32; *Anthias pleurotaenia*, *cheiropsilos*, *lepidolepis* und *Huchtii* ib. p. 34.

Bleeker sieht die Gattungen *Cirrhit*es, *Cirrhitichthys* und *Cheilodactylus* als besondere Familie *Cirrhitidae* an, die sich durch die unverzweigten unteren Brustflossenstrahlen, die hinter den Brustflossen angefügten Bauchflossen, die Cycloidschuppen u. s. w. unterscheiden, und fügt ihnen Amboina 8. l. c. p. 39 eine neue Gattung *Oxycirrhites* mit folgender Diagnose hinzu: Ossa intermaxillaria maxime evoluta, longe ante rostrum producta, ramis descendente et adscendente dentata; os quasi in tubum productum; dentes maxillis pluriseriati serie externa aequales seriebus ceteris maiores, vomerini pluriseriati in vittam semilunarem dispositi, palatini nulli; praeoperculum dentatum; operculum spina plana armatum; pseudobranchiae; membrana branchiostega radiis 6; spinae dorsi 10. *O. typus* von Amboina.

*Cirrhit*es *amblycephalus* Bleeker Natuurk. Tijdschr. Ned. Indie XIII. p. 378 von den Sangi-Inseln.

Cataphracti. Von Richardson wurden *Cottus glacialis* und *Gasterosteus insculptus* l. c. als neue Arten von Wellington Sound beschrieben.

Cottus ferrugineus n. sp. Heckel und Kner l. c. aus dem Gardasee, Mailand, Treviso, Dalmatien.

Pseudochromides. *Pseudochromis cyanotaenia* Bleeker
Natuurk. Tijdschr. XIII. p. 72.

Sciaenoidei. Bei Basilewski in der Ichthyographia Chinae borealis finden sich folgende Arten beschrieben: *Sciaena ten-lo* tab. 1. fig. 3, *Sc. arcuata*, *Mi-iuy*, *Chuan-chua*, *Mey-gun*.

In der Sciaenoiden-Familie stellte Holbrook Ichthyology of South-Carolina p. 168 eine neue Gattung *Homoprion* auf, die nahe verwandt mit Micropogon ist, aber sich von ihr durch den Mangel der Bartfäden am Kinn unterscheidet. Ihre Charaktere lauten: kleine hechelartige Zähne in beiden Kiefern, im Oberkiefer eine Reihe grösserer, konischer, spitzer Zähne, Schlundzähne nicht pflasterartig; Vordeckel mit grossen strahligen Dornen am Winkel; sieben Strahlen in der Kiemenhaut, Dahin *Leiostomus xanthurus* und eine neue Art *H. lanceolatus*.

Derselbe stellte ib. einige neue Arten auf: *Otolithus thalassinus* p. 132, *O. nothus* p. 134, *Umbrina littoralis* p. 142, *Larimus fasciatus* p. 153.

Sparoidei. *Sargus rhomboides* und *unimaculatus* trennte Holbrook Ichthyology of South-Carolina p. 56 als neue Gattung *Lagodon* von *Sargus* ab, weil sie ein vorstreckbares Maul besitzen.

Basilewski bildete l. c. tab. 3. fig. 1 einen Fisch unter dem Namen *Pagrus macrocephalus* ab; die Beschreibung passt nicht zur Abbildung, welche letztere gar keinen Sparoiden, eher einen Sciaenoiden darstellt.

Dentex nemurus und *metopias* Bleeker Amboina 8. l. c. p. 49 und 51.

Squamipennes. Neue Arten von Bleeker Amboina 8. l. c. p. 53: *Chaetodon xanthurus* und *polylepis*, *Holacanthus melanospilos* und *diacanthus*.

Labyrinthici. *Anabas microcephalus* Bleeker n. sp. Amboina 8. l. c. p. 58.

Ophicephalus Pekinensis Basilewski ist l. c. tab. 9. fig. 3 abgebildet.

Scomberoidei. *Cybinus Bonaparte* Verany ist von De Filippi et Verany Mem. Accad. di Torino XVIII. als *Pelamys Bonaparte* beschrieben und abgebildet.

Basilewski beschrieb l. c. *Stromateus echinogaster*, *Trichiurus lepturus* L. und *Scomber Pa-iuy*.

Carangoides plagiotenia Bleeker Amboina 8. l. c. p. 59.

Aus *Trachinotus pampanus* bildete Holbrook Ichthyology of South-Carolina p. 80 eine eigene neue Gattung *Bothrolaemus*, die sich von *Lichia* und *Trachinotus* durch völligen Mangel der Zähne unterscheidet.

Derselbe beschrieb ib. als neu: *Seriola carolinensis* p. 70, *Caranx falcatus* p. 92 und *Caranx Richardi* p. 94.

Novarchus nov. gen. De Filippi et Verany Mem. Accad. di Torino l. c. Habitus Seriolae; caput undique squamosum, poris nonnullis in regione nasali; dentes intermaxillares et mandibulares graciles, elongati, serie unica pectinatim dispositi; palatini et linguales minimi, conferti; pinna dorsalis radiis spinosis numerosis, pectorales elongatae, caudalis a basi perfecte divisa, lobis aequalibus. *N. sulcatus* n. sp. Mittelmeer.

Notacanthini. Nach De Filippi und Verany Mem. Acad. di Torino l. c. besteht jetzt die Gattung *Notacanthus* aus 5 Species, nämlich *N. Nasus* Bloch, sexpinnis Richard., *mediterraneus* n. sp., Bonaparte Risso und *Rissoanus* n. sp.

Teuthyes. *Acanthurus chrysocoma* Bleeker Natuurk. Tijdschr. Ned. Indie XIII. p. 67 von Buro.

Mugiloidei. Neue Arten: *Mugil So-iny* Basilewski l. c. tab. 4. fig. 3; — *Mugil belanak* Bleeker Natuurk. Tijdschr. Ned. Indie XIII. p. 337 von Batavia.

Gobioidi. Neue Arten von Bleeker: *Sicydium zosterophorum* und *balinense* Nat. Tijdschr. Ned. Indie XII. p. 296 von Boeling im nördlichen Bali; *Eleotris taenionotopterus* ib. p. 298 in süßem Wasser bei Boeling; *Culius macrocephalus* ib. XIII. p. 70.

Bleeker erhebt ib. XII. p. 300 *Eleotris belobranca* Cuv. Val. zu einer eigenen Gattung, indem er sie *Belobranthus Quoyi* nennt, und ihr eine neue Art *B. taeniopterus* aus dem süßen Wasser von Bali hinzufügt. Die Gattungseigenschaften lauten: Pinnae dorsales 2; dentes maxillares pluriseriati; palatum totum edentulum; nares oculo approximatae, anteriores tubulatae; praeperculum anacanthum; radiis membrana branchiostega 6, quorum 1 vel plures spina antrorsum spectante.

Echeneis lineata Holbrook l. c. p. 101. Diese Gattung wird von dem Verf. zu den Scomberoiden gestellt.

Murray hat Edinburgh new philos. Journ. New Series IV. 1856 p. 287 eine neue Art der Gattung *Echeneis* beschrieben (vergl. auch Bibl. univers. de Genève T. 33. p. 247), wobei er Bemerkungen über die Lebensweise der Schiffshalter überhaupt mittheilte. Namentlich hat er versucht, die Art, wie diese Fische sich an bewegten Gegenständen befestigen, zu erklären. Der Saugapparat besteht aus einem freien fleischigen Rande, der geeignet ist als Saugnapf zu wirken und aus zwei Reihen knorpliger Querplatten, die mit drei Reihen von Zähnen besetzt sind, welche sich nach hinten niederlegen. Verf. meint nun, wenn ein Wallfisch oder Haifisch über diesen Apparat von hinten her fortschwimme, so müsse er den Schiffshalter mitziehen, und er könne sich nun festsangen. Um sich wieder los zu machen, müsse er schneller nach vorn schwimmen, als sein Träger. Die Art,

Echeneis tropicus, hat nur 17 Platten in der Kopfscheibe, welche hinten nicht breiter ist als vorn; der Körper verschmälert sich nach hinten allmählicher als bei *remora*, auch schien dem Verf. die Haut weicher als bei der genannten Art.

Blennioidei. Richardson beschrieb l. c. zwei neue Arten von Wellington Sound: *Lumpenus nubilus* und *Lycodes mucosus*.

Bleeker verdanken wir folgende neue Arten: *Salarias interruptus* und *diproktopterus* Nat. Tydschr. Ned. Indie XIII. p. 68 von Buro; *Clinus xanthosoma* ib. p. 340 vom südlichen Java; *Petroskirtes amblyrhynchus* und *tapeinosoma* Amboina 8. l. c. p. 64; *Salarias heteropterus*, *chrysospilos* und *amboinensis* ib. p. 65.

Clinus Veranyi De Filippi Mem. Acad. di Torino l. c. aus dem Golf von Cagliari.

Genypterus wird von Philippi als neue Gattung der Blennioiden in unserem Archiv p. 268 aufgestellt. *G. nigricans* ist Gay's Conger chilensis, der also die Stellung dieses Fisches arg verkannte.

Pediculati. Neue Arten von Bleeker: *Antennarius leprosus*, *phymatodes*, *melas*, *oligospilos* Amboina 8. l. c. p. 68.

Anacanthini.

Gadoidei. De Filippi und Verany haben *Pteridium atrum* Swains. (*Oligopus ater* et *niger* Risso, *Gadopsis* De Filippi), namentlich auch die Schwimmblase näher beschrieben, und sind der Ansicht, dass dieser Fisch die Verbindung der Gadidi und Ophidini bilde, und eine Vereinigung beider genannten Familien fordere. Mem. Accad. di Torino XVIII. l. c. (Vergl. den Bericht über 1855 p. 79).

Ophidini. Bei Basilewski l. c. findet sich ein *Ophidium aculeatum* beschrieben.

Pleuronectae. Basilewski beschreibt ib. ferner *Platessa percocephala* und *Achirus Plagusia*, so wie ib. im Anhang *Platessa bicolorata*, *Solea fasciata* und *anonyma*.

Pharyngognathi.

Labroidei cycloidei. Neue Arten von Bleeker: *Julis (Julis) oxyrhynchus* Nat. Tijdschr. Ned. Indie XIII. p. 74 von Buro; *Julis (Halichoeres) javanicus* ib. p. 341 vom südlichen Java; *Scarus bataviensis* ib. p. 342 von Batavia; — ferner Amboina 8. l. c. p. 75sq.: *Cossyphus zosterophorus*, *Julis (Julis) melanocheir*, *Julis (Halichoeres) heteropterus*, *Anampses melanurus*, *amboinensis pterophthalmus*, *Novacula melanopus*, *spilonotus*, *Cheilinus hexataenia*.

Labroidei etenoidei. *Glyphisodon nemurus* Bleeker Nat. Tijdschr. Ned. Indie XIII. p. 73 von Buro; *Gl. amboinensis* Bleeker Amboina 8. l. c. p. 72.

Chromides. Peters stellte Monatsber. der Berliner Acad. 1857 p. 403 eine neue Gattung der Chromiden auf, die sich durch cycloidische Schuppen und einfache conische Zähne unterscheiden soll. *Hemichromis*. Genae operaculae glabra squamata; squamae cycloideae, linea lateralis interrupta; radii branchiostegi quinque, branchiae quatuor; nares simplices; os protractile; dentes conici, apice nigri, in mandibula uniseriales, in osse intermaxillari biseriales, seriebus divaricatis. *H. fasciatus* von Guinea.

Scomberesoces. Bei Basilewski l. c. finden sich im Anhang *Belone esocina* und *microstoma* beschrieben.

Exocetus (Cyprilurus) procne De Filippi et Verany Mem. Acad. di Torino XVIII. l. c. von Nizza.

Physostomi.

Siluroidei. Kner hat in den Wiener Sitzungsberichten XXVI. p. 373—448. tab. I—IX. „Ichthyologische Beiträge II. Abth.“ geliefert. Dieselben beziehen sich auf diejenigen Südamerikanischen Welse, die in seinen früheren Arbeiten nicht berücksichtigt waren. Verf. behält sich eine natürliche Gruppierung der Familie noch vor, bis er reicheres Material auch aus Asien und Afrika wird bearbeiten können, und geht für jetzt nur darauf aus, die Kenntniss der Gattungen und Species zu fördern. Im Allgemeinen schliesst er sich an die Valenciennes'schen Gattungen ohne sie gut zu heissen, und spöttelt über die von J. Müller und Referenten innerhalb der grossen Gattung *Bagrus* gebildeten Untergattungen. Er spricht sich überhaupt gegen die Einführung sogenannter Untergattungen aus. Referenten scheint es bei dem gegenwärtigen Stande unserer Wissenschaft nicht möglich, mit den Begriffen Klasse, Ordnung, Familie, Gattung und Art auszureichen. Man ist oft gezwungen, der leichtern Uebersicht wegen, in der Gattung zu theilen und naturgemäss zu unterscheiden, ohne dass diese entstandenen Gruppen als Gattungen aufzufassen wären, dann wird man sie Untergattungen nennen können. Als ich mit meinem verwegten Freunde die *Horae ichthyologicae* ausarbeitete, waren wir der Ansicht, dass *Bagrus* im weiteren Sinne ein bestimmt zu charakterisirender Begriff sei, während *Arius* *Bagrus* s. str., *Galeichthys*, *Platystoma* und dergl. zwar verschieden sind, aber nach verschiedener Definition theils ver-

schieden begrenzt worden sind, theils bei consequenter Anwendung der Charaktere sich noch stark mehrten werden. Deshalb nahmen wir *Bagrus* als Gattung, die anderen genannten als Untergattungen. Der Begriff Gattung (Genus) hat freilich seit Linné sich sehr geändert, und wird auch heute noch sehr verschieden aufgefasst. Verf. wird wenigstens zugeben müssen, dass in unserem Falle durch Einführung von Untergattungen einige Uebersicht in die Fülle von Arten komme. — Es folgen hier die vom Verf. vorgeschlagenen neuen Arten und Gattungen:

Bagrus reticulatus aus dem Araguay, *B. Goliath* Heck. Ms. ebendaher, *B. punctulatus* aus dem Rio Guaporé und Rio branco, *B. piramuta* aus dem Rio negro und Rio Madeira.

Platystoma sturio von Rio branco nebst Beschreibungen von 5 bereits bekannten Arten dieser Gattung.

Asterophysus n. gen. Kopf nackthäutig, gleich breit und lang, Unterkiefer vorstehend, Mundspalte sehr weit, breite Binden grober Sammtzähne in den Kiefern und an der ganzen Länge der Gaumenbeine, Vomerplatte zahlos; 6 Barteln, Dorsale nackenständig, Fettflosse klein, Zahl der Kiemenstrahlen gering (4—5), Kiemenspalte nur bis an die Basis der Brustflossen offen; die Urogenitalmündung bei Männchen an der Spitze des ersten Analstrahles; die rundliche Schwimmblase ringsum mit fast gleichlangen Blinddärmchen behängt. *A. batrachus* von Marabitanos.

Cetopsis gobioides von Irisanga.

Pimelodus ornatus von Surinam, Rio negro und Cujaba; *P. multiradiatus* aus dem Rio Madeira und Rio Facutu; *P. breviceps* von Marabitanos; *P. laticaudus* Heck. Ms. aus dem Cujabafluss.

Auchenipterus thoracatus aus dem Rio Guaporé, *A. ceratophyllus* aus dem Rio Guaporé, Rio branco und Rio negro.

Centromochlus n. gen. Mit freiem körnigen Helme, vier sehr kurzen Kehlbarteln, kleiner Fettflosse und wenig strahliger Anale, einfache, nicht zellige Schwimmblase mit Muskelbeleg; — sonst sehr ähnlich mit *Auchenipterus*. *C. megalops* aus Bogota. *C. aulopygius* aus dem Guaporé.

Trachelyopterus taeniatus aus dem Rio Guaporé.

Ageneiosus dentatus aus Surinam, *A. quadrifilis* aus dem Rio Guaporé.

Hypophthalmus fimbriatus aus dem Rio negro.

Bei Basilewski sind l. c. *Silurus Arotus* Linn. tab. 3. fig. 4. und *Silurus Calvarius* tab. 9., der ein *Pimelodus* ist, abgebildet.

Clarias Teijsmanni ist von Bleeker aufgestellt Natuurk. Tijd-

schr. Ned. Indie XIII. p. 344 von Tijkoppo, Provinz Buitenzorg in Java, 900 Mètres über dem Meere.

Hyrtil hat *Clarotes Heuglini* anatomisch untersucht, und weist ihm seine Stellung im System zwischen *Pimelodus* und *Synodus* an. Sitzungsberichte der Wiener Academie XXVI. p. 371. Die Abhandlung wird in den Denkschriften erscheinen.

Bilharz hat nun seine Beobachtungen über „Das electrische Organ des Zitterwelses“ in einer besondern Schrift Leipzig 1857 fol. veröffentlicht, über die schon früher einzelne Berichte bekannt geworden waren. Die Abhandlung ist von vier Tafeln begleitet.

Nach einer historischen Einleitung wird zunächst das osteologische Verhalten, dann die Bauchhöhle, ferner das Gehirn und Rückenmark beschrieben. Darauf folgt die Schilderung des electrischen Nerven und des electrischen Organes als Haupttheil des Werkes. Den Schluss macht eine vergleichende Beschreibung der electrischen Organe des Zitteraales und des Zitterrochen.

Waddell beobachtete das Verhalten eines electrischen Fisches, *Malapterurus Beninensis* Murr. gegen andere Fische. Edinburgh new phil. Journ. New Series IV. 1856. p. 164.

Du Bois-Reymond konnte zu Berlin Versuche an einem lebenden Exemplare von *Malapterurus Beninensis* anstellen. Berliner Monatsber. 1857. p. 424.

Cyprinoidei. Diese artenreiche Familie ist wiederum durch zahlreiche neue Arten bereichert worden.

Basilewski hat l. c. folgende Arten beschrieben, die er wenigstens zum Theil als neu ansieht: *Cyprinus chinensis* tab. 2. fig. 3, *C. obesus* tab. 1. fig. 2; *Carassius Pekinensis* tab. 3. fig. 3, *C. coeruleus* tab. 9 fig. 2, *C. discolor*; *Cyprinus auratus* Linn. tab. 5. fig. 4. (Dazu gehören als Varietäten *C. macrophthalmus* Bl., *C. quadrilobatus* tab. 5. fig. 5, und ferner die Abbildungen tab. 5. fig. 1—3); *Gobio rivularis*; *Leuciscus argenteus*, *teretiusculus* tab. 4. fig. 1, *Tschiliensis*, *Aethiops* tab. 6. fig. 1; *Nasus dahuricus* tab. 7. fig. 1 (hat keine Aehnlichkeit mit *Cypr. nasus* Linn.); *Leptocephalus mongolicus* tab. 4. fig. 2; *Cephalus mantschuricus* tab. 7. fig. 3, *Culter alburnus* tab. 8. fig. 3, *erythropterus* tab. 8. fig. 1, *mongolicus*, *Pekinensis*, *exiguus*, *leucisculus*; *Abramis Pekinensis* tab. 6. fig. 2, *mantschuricus*; *Cobitis decemcirrus* tab. 7. fig. 2.

Bleeker hat folgende Cyprinoiden aufgestellt: *Barbus koi-lometopon* Nat. Tijdschr. Ned. Indie XIII. p. 347 von Batavia, *B. bunter* ib. p. 350 aus dem Fluss Tjidani in Westjava, *B. polyspilos* ib. p. 351 aus der Provinz Bantam in Westjava, *B. Hasselti* ib. p. 355

nach einer Zeichnung von Kuhl und van Hasselt; *Labeobarbus tambda* (Barbus tambda C. V.) ib. p. 356 von Java; *Gobio microcephalus* und *javanicus* ib. p. 357 von Batavia; *Rohita koilogeneion* ib. p. 359 von Batavia; *Lobocheilos lucas* und *rohitoides* ib. p. 362 von Batavia. — Derselbe stellte ferner Borneo 10 l. c. auf: *Barbus tetrazona* aus dem Kehajan im südlichen Borneo, *Leuciscus Helfrichii* ebenda-her, *Rohita borneensis* und *Kappenii* aus dem Kapuas, *R. kahajanensis* aus dem Kahajan.

Richardson beschrieb Proc. zool. soc. 1856 p. 371, Annals nat. hist. XIX. p. 486 drei Arten als neu: *Cyprinus bithynicus* und *Leuciscus Apollinitis* aus dem See Apollinitis, *Leuciscus Cii* aus dem Gemlek, dem Cius der Alten.

Günther hat *Abramis dobulooides* aus dem Neckar als neue Art erkannt und beschrieben. Württembergische Naturw. Jahreshfte 1857 p. 50.

Heckel und Kner haben in „Süsswasserfische der Oestreichischen Monarchie“ auch eine Anzahl neuer Cyprinoiden beschrieben: *Cyprinus acuminatus* Donau, Neusiedler- und Plattensee, *Carassius oblongus* aus Galizien, *Alburnus breviceps*, *Alburnus fracchia* aus Treviso, *Idus miniatus* im Teiche des Kais. Hofgartens der Burg in Wien, *Scardinius dergle* aus Dalmatien und Bosnien, *Sc. plotizza* aus Dalmatien, *Sc. macropthalmus* aus Tirol, *Squalius illyricus* und *stallize* aus Dalmatien.

Dieselben gründeten ib. p. 145 auch eine neue Gattung *Leucaspis*. Schlundzähne mit compressen, gekerbten Kronen (Drückzähne, dentes contusorii), jederseits 5 in einfacher Reihe, Unterkiefer vorstehend, Bauch wie bei Alburnus gekielt, Analbasis verlängert; Schuppen gross, leicht abfallend, ohne Radien. Steht in Bezug auf die Schlundzähne der Gattung Leucos zunächst, schliesst sich aber in allen übrigen Eigenthümlichkeiten den Alburnus-Arten an. *L. abruptus* n. sp. aus der Umgebung von Lemberg.

Unter dem Namen *Acanthopsides* sehen Heckel und Kner ib. p. 296 die Gattung Cobitis nebst Verwandten als besondere zwischen Cyprinoiden und Siluroiden stehende Familie an, der aus der Valenciennes'schen Siluroidenfamilie auch die Gattungen Cetopsis, Pareiodon und Trichomycterus einzuverleiben seien. Als Charaktere dieser Familie werden folgende gesetzt: Totalgestalt lang gestreckt, Kopf klein, bis zur engen Kiemenspalte überhäutet; der Suborbitalring und öfters auch die Deckelstücke in einen oder mehrere Dornen auslaufend, Mund von Sanglippen und Barteln umgeben, die kurze Rückenflosse ohne Knochenstrahl, über den Bauchflossen stehend; Rumpf klein beschuppt.

Eine neue Art *Cobitis elongata* aus der Sala bei Idria in Krain ist ib. p. 305 beschrieben.

Chamoïn hat die Pariser Academie darauf aufmerksam gemacht, dass *Phoxinus laevis* sehr begierig die Eier anderer Fische frisst, und dadurch der Fischzucht sehr nachtheilig wird. Rev. et mag. de zoologie 1857 p. 234.

Cyprinodontes. Bellotti giebt an, *Cyprinodon calaritanus* und *C. fasciatus* Val. gehören derselben Species an, von der ersterer das Weibchen, letzterer das Männchen sei. Ebenso sei *Hydrargyra hispanica* Val. das Weibchen von *Cyprinodon iberus* Val. Gazzetta Piemontese del 1857 No. 280.

Salmones. *Salar genivittatus* Heckel und Kner Süßwasserfische der Oestreich. Monarchie p. 260, aus der Sala, Nebenfluss des Isonzo.

Eperlanus chinensis Basilewski Ichthyographia Chinae bor.

Clupeacei. Aus dieser Familie sind nur *Clupea inermis*, *Pristigaster chinensis* und *Osteoglossum prionostoma* bei Basilewski l. c. zu erwähnen.

Mormyri. Ueber die Nerven-Endigungen im electrischen Organ der Mormyri schrieb Ecker, Untersuchungen zur Ichthyologie, Jubelschrift der Universität Freiburg in B. 1857. p. 29.

Heteropygii. Wyman hat Beobachtungen an dem blinden Fisch der Mammoth-Höhle angestellt. Er fand, dass die Streifen am Kopfe aus einer Reihe von Papillen bestehen, die eng aneinander liegen, und unter ihnen einen Zweig des fünften Nervenpaares, der kleinere Zweige zu den Papillen sendet. Die grösseren Fische zeigen dieselben Streifen mit derselben Structur längs dem Körper zwischen Kopf und Schwanz. Er fand auch die rudimentären Augen und Muskelbündel an jeder Seite des Auges. Der Magen enthielt einen Fisch mit grossen Augen, das erste Beispiel eines Fisches mit Augen aus der Höhle. Proc. Boston soc. VI. p. 72.

Muraenacei. *Anguilla eurystoma* Heckel und Kner l. c. p. 325 aus Dalmatien.

Bleeker beschrieb *Muraena buroensis* Natuurk. Tijdschr. Ned. Indie XIII. p. 79 von Buro und *Conger Noordzieki* Amboina 8. l. c. p. 86 als neu.

Basilewski l. c. beschrieb *Muraena Pekinensis*, *Apterygia saccoocularis* tab. 8. fig. 2. und *A. nigromaculata* tab. 2. fig. 2.

Ophisuridae. Bellotti hat eine neue Art *Ophisurus hispanus* von Barcelona beschrieben. Accademia fisico-medico-statistica di Milano 23. dicembre 1857.

Bleeker desgleichen: *Muraenichthys Schultzii* Nat. Tijdschr. Ned. Indie XIII. p. 366 von Süd-Java; *Ophisurus cirrocheilos* Amboina 8. l. c. p. 89; *Muraenichthys gymnotus* und *macropterus* ib. p. 90.

Gymnotini. In den Nachrichten von der Universität und der Königl. Ges. der Wissensch. zu Göttingen 1857 No. 19

haben Kupfer und Keferstein „über den feineren Bau des elektrischen Organs beim Zitter-Aal (*Gymnotus electricus*) mit Rücksicht auf den Bau bei andern elektrischen Fischen, insbesondere bei *Mormyrus oxyrhynchus*“ geschrieben, wozu Rud. Wagner nachträgliche Bemerkungen über die Endigungen der Nerven im Allgemeinen hinzufügte.

Plectognathi.

Ostracionidae. Von Hollar d erschien eine Monographie der Familie der Ostracioniden in den Annales des sc. nat. VII. p. 121—170, mit einer Tafel, auf welcher die Struktur der Schuppen dargestellt ist.

Verf. stellt die allgemeinen Charaktere auf, und beschreibt dann die Hautbedeckung und das Skelett. Die Schuppen der Ostracioniden sind polygonale Platten, die durch Eingreifen von Zahnvorsprüngen vereinigt sind, und die auf einer Schicht von Fasergewebe ruhen, welches in die Verbindungslinien eindringt, und so einige Ausdehnbarkeit möglich macht. Die einzelnen Platten sind aussen convex, innen concav und zeigen hier in der Mitte einen Raum, in welchem mehrere kleine Löcher sichtbar sind, durch welche die Gefäße in die Platte eindringen. Von dem mittleren Raum ziehen sich Linien nach den Ecken der Platte und theilen so die Unterseite in Dreiecke, welche parallel dem Platterrande gestreift sind. Ein näheres Eingehen auf die interessante Darstellung der feineren Organisation der Schuppen gestattet uns leider der Raum nicht. — Verf. nimmt nur zwei Gattungen an, nämlich *Aracana* Gray mit 3 Arten und *Ostracion* Gray mit 16 Arten, die alle charakterisirt und beschrieben sind.

Ostracion pentacanthus ist eine neue Art von Bleeker *Amboina* 8. l. c. p. 98.

Gymnodontes. Hollar d hat sich nunmehr auch mit der Familie der Gymnodonten beschäftigt und findet sie in Betreff der Körperbedeckung weniger von den Balistes und Otracion entfernt, als man bisher geglaubt hat. Das Skelett bietet dem Verf. Grund, die Gymnodonten in zwei Familien zu spalten: *Sphérosomes* und *Ellipsosomes* (*Orthragoriscus*). Erstere zerfällt wieder in zwei Tribus, *Tetrodoniens* und *Diodoniens*, unter deren ersterer sich osteologisch vier Gattungen begründen lassen: *Rhynchusus*, *Xenopterus*, *Tetrodon* und *Batrachops*. *Comptes rendus* XLV. p. 796; *Rev. et mag. de zoologie* 1857. p. 517.

In der über diesen Gegenstand veröffentlichten vollständigen Abhandlung von Hollard *Annales des sc. nat.* VIII. p. 275—328, „*Etudes sur les Gymnodontes et en particulier sur leur osteologie et sur les indications qu'elle peut fournir pour leur classification*“, ist das Skelett in ausführlicher Weise beschrieben, und in seinen einzelnen Theilen abgebildet. Die Eintheilung weicht etwas von der vorhin erwähnten ab. Hier zerfällt die Ordnung der Gymnodonten in drei Familien: *Loganiasomes* (Triodon), *Sphérosomes* und *Ellipsosomes* (Orthagoriscus). Zu den Sphérosomes gehören die beiden Tribus Tetrodoniens und Diodoniens. Die erstere derselben enthält die Gattungen *Rhynchotus* Bibr., *Xenopterus* Bibr., *Batrachops* Bibr., *Apsicephalus* Hollard, *Brachycephalus* Hollard, *Monotreta* Bibr. Die Species sind nicht aufgezählt.

Tetrodon Basilewskianus bei Basilewski l. c. im Anhang, von China.

Balistini. *Balistes unicornu* Basilewski ib. im Anhang, von China.

Monacanthus isogramma Bleeker *Nat. Tijdschr. Ned. Indie* XIII. p. 367 von Batavia.

Lophobranchii.

Neue Arten: *Syngnathus bicoarctatus* Bleeker Amboina S. l. c. p. 99. — *Hippocampus chinensis* Basilewski *Ichthyogr. Chinae borealis*.

Ganoidei.

Agassiz machte eine Bemerkung über die Jungen des *Lepidosteus* aus dem Ontario-See. Bei ihnen war die Verlängerung der Wirbelsäule in Form eines fleischigen Fadens deutlich von der Schwanzflosse getrennt. *Proc. Boston Soc.* VI. p. 47.

Derselbe fand ib. p. 63 eine Aehnlichkeit zwischen den Stören und *Lepidosteus* in der Entwicklung der Schuppen. Der jüngste von ihm beobachtete *Lepidosteus* hatte eine Reihe Schuppen längs der Mittellinie des Körpers; bei einem etwas älteren fand sich auch eine Schuppenreihe über und unter der Mittellinie; gegen den Schwanz waren die Schuppen zusammengedrängt und von rhombischer Form. Aehnlich ist

es beim Stör. Er erwartet bei den Embryonen von *Lepidosteus* den Mund unterhalb der Schnauze zu finden.

Golowatschow hat, *Bulletin de la soc. imp. des naturalistes de Moscou* 1857 p. 530 die Arten der russischen Störe kritisch untersucht.

Er ist der Ansicht, dass die Altersverschiedenheiten, die Localvarietäten und die individuellen Abweichungen, so wie die Bastardformen bisher nicht hinlängliche Berücksichtigung gefunden haben. Er hält *Güldenstädt's Acipenser Schipa* für gute Art, *A. Heckeli* Fitz. identisch mit *A. Güldenstädtii* Brandt, *A. glaber* Heck. für glatte Varietät von *A. Schipa*, und *A. Gmelini* Fitz für Varietät von *A. Ruthenus* ct.

Acipenser Mantschuricus Basilewski l. c. aus China.

Ich will nicht unterlassen auf die gründliche Auseinandersetzung der europäischen Störe in Heckel und Kner's mehrerwähntem Buche „Süsswasserfische der österreichischen Monarchie“ aufmerksam zu machen. Dasselbst sind 12 Arten beschrieben und nebst Detail der Köpfe abgebildet. Die Eintheilung der Gattung von Fitzinger und Heckel in den Wiener Annalen I. in sechs Gruppen, die sich besonders auf die Beschuppung, die Bartfäden und die Unterlippe stützt, ist beibehalten. Danach vertheilen sich die beschriebenen Arten folgendermassen: I. *Lionisci*: 1, *A. glaber* Heck. II. *Acipenser*es: 2, *A. ruthenus* L., 3, *A. Gmelini* Fitz. III. *Helopes*: 4, *A. stellatus* Pall. IV. *Antacei*: 5, *A. schypa* Güld., 6, *A. Güldenstaedtii* Brandt, 7, *A. Naccarii* Bonap., 8, *A. Nardoi* Heck. 9, *A. Heckeli* Fitz., 10, *A. nasus* Heck. V. *Sturiones*: 11, *A. Sturio* Linn. VI. *Husones*: 12, *A. huso* Linn.

Selachii.

Squali. *Scyllium acanthonotum* de Filippi und Verany ist Mem. Accad. di Torino XVIII. Fig. 2. abgebildet worden.

Rajae. Hyrtl gab vorläufige Kenntniss von einer für die Denkschriften bestimmten Abhandlung über das arterielle Gefäss-System der Rochen in den Wiener Sitzungsberichten XXV. p. 236.

Green beobachtete am Mundrande von *Pristis sagittata* Zähne unmittelbar neben den Placoidschuppen, welche den Körper des Fisches bedecken. Beide waren sehr ähnlich gebildet, nur dass die Zähne zwei- bis dreimal grösser und dreieckig sind. Proc. Boston Soc. VI. p. 67.

Malm beschrieb *Raja circularis* Couch als neu für die Scandinavische Fauna sehr ausführlich. Öfversigt af kongl. Vetenskapsakad. förhandlingar. 1857. p. 187.

Indem Philippi in unserem Archive p. 270 die Identität von Gay's *Raja chilensis* mit Poeppig's *Raja lima* hervorhebt, beschreibt er zugleich eine neue Art *Raja scobina* von der Küste der Provinz Valparaiso, die in die Abtheilung Uraptera gehört.

Raja chinensis Basilewski l. c.

Rhynchobatis ist der Name, welchen Philippi einer neuen Rochengattung mit langem linealischen platten Schnabel giebt Archiv für Naturgesch. p. 271.

Cyclostomi.

Hubert Reich untersuchte den feinern Bau des Gehörorgans von *Petromyzon* und *Ammocoetes*. Untersuchungen zur Ichthyologie, Jubelschrift der Universität Freiburg im Br. 1857.

Van Beneden bestätigt die interessante Entdeckung von Aug. Müller von der Verwandlung der *Petromyzon* vollkommen und beschreibt als neue Art *Petromyzon Omalii*, die sich durch ihre Länge, und durch die Anordnung der Zähne von *P. Planeri* unterscheidet. Ist abgebildet. Bulletin de l'acad. de Belgique 2. Serie. II. p. 549.

Es verdient erwähnt zu werden, dass Heckel und Kner in ihrem schönen Werke „Die Süßwasserfische der Oestreichischen Monarchie“ die Beobachtungen Aug. Müller's, *Ammocoetes* sei der Jugendzustand von *Petromyzon Planeri*, noch nicht für abgeschlossen halten, sondern vermuthen, der Larvenzustand von *P. Planeri* möge nur Aehnlichkeit mit *Ammocoetes* haben. Sie berufen sich vorzüglich auf die Angabe A. Müller's, dass *Ammocoetes* durchsichtige Eier habe, die doch bei einer Larve nicht vorkommen könnten. Natürlich sind die Eierstocks-Eier gemeint.

Die Beschreibung von *Velasia chilensis* Gray von Philippi s. in diesem Archiv p. 266.

Leptocardii.

Lindsay berichtet, dass im August in der Nähe von Portincross an der Küste von Ayrshire eine grössere Anzahl Exemplare von *Amphioxus lanceolatus* mit dem Schleppnetz gefangen sei. Er lobt Glycerin als eine gute Conservations-Flüssigkeit. Annals nat. hist. XX. p. 339.

Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der niedern Thiere während des Jahres 1857.

Von

Dr. Rud. Leuckart,

Professor in Giessen.

Allgemeines.

Dana publicirt (Silliman's Amer. Journ. 1857. Vol. XXIV. p. 303—316, Annals and Mag. nat. hist. Vol. XX. p. 485) „Thoughts on species“ und behandelt darin die Fragen nach der Natur, der Stabilität und den Abänderungen der Art von einem allgemein naturwissenschaftlichen Standpunkte.

Jäger unterwirft die Symmetrie und Regularität der Thierformen einer schärferen mathematischen Betrachtung und glaubt den Nachweis liefern zu können, dass die symmetrischen („zweiachsigen“) und radiären („einachsigen“) Thiere zweien principiell verschiedenen Bildungstypen angehören. Daraufhin wird eine Eintheilung des Thierreichs in axenlose (Protozoen), einachsige und zweiachsige Formen als natürlich empfohlen.

Die von V. Carus herausgegebenen, in erster Hälfte (Tab. I—XXIII) vorliegenden Icones zootomicae, Leipz. 1857 enthalten zahlreiche Originalbeiträge von Allmann, Gegenbaur, Huxley, Kölliker, H. Müller, Schultze, v. Siebold und Stein und liefern durch eine grosse Menge trefflich ausgeführter Zeichnungen eine ziemlich vollständige Uebersicht über unsere heutigen Kenntnisse von den Organisationsverhältnissen der wirbellosen Thiere. Format und Ausführung erinnert, wie auch der Titel, in unverkennbarer Weise an R. Wagner's vortrefflichen, für die niedern Thiere freilich meist veralteten Handatlas, der unserem Verf. offen-

bar zum Vorbilde gedient hat. Wir werden später noch mehrfache Gelegenheit haben, auf dieses zeitgemässe Unternehmen zurückzukommen und erwähnen hier nur noch so viel, dass Verf. in den den Tafeln vorausgehenden „einleitenden Bemerkungen“ die verschiedenen Haupttypen des Thierreiches bespricht und deren Bau durch schematische Zeichnungen erläutert. Verf. unterscheidet dieselben sieben Hauptabtheilungen des Thierreiches, die zuerst Ref. aufgestellt hat — Verf. verweist dabei freilich nur auf seine eigene Morphologie und Huxley's Lectures —: Protozoa, Coelenterata, Echinodermata, Vermes, Arthropoda, Mollusca, Vertebrata, und schildert deren gegenseitige Beziehungen in folgenden Worten: „Den Anfang der ganzen Reihe bilden einzellige Wesen mit kaum beginnender Organisation (Protozoa) und solche, welche ohne einen von der Leibeshöhle durch besondere Membranen getrennten Darm zu besitzen, einen strahligen, einfach von Hohlräumen durchzogenen Körper haben (Coelenterata). Mit dem Auftreten eines Darmes und des damit nothwendigen Gefässsystemes spalten sich die Formen in zwei Reihen, deren eine dadurch ausgezeichnet ist, dass sich bei gestreckter Körperform (zuerst noch in Anschluss an den strahligen Bau) alle Organensysteme allmählich in zunächst gleichwerthige hinter einander liegende Abschnitte sondern (Echinodermata, Vermes, Arthropoda), während in der andern die Form des Körpers von einer räumlichen Trennung der Organe nach ihrer physiologischen Bedeutung abhängt (Mollusca). Das Endglied der ganzen Reihe bilden Thiere, welche neben der Anordnung der Organe in dem letzteren Sinne noch eine Anordnung der animalischen Thierhälfte in hinter einander liegende Abschnitte aufweisen (Vertebrata).“

Kölliker's „Untersuchungen zur vergleichenden Gewebslehre“ (aus den Verhandl. des med. physik. Vereins zu Würzburg vom Jahre 1857 bes. abgedruckt, 125 Seiten mit 2 Tafeln) machen uns mit zahlreichen neuen Strukturverhältnissen höherer und niederer Thiere bekannt und behandeln namentlich in dem Abschnitte über secundäre Zellenmembranen und Cuticularbildungen (S. 37—109) einen Gegenstand, der für die richtige Auffassung der bei den Wir-

bellosen so häufigen äusseren Skeletbildungen von höchster Wichtigkeit ist. Die meisten dieser Bildungen lernen wir hier als Zellenabscheidungen kennen, die an sich structurlos sind, durch Abmodelliren der darunter liegenden Zellen und andere Vorgänge aber nicht selten ein zierliches Ansehen gewinnen. Eine sehr häufige Auszeichnung dieser sog. Cuticularschichten sind mehr oder minder feine und zahlreiche, senkrecht stehende Poren. Ebendas. macht Verf. (S. 109—113) auf die grosse Verbreitung der contractilen Faserzellen bei den Wirbellosen (Scheibenquallen, Schalthieren, Mollusken) aufmerksam, so wie weiter darauf, dass diese Gebilde an gewissen Stellen eine Structur darbieten (Querstreifen, reihenweis gestellte interstitielle Körnchen, ungemeine Länge, bedeutende Breite, eine besondere Hülle), welche derjenigen der quergestreiften Fasern der Wirbelthiere sehr nahe steht.

Williams tritt mit einer Anzahl aphoristischer Sätze der Annahme von der Existenz eines sog. Wassergefässsystems entgegen und sucht die verschiedenen, mit diesem Namen bezeichneten Organe in anderweitiger Weise zu deuten. (Annal. and Mag. nat. hist. Vol. XIX. p. 133.) Verf. verspricht seine darauf bezüglichen Beobachtungen in einer besondern Monographie der Respirationsorgane ausführlich zu publiciren, so dass es billig erscheint, etwaige weitere Bemerkungen über die vorliegenden Notizen bis dahin zu verschieben. Ref. kann übrigens die Bemerkung nicht unterlassen, dass er in der Hauptsache mit Williams derselben Ansicht ist und solches auch schon vor längerer Zeit (Bergmann und Leuckart vergl. Physiol. S. 284) öffentlich dargelegt hat.

Lancaster hält in der British Assoc. 1857 einen Vortrag über die Fortpflanzung der organischen Wesen und sucht die verschiedenen Formen derselben, mit Einschluss des Generationswechsels und der Parthenogenesis, unter gewisse gemeinschaftliche Gesichtspunkte zusammenzufassen. (Der kurze Bericht in l'Institut. 1858. p. 140, der Ref. bis jetzt allein vorliegt, lässt keine weitere Mittheilung über den Inhalt des Vortrages zu.)

Von Sars erhielten wir den zweiten Theil seines „Bidrag til kundskaben om Middelhavets Littoral-Fauna, Reise-

bemaerkingen fra Italien“, *Nyt Mag. for Naturvidensk.* X. p. 59—155 (c. 2 tabb.) mit Beobachtungen über Akalephen und Echinodermen, die später noch besonders anziehend sind.

Der *Prodromus descriptionis animalium evertibratorum*, quae in expedit. ad oceanum septentr. Joh. Rodgers duce observ. et descript. Stimpson (*Proc. Ac. nat. sc. Philad.* 1857) bezieht sich, soweit er hier zu berücksichtigen ist (Pars 1 u. 2), ausschliesslich auf die Gruppe der Turbellarien, auf die wir hier hinweisen.

I. Vermes.

O. Schmidt publicirt einen zweiten Beitrag „zur Kenntniss der Turbellaria rhabdocoela und einiger anderer Würmer des Mittelmeeres“ Wien 1857, mit 5 Tafeln (*Sitzungsber. der k. k. Akad. der Wissenschaften* Bd. XXIII. S. 347 ff.). Die Beobachtungen des Verf. werden an der betreffenden Stelle von uns berücksichtigt werden.

Die „Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Eingeweidewürmer“*) von G. Wagner, eine von der holländischen Societät der Wissenschaften zu Harlem im Jahre 1855 gekrönte und in dem 13. Bande der *Naturkundige Verhandlungen* 1857 veröffentlichte Preisschrift, sind in gleicher Weise durch den Reichthum an Beobachtungen, wie durch die vollendete Schönheit der vom Verf. selbst entworfenen Abbildungen (27 Tafeln in Quart) ausgezeichnet. Sie bilden eine besondere Zierde unserer helminthologischen Litteratur

*) Ref. benutzt diese Gelegenheit, einen Irrthum des vergangenen Jahresberichtes zu verbessern. Die auf S. 172 citirte Note von Retzius, die Ref. nach einem nordamerikanischen Journal noch nachträglich, nachdem er die betreffenden Reports nicht mehr zu Händen hatte, seinem Berichte hinzufügte, handelt nicht, wie angeführt „über die Entwicklung von Würmern in dem Gehirne eines Albatros,“ sondern vielmehr über die Entwicklung des Wurmes (*vermis cerebelli*) im Hirne des Albatros, also über einen Gegenstand, der unserem Berichte ganz fern liegt.

und werden später, besonders bei den Trematoden, noch ausführlich von uns angezogen werden.

Die hauptsächlichsten Resultate dieser Beobachtungen sind mit einigen anderen vom Verf. in einem Sendschreiben an C. Th. v. Siebold zusammengestellt und durch zwei Tafeln neuer, nicht minder schöner Abbildungen erläutert, Zeitschr. für wissensch. Zoologie IX. S. 73—90. Taf. V. u. VI. „helminthologische Bemerkungen.“

Virchow's „helminthologische Notizen“ (Arch. für pathol. Anat. XI. S. 79—86) handeln über Verbreitung der Entozoen und über die Kalkkörperchen der Tanioiden.

In dem ersten Aufsätze hebt der Verf. die Verschiedenheiten in der Häufigkeit des Vorkommens gewisser Parasiten an verschiedenen Localitäten hervor. So finden sich z. B. Tánien und Cysticercen bei dem Menschen ungleich häufiger in Berlin (Norddeutschland), als in Würzburg (Franken). Ebenso auch eingekapselte Pentastomen, während in Betreff der Rundwürmer das umgekehrte Verhältniss obwaltet. Wenn Verf. zur Erklärung dieser Verschiedenheiten auf die Eigenthümlichkeiten der Nahrung und Lebensweise hindeutet, ist derselbe gewiss in vollem Rechte; dass dabei aber der Genuss von Würsten und Schinken in der vom Verf. hervorgehobenen Weise in Betracht komme, ist für Ref. im höchsten Grade unwahrscheinlich, da diese Substanzen gekocht oder geräuchert, wie sie allein gegessen werden, bestimmt niemals lebendige oder lebensfähige Helminthen enthalten.

Für Willshire's „klinische Vorlesungen über Helminthiasis“ (Lancet 1856. I. 14) verweisen wir auf das Referat in Schmidt's Jahrbüchern 1858. No. 7.

Giebel macht (Zischr. f. die ges. Naturwiss. Bd. IX. S. 264—269) nach den in seinen Händen befindlichen Collectanen Nitzsch's einige Mittheilungen über die helminthologischen Untersuchungen dieses ausgezeichneten Forschers und veröffentlicht namentlich eine Uebersicht der von demselben untersuchten (189) Eingeweidewürmer, unter denen zahlreiche, zum Theil auch wohl jetzt noch unbekannte Formen vorkommen. Auch für die Kenntniss der Helminthenwirththe enthält die vorliegende Mittheilung manche interessante Angabe.

1. Annelides.

Chaetopodes.

Von Lockhart Clarke erhielten wir eine sehr detaillirte Darstellung von dem anatomischen Baue und dem histologischen Verhalten des Nervensystems bei *Lumbricus terrestris*, aus der wir hier nur so viel hervorheben, dass der sehr zierlich entwickelte Nervus sympathicus jederseits mit vier Wurzeln aus den Commissuren des Nerven Halsbandes entspringt und auf dem Pharynx ein reiches Netzwerk mit deutlichen Ganglien bildet. Gelegentlich erwähnt Verf. auch die Anwesenheit von zwei oder drei Gruppen Speicheldrüsen, die aus zusammengewundenen Röhren bestehen und in die Seitentheile des Mundes und Pharynx einmünden. Proc. roy. Soc. 1857. Jan. oder Annal. and Mag. nat. hist. T. XIX. p. 250—257.

Meissner giebt an (Zeitschr. für rat. Medicin 1857. S. 633 Anm.), dass die Gehörbläschen von *Arenicola* durch einen dünnen Canal auf der Hautoberfläche ausmünden, dass also hier dieselbe Communication mit der Aussenwelt besteht, die neuerdings von mehreren Seiten für die Gehörkapseln der Schnecken nachgewiesen wurde.

Grube spricht auf der Bonner Naturforscherversammlung (Tageblatt S. 52) über die Lage des Afters bei den Anneliden und hebt ein Paar Fälle hervor, in denen derselbe von dem hinteren Leibesende auf den Rücken emporrücke (einige Sabellen, *Notopygos* Gr.), so dass dadurch eine Anknüpfung zu den Sipunculiden gegeben werde.

Kölliker fand im Darne von *Arenicola* einen mässig verdickten Epithelsaum ohne wahrnehmbare Streifen, bei *Sipunculus* ausserdem auch noch kurze Flimmerhaare. Bei *Cirratulus* wurden merkwürdige keulenförmige Wimperorgane im Darne gesehen. Unters. zur vergl. Gewebslehre S. 57.

Die cylindrischen oder pflasterförmigen Epidermoidalzellen der Chaetopoden sind constant mit einer Cuticularschicht bedeckt, die in manchen Fällen ganz homogen ist, aber gewöhnlich — wie das übrigens von Ref. in Wagner's Zootomie II. S. 270 schon längst hervorgehoben wurde — durch

kreuzende Streifen wie gegittert aussieht. Bei *Hermione hystrix* ist die Cuticula mosaikartig gezeichnet. Porenkanäle sind häufig vorhanden. Bei *Cirratulus* wurde in einem Falle die merkwürdige Beobachtung gemacht, dass der Cuticularsaum nach Kalizusatz in flimmernde Härchen zerfiel. Kölliker, ebendas. S. 66.

Wright untersucht die Tentakel von *Spio seticornis* und findet die Oberfläche derselben mit zahlreichen kleinen Fühlpapillen besetzt, die in eine Spitze auslaufen und einen Sack im Innern einschliessen, dessen Inhalt aus zahllosen kleinen nadelförmigen Körperchen besteht. Verf. vergleicht diese Kapseln mit Nesselfäden. Edinb. new phil. Journ. VI. p. 90.

Kölliker liefert eine detaillirte Beschreibung von dem festen Kiemengerüste der Sabellen und nimmt dasselbe (was freilich auch schon von anderer Seite geschehen ist) als ein Knorpelskelet in Anspruch. Nach den Beobachtungen des Verf. (Untersuchungen zur vergl. Gewebslehre S. 113—119) steckt im Kopfe dieser Thiere ein fest geschlossener, ziemlich dicker Ring von Knorpelsubstanz, der in der Höhe des Halskragens sich mit verdünntem Rande in die Muskelmasse hinein verliert, vorn aber in zwei grosse dünnere Knorpelblätter sich fortsetzt, die sich vielfach spalten und in dünne, den einzelnen Kiemenfäden zur Stütze dienende Stäbe auflösen.

Williams lenkt die Aufmerksamkeit der Zoologen auf die in den Seitentheilen der einzelnen Segmente bei den Ringelwürmern gelegenen schlauchförmigen Organe (segmental organs), die, seiner Meinung nach, dazu dienen, theils den Inhalt der Leibeshöhle nach Aussen zu entleeren, theils auch die Samenkörperchen und Eier abzusondern. Verf. glaubt, dass analoge Gebilde sehr weit unter den niederen Thieren verbreitet seien und vindicirt dieselben namentlich auch den Rotiferen, Echinodermen und Actinien (Mesenterialfilamente). Proc. roy. Soc. 1857. Febr. oder Ann. and Mag. nat. hist. T. XIX. p. 392.

Für die Einzelheiten verweist Ref. auf die Arbeit selbst, doch muss derselbe gestehen, dass ihm, wie in den früheren Arbeiten des Verf., so auch hier, zahlreiche Irrthümer untergelaufen schei-

nen. So sollen z. B. die Geschlechtsstoffe nur bei *Arenicola* und *Terebella* frei in der Leibeshöhle getroffen werden, in die sie zunächst aus den „segmental organs“ gelangten; *Glycera*, *Cirratulus* und die Aphroditen sollen Hermaphroditen sein, dabei auch des Blutgefässsystems völlig entbehren u. s. w.

In einer zweiten Mittheilung desselben Verf. (26. Meet. Br. Assoc., l'Instit. 1857. p. 61) wird wiederholt, dass in der Familie der Aphroditeen das Blutgefässsystem fehle. Auch sollen die betreffenden Thiere die grösste Verwandtschaft mit den Echinodermen haben.

Hering theilt einen Querschnitt durch den Körper von *Lumbricus* und den Bau der Geschlechtsorgane desselben in einer Abbildung mit. Carus, Icon. zoot. Tab. IX. Fig. 5 u. 24.

Die bekannten, um eine grössere Centralkugel gruppirten Zellenagglomerate aus dem Hoden der Regenwürmer und anderer Anneliden entstehen nach Meissner (Zeitschr. für rationelle Medicin 1857. S. 622) durch Kospung aus der centralen Mutterzelle. Die Samenfäden entwickeln sich durch Metamorphose des Kernes.

Van Beneden macht die Oersted'sche *Lumbriconais marina* (*Capitella capitata* v. B.) zum Gegenstande einer besonderen anatomischen und embryologischen Untersuchung und gewinnt dabei die Ueberzeugung, dass dieses Thier nicht zu den Lumbricinen, sondern, (trotz der Abwesenheit besonderer Kiemen) zu den Kiemenwürmern zu rechnen sei. Aus den vorläufigen Mittheilungen unseres Verf. (Bullet. Acad. Belg. 1857. Oct., l'Inst. 1857. p. 443) heben wir hervor, dass die betreffenden Würmer nicht bloss, wie schon früher bekannt war, getrennten Geschlechts sind, sondern auch, wie die Kiemenwürmer, durch eine Metamorphose sich entwickeln. Die neugeborenen Larven tragen Augen und zwei Flimmerkränze. Die männliche Geschlechtsöffnung liegt im vordern Körperdrittheil und ist von einem Borstenkranze umgeben. Ein Blutgefässsystem fehlt, dafür aber ist in der Leibeshöhle eine Flüssigkeit mit grossen rothen Blutkörperchen vorhanden. Eine zweite von d'Ukedem entdeckte Art ist seitlich und hinten am Körper mit Zotten besetzt: *C. fimbriata* n. sp.

Krohn spricht in der Bonner Naturforscherversammlung über Actinotrocha und hebt hervor, dass sich dieselbe nach Verlust des Schirmes zu einem wahrscheinlich den Tubicolen zugehörenden Wurme entwickle. Tageblatt der Bonner Naturforscherversammlung S. 52.

Von Kinberg erhielten wir die Fortsetzung seiner „neuen Gattungen und Arten von Annulaten“ (Öfvers. af k. Vet. Akad. Förhandling. Aarg. XIV. p. 11—14) mit Beschreibungen folgender Arten:

Fam. *Amphinomea*. Trib. 1. *Amphinomacea*: *Chloeia candida* n. sp. St. Thomas; *Notopygus crinitus* Gr. St. Helena, *Lirione* (n. gen.) *maculata* n. sp. Panama; *Amphinome rostrata* Pall., *A. vagans* Sav., *A. Luzoniae* n. sp. Luzon, *Hermodice* (n. gen.) *carunculata* Pall., *H. striata* n. sp. Stiller Ocean, *Eurythoe* (n. gen.) *Hedeborgi* n. sp. hab.?, *E. syriaca* n. sp. syr. Küste; *E. chilensis* n. sp. Valparaiso; *E. capensis* n. sp. Cap b. sp., *E. pacifica* n. sp. Südsee; *E. corallina* n. sp. ebendah.; Trib. 2. *Euphrosynea*: *Euphrosyne capensis* n. sp. Cap b. sp. (Die Diagnosen der neuen Arten sollen nachgeliefert werden.)

Ebenso publicirt Grube die Fortsetzung seiner „Annulata Oerstediana“, denen jetzt auch die Beschreibung einiger von Kroyer in Centralamerika gesammelten Arten zugefügt ist. (Vidensk. Meddel. for 1857. p. 158—186.)

Die beschriebenen Arten gehören zu den Familien der Euniceen, Lycorideen, Nephthydeen, Phyllodoceen, Glycereen und Syllideen, und sind wiederum sämmtlich neu:

Lumbriconereis longissima Valparaiso, *L. brasiliensis* Rio-Janeiro, *Nereis rallata* Valpar., *N. marginata* St. Jean, *N. Krebsii* St. Croix, *N. rigida* Puntarenas, *N. Riisei* St. Croix, *N. puncturata* hab.?, *N. debilis* hab.?, *N. (Nereilepas Blainv.) variegata* Callao, *N. Callaona* ibid., *N. (Heteronereis Oerst.) caudipunctata* St. Croix, *N. pannosa* Callao, *Nephthys imbricata* Valparaiso, *Phyllodoce macrophthalma* Realejo, *Ph. Puntarenas* Puntarenas, *Ph. Callaona* Callao, *Ph. longicornis* Realejo, *Ph. flavescens* Puntaren., *Oxydromus longisetis* St. Croix, *O. flaccidus* ibid., *Pisione* (n. gen.), *Oerstedii* Valpar., *Glycera cirrata* Rio-Jan., *Gl. papillosa* Valpar., *Gl. simplex* Valpar., *Syllis latifrons* Callao, *S. brachycirris* St. Croix, *S. breviarticulata* ibid., *S. rubra* ibid., *S. obscura* ibid., *S. streptocephala* ibid., *S. zonata* ibid., *S. valida* Valpar., *S. longesegmentata* St. Croix. *S. macroceras* ibid., *Amblyosyllis* (n. gen.) *rhombeata* St. Croix.

Char. gen. n. *Pisione* Gr. Corpus vermiforme, segmentis numerosis. Lobus capitalis ovalis tentaculis frontalibus utrimque duobus, oculis duobus. Segmentum buccale supra brevissimum vel vix

distinguendum, cirro tentaculari utrimque uno laterali pinnaque adumbrata munitum; pharynx exsertilis longa, cylindrata, corona papillarum maxillisque quatuor uncinatis armata, superioribus inferioribus adversis. Segmentum secundum cirro dorsali pinnaque similibus instructum. Pinnae segmentorum caeterorum paulo productae, in lobulos exeuntes, cirro dorsali et ventrali basilaribus, cirroque altero centrali sub apice munitae; setae compositae. Cirri ani nulli. Pisione genus a Phyllodoceis ad Glycerea transiens cum illis lobi capitalis conformatione, cum his pharyngis armatura consentit; pinnae singulares ab utrisque differentes.

Char. gen. n. *Amblyosyllis* Gr. Corpus, pinnae, cirri, setae Syllidis generis, lobus capitalis cum segmento buccali coalitus; toris frontalibus nullis. Tentacula tria, cirri tentaculares duo, oculi duo.

Die Beschreibung des von Fr. Müller in Brasilien entdeckten *Lumbricus corethrurus*, dessen wir bereits im letzten Jahresberichte (S. 180) Erwähnung thaten, ist jetzt auch in dieses Arch. 1857. S. 113, so wie in die Ann. and Mag. nat. hist. 1857. T. XX. p. 13 übergegangen.

O. Schmidt entdeckte im Mittelmeere eine neue proliferirende Naide: *Parthenope* (n. gen.) *serrata*, die sich besonders durch einen tonnenförmigen, vorstülpbaren Schlund, Mangel der Augen und Zähnelung der Borsten auszeichnet. Sitzungsber. der Wiener Akad. Bd. XXIII. S. 363. Tab. V. Fig. 13.

Ob die ebend. S. 361. Fig. 12 beschriebenen *Thysanoplea* (n. gen.) *luctuosa* gleichfalls den Naiden zugehöre, müssen wir unentschieden lassen; Verf. hebt mit Recht hervor, dass der mit diesem Namen bezeichnete kleine Borstenwurm, der in Neapel nicht selten in Gesellschaft von Turbellarien gefunden wurde, ein seltsames Aussehen besitze und von allen bekannten Gattungen abweiche. Der Körper ist im hohen Grade contractil, fast ohne Spuren einer Segmentirung und in ganzer Ausdehnung mit Hautpapillen bedeckt. Am Vorderende ein Paar Fühler und zwei Augen. 16 Paar schwache, lineare Borstenbüschel, von denen jedes in einer grösseren, am Bauche befindlichen Papille steckt, die mit einigen kleineren Papillen besetzt ist. Geschlechtsorgane einfach, wie bei den Polychaeten. Ein Gefässsystem wurde nicht beobachtet.

Nicht minder merkwürdig ist das von Wright Edinb. new

philos. Journ. T.V. Oct. entdeckte Gen. n. *Phoronis*, das durch die Abwesenheit von Borsten und Segmenten an die Sipunculiden sich anschliesst und auch durch Aufenthalt in Felsspalten diesen Thieren verwandt scheint. Die wesentlichste Auszeichnung der beobachteten Art (*Ph. hippocrepia* n. sp.) besteht in der Abwesenheit eines hufeisenförmigen Tentakelapparates, wie er sonst nur bei den Süsswasserbryozoen vorkommt.

Auch Allman beobachtet dieses interessante Thierchen und liefert gleichfalls davon eine Beschreibung und Abbildung. A monograph of the fresh-water Polyzoa p. 55. Note.

Körper ohne Ringelung und Fusshöckern, ein einfacher Cylinder, dessen vorderes Ende mit einem zweischenklichen, tentakeltragenden Kopfschirme versehen ist. Mund von einer Oberlippe überdeckt: After dicht neben dem Munde, in dem Ausschnitte des Kopfschirmes. Im Innern ein Darm mit ansehnlich entwickelten pulsirenden Gefässen, die ein rothes Blut führen. Eine Leibeshöhle fehlt.

Die von Trask (Proc. Calif. Acad. Vol II. p. 99. Pl. VI) unter dem Genusnamen *Leptosiaagon* beschriebenen mikroskopischen Organismen, von denen Verf. es ungewiss lässt, ob sie den Krebsen, ob den Zoophyten oder Diatomeen zugehören, sind nach dem Berichterstatter in Silliman's Am. Journ. 1858. T. XXVI. p. 295 — Ref. ist das Vol. II der betr. Proc. noch nicht zugekommen — Nichts als Annelidborsten.

Nematodes.

Nach den Beobachtungen von G. Wagener sieht man bei *Strongylus auricularis* und anderen Nematoden nach dem Zerdrücken neben den in etwas körnige Masse eingehüllten, glatten und hohlen Bändern der beiden Seitenlinien zwei helle, leicht geschlängelte Streifen, welche mit eigenen Wandungen versehen sind und in sehr weiten Abständen hier und da einen gefässartig verlaufenden Zweig aufnehmen, der sich in den benachbarten Geweben bald den Blicken entzieht. Archiv für Anat. und Physiol. 1857. S. 363.

Williams betrachtet die bekannten, in der Leibeshöhle der Ascariden gelegenen drüsenartigen Beutel als Absorptionsapparate und lässt sie an der äussern Körperfläche sich öffnen. Wasser- und Blutgefässe werden dagegen in Abrede gestellt. Rep. br. Assoc. 26. Meet. p. 101. l'Inst. 1857. p. 82.

Nach Köl liker besitzen die Ascariden im Darne einen mehr oder minder dicken Epithelialsaum mit einer, bei den grösseren Arten deutlichen Streifung. Die Epithelialzellen, die diesen Saum tragen, sind cylindrisch und werden von einer äusseren dicken Darmhaut umhüllt, die keine Spur eines besonderen Baues zeigt. Unters. zur vgl. Gewebslehre S. 42. (Bei *Asc. lumbricoides* zeigt diese äussere dicke Darmhaut deutliche Porenkanäle. Ref.)

Auch die äussere elastische Haut der Nematoden ist nach Köl liker (ebendas. S. 60) eine Cuticula, jedoch liess sich das zur Abscheidung dienende Epithelium nur unvollständig und immer nur in Spuren nachweisen.

Claparède handelt (Zeitschr. für wissensch. Zoologie IX. S. 106—128) „über Eibildung und Befruchtung bei den Nematoden“ und sucht dabei die widersprechenden Angaben früherer Forscher zur Einigung zu bringen.

Die Bischoff'schen Epithelialzäpfchen sind nach unserem Verf. die wirklichen Samenkörperchen, die in manchen Fällen, wie z. B. bei *Ascaris suilla* bereits in den männlichen Organen ihre spätere kegelförmige Bildung annehmen. Dass diese Gebilde in vielen Nematoden eine sehr eigenthümliche amoebenartige Bewegung besitzen, ist bereits von Schneider (J. B. XXIII. S. 187) beobachtet, und dürfte für den Befruchtungsprocess nicht ohne Bedeutung sein. Ein Eindringen der Samenkörperchen in die Eier, wie Meissner es behauptet, konnte nicht beobachtet werden. Eben so wird die Angabe dieses Forschers über die Fettmetamorphose der erstern in Zweifel gezogen. Fetttropfen, wie sie Meissner von den eingedrungenen Samenkörperchen ableitet, finden sich ganz in derselben Weise auch in den Eiern unbefruchteter Weibchen. Eine Micropyle fehlt den Nematodeneiern; die desfallsigen Angaben Meissner's beruhen auf einem Irrthume, wie das auch von Ref. immer behauptet ist. Ebenso fehlt zur Zeit der Befruchtung eine eigentliche Eihaut, während die Rhachis dafür eine wirkliche Rhachis ist. Die Entwicklung der Eier geht ganz auf dem gewöhnlichen Wege durch allmähliche Umlagerung von Dotter um das Keimbläschen vor sich.

Ueber die Vorgänge der Ei- und Spermatozoenbildung bei den Nematoden vergl. man auch V. Carus, Icon. zoot. Tab. VIII. Fig. 1—3, wo dieselben durch M. Schultze und v. Siebold bei verschiedenen Arten bildlich dargestellt sind. Die Samenkörperchen entwickeln sich nach den hier mitge-

theilten Beobachtungen durch eine Art Furchung aus den männlichen Keimzellen.

Weiter findet sich daselbst von Max Schultze eine Abbildung von *Diplogaster micans* n. gen. et n. sp. ♂ und *Rhabditis oculata* n. sp. ♀ mit vollständiger Anatomie, so wie die der vordern Körperhälfte eines *Enoplus* n. sp. aus Triest.

Die schon im Jahresberichte für 1855 (Bd. XXII. S. 353) erwähnten und ausgezogenen Untersuchungen von Davaine über *Vibrio tritici* sind inzwischen in einem selbstständigen Werke erschienen: Rech. sur l'anguillule du blé niellé. Paris 1857. Avec 3 pl.

Nach den Beobachtungen Kühn's ist auch die sg. Kernfäule der Weberkarde durch den Parasitismus einer Anguillula bedingt, die theils in den Körnern und dem Pappus, theils auch am Fruchtboden und im Marke des Blüthenkopfes haust, und in ganz ähnlicher Weise, wie *A. tritici*, an erster Stelle eine abnorme Bildung, an letzterer ein allmähliches Absterben und Braunwerden des Gewebes zur Folge hat. Die Lebensgeschichte dieser *A. dipsaci* n. sp. scheint überhaupt die grösste Aehnlichkeit mit der von *A. tritici* zu besitzen, mit welcher Art dieselbe auch die Fähigkeit des Austrocknens und Wiederauflebens nach Wasserzusatz theilt. Männliche und weibliche Oeffnung liegt im hintern Körperende, die letztere etwas höher, aber doch noch weit von der Mitte entfernt, wo die weibliche Oeffnung bei den frei lebenden viviparen Anguilluliden gefunden wird. Das Männchen hat neben der Geschlechtsöffnung bis zur Schwanzspitze eine senkrechte Hautfalte.

Krabbe fand in der Leber von Triton cristatus fast bei allen Individuen (Mai, Juni) zahlreiche freie Exemplare eines weiblichen Trichosomum, zum Theil so vollständig mit Eiern gefüllt, dass sie einem einfachen Eierschlauche gleichen. Ausser diesen Parasiten enthielt die Leber noch eine Menge eingekapselter Eierhaufen, meist schon mit Embryonen, die von jenen Trichosomen abstammten. In einigen Kapseln waren die Körperwandungen des abgestorbenen Wurmes noch deutlich zu erkennen, in anderen war derselbe zerfallen, so dass die Eier dann frei in der Kapsel zu liegen schienen. Mitunter wurden zugleich im Darne Trichosomen

gefunden, aber fast immer nur unreife Exemplare. Auch die Muskeln der Bauchwand enthielten hie und da freie Nematoden von sehr unbedeutender Grösse (Sitzungsber. der k. k. Akad. zu Wien, Bd. XXV. S. 520—523).

Miescher's *Filaria piscium* ist nach G. Wagener (Beitr. zur Entwicklungsgesch. der Eingeweidew. S. 4) keine *Filaria*, noch viel weniger aber der Jugendzustand eines *Tetrarhynchus*, sondern vielmehr eine Collectivbenennung verschiedener junger *Ascaris*arten, die alle drei Lippen tragen, von denen die eine gewöhnlich mit einem geflügelten Häkchen versehen ist. Die Gestalt des Häkchens richtet sich nach der Art, zu der die betreffende Form gehört. Uebrigens geht dasselbe späterhin verloren.

Ebendasselbst giebt Verf. eine Beschreibung der *Filaria globiceps* Rud., die im Ovarium (nicht Peritonäum) vom *Uranoscopus scaber* lebt. Interessant ist der gewaltige Grössenunterschied von Mann (6 Lin.) und Weib (200 Lin.), der auf ähnliche Verhältnisse bei *Fil. medinensis* zurückschliessen lässt, mit welcher unsere Art überhaupt eine gewisse Aehnlichkeit hat. Ein After wurde nicht gefunden. Der einfache Penis liegt in der Mitte des abgerundeten Schwanzendes. Das Junge, das in den Geschlechtsorganen der Mutter zur vollen Entwicklung kommt, unterscheidet sich von seinen Eltern durch den feinen, langen Schwanz, der sich allmählich in eine scharfe Spitze auszieht, während beide Geschlechter im erwachsenen Zustande einen kurz abgerundeten Schwanz haben.

Ueber den inneren Bau von *Filaria horrida* berichtet Diesing, sechszehn Arten Nematoden in den Denkschriften der Wiener Akad. 1857 S. 19. Tab. IV.

Die eben citirte Abhandlung, die vierte der von unserem Wiener Helminthologen herausgegebenen und den Denkschriften der k. k. Akad. (1857. S. 6—23 mit 4 Tafeln) einverleibten Monographien handelt über:

Oxyuris obesa aus dem Blinddarm von *Hydrochoerus Capybara*
Ascaris heteroptera aus verschiedenen Ibisarten, *A. lonchoptera* aus den Gallengängen und dem Darm von *Elephas indicus*, *A. macroptera* aus dem Magen von *Champsia nigra*, *A. hystrix* aus dem Mastdarm von *Podocnemis erythrocephala*, *Spiroptera hamulosa* aus der Magenwand von *Phasianus gallus*, *Sp. serpentulus* aus den Sehnenscheiden der

Extremitäten bei verschiedenen Brasilianischen Falken, *Sp. echinata* aus dem Oesophagus von *Mergus albellus*, *Physaloptera mucronata* aus dem Magen von *Champsia nigra*, *Ophiostomum amphiacanthum* aus dem Dünndarm von *Lemmus dasytrichus*, *Trichocephalus subspiralis* aus dem Blinddarm verschiedener Dasypusarten, *Filaria bispinosa* aus der Leibeshöhle verschiedener Brasilianischer Schlangen, *F. horrida* aus der Brusthöhle von *Rhea americana*, *Sclerostomum dispar* aus der Luftröhre von *Felis concolor*, *Sc. monostichum* aus dem Blinddarm von *Tapirus americanus*, *Strongylus longevaginus* (*Filaria hominis bronchialis* Rud.?) aus den Lungen des Menschen. Der letzte, durch die besondere Länge der Penisscheide so ausgezeichnete Rundwurm wurde bis jetzt nur einmal (zu Klausenburg) in der Lungensubstanz der Leiche eines sechsjährigen Knaben in vielen Exemplaren angetroffen. Die übrigen Arten sind grösstentheils aus Brasilien, wo sie von Nattner gesammelt wurden. Bei dem besonderen Interesse, das der *Str. longevaginus* in Anspruch nimmt, lassen wir hier die von unserem Verf. entworfene Diagnose folgen:

Caput truncato conicum, haud alatum; oris limbo papillis 4—6 cincto. Corpus subaequale rectum, albo-fuscum, maris antrorsum, feminae utrimque parum attenuatum, extremitate caudali maris inflexa; bursa subcampanulata biloba, lobo singulo triradiato, radiis externis simplicibus, medianis interdum bipartitis; vaginae penis petalis longissimis linearibus, dimidia fere corporis longitudinis, aurantiacis, transverse tenuissime striatis; feminae apice mucronata, apertura genitali supra caudae apicem. Viviparus. Long. maris 6—7^{'''}, crassitudo $\frac{1}{4}$ ^{'''}, fem. ad 1^{''}, crassit. $\frac{1}{3}$ ^{'''}.

Auch Leidy beschreibt (Proc. Acad. Phil. 1856, VIII p. 49 — wie schon früher *ibid.* V p. 102) eine Anzahl neuer Rundwürmer: *Anguillula socialis* aus *Acheta abbreviata*, *Ascaris columnaris* aus *Mephitis Chinga*, *A. laevis* aus *Arctomys monax*, *A. longa* aus *Tantalus loculator*, *A. entomelas* aus *Rana halecina*, *A. nuda* aus *Crotalus adamanteus*, *A. humilis* aus *Tropidonotus sirtalis*, *A. neglecta* aus *Diodon maculo-striatus*, *Oxyuris compar* aus *Felis Catus*, *Oxyuris* (?) *dubia* aus *Bufo americana* und *Salamandra rubra*. *Physaloptera turgida* aus *Didelphys virginiana*, *Ph. limbata* aus *Scalops canadensis*, *Ph. objecta* aus *Psammophis flagelliformis*, *Ph. constricta* aus *Tropidonotus sipedon*, *Ph. contorta* aus verschiedenen nordamerikanischen Schildkröten, *Filaria immitis* aus *Canis familiaris*, *Filaria* (?) *dubia* aus *Diomedea exulans*, *F. solitaria* aus *Emys serrata*, *F. Cistudinis caroliniae*, *F. nitida* aus *Rana pipiens*, *F. Amphiumae meantis*, *F. rubra* aus *Labrax lineatus*, *F. quinque tuberculata* aus *Anguilla vulgaris*.

Diesing hält die von Györy (J. B. XXIII. S. 185) aufgefundene *Oxyuris spirotheca* für den Repräsentanten eines eignen Genus und schlägt dafür den Gattungsnamen *Pseudonymus* vor

(Sechszehn Arten von Nematoden a. a. O. S. 10. Anm.). Der Gattungsscharakter stellt sich nach Verf. folgendermaassen heraus:

Corpus cylindricum, antrorsum limbo lato reflexo cinctum. Caput subglobosum antice plicis quinque e centro radiantibus. Os in plicarum centro. Extremitas caudalis maris obtusa mucrone terminali, pene setiformi infra apicem caudalem; femina subulata; apertura genitalis in postica tertia corporis parte; uterus bicornis (?). Vivipara. In coleopterorum intestino recto endoparasita.

Kolenati's *Nematoidum miniopteri* (Parasiten der Chiropteren 1857) ist nicht zu entziffern.

Marcel beschreibt einen neuen 5—10^{'''} langen Spuhlwurm aus dem Darne des *Ouistiti*, mit Hautfalte am Kopfe (wie bei *Asc. mystax*) und zwei ungleich entwickelte *Spiculis*. Bull. Soc. Vaud. des sc. nat. 1857. V. p. 340.

Prestel berichtet (Allgem. deutsche naturh. Ztg. 1857. III. S. 353) von einer Taube, deren *Tractus intestinalis* mit zahllosen Exemplaren von *Ascaris teres* so vollständig erfüllt war, „dass kein fremder Gegenstand noch Platz neben ihnen finden konnte.“

Assmus beobachtete an den Drohnen seiner Bienenstöcke (Gouvernement Moskau bei Podolsk) eine Epidemie, die durch den Parasitismus von *Mermis albicans* bedingt war. Allgem. deutsche naturh. Ztg. 1857. III. S. 353.

Leidy's Notes on *Gordius* (Proc. Acad. Philad. 1857. p. 205) sind Ref. bis jetzt noch nicht zu Gesicht gekommen.

Acanthocephala.

In den „Beiträgen zur Entwicklungsgeschichte der Eingeweidewürmer“ von G. Wagener (S. 79—84) und detaillirter in dessen „helminthologischen Bemerkungen“ (a. a. O. S. 77—83. Tab. VI) findet sich eine Darstellung von Embryonen verschiedener Echinorhynchen mit Beobachtungen über Entwicklung derselben und Bildung der Eier, denen an letzterem Orte auch eine vortreffliche Abbildung der ausführenden weiblichen Organe, des Rüssels mit Rüsselscheide u. s. w. zugefügt ist. Wir heben daraus folgende Angaben hervor:

Die schon im Ei sich bewegend jungen Echinorhynchen haben bei allen Species dieselbe Gestalt und zeigen eine unverkennbare äussere Aehnlichkeit mit ihren Eltern. Am Kopfe besitzen dieselben eine schlitzförmige Grube, die mit einem daran sich anschliessenden Sacke in Verbindung zu stehen scheint. Der ganze Leib ist mit rückwärts gerichteten Stacheln bekleidet, die nach dem Kopfe zu meist grösser werden, sonst aber mancherlei Unterschiede in Stärke u. s. w. besitzen. Oftmals gesellen sich zu diesen grösseren Kopfstacheln noch

besondere Haken, bald zwei Paar, bald deren nur eins. Die Eier unsrer Echinorhynchen sind bekanntlich Anfangs zu scheibenförmigen Ballen zusammengehäuft und frei (als sg. lose Ovarien) in der Leibeshöhle enthalten. Verf. beobachtete nun, dass diese Ballen sich aus Zellen entwickeln, die einzeln in dem sg. Lig. suspensorium eingebettet sind, sich aber nach einiger Zeit mit körnigem Inhalt füllen und dann statt des früher einfachen Kernes eine grosse Menge von Kernen erkennen lassen. In diesem Zustande lösen sich die Körnerhaufen aus dem Verbande mit dem Ligamentum suspensorium, einer nach dem andern, bis letzteres ganz zerfetzt ist und schliesslich in eine schleimige Masse sich auflöst. Die Körnerhaufen unterliegen nun von ihrer Peripherie her einer Klüftung; die einzelnen Klüftungskugeln isoliren sich, umgeben sich mit einer Haut und stellen dann Eier dar, in denen man mitunter einen deutlichen Kern mit Kernkörperchen unterscheiden kann. (Ref. erinnert diese Darstellung an einen Vorgang der Eibildung, den er in Gemeinschaft mit Dr. Pagenstecher jüngst bei *Tomopteris* beobachtet hat. Bei diesem Wurme entstehen durch Knospung an der Innenwand der hohlen Fusshöker Zellen, die durch Theilung des Inhaltes meist vier Tochterzellen bilden und sich dann ablösen, um frei in der Leibeshöhle umherzutreiben. Die Tochterzellen gelangen eine nach der andern zu einer stärkern Entwicklung und schliesslich zur Isolation, und erscheinen dann als unverkennbare Eier mit Dotter, Keimbläschen und Keimfleck). Die Embryonalentwicklung geschieht unter beständiger Grössenzunahme des Eies, nach vorhergegangener Dotterklüftung. Die Eihaut ist Anfangs einfach, während der Entwicklung werden aber auf der Oberfläche des Dotters noch zwei oder drei andere, festere Häute abgeschieden. Die Organisation der weiblichen Ausführungsgänge ist ziemlich zusammengesetzt, und finden sich namentlich an den Enden des muskulösen Geschlechtsganges, wo dieser in den glockenförmigen Schluckapparat übergeht und nach aussen ausmündet, eine Anzahl kugliger, zum Theil einfach zelliger Anhangsgebilde von unbekannter Bedeutung. Haut (unterhalb der Chitindecken) und Lemniskcn bestehen in wesentlich übereinstimmender Weise aus einer blasig zelligen Masse, in die hie und da eigenthümliche zellenartige Körper eingelagert sind. Von den im Grunde der Rüsselscheide gelegenen Ganglion entspringen jederseits ein Paar Fäden, die in der anliegenden Muskelschicht hinlaufen.

Stein liefert (in Carus, Icon. zoot. Tab. VII. Fig. 2—10) eine Reihe von Originalabbildungen über den Bau der Echinorhynchen, auch über den weiblichen Geschlechtsapparat, doch bleiben dieselben an Schönheit und Detailzeichnung weit hinter den eben erwähnten Abbildungen Wagener's zurück.

2. Platódes.

Hirudinei.

Leconte et Faivre publiciren Etudes sur la constitution chimique des elements et des tissus nerveux chez le sangsue médicale, Arch. génér. de Médecine 1857. p. 666 sq., Cpt. rend. 1857.

Nach Stölter geniesst der medicinische Blutegel ausschliesslich Blut und niemals Infusorien oder dergl. Im freien Zustande ernährt er sich vorzugsweise von nackten Amphibien, deren Blut ihn aber nur langsam wachsen macht, während das Blut der Warmblüter weit nahrhafter ist und so lange vorhält, dassman noch zwei Jahre nach dem Saugen die unverdauten Reste desselben im Magen vorfindet. Schweizerische Zeitschrift für Pharmacie 1857. S. 152.

Trematodes.

Pagenstecher publicirt eine Abhandlung über „Trematodenlarven und Trematoden; ein helminthologischer Beitrag“ 56 Seiten mit 6 Tafeln in Farbendruck, Heidelberg 1857.

Der Geschichte unserer Kenntnisse von den Trematodenlarven (S. 1—12) folgt eine Beschreibung von *Cercaria ornata*, *C. armata*, *C. subulo* n. sp. aus *Paludina vivipara*, *C. pugnax* (= *C. microcotylea* de Fil.), *C. vesiculosa*, *C. magna*, *C. fallax*, *C. ephemera*, *C. diplocotylea*, *Bucephalus polymorphus*, *Distoma duplicatum*, *D. echiniferum* *Paludinae*, *D. echinatoides Anodontae* n. sp., *Tetracotyle Lymnaei*, *Distoma luteum*, *D. flavescens* n. sp. aus *Bulimus radiatus*, *Aspidogaster conchicola*, sämmtlich aus Mollusken und mit Ausnahme von *Aspidogaster* unreif, so wie ferner eine Beschreibung von *Tylodelphis rhachidis*, *Distoma crystallinum*, *D. clavigerum*, *D. endolobum* n. sp., *D. variegatum*, *D. cylindraceum*, *D. cygnoides*, *Polystoma integerrimum*, *Amphistoma subclavatum*, sämmtlich aus Fröschen und mit Ausnahme der zwei ersten in Geschlechtsreife. Zahlreiche zum Theil sehr schöne Abbildungen erläutern die Angaben des Verf., die uns mit mancherlei neuen Beobachtungen über Anatomie und Entwicklung bekannt machen, auch die Unterscheidung einzelner Arten, z. B. der bestachelten Cercarien durch Berücksichtigung der Stachelform, auf eine sichere Grundlage zurückführen. Uns können natürlich hier zunächst nur die allgemeinen Resultate der vorliegenden Arbeit interessiren und aus diesen heben wir Folgendes hervor. Während man gewöhnlich annimmt, dass die einzelnen Arten entweder nur durch Sporocysten oder durch Redien sich fortpflanzen, glaubt Verf. bei manchen Arten

(z.B. *C. ornata*, *armata*) beiderlei Ammenformen neben einander gefunden, hie und da auch Sporocysten mit Spuren einer höheren Organisation beobachtet zu haben. Ebenso sind nach unserm Verf. die Grenzen zwischen den Cercarien und Redien nicht so gar schroff; Verf. beschreibt nicht bloss Redien mit gespaltenem Darne (*C. ornata*, *C. ephemera*), sondern lässt auch Cercarien, deren Entwicklung eine bestimmte Stufe noch nicht überschritten hat (*C. pugnax*), unter gewissen Verhältnissen durch Production von Keimen sich in Redien verwandeln. Bei *Bucephalus* beobachtete derselbe die Neubildung von Keimen in den sich allmählich abtrennenden Schwänzen, mit andern Worten also eine Umwandlung der Schwänze in Keimschläuche. Dasselbe sucht unser Verf. auch für *D. duplicatum* und andere Cercarien glaublich zu machen. Die Flimmergefäße der Amme und die von de la Valette entdeckten seitlichen Oeffnungen zum Durchtritt der in den Redien sich entwickelnden Cercarien sind nicht beobachtet; der Durchtritt der letztern soll am Hinterleibsende erfolgen. Von besonderem Werthe sind die von unserm Verf. angestellten zahlreichen Fütterungsversuche, nach deren Resultaten die bewaffneten Cercarien als Larven bestachelter Amphibiendistomen erscheinen. So gelang es namentlich mit ziemlicher Bestimmtheit die *C. ornata* als Larve von *Distomum clavigerum*, die *C. armata* als solche zu *D. endolobum* n. sp. nachzuweisen, wie denn auch die Versuche mit *C. diplocotylea* für die de Filippi'sche Ansicht der Identität mit *Amphistomum clavatum* sprachen. Auch *Dist. duplicatum* lebt nach abgeworfenem Schwanz eine Zeitlang im Froschdarme, doch dürfte die Vermuthung, dass sich dasselbe zu *D. cygnoides* entwickle, durch Wagener's Beobachtungen (s. u.) ihre Widerlegung finden. Interessant ist die weitere Bemerkung, dass sich bei den jungen Trematoden nach ihrer Uebersiedelung an den rechten Ort zunächst die männlichen Organe mit ihren Producten entwickeln, dass also auch hier (wie es Ref. in ganz übereinstimmender Weise für gewisse Cestoden nachgewiesen hat) die männliche Reife vorausgeht. Die Production von Eiern beginnt erst später, nimmt dann aber allmählich in solchem Uebermaasse zu, dass Form und Organisation des Thieres darüber schliesslich zu Grunde geht.

Ein weiterer Aufsatz desselben Verf. „über Erziehung von *Distomum echinatum* durch Fütterung“ (Archiv für Naturgesch. 1857. I. S. 246), und zwar durch Fütterung mit dem eingekapselten *Dist. echiniferum* Paludinae bildet gewissermassen eine Ergänzung der voranstehenden Abhandlung.

Zwei junge zahme Enten wurden mit etwa 8—10,000 Stück Distomenkapseln gefüttert und enthielten 15 resp. 18 Tage nach Fütterung die eine etwa 50, die andere etwa 200 geschlechtsreife Distomen von 4—5 Mm., die vorzugsweise an der Insertionsstelle der

Blinddärme ansassen. (Ref., der durch die Freundlichkeit P.'s mit den hier fehlenden Paludinen versorgt wurde, hat den Versuch gleichfalls mit zwei zahmen Enten wiederholt. Das eine Versuchsthier, das 14 Tage nach der Fütterung untersucht wurde, zeigte vielleicht 25 Exemplare von 3—4 Mm., die nur zum Theil mit reifen Eiern versehen waren; das andere, dessen Untersuchung erst nach einem Monate vorgenommen wurde, enthielt deren nur zwei von mehr als 1 Cm. Länge. Dabei darf wohl bemerkt werden, dass *D. echinatum* hierin bisher von Ref. nur selten, und bei zahmen Enten noch niemals gefunden ist.) Gleichzeitig macht Verfasser darauf aufmerksam, dass bei den behufs der Encystirung von den Cercarien vorgenommenen Wanderungen eine grössere Freiheit herrsche, als auf anderen Entwicklungsstufen der Trematoden. Er erwähnt zum Belege dieser Annahme, dass er z. B. Cysten von *Cercaria ornata* in *Hydrachna concharum*, sowie *Tetracotylecysten* nicht nur in verschiedenen Mollusken, sondern auch in den Halsmuskeln der wilden Ente und den Darmhäuten verschiedener Fische gefunden habe.

Die Mittheilungen, die uns Wagener (Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Eingeweidewürmer S. 19—76 Tab. IX—XXVI, sowie helminthologische Bemerkungen a. a. O. S. 83—90 Tab. V) über Trematoden macht, zerfallen in zwei Rubriken, über Distomeen, besonders Entwicklung von *D. cygnoides* Ranae, und über *Gyrodactylus*. Wir berücksichtigen hier zunächst die auf ersteren Punkt sich beziehenden Untersuchungen, deren Hauptresultate schon bei einer früheren Gelegenheit (J. B. XXII. S. 366) von uns hervorgehoben wurden.

Die bis jetzt aufgefundenen Distomeenembryonen (10 Spec., von denen 4 zum ersten Male vom Verf. beschrieben sind) zerfallen in zwei Klassen, in bewimperte und unbewimperte Formen. Die ersteren sind sehr einfach gebaut und nur am Kopfende mit gewissen Auszeichnungen, mitunter mit Stacheln versehen; sie verwandeln sich durch einfache Vergrösserung (*D. duplicatum*, wahrscheinlich = *D. tereticolle*), selten auch durch gleichzeitige Verästelung (*Bucephalus*, wahrscheinlich = *Gasterostomum fimbriatum*) in eine Amme. Die bewimperten Embryonen enthalten Flimmercanäle im Innern, öfters auch eine Mundöffnung mit blind geendigtem Magensacke (*Amphistomum subclavatum*, *Monostomum capitellum*) und mitunter selbst schon die für das Ausschlüpfen der später gebildeten Keime bestimmte Oeffnung. Noch complicirter ist der Bau bei den wimpernden Embryonen von *Monostomum mutabile* und *M. flavum*, die nicht bloss einen mit brechenden Medien versehenen Augenfleck tragen, sondern namentlich auch statt des Magensackes einen mit selbstständigem Darmapparat und

Flimmergefässen versehenen Thierkörper in sich einschliessen, der nach dem Abstreifen der umgebenden Embryonalhülle als Amme zu fungiren hat. Steenstrup betrachtet diese Amme bekanntlich als Abkömmling des flimmernden Embryo, doch ist dabei zu bemerken, dass Amme und Embryo zu gleicher Zeit sich bilden und stets im gleichen Stadium der Entwicklung stehen. Bei den übrigen Flimmerembryonen geht während der Umwandlung in die Amme nur das Wimperepithelium verloren, so dass der Embryonalkörper selbst als Amme zu betrachten ist (*D. cygnoides*). Die Bildung des Embryonalkörpers geht von dem Keimbläschen aus, indem dieses, ohne directe Theilnahme des körnigen Dotters, durch fortgesetzte Theilung die Embryonalzellen liefert. Ebenso entstehen auch die Zeugungsproducte der Ammen durch fortgesetzte Theilung der einzelnen hie und da in den körnigen Belag der innern Körperfläche eingesprengten Keimzellen.

Die Entwicklungsgeschichte von *D. cygnoides* konnte von unserm Verf. Schritt für Schritt bis zur Auswanderung der Cercarien (*C. macrocerca* de Fil.) verfolgt werden, nachdem der Verf., geleitet durch die Aehnlichkeit der in *Cyclas* und *Pisidium* aufgefundenen Cercarien mit dem betreffenden Distomum, eine Anzahl dieser Bivalven mit reifen Eiern und ausgeschlüpften Embryonen von *D. cygnoides* in demselben Gefässe zusammengebracht hatte. Die bewimperten (magenlosen) Embryonen setzten sich mit ihrem beweglichen Kopfe an den Kiemen der Muscheln fest, verloren ihre Wimpern und wurden zu Ammen, die Gefässe mit Wimpern enthielten, sonst aber einfach schlauchartig waren. In diesen Ammen entstanden neue Ammen, die den Mutterthieren ähnlich waren, aber — wie die aus unbewimperten Embryonen hervorgehenden Ammen — der Gefässe zu entbehren schienen und statt der Ammen Cercarien producirten. Eine Einkapselung wurde bei diesen Cercarien niemals beobachtet; Verf. vermuthet, dass dieselben direct in den After des Frosches einwandern und in die Harnblase gelangen, obwohl die hier aufgefundenen Distomen, selbst die kleinsten, die kaum grösser waren, als die Cercarienkörper, beständig schwanzlos erschienen.

In Betreff des Cercarienbaues wollen wir noch soviel hervorheben, dass in der Art, wie das Gefässsystem derselben nach aussen ausmündet — bei den Ammen mit Wimpergefässen konnte bisjetzt noch keine Ausmündung nachgewiesen werden — mancherlei Differenzen stattfinden. Bei vielen Cercarien mündet dasselbe nach vorhergegangener Spaltung zu beiden Seiten des Schwanzes, entweder an der Spitze oder nicht weit von der Schwanzwurzel aus. Bei andern scheint der dem spätern Porus excretorius aufsitzende und von besondern Zellen ausgekleidete Centralkanal des Schwanzes die Stelle einer Ausmündung nach Aussen zu vertreten.

Unter den sehr zahlreichen, mit bekannter Meisterschaft ausgeführten Abbildungen erwähnen wir — ausser den zu *Dist. cygnoides* gehörenden — noch besonders die Zeichnungen von *Aspidogaster conchicola* Embryo, von *Amphistomum subclavatum* (Tab. XVI) mit *Cercaria* (*Diplodiscus* de Fil. Tab. XVIII), Amme (Tab. XIX) und Embryo (Tab. XVII), von *Distomum Conus* Crepl., *D. xanthosomum* Cr.? (Tab. XXII), *Gasterostomum fimbriatum* v. Sieb. (Tab. XXIV), *Cercaria echinifera* (Tab. XVIII), eine sehr auffallende *furcocerce* *Cercaria* aus *Planorbis marginatus* (Tab. XXX), *C. Leucochloridii* (wohl zu *Dist. holostomum* gehörig, Tab. XXXIII), *Dist. duplicatum* (Tab. XXXIV), Amme mit *Dist. Lymnaei auricularis* de Fil. (Tab. XXXVI). Dazu in den helminthologischen Bemerkungen (a. a. O. Tab. V) noch die Embryonen und Ammen von *Monostomum flavum*, sowie ein sehr merkwürdiges hammerförmiges Ei mit wimperndem Embryo von unbekannter Herkunft (aus *Anas boschas*).

Von de Filippi erhielten wir eine dritte Abhandlung über die Entwickelung der Trematoden (*troisième mémoire pour servir à l'histoire génétique des Trematodes*, 34 S. in Quart, 3 Kupfertafeln, aus dem XVIII. Bande der *Mém. de l'Acad. des scienc. de Turin* 1857), in der die schon früher im letzten J. B. XXIII S. 195 nach einer vorläufigen Mittheilung unseres Verf. angezogenen, neuerdings auch in die *Ann. and Mag. nat. hist.* XX. p. 129 übergegangenen Beobachtungen mit andern neueren zusammengestellt worden sind.

Die Arbeit handelt über *Cercaria triloba* n. sp. aus *Lymnaeus stagnalis*, *C. agilis* n. sp. ebendaher, *C. lophocerca* n. sp. (Larve eines *Monostomum*) aus *Paludina impura*, *C. micrura* n. sp. ebendaher, *C. virgula* ebendaher, *C. cristata* aus verschiedenen Schneckenarten, *C. tuberculata* n. sp. aus *Paludina impura*, *Distoma* (*Cercaria*) *Paludinae impurae inerme et armatum* n. sp., *D.* (*Cerc.*) *planorbis carinatus*, *Cercaria* (?) *Coni mediteranei* n. sp., *C. vesiculosa* aus *Paludina vivipara* und *achatina*, sowie schliesslich über *Tetracotyle*. Die schwanzlose *C. armata* *Paludinae* wird in einer *Redia* aufgenannt — die erste dem Verf. bekannte Ausnahme von dem Gesetze, dass die bewaffneten Cercarien in Sporocysten ihren Ursprung nehmen. Für die Beschreibung der einzelnen Formen von Cercarien und Ammen (Sporocysten, Redien und Sporocystophoren) verweisen wir auf das Original, das, wie die vorhergehenden zwei Abhandlungen, des Interessanten viel enthält. Wir heben hier nur hervor, dass Verf. bei den Sporocysten von *C. virgula*, wie früher bei denen von *C. microcotyla*, in einzelnen Fällen eine Quertheilung beobachtete. Die schwanzlosen Cercarien der *Pal. impura* scheinen nicht zu schwärmen; Verf. sah wenigstens (p. 10), dass dieselben unmittelbar im Körper ihres

Wirthes sich einkapselten und im encystirten Zustande vielfach ausgeworfen wurden. Fütterungsversuche, die Verf. mit solchen Cysten vornahm, schienen dafür zu sprechen, dass die betreffenden Parasiten in Fischen zur Reife kommen, die bewaffnete Form in der Forelle, die unbewaffnete in der Schleie. Die letztere dürfte wahrscheinlich mit *D. perlatum* identisch sein. Die Redien, in denen diese Cercarien sich entwickeln, beginnen die Keimbildung bereits vor ihrer vollkommenen Ausbildung, zu einer Zeit, in der dieselben noch nicht einmal mit völlig entwickeltem Tractus versehen sind.

In Betreff der Tetracotyle (p. 15) verharret Verf. bei seiner früheren Ansicht, nach der dieser merkwürdige Schmarotzer ein directer Abkömmling verschiedener Sporocysten sei. Er glaubt diese Ansicht jetzt sogar beweisen zu können und schildert die allmähliche Entwicklung derselben aus einer Spore der Sporocystis *Cerc. vesiculosae*. Die Cyste, in welche die Tetracotyle nach ihrer Entwicklung sich einschliesst, zeigt an den Saugnäpfen und der Excretionsöffnung Löcher. (Nach G. Wagener und Pagenstecher ist diese Cyste, wie bei *Dist. Leucochloridii*, die abgestossene Körperhaut selbst.)

Ganz anders urtheilt Pagenstecher (a. a. O. S. 32) und Claparède (Zeitschrift für wiss. Zool. IX. S. 103), die beide, wie Moulinié, die Tetracotyle für einen zufälligen Insassen der Cercarienammern halten. Letzterer möchte die entsprechenden reifen Zustände, wie auch die der Diplostomen, unter den Holostomeen suchen und macht darauf aufmerksam, dass die in verschiedenen Wohnthieren lebenden Tetracotylen wahrscheinlicher Weise auch verschiedenen Arten angehören.

G. Wagener nennt die Tetracotyle geradezu *Holostomum* und glaubt die in Schnecken vorkommende Form auf *H. macrocephalum* beziehen zu dürfen (helminthol. Beiträge a. a. O. S. 90 mit Berichtigung S. 306).

Auch Lespés liefert einen Beitrag zur Kenntniss der Cercarien und deren Entwicklungsgeschichte (*Annales des sc. natur.* 1857. T. VII. p. 113–118). Seine Beobachtungen sind um so interessanter, als sie an Seemollusken angestellt sind, die bisher noch so wenig auf Helminthen untersucht wurden, im Ganzen aber auch sehr viel ärmer daran zu sein scheinen, als unsere Süsswasserschnecken.

Die untersuchten Arten sind vom Verf. unter folgenden provisorischen Namen beschrieben und abgebildet: *Cercaria sagittata* aus *Nassa reticulata*, *C. lata* aus *Venus decussata*, *C. proxima* aus *Littorina littorea*, *Cerc. brachyura* aus *Trochus cinereus*, *C. linearis* aus *Littorina littorea*. Die erste und dritte Form entwickeln sich in einer Redia, die übrigen in Sporocysten, doch entbehrt die zweite trotz-

dem der Stacheln und der Speicheldrüsen. Die drei ersten Formen tragen an ihrem Schwanze einen Seitenkamm, die zweite auch noch jederseits eine Reihe gekrümmter Häkchen, während die zwei letzten Arten einen kurzen und unbeweglichen, stummelförmigen Schwanz besitzen, wie die von Muliné bei *Limax* entdeckte Form (J. B. XXIII. S. 194) und *C. micrura* de Fil. Das Excretionsorgan durchbohrt bei *C. lata* den Schwanz, um auf der Spitze desselben auszumünden. Auch in *Buccinum* wurde eine Redia mit grossen Cercarien aufgefunden, deren Schwanz tief gespalten war.

Die „anatomischen Beobachtungen über Trematoden von Wedl“ (Sitzungsber. der Wiener Akad. 1857. Bd. XXVI. S. 241—278 mit 4 Taf.) enthalten Bemerkungen über den innern und äussern Bau von *Distoma ovatum* Rud., *D. auriculatum* n. sp. aus *Acipenser Ruthenus*, *D. campanula* Duj. (nach Beschreibung und Abbildung wohl = *Gastrostomum fimbriatum*), *D. crassiusculum* Rud., *D. echinatum* Zed. aus *Haliaeus Carbo*, *D. bilobum* Rud., *D. sp.?* (geschlechtlich unreif, in Cysten am Oesophagus von *Ardea purpurea*), *Monostoma verrucosum* Zed., *M. lanceolatum* n. sp. aus der Bauchhöhle von *Himantopus rubropterus*, *Holostoma variabile* Nitzsch, *H. cornu* Nitzsch, *H. trilobum* Dies., *Hemistoma spathula* Dies., so wie ferner Untersuchungen über *Gyrodactylus*, welche letztere später noch unser besonderes Interesse in Anspruch nehmen werden. Von Wichtigkeit für die Kenntniss der Helminthen sind aus dem ersten Theile dieser Beobachtungen namentlich die Angaben über *D. bilobum*, *Monostomum verrucosum* und *Hemistomum* (*H. spatula* besonders in Vergleich mit *Tetracotyle*).

Stein liefert in der *Icon. zoot.* von Carus Tab. VII. Fig. 23 eine Zeichnung von *Distoma polymorphum* mit einer Darstellung der Genitalien, des Darmes und des Porus excretorius. Die sog. hintere Samenblase empfängt ihren Inhalt von der Vagina und steht keineswegs mit dem Hoden in Zusammenhang. (Da dieses *Receptaculum* bei dem ausgewachsenen Thiere wegen der bedeutenden Länge des überdiess mit zahllosen Eiern angefüllten Uterus kaum zugänglich sein dürfte, so liegt die Vermuthung nahe, dass die Füllung desselben — wie das Ref. auch für die Cestoden und Pentastomen direct beobachtet hat — vor dem Eintritte der weiblichen Geschlechtsreife geschehe.)

Nach den Untersuchungen von Claparède sind die bei manchen Trematoden (*Diplostomum*, *Tetracotyle* *Percæ* et *Acerinae*) zerstreut im Leibe vorkommenden Kalkkörper nicht, wie man früher annahm, frei im Körperparenchym gelegen, sondern in die kolbenförmig erweiterten Endigungen des verästelten Excretionsorganes eingelagert, demnach also denjenigen Kalkkörperchen vollkommen vergleichbar, die bei vielen Cercarien und gewissen Distomeen in den Hauptstämmen des Excretionsapparates gefunden werden. Die chemische Zusammensetzung dieser Kalkkörper ist übrigens noch ziemlich dunkel und scheint bei den einzelnen Arten auch manche Verschiedenheit zu bieten, wie schon das Verhalten gegen Säuren, bei deren Zusatz sie bald brausen, bald auch nicht — ganz wie die Kalkkörperchen der Cestoden — zur Genüge beweist. Zeitschr. für wissensch. Zool. IX. S. 98. Tab. VIII.

Ref. hat schon im letzten Jahresberichte (S. 198) als Resultat seiner eigenen, in extenso freilich nicht veröffentlichten Untersuchungen hervorgehoben, dass das Gen. *Gyrodactylus* keineswegs, wie v. Siebold behauptete, aus geschlechtslosen Thieren bestehe, „deren geschlechtlich entwickelte Formen unter den Polystomeen, Octobothrien oder ähnlichen Trematoden zu suchen seien“, sondern ein selbstständiges Genus repräsentire, das ausser *Gyr. elegans* auch eine ganze Anzahl ausgebildeter Geschlechtsthiere mit zwitterhaften Genitalien enthalte. Zu ganz denselben Resultaten sind, unabhängig von einander, wie von Ref., auch noch zwei andere Helminthologen gelangt, G. Wagener und Wedl, aus deren Untersuchungen wir Nachstehendes hervorheben.

G. Wagener, dem wir die umfassendsten und detaillirtesten Angaben über diese Thiere verdanken (Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Eingeweidewürmer S. 49—96. Tab. XI—XVI, auch helminthologische Bemerkungen a. a. O. S. 83, 84) kennt ausser *Gyrod. elegans*, für den er die bekannten v. Siebold'schen Angaben vollkommen bestätigen konnte, noch 14 andere Species, die alle geschlechtsreif sind und sich ausserdem noch dadurch von *Gyr. elegans* unterscheiden, dass die grossen Haken ihrer Schwanzscheibe nicht nach dem Bauche, sondern nach dem Rücken zu sehen.

Verf. glaubt desshalb auch berechtigt zu sein, diese letztern generisch von *Gyr. elegans* zu trennen und bedient sich zu ihrer Bezeichnung, wie Diesing, des Genusnamens *Dactylogyrus*.

Die Species unseres Verf. sind theils von Süsswasserfischen, theils aber auch von Seefischen abgelesen und unterscheiden sich vorzugsweise durch die Bewaffnung der Schwanzscheibe, so wie weiter durch die Bildung der mit den Geschlechtsorganen in Zusammenhang stehenden Bauchhaken (Legscheidev. Sieb. = Penis). Ihre Namen sind folgende: *D. monenteron* n. sp. vom Hecht, *D. uncinatus* von *Perca fluviatilis*, *D. crucifer* n. sp. von *Cyprinus erythrophthalmus*, *D. minor* n. sp. von *Cypr. alburnus*, *D. megastoma* n. sp. von *Cypr. amarus*, *D. difformis* n. sp. von *Cypr. erythrophthalmus*, *D. anchoratus* Duj. (= *D. auriculatus* Nordm.?), *D. major* n. sp. von *Gobio fluviatilis*, *D. trigonostoma* n. sp. von *Cypr. rutilus*, *D. amphibothrium* von *Acerina cernua*, *D. pedatus* n. sp. von *Julis*?, *D. echeneis* n. sp. von *Chrysophrys aurata*, *D. aequans* n. sp. von *Labrax lupus*. Die sieben ersten Species hat Verf. durch Abbildung der unterscheidenden Hautgebilde zur Genüge charakterisirt, die übrigen Arten jedoch nur namentlich angeführt, obwohl einzelne gelegentliche Angaben (besonders in den „helminthologischen Bemerkungen“) die eine oder andere derselben kenntlich machen, die Haken der Schwanzscheibe bestehen aus zweierlei durch Grösse und Form, besonders auch Entwicklung der Wurzelfortsätze verschiedenen Gebilden. Die kleinen sind zum grössten Theile (meist zu 10) an der Peripherie der Schwanzscheibe eingepflanzt, zum kleinern aber auch auf der Fläche der Scheibe befestigt. Zwischen ihnen findet sich oftmals noch, im Centrum der Scheibe, ein sehr verschieden entwickelter stäbchenförmiger Hornapparat (Gerüst der Centralscheibe, das Verf. freilich nur bei drei Species auffand, das nach den Beobachtungen des Ref. jedoch viel häufiger vorkommt, wenngleich bisweilen nur in minimaler Entwicklung). Von grossen Haken findet sich in der Regel nur ein einziges Paar, zwischen deren zweischenkligen Wurzelfortsätzen ein balkenförmiges Querstück (Klammer Verf., Schloss Wedl) sich ausspannt. Mitunter sind die grossen Haken aber auch in zwei Paaren vorhanden, die in verschiedener Weise beim Festhalten zusammenwirken. So namentlich bei *D. monenteron* und *D. uncinatus* (denen Ref. noch eine von ihm beobachtete neue Species *D. forceps* von *Cypr. nasus* und *C. dobula* anreicht, bei dem freilich der eine dieser grösseren Haken nur eine einfache Wurzel hat). Bei den oceanischen Formen scheint die Bildung dieser Klammerapparate noch mannichfaltiger zu sein. *D. echeneis* hat auf der Innenfläche der Schwanzscheibe eine rosettenartig in Falten gelegte, feste Haut, während *D. aequans* und *D. pedatus* statt einer Schwanzscheibe deren sogar zwei besitzen, die

durch einen besondern, den zwei grossen Hakenpaaren anhängenden, dreigliedrigen Apparat getrennt und auf der Innenfläche mit concentrisch angeordneten Stäbchen bekleidet sind.

Das Körperparenchym unserer Thiere besteht aus einer weichen, sarkodeartigen Masse, in der man nur hier und da, besonders gegen die Schwanzscheibe zu, einzelne muskulöse Faserzüge unterscheidet. In den sehr beweglichen Kopfspitzen finden sich eigenthümliche braun-gefärbte Canäle, die Verf. als Drüsen ansehen möchte, deren Sekret möglicher Weise zum Festhalten und Fadenspinnen diene. (Ref. sah bei einer vielleicht mit *Gyr. tenuis* Wedl übereinstimmenden Art aus der Spitze der stark, zu fingerförmigen Fortsätzen ausgestreckten und tastenden Kopfzipfel den Inhalt der betreffenden Schläuche in Tropfenform hervortreten.) Der Darmapparat besteht aus einem fast kugligen, protractilen Schlundkopfe und einem meist zweischenklichen nur bei *D. monenteron* einfachen Magen ohne After. (Ref. glaubt einige Male bei der oben erwähnten *G. tenuis* u. a. eine schlingenförmige Vereinigung der beiden Darmschenkel beobachtet zu haben.) Die hier und da flimmernden Gefässe entspringen aus vier durch Queranastomosen verbundenen Längsstämmen, die sich zu einem kurzen Stamme vereinigen und dicht über der Schwanzscheibe auf dem Rücken ausmünden. In den vier Augenflecken wurde bei *D. monenteron* ein linsenartiger heller Körper gefunden. (Ref. hat bei *D. forceps* gleichfalls eine solche Linse aufgefunden, in anderen Arten aber vergebens darnach gesucht.) Als Nervensystem möchte Verf. ein schmales Querband in Anspruch nehmen, das er dem Anfangstheile des Darmes aufliegen sah (während Ref. glaubt, dasselbe in Form einer zweilappigen Ganglienmasse unterhalb der Augenflecke aufgefunden zu haben). Die weiblichen Geschlechtsorgane zerfallen in Dotterstock, Keimstock und Eiergang. Die ersten sind von sehr ansehnlicher Entwicklung und umhüllen im ausgewachsenen Thiere fast sämtliche übrigen Organe. Sie bestehen aus zweien unregelmässig ausgebuchteten Schläuchen, die sich jederseits am Rücken und Bauche wiederholen, später aber so zusammenfliessen, dass überhaupt nur ein rechter und ein linker Schlauch zu unterscheiden ist. Die Ausführungsgänge verlaufen quer und treffen am vordern Ende des einfachen sackförmigen Keimstockes, etwas vor der Körpermitte, auf einander. An dieser Stelle entspringt der Eiergang, der sich nach vorn verfolgen lässt und auf der Bauchseite, nicht weit vom Munde, nach Aussen öffnet. Es bildet sich immer nur, und zwar im untern Ende des Eierganges, ein Ei, das bei den oceanischen Formen mit einem längern Stiele versehen ist. Der Hoden liegt dicht hinter dem Keim- oder Eierstocke und ist einfach, wie dieser. Ein Ausführungsgang desselben verläuft an der Rückenfläche bis zu den Bauchhaken und steht mit einer ovalen *Vesicula seminalis* in Verbindung. Ein zweiter Aus-

führungsgang mündet, gleichfalls mittelst einer, freilich nicht immer deutlichen *Ves. seminalis* neben den Dotter- und Keimgängen in den Anfang des Fruchthälters. Neben der *Ves. seminalis externa* liegen an der Basis der Bauchhaken noch zwei sackförmige Anhangsorgane, die mit brauner zäher Masse gefüllt sind und ganz in derselben Weise auch bei andern verwandten Arten (*Tristomum*, *Polystomum*) vorkommen. Bei *D. monenteron* scheinen dieselben zu fehlen. Der Bauchhakenapparat ist schwer zu verstehen, doch scheint seine Grundform die eines Doppelhakens zu sein. (Nach den Untersuchungen des Ref. besteht dieser Apparat durchgehends aus einer hohlsondenartigen, theilweise geschlossenen Scheide und einem dünnen Cirrus, dessen unteres Ende in ein plattes Basalstück ausläuft und den Ausführungsgang der vordern *Ves. seminalis* aufnimmt. Zwischen dem Basalstücke des Cirrus und der sehr verschieden gestalteten, meist mit Fortsätzen versehenen Scheide sind Muskeln ausgespannt, durch deren Thätigkeit der Cirrus in der Scheide auf- und absteigt. Bei manchen Arten konnte auch das Hervortreten des Cirrus aus dem Körper deutlich gesehen werden. Ref. trägt kein Bedenken, den Cirrus als Penis zu beanspruchen und glaubt, dass zur Aufnahme dieses Cirrus eine kleine Oeffnung diene, die oberhalb des Keimstockes zur Linken der Medianlinie vorkommt und von einem kleinen, aber verschieden gestalteten hornigen Mundstücke umgeben ist. Die Oeffnung führt in einen ziemlich weiten Hohlraum, der mit dem unteren Theile des Fruchthälters zusammenzuhängen scheint und bei *D. fallax* wahrscheinlich auch, mit Samenfäden gefüllt, vom Verf. gesehen wurde.) Die Entwicklung der an Fischkiemen abgelegten Eier geht ohne Dotterfurchung vor sich und liefert einen Embryo, der im Wesentlichen den Mutterthieren gleicht, d. h. wie diese flimmerlos ist und bereits die mit Hakenanfängen besetzte Saugscheibe, so wie die Anlagen der Bauchhaken erkennen lässt. Von innern Organen ist besonders der Schlundkopf und eine Reihe von Excretkörnern in seitlichen Schläuchen deutlich. Welche Beziehungen der *Gyr. elegans* zu *Dactylogyrus* habe, muss einstweilen noch unentschieden bleiben, ebenso die Frage, ob unter ersterem Namen sich vielleicht mehrere verschiedene Formen verstecken.

Die Angaben von Wedl (*Anatomische Untersuchungen über Trematoden* a. a. O. S. 258—278) sind im Wesentlichen mit den Untersuchungen Wagener's übereinstimmend und auch da, wo sie, wie mitunter in Einzelheiten, abweichen, mit ihnen leicht zu vereinigen.

Ausser dem von unserem Verf. wieder aufgefundenen, wahrscheinlich echten *Gyrodactylus auricularis* Nordm. — bei dem unser Verf. auch die oben erwähnte Lage der grossen Scheibenhaken auf der Rückenfläche sah und zeichnete — wurden noch sechs andere

neue Arten beobachtet, die aber zum Theil mit Wagener'schen Arten zusammenfallen: *G. cochlea* n. sp. vom Hechte (= *D. monenteron* G. Wag.), *G. crassiusculus* n. sp. von *Lucioperca Sandra* (= *D. uncinatus* G. W.), *G. tenuis* n. sp. von *Perca fluviatilis*, *G. cruciatus* n. sp. von *Cobitis*, *G. falcatus* n. sp. von *Cyprinus* sp. ? (= *D. megastoma* G. W.) und *G. mollis* n. sp. von *Cyprinus Carpio* (= *D. crucifer* G. W.). Bei *G. crassiusculus* wurden die kleinen Häkchen übersehen, ebenso auch wahrscheinlicher Weise bei dem gleichfalls mit zwei grossen Hakenpaaren versehenen *G. cruciatus*. Der Magensack wird nach Analogie von *G. monenteron* überall für einfach gehalten, doch bemerkt Verf. ausdrücklich, dass er sich davon nirgends mit gleicher Bestimmtheit überzeugt habe. Der Zusammenhang der vorderen Samenblase mit dem Penis wurde auch vom Verf. beobachtet, indessen scheint es, dass derselbe die Penisscheide allein als Penis betrachtet, während er den wahren Penis als eine Art Fang- oder Adhäsionsorgan für die Vagina deuten möchte. Ein Hoden wurde nicht mit Bestimmtheit nachgewiesen, obwohl Samenfäden deutlich erkannt werden konnten.

Heller beschreibt ein interessantes Exemplar von *Diplozoon paradoxum*, bei dem die Verwachsung der beiden Diporpen sich über die ganze vordere Körperhälfte ausgedehnt hatte. Gleichzeitig macht derselbe einige Angaben über den Gefässverlauf der Diplozoen. Sitzungsber. der k. Akad. in Wien XXV. S. 109. Mit Abbild.

Ueber das merkwürdige, seiner systematischen Stellung nach immer noch ziemlich problematische Schmarotzergenus *Myzostomum* Lt. haben wir im Laufe des vergangenen Jahres gleichfalls zwei Mittheilungen erhalten, von Semper (zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Gattung *Myzostoma*, Zeitschrift für wissensch. Zool. IX. S. 48—64 mit 2 Tafeln) und von O. Schmidt (über die Schmarotzergattung *Myzostoma* in den Sitzungsber. der Wiener Akad. XXIII. S. 15—17). Beide untersuchten ausser dem besonders durch Thomson bekannt gewordenen *M. cirriferum* Lt. noch eine zweite Art, Schmidt das *M. glabrum* Lt., Semper das an seinen 20 Randpapillen und seinen zahlreichen gelb pigmentirten Rückentuberkeln leicht zu unterscheidende *M. tuberculosum* n. sp. (wohl identisch mit Max Schultze's *M. glabrum*), das fast ausschliesslich auf der gesprenkelten Varietät von *Comatula mediterranea* lebt. Besonders wichtig sind die Angaben Semper's, der eine fast vollständige

Anatomie liefert, während die Mittheilungen von Schmidt sich mehr auf einzelne Notizen beschränken. Im Wesentlichen enthält Semper's Darstellung übrigens nur eine Bestätigung der Untersuchungen, die schon im Jahre 1853 von M. Schultze publicirt sind (J. B. XXII. S. 356), unserem Verf. jedoch bei Abfassung seiner Arbeit unbekannt waren.

Die Wimpern der Epidermis stehen, wie schon Schultze fand, in unregelmässigen Büscheln. Das Nervensystem, das Schultze vermisste, ist ganz in der von Lovén beschriebenen Weise vorhanden. Es liegt auf der Bauchseite des Thiers zwischen Magen und centralem Muskelsystem, das Sch. irrthümlich an den Rücken verlegte. Die peripherischen Muskeln treten an die Haken, deren Bildung und Bewegung Verf. genau erörtert. Der Darmapparat ist von Lovén sehr richtig beschrieben, mit verästelten Anhangsschläuchen, die trotz der Abwesenheit einer Muskelhaut eine selbstständige Contractilität besitzen, so wie mit Mastdarm und After, welcher letzterer aber auch zugleich weibliche Geschlechtsöffnung ist (wodurch sich die Angaben von Schultze und Schmidt, von denen der eine wohl den After, aber keine Vulva, der andere jedoch umgekehrt eine weibliche Oeffnung, aber keinen After fand, gegenseitig ausgleichen). Eine Leibeshöhle fehlt; die männlichen und weiblichen Keimdrüsen, die in jedem Individuum neben einander vorkommen, sind mit den Blindschläuchen des Magens so dicht verpackt und verschlungen, dass es sehr schwer ist, über das Verhältniss derselben eine überzeugende Ansicht zu gewinnen. Bei *M. tuberculatum* lassen sich zahlreiche längliche Hodenfollikel entdecken, die den Verästelungen des Samenleiters aufsitzen. Der letztere mündet jederseits zwischen dem 3. und 4. Fusspaare auf einer kleinen Papille nach Aussen und theilt sich sehr bald (Schmidt lässt ihn einfach bleiben) in einen doppelten, vordern und hintern Canal. Bei *M. cirriferum* sollen eigentliche Hodenvollikel fehlen; Verf. vermuthet, dass die Hoden hier nach dem Typus der sog. einzelligen Drüsen entwickelt seien, und lässt diese je mit einem besondern Ausführungsgange in die blasig erweiterten Enden des Samenleiters einmünden. Auch die Eier scheinen sich nicht eigentlich in Follikeln zu entwickeln. Trotzdem aber gelangen dieselben gleichfalls in einen deutlichen Eileiter, die beide sich in die Cloake inseriren. Die Begattung wurde nicht beobachtet; jedoch sah Verf. einmal eine Anzahl zusammengeballter Samenfäden in der Cloake. Die männliche Brunst scheint, nach einer Beobachtung des Verf. zu schliessen, früher, als die weibliche einzutreten. Ein paar Junge von $\frac{1}{15}$ — $\frac{1}{20}$ “, die Verf. einmal auf einem grossen *M. tuberculatum* in der Nähe des Schlundes sitzen sah, glichen im äussern Aussehen bereits ganz den alten, hatten jedoch weder Magenanhänge, noch Geschlechtsorgane; auch waren bei ihnen die Haken der Fusshöcker

nur etwa $\frac{1}{6}$ so gross, als bei den ausgewachsenen Exemplaren. Interessanter durch die abweichende äussere Form war ein Junges, welche Verf. auf einem ausgewachsenen *M. cirriferum* sitzend fand. Dasselbe hatte ($\frac{1}{30}$ '''') eine längliche, vorn etwas schmalere, hinten abgerundete Gestalt und besass nur vier Beine, die weit prominirten und bereits mit Krallen versehen waren. Das Thierchen glich eher einem Tardigraden, als einem Myzostomum, liess sich aber doch an Fushaken und Rüssel mit Bestimmtheit als solches erkennen. Welche Zwischenstufen zwischen dem Ei und dieser Form liegen, musste Verf. leider unbekannt lassen; wir bedauern das um so mehr, als dieselben möglicher Weise ein bestimmteres Licht auf die Verwandtschaftsverhältnisse unserer merkwürdigen Schmarotzer würden geworfen haben.

Cestodes.

Carus, Icon. zoot. Tab. VII. Fig 11 enthält eine sehr instructive Zeichnung von *Caryophyllaeus* mit vollständig analysirtem Geschlechtsapparate und (Fig. 12) Ausmündung der acht Längskanäle am hinteren Körperende, die, wie Fig. 13, das hintere Leibesende von *Taenia ocellata* juv. mit contractiler Blase, von M. Schultze mitgetheilt sind. Einige weitere Originalien von Stein und v. Siebold erläutern den Bau der Eier mit dem sechshakigen Embryo, sind aber theilweise (so weit sie *Taenia Solium* betreffen) als ziemlich misslungen zu bezeichnen.

Virchow schildert die Entwicklungsgeschichte der Kalkkörperchen bei den Cestoden und nimmt dieselben als verkalkte Zellgewebkörperchen in Anspruch. Arch. für path. Anat. XI. S. 82. Mit Abbild.

Die oben erwähnten Untersuchungen Claparède's über die Kalkkörperchen der Trematoden machen es sehr glaublich, dass diese Gebilde bei den Cestoden die gleichen Beziehungen zu den Excretionsorganen haben, obwohl die Untersuchungen, die Cl. zur Unterscheidung dieser Frage bei *Echinococcus* anstellte, bisher noch kein positives Resultat geliefert haben. A. a. O. S. 104. (Ref. darf wohl hinzufügen, dass es ihm und Dr. Pagenstecher bei gemeinschaftlicher Untersuchung des *Cysticercus Echinobothrii* seitdem gelungen ist, sich von der Richtigkeit dieser Vermuthung zu überzeugen.)

Kölliker bestätigt — wie das früher auch schon Ref.

gethan hatte, Blasenbandwürmer S. 134 — die Existenz der von Wagener beschriebenen seitlichen Ausmündungen am Gefässsysteme der Cestoden (Zeitschrift für wiss. Zool. IX. S. 139). Bei einem unbewaffneten Scolex wurden jederseits vielleicht 30—33 Oeffnungen gezählt, die durch kurze Querzweige mit den Längsgefässen communicirten. Die letztern standen ausserdem noch durch den pulsirenden Endschlauch mit der Aussenwelt in Verbindung.

G. Wagener liefert (in seinen Beiträgen a. a. O. S. 5—17) eine Uebersicht über die Entwicklungsgeschichte der Cestoden nach seinen bereits früher publicirten zahlreichen Beobachtungen (J. B. XXII. S. 379) und erläutert dieselben durch eine Reihe von Abbildungen, die zum Theil schematischer Natur sind.

Der Embryo entsteht, wie es scheint durchgehends, durch Theilung des Keimbläschens schon im Bandwurmgliede und stellt, im ausgebildeten Zustande, eine überaus contractile Kugel mit drei, seltener zwei Paar Haken dar. Nach der Uebeftragung der Eier in einen Wirth schlüpft der Embryo aus, um sodann an einem zusagenden Orte eine structurlose, mitunter von kleinen Stacheln oder Härchen besetzte Haut zu bekommen und im Innern ein Gefässsystem mit Flimmerläppchen und pulsirendem Endschlauch zu entwickeln. Bis dahin scheinen sich alle Cestoden mit unwesentlichen Differenzen gleich zu verhalten — später aber weichen dieselben nach sechs verschiedenen Typen aus einander.

Bei den Ligulaarten und Caryophyllaeus scheint die Metamorphose schon auf dieser Stufe beendet. Die Schwanzöffnung des Gefässsystemes bleibt und das Kopfende erleidet nur geringe oder gar keine Modifikationen.

Triaenophorus entwickelt am Kopfende des Embryo Haken und zwei flache Gruben, während das Schwanzende mit dem Porus excretorius abgeworfen wird (vielleicht aber auch in einigen Fällen nach Oblitteration des pulsirenden Schlauches persistirt).

Bei der Taeniae inermis soll sich das eingezogene Kopfende des Embryo ganz einfach mit Saugnäpfen und Rüsseln verschn, worauf dann durch Abschnürung am Halsende sogleich die Gliederbildung beginnt. Das Schwanzende des Embryo mit dem Porus erscheint demnach als letztes Glied, das zuerst abgeworfen wird. (Nach Ansicht des Ref. dürften sich die T. inermis trotz diesen Angaben im Wesentlichen wie die T. armatae verhalten, zumal bei diesen ja bisweilen gleichfalls, z. B. bei T. crassicolis — auch nach Beobach-

tungen von Pagenstecher und Ref. bei Echinobothrium — die Gliederbildung vor Abstossung der Schwanzblase vor sich geht.)

Der Embryo der Tetrabothrien erhält an seinem vorderen Ende vier Gruben oder Saugnäpfe mit einem Stirnnapfe (Scolex Rud.); die vier Gruben vergrössern sich, oftmals nach vorhergegangener Einziehung, sie theilen sich nicht selten auch in dieser oder jener Richtung, bis sich schliesslich, nach Ausbildung des Kopfes, das Schwanzende mit seinem pulsirenden Schlauche abtrennt und zu Grunde geht.

Die Taeniae armatae bilden den Kopf in der Weise, dass sich das meist sehr durchsichtige und mit einer dünnen structurlosen Haut überzogene Kopfende der embryonalen Cestodenblase einzieht. Der Boden des Kopfsackes hebt sich; die Seitenwände bauchen sich aus und bilden die Saugnäpfe, die allmählich auf den sich immer höher hebenden Grund des Sackes, den späteren Kopf, übergehen. (Ref. glaubt bei seinen Untersuchungen zu der Ueberzeugung gekommen zu sein, dass die Bildung des Kopfes bei den Blasenbandwürmern ohne Erhebung des Bodens dadurch vor sich gehe, dass die Wände des Kopfsackes sich unmittelbar in die Wände des völlig eingestülpten Kopfes metamorphosirten. Die Möglichkeit einer secundären Erhebung ist dabei nicht ausgeschlossen, vielmehr direkt zugestanden, und somit ist denn der Unterschied zwischen den beiderlei Auffassungen nicht eben allzu bedeutend. Ob das freilich zu der Behauptung genügt, dass die vom Ref. gegebene Darstellung sich bereits beim Verf. — in dem grossen, oben erwähnten Cestodenwerke — vorfinde (helminthol. Bemerkungen a. a. O. S. 77), will Ref. hier nicht weiter erörtern. Der Rückblick auf Steinbuch kann dabei nichts entscheiden, schon desshalb nicht, weil es sich bei diesem überhaupt nicht um Entwicklungsvorgänge handelt. Ueberdiess giebt St. ausdrücklich an, dass das rüsseltragende Vorderende auch bei zurückgezogenem Kopfe „nicht umgestülpt“ sei, obgleich dasselbe doch gleichfalls „im umgestülpten Zustande“ seinen Ursprung nimmt. Der Vergleich des retractilen Cysticercuskopfes mit den Tentakeln der Schnecken ist übrigens schon älter und schon von Malpighi in Anwendung gezogen.)

Ganz eben so verhält sich eine Anzahl von Tetrarhynchen, während andere dieser Thiere, wie auch einige Dibothrien, in sofern abweichen, als sich bei ihnen der emporgehobene Kopf nach völliger Ausbildung von seiner Blase ablöst und dann frei im Innern derselben gelegen ist.

In den beiden letzten Fällen erreicht die Cestodenblase offenbar ihre höchste Entwicklung; sie erscheint als ein mit deutlichen Organen versehenes Thier, das den späteren Kopf als Knospe hervortreibt.

Die v. Siebold'sche Annahme von der Verirrung und Hydropsie

der sog. Blasenwürmer wird als eine jetzt genügend widerlegte und erledigte Hypothese bezeichnet.

Unter den beigegebenen Abbildungen heben wir besonders die schöne Zeichnung von *Gyporhynchus pusillus* Norm. (Tab. VI) hervor, so wie die Abbildung des bei *Tetrarhynchus* gefundenen muthmasslichen Nervensystems (Tab. IV. u. V).

In den „helminthologischen Bemerkungen“ (a. a. O. S. 74) wird hervorgehoben, dass Verf. in der Leibeshöhle von *Nais elinguis* einst einen noch mit seinen Embryonalhaken versehenen Cestodenembryo fand; es wird dann ferner der Embryo von *Dibothrium rugosum* mit und ohne Eihüllen durch treffliche Abbildungen erläutert und schliesslich die schon oben erwähnte Prioritätsfrage in Betreff der Kopfentwicklung bei den Blasenbandwürmern erörtert. (Wenn Ref. hier auf diese Angelegenheit nochmals zurückkam, so geschah das nicht in der Absicht, mit dem so hoch geehrten Forscher um persönliche Ansprüche zu mäkeln, sondern lediglich aus dem Wunsche, sich von dem Verdachte zu rechtfertigen, als habe er wissentlich die Verdienste desselben um unsere Kenntnisse von der Entwicklungsgeschichte der Cestoden schmälern wollen.)

Nach den Mittheilungen von Verloren bezieht sich die bekannte (aber mehrfach bezweifelte Beobachtung) Schubart's von dem Vorkommen eines Flimmerüberzuges bei Cestodenembryonen auf *Bothriocephalus latus*. Verloren legte in der Bonner Naturforscherversammlung die darauf bezüglichen Abbildungen Schubart's vor, und aus diesen geht hervor, dass die sechshakigen Embryonen des genannten Bandwurmes von einer eigenen, locker anliegenden Flimmerhülle umgeben sind, wie etwa die Ammen von *Monostomum mutabile*. Tageblatt der Naturf. und Aerzte 1857. S. 19.

Lespés fand in der Leber von *Nassa reticulata* einige Male einen *Cysticercus*, der dem Gen. *Echinobothrium* zugehörte und wegen der Abwesenheit der Halsstacheln als *E. levicolle* n. sp. beschrieben wurde (Ann. des sc. nat. 1857. T. VII. p. 118). Die Benennung ist unpassend, denn nach den Beobachtungen von Ref. und Dr. Pagenstecher entwickelt auch das *Echin. typus* seine Halsstacheln erst nach dem Freiwerden aus der *Cysticercus*blase. Der *Cysticercus* der letzten Art lebt in Krebsen und wird nicht selten im Magen verschiedener nordischer Rochen zwischen den Ueberresten seiner früheren Wirthes angetroffen. Ob übrigens die von L. beobachtete Art von *E. typus* wirklich verschied-

den ist, dürfte schwer zu entscheiden sein, zumal auch der am Ende der Schwanzblase vom Verf. beschriebene bewegliche Saugnapf, der bei *E. typus* nicht aufgefunden wurde, möglicher Weise nichts Anderes, als die Einstülpungsstelle der *Cysticercus*-blase darstellt.

Nachträglich mag hier auch noch bemerkt sein, dass Gegenbaur schon vor einigen Jahren (Unters. über *Pteropoden* und *Heteropoden* 1855. S. 59. Anm.) in dem die Schale überziehenden Manteltheile von *Tiedemannia* fast constant eine Anzahl „encystirter Tänienammen“ auffand, die „ganz nach der durch v. Siebold, Stein und Meissner beschriebenen Weise“ beschaffen waren. Die Embryonalhäkchen werden vom Verf. nicht erwähnt, dagegen am vorderen Pole des Tänienkopfs ein dichter Kranz kleiner Häkchen.

Die schon im letzten Jahresberichte (S. 205) nach einer vorläufigen Mittheilung erwähnten Untersuchungen von Rainey „on the structure and developement of the *Cysticercus cellulosae*“ liegen jetzt ausführlich, in den *Transact. roy. soc.* 1857. I. p. 111—127 mit zwei Abbildungen, vor.

Ref. kann das damals ausgesprochene Urtheil über diese Abhandlung nur wiederholen. Es unterliegt für ihn keinem Zweifel, dass sich Verf. über die ersten Zustände des *Cysticercus* völlig getäuscht, und auch in seinen weiteren Beobachtungen nicht bloss manche Lücke gelassen, sondern auch manchen Fehlgriff gethan hat. Was Verf. als die ersten Anfänge des *Cysticercus* beschreibt, gehört offenbar in die Reihe jener sonderbaren parasitischen Bildungen, von deren Vorkommen wir zuerst durch Miescher's Untersuchungen in den Muskelfasern der Hausmaus Kenntniss bekommen haben, die mit der Entwicklungsgeschichte der Cestoden aber bestimmt in keinerlei Zusammenhang stehen.

Ueber das Vorkommen des *Cysticercus cellulosae* am und im Auge des lebenden Menschen vergleiche man die zahlreichen Beobachtungen, von v. Graefe in *Zeitschr. für Ophthalmologie*, bes. 1857. S. 308, so wie Berthold, de *Cysticercis cellulosae in oculo hom.* Dissert. Berol. 1857 und Nagel, *med. Zeitung des Vereins für Heilk. in Preussen* 1858. No. 29.

Nach den Mittheilungen von Dr. Anderson und Dr. Gordon ist der Bandwurm in Indien so häufig, dass in gewissen Gegenden jeder dritte Soldat daran leidet. Ausgenommen sind diejenigen Nativ-Regimenter und Diener, die

sich ausschliesslich von Pflanzenkost nähren, wie denn überhaupt der Fleischgenuss, je nachdem er mehr oder minder vorwaltend ist, ein Maass für die Häufigkeit des Bandwurms abgiebt. *Med. Times and Gaz.* 1857. No. 357. Mai. (*Pharmaceutical Journ. and Transact.* 1858. Vol. XVII. p. 409.)

Dela fond in Alfort beobachtete das (bekanntlich sehr seltene) Vorkommen eines *Coenurus* im Rückenmarke eines Lammes und schildert die dadurch bedingten krankhaften Erscheinungen (*Cpt. rend.* Vol. XLV. p. 452). Der Blasenwurm lag in der Gegend des dritten Lendenwirbels. Gleichzeitig fand sich auch ein zweiter *Coenurus* im Hirne.

Kreuder berichtet in der Zeitschrift für die landwirthschaftl. Vereine des Grossherz. Hessen 1857. No. 35 über einige vom Ref. in seinen Vorlesungen zur Aufklärung über die Natur der Drehkrankheit vorgenommene Experimente und hebt dabei namentlich einen Fall hervor, in dem sich die (freilich auch sehr grossen) *Scolecus Coenuri* innerhalb 10 Tagen zu völlig ausgebildeten, infectionsfähigen Bandwürmern entwickelt hatten.

van Beneden verfütterte *Echinococcus* an zwei neugeborene Hunde und fand nach drei resp. vier Wochen Hunderte von reifen *Taenia Echinococcus*. *l'Inst.* 1857. p. 287.

Levison macht uns mit einem Falle von *Echinococcus hominis* aus der Milz bekannt, der durch seinen Bau (Anwesenheit von Tochterblasen) an den Küchenmeister'schen *E. altricipariens* sich anschliesst, durch Form, Grösse und Zahl der Haken aber die Charaktere des *E. scolecipariens* Kuchm. besitzt. Eine zweite *Echinococcus*blase war ohne ausgebildete Tochterblase und Tännien — eine sog. *Acephalocystis*. Versuche, im Darmkanale des Hundes die Tännienköpfe der ersten Blase zur Entwicklung zu bringen schlugen fehl, ebenso auch — was freilich vorauszusetzen war — die mit *T. cucumerina* bei Kaninchen angestellten Fütterungsversuche. *Disquisit. nonnullae de Echinococcis* Dissert. inaug. Gryph. 1857. (Ob die Untersuchungen des Verf. zu dem Resultate berechtigen, dass die *Echinococcus* überhaupt nur eine einzige Species bildeten, steht dahin. Man könnte darin ebenso gut auch einen Grund für die Annahme einer noch grösseren Menge von Arten finden. Die Entscheidung über diese

Frage bleibt späteren genaueren Untersuchungen und namentlich auch dem Experimente vorbehalten.)

Steenstrup brachte eine Reihe von Beobachtungen, aus denen hervorgeht, dass der *Schistocephalus solidus* regelmässig auf einer bestimmten Entwicklungsstufe und zu bestimmter Zeit (Juni—August) die Leibeshöhle der Stichlinge, die er anfangs bewohnt, nach Durchbohrung der Körperwandung verlässt und in das Wasser auswandert. Der Stichling geht durch die Verletzung des auswandernden Bandwurmes zu Grunde, während der letztere eine längere Zeit (wie schon Linné wusste und v. Bär bestätigte) frei im Wasser lebt und in der Mehrzahl der Fälle auch wohl erst von da in den Darmkanal der Wasservögel gelangt. Die von Abilgaard schon im vergangenen Jahrhundert experimentell festgestellte Einwanderung des *Schistocephalus* mit seinem Wirthe scheint weit seltener zu sein. Nach einigen, zum Theil schon von Götze herrührenden Beobachtungen ist es Verf. wahrscheinlich, dass auch die Liguarten in activer Weise durch die Körperwandungen der sie beherbergenden Fische auswandern. Overs. kongl. danske Videnskab. Selsk. Forhandl. 1857. p. 186—196.

Kolenati erwähnt in seiner Abhandlung über die Parasiten der Chiropteren (Wien 1857) eines *Cysticercus miniopteri*, vielleicht *C. fasciolaris*.

Turbellarii.

Pharyngocoela. M. Schultze veröffentlicht in den Icon. zoot. von Carus Tab. VIII. Fig. 18 eine Abbildung von *Planaria torva*, die zur Erläuterung der schon früher von unserem Verf. (J. B. XX. S. 343) gegebenen Darstellung der Geschlechtsorgane dient. Die Keimstöcke sind doppelt, sehr weit nach vorn gelegen, die Hoden zur Zeit der Geschlechtsreife durch den ganzen Körper verbreitet. Der Samen wird in eine Spermatophore eingeschlossen und in dieser Form in die kurze Vagina eingeführt. Neben der Vagina noch ein ovales Säckchen von unbekannter Bedeutung.

Ebenso auch eine Abbildung von *Prostomum lineare* mit vollständiger innerer Organisation. Ebendas. Tab. VIII. Fig. 16.

O. Schmidt giebt eine vorläufige Uebersicht über die „Ergebnisse der Untersuchung der bei Krakau vorkommenden Turbellarien,“ Sitzungsber. der Wiener Akad. Bd. XXV. S. 87, auf die wir bei einer späteren Gelegenheit, nach Veröffentlichung der ausführlichen, in den Denkschriften der Akademie abgedruckten Arbeit, zurückkommen werden. Wir beschränken uns hier auf die Bemerkung, dass die Untersuchungen des Verf.'s sich besonders auf Vortex, Mesostomum und Proporus beziehen und manche interessante anatomische Thatsache theils neu feststellten, theils bestätigten. Von neuen Arten (unter 20) werden aufgeführt: *Vortex scoparius*, *V. coronarius*, *Derostomum galizianum*, *Mesostomum Craci*, *M. cyathus*, *M. Wandae*, *M. fallax*, *M. trunculum*, *M. hirudo*, *Prostomum furiosum*.

Unsere Kenntnisse über die Systematik und die einzelnen Formen der Dendrocolen sind im Laufe des verflossenen Jahres besonders durch Stimpson gefördert worden, der in dem ersten Theile seines Prodrusus (Proc. Acad. Philad. 1857. p. 19 sq.) nicht bloss eine Uebersicht über die bei Weitem grössere Mehrzahl der bisher beschriebenen Thiere dieser Gruppe giebt, sondern auch noch 52 neue Arten, die er in dem stillen Oceane sammelte, denselben hinzufügt. Genera und Familien sind dabei nach eigener Untersuchung kurz charakterisirt worden. Wir tragen die neuen Arten in die folgende Synopsis ein.

Subtrib. I. *Digonopora*. Aperturae genitales duae.

Fam. *Euryleptidae*. Corpus planum, dilatatum laeve vel papillosum. Caput plicis tentacularibus duabus frontalibus. Os ante medium situm. Ocelli numerosi prope extremitatem anteriorem siti. Maricolae.

Thysanozoon Grube. Corpus supra papillis ubique obsessum. Caput discretum, tentaculis mediocribus. Ocelli frontales aut cervicales. Os subcentrale. Apertura genitalis mascula subcentralis, feminea retrorsum sita. 6 Species, unter denen neu: *Th. australe*.

Planeolis (n. gen.). Corpus papillis sparsis, seriebus duabus lateralibus dispositis. Caput grande, discretum, tentaculis magnis. Ocelli capitales et tentaculares. Os subcentrale. Sp. P. Panormus Quatref.

Proceros Quatref. Corpus laeve, caput subdiscretum, tentaculis subdistantibus. Ocelli cervicales vel tentaculares. Os subterminale; aperturae genitales retrorsum sitae. 3 sp. unter denen *P. albicornis* neu.

Eurylepta Hempr. et Ehrbg. Corpus laeve, tenue. Caput vix subdiscretum. Plicae tentaculares marginales approximatae. Ocelli in acervum minutum cervicalem. Os ab apice circiter quartam corporis partem remotum. Apertura genitalis mascula ante, feminea post os sita (an semper?). N. sp.: *E. fulminata*, *E. nigra*, *E. interrupta*, *E. guttatomarginata*, *E. japonica* und *E. coccinea*. Ausserdem noch 6 bereits bekannte Species.

Fam. *Nautiloplanidae*. Corpus planum, hyalinum. Caput parvum, discretum, auriculis duabus. Ocelli nulli. Os post-mediale, oesophago protractili multilobo. Aperturæ genitales antrorsum sitae. Pelagicae.

Nautiloplana gen. n. unic. mit 1 Art: *Planaria* (Eurylepta) *oceanica* Darv.

Fam. *Cephaloleptidae*. Corpus planum dilatatum. Caput discretum, extremitate acetabuliformi. Ocelli duo. Os subcentrale, oesophago valde protractili. Aperturæ genitales ante os sitae. Aquarum subsalinarum incolae.

Cephaloptera Dies. Gen. unicum. Sp. *E. macrostoma* Darv

Fam. *Typhloleptidae*. Corpus planum v. depressum, capite continuo, tentaculis nullis. Ocelli nulli. Os subcentrale, ante vel post medium situm. Aperturæ genitales retrorsum sitae (an semper?). Maricolae.

Typhlolepta Oerst. Corpus plano-depressum, oblongum, dilatatum. Os pone medium situm. „Penis absque stylo calcareo.“ 3 sp.

Cryptocoelum (n. gen.). Corpus planum, crassiusculum, latum, utrimque rotundatum. Os ante medium situm. Parasiticae. Sp. n. *Cr. opacum*. Schmarotzt auf einem Echinarachnius.

Typhlocolax (n. gen.). Corpus oblongum, depressum, utrimque attenuatum. Os post medium situm. Parasiticae. *T. acuminatus* sp. n. von einer Chirodota, *T. (Typhlolepta) acutus* Gir., *T. (Typhloplana) marinus* Oerst.?

Fam. *Leptoplanidae*. Corpus planum, dilatatum, laeve, saepius tenerrimum. Caput continuum, tentaculis nullis. Ocelli plus minusve numerosi, occipitales v. occipitales et marginales. Os ante medium situm. Aperturæ genitales pone os, saepius pone medium sitae. Maricolae.

Centrostromum Dies. Ocelli in acervos duos parallelos dispositi. Os centrale, oesophago protractili, multilobo. Aperturæ genitales retrorsum sitae. *C. lichenoides* Mert.

Elasmodes Le Conte. Corpus oblongum, tenerrimum. Ocelli occipitales in acervos duos saepius lineares et parallelos dispositi. Os ante medium situm. Apertura mascula centralis, feminea retrorsum sita. 8, früher zum Theil andern Genera (*Polycelis* s. s. w.) zugerechnete Species, worunter 2 neue: *E. acutus* und *E. tenellus*.

Leptoplana Hempr. et Ehrbg. Corpus planum, dilatatum, tenerimum. Ocelli omnes occipitales, formarum duarum: primarii maiores, angulares, nigri, conferti, in acervos duos saepius in umbonibus aggregati; secundarii minuti in acervos nebuliformes dispositi. Os subcentrale, ante medium. Aperturæ genitales retrorsum sitae. 6 bekannte, 9 neue Species: *L. humilis*, *L. oblonga*, *L. delicatula*, *L. maculosa*, *L. patellarum*, *L. punctata*, *L. Schoenbornii*, *L. trullaeformis*, *L. fusca*.

Dioncus Stimps. Corpus planum, dilatatum. Ocelli in umbones duos subdistantes, occipitales dispositi. Ocelli marginales nulli. Os subcentrale. 2 Sp.

Pachyplana (n. gen.). Corpus latum, crassiusculum. Ocelli primarii in umbones duos parvos occipitales aggregati; secundarii in margine anteriore dispositi. Os subcentrale. Sp. n. *P. lactea*.

Prothiostomum Quatref. Corpus oblongum. Ocelli numerosi, quidam in acervum unicum saepe bipartitum occipitalem, reliqui anteriores, marginales aut submarginales, arcuatim dispositi. Aperturæ genitales subcentrales. 11 Species, von denen neu: *P. affine*, *P. tenebrosus*, *P. constipatum*, *P. cribrarium*, *P. crassiusculum*, *P. sparsum*, *P. grande*, *P. collare*, *P. obscurum*.

Diplonchus (n. gen.). Corpus oblongum, crassiusculum et maculatum ut in *Stylochis*. Caput papilla occipitali, bilobata ocellifera instructum. Ocelli numerosi, minuti, ad papillam etiam saepe ad eiusdem basin dispositi. Ocelli marginales nulli. Sp. n. *D. marmoratus*.

Fam. *Stylochidae*. Corpus planum, saepius crassiusculum. Tentacula duo parva, brevissima, occipitalia. Ocelli numerosi ad tentacula, vel in acervos capitales aggregati. Os subcentrale. Aperturæ genitales approximatae, retrorsum sitae. Maricolae.

Stylochus Hempa et Ehrbg. Corpus laeve. Tentacula subdistantia. Ocelli numerosi, minuti, conferti in tentaculorum superficie, marginales nulli. 3 Arten mit 2 neuen: *St. corniculatus* u. *obscurus*.

Stylochoplana (n. gen.). Corpus laeve. Tentacula subapproximata. Ocelli ad basin tentaculorum v. in acervos vicinos aggregati; marginales nulli. Ausser *St. folium* Gr. und *St. maculata* Quatrf. noch *St. reticulata* und *St. tenuis* nn. sp.

Callioplana (n. gen.). Corpus tenue, laeve. Tentacula elongato-conica, gracilia, approximata in areola alba. Ocelli ad tentacula et in areola inter tentacula; marginales nulli. Sp. n. *C. marginata*.

Trachyplana (n. gen.). Corpus crassiusculum, supra tuberculatum. Tentacula parva, inconspicua, hyalina. Ocelli ad tentacula; marginales nulli. Sp. n. *Tr. tuberculosa*.

Stylochopsis (n. gen.). Corpus subcrassum, molle. Tentacula distantia, obtusa. Ocelli magni ad tentacula et minuti ad marginem anteriorem; interdum quoque in acervum occipitalem. Sp. nn. *St. limosus* und *St. conglomeratus*.

Imogene Gir. Corpus laeve. Tentacula brevita. Ocelli duo magni, ad apicem tentaculorum, et numerosi minuti in corporis margine. I. oculifera Gir.

Fam. *Planoceridae*. Corpus planum, latum, laeve. Tentacula duo elongata, subfiliformia, retractilia. Ocelli nulli. Os subcentrale. Aperturae genitales retrorsum sitae. Maricolae.

Planocera Blainv. Gen. un. mit 2 Sp.

Subtr. II. *Monogonopora*. Apertura genitales unica.

Fam. *Planariadae*. Corpus oblongum, depressum v. subplanum, antice auriculatum v. subauriculatum, capite raro tentaculato. Ocelli duo globulis vitreis instructi; rarissime plures vel nulli. Os post medium situm, interdum centrale. Stomachus amplus, postmedialis. Apertura genitales pone os. Aquarium dulcium vel marinarum incolae.

Procotyla Leidy (n. gen.). Corpus elongatum, antice vix auriculatum. Caput absque tentaculis. Frons disco evertibili acetabuliformi praedita. Ocelli duo distantes. Tubus cibarius ramis parum divisus. Fluviales. P. fluvialis Leidy (= *Dendrocoelum superbum* L.).

Galeocephala (n. gen.). Corpus oblongum, antice subauriculatum; tentaculis ab auriculis distinctis. Ocelli duo subdistantes. Os postmediale. Tubus cibarius ramis arbusculiformibus. G. superba Gir. und G.(?) tentaculata Müll.

Dendrocoelum Oerst. Corpus antice auriculatum, auriculis tentaculiformibus. Caput antice excavatum v. bilabiatum, absque tentaculis. Ocelli duo. Os subcentrale, oesophago protractili cylindrico. Tubus cibarius ramis arbusculiformibus. Fluviales. 3 sp.

Planaria Müll. (= *Dugesia* Gir.). Corpus depressum, oblongum, capite saepius subdiscreto, triangulari, nec labiis, nec acetabulo praedito. Ocelli duo subapproximati. Os subcentrale, oesophago protractili cylindrico. Fluviales. Ausser zahlreichen bekannten Arten neu: *Pl. sinensis* aus Hong-kong, *Pl. cinerea* aus Ousima und *Pl. radia* aus Loo Choo.

Phagocata Leidy. Corpus antice subauriculatum, tentaculis nullis. Ocelli duo. Os post medium situm, oesophago protractili multipartito. Fluviales. *Pl. gracilis* Leidy.

Procerodes Gir. Corpus depressum, antice truncatum, tentaculis auricularibus duobus. Ocelli duo distantes. „Tubi cibarii rami indivisi“. Maricolae. Pr. ulvae Oerst., Pr. Wheatlandii Gir., Pr. frequens Leidy.

Fovia Gir. Corpus depressum, antice subtruncatum; fronte saepius in medio producta v. acuta. Ocelli duo subapproximati. Tubus cibarius ramis indivisis. Maricolae. Ausser *F. littoralis* Oerst., *F. affinis* Oerst., *F. Warrenii* Gir. als neu: *F. gracilipes* und *F. trilobata*.

Bdelloura Leidy. Corpus depressum, antice acutum v. subacutum, cauda subdiscreta, dilatata. Ocelli duo. Os centrale, oesophago cylindrico. Stomachus latus. Coeca indivisa. Apertura genitales... Maricolae. 3 sp.

Anocelis (n. gen.). Corpus depressum, elongato-ovale, saepe antice truncatum. Os post medium, subcentrale. Ocelli nulli. Fluviatiles. *A. coeca* Duj. und *A. fuliginosa* Leidy.

Oligocelis (n. gen.). Corpus oblongum, depressum, antice auriculatum. Ocelli sex in acervos duos parallelos subterminales dispositi. Os post medium, subcentrale. Tubus cibarius ramis arbusculiformibus. Fluviatiles. *O. pulcherrima* Gir.

Fam. *Polycelidae*. Corpus oblongum, planum, dilatatum. Ocelli numerosi marginales. Os post medium subcentrale, oesophago cylindrico, longe protractili. Aperturā genitalis retrorsum sita. Fluviatiles.

Polycelis Hempr. et Ehrbg. Gen. unic. *P. nigra* Müll., *P. brunnea* Müll., *P. Viganensis* Duj.

Fam. *Geoplanidae*. Corpus elongatum, depressum v. depressiusculum, subtus pede sat distincto. Caput continuum v. discretum. Ocelli duo v. plurimi, in capite dispositi. Os postmediale. Oesophagus protractilis campanulatus, margine saepius sinuoso. Apertura genitalis pone os. Terricolae.

Geoplana (n. gen.). Corpus depressum v. depressiusculum, elongatum v. lineare, capite continuo. Ocelli numerosi marginales vel in acervos submarginales, in capite dispositi. 7 sp., unter denen eine neue: *G. lapidicola* aus Loo Choo.

Bipalium (n. gen.). Corpus lineare, depressiusculum. Caput discretum, lunatum, transversum, auriculis sat longis retrorsum tendentibus. Ocelli numerosi, minuti, in capite, plerumque in eius margine dispositi. Os centrale vel postcentrale. Apertura genitalis inter os et extremitatem posteriorem, saepius ad dimidium distantiae. Sp. nn. *B. maculatum* Ousima, *B. fuscum* Japan, *B. trilineatum* Jesso, *B. virgatum* Loo Choo.

Rhynchodesmus Leidy. Corpus elongatum, subdepressum, antrorsum attenuatum, utrimque obtusum. Ocelli duo subterminales. 2 sp.

Fam. *Polycladidae*. Corpus planum v. depressum, oblongum, dilatatum, capite continuo. Ocelli nulli. Os subcentrale. Apertura genitalis ante os (? Ref.). Terricolae.

Polycladus Blanch. Gen. un. Hieher ausser *Pl. Gayi* Bl. noch 3 Darwinsche Species *P. maculatus*, *P. semilineatus* und *P. elongatus*.

Die *Annals and Mag. of nat. hist.* T. XX. p. 1 sq. publiciren eine Uebersetzung der schon im letzten Jahresberichte (Bd. XXIII. S. 209) von uns berücksichtigten Arbeit von M. S. Schultze über Landplanarien.

O. Schmidt liefert in seinen Beiträgen zur Kenntniss der Turbellaria rhabdocoela (Sitzungsber. der Wiener Akad. XXIII. S. 351 ff.) Beschreibung und Abbildung einiger neapolitanischer Arten:

Vortex Girardi n. sp., *V. penicillatus* n. sp., *V. reticulatus* Schmidt (?), *Mesostomum solea* n. sp., *M. (?) chlorostichum* n. sp., *Prostomum immundum* n. sp., *Spiroclytus* (n. gen.) *Nisus* n. sp., *Monocelis anguilla* n. sp., die letztere durch Anwesenheit zweier Augenflecke vor der Gehörkapsel von den übrigen Arten der Gen. *Monocelis* verschieden. Das neue Gen. *Spiroclytus* ist mit dem früher nach einem irrthümlich angenommenen Charakter von dems. Verf. aufgestellten Gen. *Trigonostomum* (J. B. XX. S. 348, *Trigonostomum setigerum* = Sp. *Euryalus* Schm.) identisch und dürfte nach den gegenwärtigen Untersuchungen folgende Charaktere besitzen. „Die hellere Grundfarbe ist an keine wahrnehmbaren Pigmentkörner gebunden, während längs des Rückens dieselbe Farbe in einem weit intensiveren Tone in einem unregelmässigen Maschenwerke von Pigment sich ausbreitet. Das Kopfende trägt eine Anzahl steifer und langer Wimpern (kann wohl kaum als Genuscharakter angeführt werden, da solche steife Borsten sehr weit unter den Turbellarien, auch bei *Dendrocoelen*, wie *Prothiostomum arctum*, und überhaupt den frei lebenden Würmern verbreitet sind Ref.). Die Generationsorgane sind durch einen merkwürdigen penisartigen Theil von horniger Beschaffenheit ausgezeichnet, der in mehrere Spiralwindungen und ein gerades Endstück zerfällt.“

Eine neue von Schmidt (ebendas. S. 348) entdeckte Art des Gen. *Dinophilus* (J. B. XX. S. 351) ist durch eine grössere Anzahl von Wimperkränzen ausgezeichnet. Der sg. Schlund liegt wahrscheinlicher Weise oberhalb des Oesophagus, wie der Rüssel der Nemertinen und der vordere sg. Pharynx der Prostomeen, den Verf. jetzt gleichfalls als Analogon des Nemertinenrüssels erkannt hat (a. a. O. S. 356, ebendas. XXV. S. 88).

Rhynchocoela. Aus der schönen von M. Schultze in Carus, Icon. zoot. Tab. VIII. Fig. 10 veröffentlichten Abbildung von *Tetrastemma obscurum* ersehen wir, dass dieser Forscher sich jetzt auch von der Anwesenheit eines besondern, geschlossenen Blutgefässsystemes bei den Nemertinen überzeugt hat. Dasselbe besteht aus einem Rücken- und zwei Seitengefässen, die schlingenförmig in einander übergehen und sich abwechselnd contrahiren. (Die Anwesenheit eines contractilen Rückengefässes ist auch Ref. schon seit längerer Zeit bekannt gewesen.) Das Wassergefässsystem ist ohne Zusammenhang mit diesen Längsstämmen und bei der betr. Art in der Mitte des Körpers nach Aussen

geöffnet. Andere Originalzeichnungen desselben Verf. behandeln den Bau des Stachelapparates, der Geschlechtsorgane und Flimmerläppchen in den peripherischen Verbreitungen des Wassergefäßssystemes.

Eine Abbildung von *Nemertes olivacea* mit Eierschlauch im Umkreis des Körpers, ebendas. Fig. 14, gleichfalls von M. Schultze.

Der zweite Theil des *Prodromus descriptionis animalium, quae observ. Stimpson (l. c.)* handelt über Nemeriten, deren Verf. — mit Einschluss der schon J. B. XXII. S. 389 erwähnten Arten — 33 neue Species (aus 17 Genera) beobachtete.

A. Apertura ventralis (os Ref.) infra caput v. cervicem sita. Ocelli nulli (ob immer? Ref.)

a. Fissurae laterales in capitis marginibus.

1. Corpus normale.

Lineus Sowerby. Corpus depressum, lineare, longissimum. Caput vix subdiscretum, quadratum, antice late truncatum, apertura proboscidis terminali ampla. Apertura ventralis ante fissurarum finem posteriorem sita, saepius subterminalis. L. piperatus St. Japan (auch L. longissimus Sow. = *Meckelia Borlasii* Dies.)

Cerebratulus Ren. (= *Meckelia* p. p.) Corpus depressum v. teretiusculum, postice saepius plus minusve dilatatum, longitudine mediocri. Caput corpori continuum v. subdiscretum, oblongum v. elongatum; apertura proboscidis terminali minuta. Apertura ventralis saepius minor et fine posteriore fissurarum lateralium opposita. Fissurae ad cervicem productae. Species errantes, non fossores. Sp. nn. *C. impressus* Berings Str., *C. paludicosus* Canton, *C. oleaginus* Cap der guten Hoffnung, *C. albo-rittatus* Loo Choo, *C. cingulatus* Hong-kong, *C. fasciatus* Jeddo, *C. bellus* ibid., *C. niger* Hong-kong, *C. sinensis* ibid., *C. nigrofuscus* Ousima.

Meckelia Auct. limit. Corpus depressum, retrorsum dilatatum, interdum subplanum, marginibus acutis. Caput lanceolatum, apertura proboscidis terminali minuta. Apertura ventralis ampla, saepius paulo post finem fissurarum lateralium sita. Fossores in limo vel arena marina. Sp. nn. *M. subacuta* Loo Choo, *M. albula* China, *M. australis* Port Jackson.

Serpentaria Goods. *Meckeliae* affinis, sed apertura ventrali maiore, infra caput et ante cervicem sita. Fossores. *S. rubella* n. sp. Hong-kong.

2. Corpus lateribus involutis.

Diplopleura (n. gen.). Corpus elongatum, dilatatum, lateribus (pone caput) supra involutis, marginibus in linea dorsali me-

diana vix convenientibus. Caput subdiscretum, triangulare vel subcordatum, fissura longitudinali in utroque margine ad cervicem producta. Apertura proboscidis terminalis minuta. Apertura ventralis parvula, infra corpus, post cervicem sita, subdistans. Ocelli nulli. Maricolae. Sp. n. *D. Japonica*.

b. Fissurae laterales nullae.

1. Apertura proboscidis terminalis.

Taeniosoma (n. gen.). Corpus grande longissimum, lineare, depressum, ut plurimum supra infraque lineatum. Caput vix discretum, breve, sulco indistincto (rima obsoleta v. linea impressa incolorata) longitudinali in utroque margine. Apertura ventralis parvula postcervicalis. Species in maribus orientalibus habitantes. Sp. nn. *T. septemlineatum* Strasse Gaspar, *T. aequale* Ousima.

2. Apertura proboscidis infra caput.

Valencinia Quatref. Sp. n. *V. annulata* Cap d. g. Hoffnung.

B. Apertura ventralis nulla (? parum conspicua ? Ref.). Ocelli duo vel plurimi.

a. Fissurae v. foveae in capitis marginibus.

Dichilus (n. gen.). Corpus lineare, depressum, longitudine mediocri. Caput corpori continuum, subquadratum, plica transversa terminali bilabiatum, labio inferiore emarginato. Ocelli duo subterminales. Cervix supra rimis obsoletis (pseudorimis) impressa. Maricolae. Sp. n. *D. obscurus* Ousima.

Tetrastemma Hempr. et Ehrbg. Corpus filiforme teretiusculum v. lineare depressum; longitudine mediocri. Caput discretum v. subdiscretum, fovea transversa in medio utriusque lateris; fronte truncata; apertura proboscidis in rima transversa terminali. Ocelli quatuor, duo post frontales ante foveas, duo occipitales. Maricolae. Sp. nn. *T. stigmatum* Jesso, *T. incisum* Cap b. sp.

Cephalonema (n. gen.). Corpus teretiusculum filiforme. Caput rhomboidale, antrorsum subconicum; strictura discretum; fovea transversa in utroque latere. Apertura proboscidis terminalis. Ocelli duo occipitales. Maricolae. Sp. n. *C. bruniceps* Hong-kong.

Emplectonema (n. gen.). Corpus longissimum, subfiliforme, depressum, proteum. Caput subdiscretum, stricturis nullis; fovea longitudinali in utroque margine antero-laterali. Ocelli plurimi. Maricolae. N. sp. *E. viride* San Francisco.

b. Foveis nullis.

* Ocelli duo.

Diplomma (n. gen.). Corpus depressiusculum. Caput discretum, fronte emarginata, apertura proboscidis terminali. Fissurae laterales nullae. Ocelli duo; singulus bilobatus, quasi ex duobus compositus. (Cerebella cervicalia, valde remota. Cavum intestinale angustius; cava genitalia ampla.) Maricolae. Sp. n. *D. serpentina* Loo Choo.

Dicelis (n. gen.). Corpus lineare, depressiusculum, utrimque obtusum. Caput continuum v. subdiscretum, fronte emarginata, apertura proboscidis terminali. Ocelli duo simplices, rotundati, subterminales. Maricolae. Sp. n. *D. rubra* Japan.

** Ocelli plurimi.

Polystemma Hempr. et Ehrbg. Caput strictura a corpore discretum, parte anteriore subcontracta, valde extensibili, extremitate obtusa, apertura proboscidis terminali. (Cauda saepius non dilatata.) Sp. n. *P. sinuosum* Hong-kong.

Polina (n. gen.). Corpus valde contractile, depressiusculum, longitudine mediocre. Caput discretum v. subdiscretum, strictura nulla; apertura proboscidis terminali in margine frontali inferiore. Proboscis laevis. Ocelli in acervos quatuor aggregati. Maricolae. Sp. nn. *P. rhomboidalis* Port Jackson, *P. grisea* Norfolk, *P. cervicalis* Japan.

Tatsnoskia (n. gen.). Corpus depressum. Caput subdiscretum. Apertura proboscidis terminalis cruciata. Ocelli in acervos duos lineares, antice convergentes; posteriores usque maiores. Maricolae. Sp. n. *T. depressa* Jesso.

Cosmocephala (n. gen.). Caput depressum, longitudine mediocre, minus contractile. Caput continuum vel subdiscretum, maculis angularibus v. fasciis saepius ornatum. Apertura proboscidis in margine frontali inferiore sita. Proboscis laevis. Cervix utrimque pseudorimis inconspicuis (lineis impressis incoloratis) instructus. Ocelli minus conspicui, ut plurimum in margine capitis antero-laterali dispositi. Species maricolae, maxima ex parte boreales. Sp. nn. *C. Beringiana*, *C. Japonica*.

3. Ciliati.

Rotiferi.

Gosse's Abhandlung „on the dioecious character of the Rotifera“ (Transact. roy. Soc. 1857. II. p. 313—325, mit 2 Tafeln) enthält die schon im letzten Jahresberichte (S. 212) erwähnten Beobachtungen unsers Verf.'s über die Zwergmännchen zahlreicher Rotiferen.

Wir ersehen daraus u. a., dass auch die von Leydig als Jugendzustände einiger Brachionusarten (*B. rubens* und *Backeri*) beschriebenen Individuen, wie schon Cohn früher vermuthet hatte, solche männliche Thiere darstellen (eine Thatsache, die wir um so mehr hervorheben müssen, als die betr. Abbildungen Leydig's mit ihrer Interpretation auch in V. Carus, Icon. zoot. Tab. VIII. Fig. 33 übergegangen sind). Es scheint übrigens, als wenn die Männchen von Brachionus — und Gleiches gilt auch von einigen andern Formen — sehr wenig vollständig organisirt wären, und namentlich auch der Flimmergefäße entbehrten. Eine besondere Auszeichnung der männlichen Rotiferen besteht in der stärkeren Entwicklung des

Räderorganes; auch die Bewegungen derselben sind schneller und ungestümmer, als die der Weibchen. Die Thatsache, dass bei den mit anhängenden Eiern versehenen Weibchen entweder nur männliche oder nur weibliche Eier gefunden werden, findet auch bei unserm Verf. ihre Bestätigung, doch lässt es derselbe unentschieden, ob diese beiderlei Eier immer nur von verschiedenen Individuen gelegt werden. Es sei ja auch möglich, dass die Begattung auf die Natur der Eier influire. Die meisten der vom Verf. beobachteten Männchen wurden aus solchen, den Weibchen anhängenden Eiern erzogen; auch wurde bei einigen Formen, wie schon früher, der Coitus beobachtet. Unter den beschriebenen und abgebildeten männlichen Formen gehört eine zu einer neuen Art des Gen. *Brachionus*, *Br. angularis* Gosse. Die *Notommata Sieboldii* Leyd. rechnet Verf. zu seinem Gen. *Asplanchna* (J. B. XXII. S. 364). Ebenso wird gelegentlich die Identität des Gen. *Sacculus* Gosse (ibid.) mit *Ascomorpha* Perty (ibid.) hervorgehoben.

Leydig publicirt (Archiv für Anat. u. Physiol. 1857. S. 404, Taf. XVI, Ann. and Mag. nat. hist. T. XX. p. 288) einen Aufsatz „über *Hydatina senta* und deren Männchen (*Enteroplea hydatina*) mit Bemerkungen über die äussere und innere Organisation dieser Thiere“, durch welche die Angaben von Cohn (J. B. XXII. S. 392) in manchen Einzelheiten berichtigt werden.

Besonders hervorzuheben sind die Bemerkungen Verf.'s über den Bau des Räderorganes und die männlichen Organe. Den schon von Cohn beschriebenen *Suspensor testis*, der sich bis zur Stirnwand fortsetzt, nimmt Verf. — und allem Anschein nach mit Recht — als Rudiment des Darmkanals in Anspruch. Die „Harnconcremente“ liegen im Innern dieses strangförmigen Rudimentes, dem der Hoden angewachsen ist, und keinesweges in einem besonderen sackförmigen Behälter; eine Thatsache, die wohl geeignet erscheint, denselben die Bedeutung von Excretionsstoffen zu sichern.

Ehrenberg fand in den von Gebr. Schlagintweit auf der Höhe des Himalaya (18000') gesammelten Erdspuren u. a. auch augenlose *Callidien*, die mit denen der Monte-Rosa-Spitzen meist identisch zu sein scheinen. Berl. Monatsber. 1857. S. 585.

Leydy giebt eine kurze Notiz über ein eigenthümliches ($\frac{1}{5}$ ''' grosses) Thierchen, *Dictyophora* (n. gen.) *vorax* n. sp., das durch die Bildung und die beständige Bewegung seiner Schlundkiefer, wie durch andere Charaktere den Rotiferen verwandt scheint, statt des Räderorganes jedoch am

abgestutzten Vorderleibsende ein becherförmiges Greiforgan trägt, das nach hinten in die Mundöffnung hineinführt und in den Körper zurückgezogen werden kann. Es lebt im fließenden Süßwasser Nord-Amerikas (Delaware) und ist an Steinen und abgestorbenen Stämmen befestigt. Proc. Acad. Philad. 1857. p. 204.

Nach einer vorläufigen Mittheilung von Semper ist der von Ehrenberg als Rotifere beschriebene *Cyphonautes compressus* die Larve einer Lamellibranchiate. Bull. Ac. de Belg. 1857. Dec. (l'Inst. 1858. p. 98). Ref. hatte in Helgoland Gelegenheit, dieses Thier gleichfalls zu beobachten und kann wenigstens so viel bestätigen, dass es mit einem Räderthiere nicht das Geringste gemein hat. Der Körper ist von einer förmlichen Schale bedeckt, die bei Druck leicht in ihre zwei Seitentheile zerfällt und nach Aussehen und Festigkeit an einen Kieselpanzer erinnert.

Bryozoa.

Die schon im letzten Jahresberichte beiläufig erwähnte Abhandlung von Allman, a monograph of the fresh-water Polyzoa. London 1856 (119 Seiten in Fol. mit 11 Tafeln) liefert nicht bloss eine sorgfältige, auf langjährige eigne Untersuchungen basirte Beschreibung aller bis jetzt bekannt gewordenen Arten dieser interessanten Thiergruppe, sondern behandelt auch in möglichst vollständiger Darstellung deren Organisation, Fortpflanzung, Lebensweise u. s. w. (Für die früheren Mittheilungen unsers Verf. über denselben Gegenstand verweist Ref. auf J. B. Bd. XX. S. 366.) Die Ray Society hat sich durch Publication dieses classischen Werkes ein ganz besonderes Verdienst erworben.

Die Körperwand der Süßwasser-Bryozoen besteht überall, mit Ausnahme der frei beweglichen *Cristatella*, aus zwei über einander liegenden Schichten, einer äussern, meist erhärteten (nur bei *Lophopus* gallertartigen) Chitinschicht und einer zelligen, von Muskelfasern (?) durchsetzten Innenlage, die an manchen Stellen, wie namentlich im vordern Körperende, vielleicht selbst in ganzer Ausdehnung, mit Flimmerhaaren versehen ist. Scheidewände zwischen den einzelnen Thierzellen sind nicht bloss bei *Paludicella*, sondern auch sonst nicht selten nachzuweisen, nur erscheinen dieselben meist viel weniger regelmässig und vollständig. Ein Pharynx findet sich unter den Süßwasserbryozoen nur bei *Paludicella*, bei der auch das Pylorialende

des Magens flimmert, während sonst die Wimperung nur auf den Mund und den anliegenden Theil des Oesophagus beschränkt ist. *Paludicella* (und *Urnatella*?) ist auch die einzige Süßwasserart, bei der die Mundklappe (epistome) und die bilaterale Bildung des Tentakelapparates, die auch bei *Fredericella* noch deutlich nachweisbar ist, vermisst wird. Die Tentakel, deren Wimperhaare bekanntlich nur in einer einzigen Reihe stehen, sind hohl und enthalten eine Flüssigkeit, die von der Leibeshöhle in dieselbe übertritt und wohl als Blutflüssigkeit gedeutet werden muss. Eine Oeffnung der Leibeshöhle nach Aussen, wie sie von andern Forschern angenommen worden, konnte nicht nachgewiesen werden. Die Muskeln dienen vorzugsweise zum Vorstossen und Zurückziehen des Kopfendes. Sie sind kräftig entwickelt, zum Theil selbst mit quergestreiften Fasern versehen. *Paludicella*, die sich durch Zahl und Verlauf der Muskeln mehrfach von den übrigen Arten unterscheidet, differirt von denselben auch durch die Invagination des Kopfendes. Das Ganglion ist einfach oder gelappt. Es entsendet jederseits einen deutlichen Nerven an die hufeisenförmige Kopfscheibe mit zahlreichen Zweigen für die einzelnen Tentakel und ausserdem noch einen Nerven an den Oesophagus. Männliche und weibliche Geschlechtsorgane sind (*Alcyonella* und *Paludicella*) in derselben Zelle mit einander vereinigt; unsere Süßwasserbryozoen sind also Hermaphroditen. Die mit zahlreichen Eikeimen erfüllten Ovarien sind an der Innenfläche der vorderen Körperwand befestigt, während die Hoden mit ihren Samenkapseln entweder auf einem von dem Magengrunde abgehenden Bande aufsitzen (*Alcyonella*) oder sich an der Insertionsstelle dieses Bandes gleichfalls der inneren Körperfläche anheften. Im letzten Falle (*Paludicella*) geht auch von dem Ovarium ein strangförmiges Ligament an den Cardiacaltheil des Magens. Samenfäden und Eier gelangen nach ihrer Reife in die Leibeshöhle, wo auch (*Alcyonella fungosa*) die Befruchtung und Entwicklung vor sich geht. Das befruchtete Ei unterliegt dem Furchungsprocesse und verwandelt sich in einen flimmernden Embryo, der noch eine längere Zeit von der ursprünglichen Dotterhaut umhüllt bleibt. Nach der Entwicklung der Flimmerhaare entsteht im Innern des ovalen Embryo ein lichter Hohlraum, der an dem einen Pole nach Aussen hindurchbricht. Die innere Auskleidung dieses Hohlraums erhebt sich sodann in Form eines ansehnlichen Zapfens, der aus der Oeffnung des flimmernden Körpers hervorwächst, Anfangs aber auch gelegentlich wieder in denselben zurückgezogen wird und schliesslich in seinem vordern Ende durch eine Art Knospung das eigentliche Thier (polypide) mit Tentakelapparat und Darmkanal entwickelt. Gewöhnlich folgt der Entwicklung dieses einen Thieres alsbald auch noch die eines zweiten, das dann neben dem ersten in den Innenraum des Zapfens hineinhängt, ganz wie der gewöhnliche Knos-

pensrössling in seine Zelle, die vor ihm aus dem gemeinschaftlichen Stamm (coenoecium) hervorkam. Ueberhaupt scheint die Bildung dieser beiderlei Sprösslinge in einer wesentlich übereinstimmenden Weise zu geschehen und zwar durch Verdickung und Metamorphose der zelligen innern Leibeswand (endocyst).

Die sog. hartschaligen Eier (statoblasts) hält Verf. für abfallende Knospen, die keiner Befruchtung bedürften (p. 57). Sie entstehen zu gewissen Zeiten an dem von dem Magenblindsacke abgehenden Stränge und erscheinen von Anfang an als Zellenhaufen ohne Keimfleck und Keimbläschen, die man an den wahren, erst von Verf. entdeckten Eiern mit Bestimmtheit nachweisen kann. Eine Dotterklüftung scheint bei diesen Fortpflanzungskörpern nicht vorzukommen, wie denn auch weiter die jungen Thiere, die aus den klaffenden Schalen derselben hervorbrechen, bekanntlich gleich von Anfang an ihre spätere Bildung haben. Bei einigen Arten findet sich ausser den gewöhnlichen, frei in der Leibeshöhle enthaltenen Statoblasten auch noch eine zweite Form dieser Körper an der Innenfläche der Körperwand befestigt.

Wenn Verf. aus seinen Beobachtungen über die Entwicklung der Bryozoen den Schluss zieht, dass diese Thiere (p. 41) keine so einfache morphologische Individualität besitzen, wie man gewöhnlich annahm, so ist er dazu gewiss vollkommen berechtigt. Aus dem befruchteten Ei entsteht zunächst nur der flimmernde Embryo, der sich durch Ausscheidung einer äusseren Chitindecke in die Thierzelle verwandelt und erst durch Knospung in seinem Innern das Polypid d. h. das tentakeltragende Thier mit Verdauungsapparat entwickelt. Es sind also zwei Generationen polymorpher Individuen, die das Bryozoon im gewöhnlichen Sinne des Wortes zusammensetzen, ganz ähnliche Verhältnisse also, wie sie auch bei den Blasenwürmern vorkommen. (Verf. hätte zur Unterstützung seiner Ansicht hier auch auf die sog. Avicularien verweisen können, deren individuelle Natur an einem anderen Orte, S. 54 ausdrücklich anerkannt wird.) Aber Verf. bleibt dabei nicht stehen. Er glaubt sich berechtigt, auch das Ovarium, das in einer dem Polypiden wesentlich gleichen Weise an dem Endocyst entsteht, als eine individuelle Bildung in Anspruch zu nehmen und möchte dieselbe Auffassung sogar auf den Hoden übertragen obwohl dieser nicht an der Thierzelle, sondern vielmehr am Polypiden hervorknospet.

Was die systematischen Beziehungen der Bryozoen betrifft, so entscheidet sich Verf. mit aller Bestimmtheit für die Molluskennatur derselben. Er legt dabei das Hauptgewicht auf die Aehnlichkeit der Bryozoen mit den Ascidien und glaubt eine vollständige Homologie beider Gruppen nachweisen zu können (p. 43 sq.), wie er da auch schon früher (J. B. XX. S. 356) versucht hat.

Eine besondere eingehende Behandlung findet auch die Geschichte unserer Kenntnisse über die Süßwasserbryozoen (p. 56—75).

Die Mittheilungen desselben Verf's. „on the signification of the so called ova of the hippocrepian Polyzoa and on the development of the proper Embryo in these animals“ (Rep. br. Assoc. at Glasgov. Lond. 1856. p. 118) enthalten, den vorstehenden Beobachtungen gegenüber, nichts Neues.

In Carus, Icon. zoot. Tab. XVII. Fig. 1—6 sind gleichfalls von demselben Verf. einige Abbildungen über Bryozoen publicirt, von denen wir namentlich die Fig. 1, *Plumatella repens* in ihrer Zelle, als eben so gelungen, wie instructiv hervorheben.

Allman liefert auch einige Notizen über den Bau von *Pedicellina* und macht darauf aufmerksam, dass sich dieselbe durch den Bau des Tentakelapparats, durch Anwesenheit der Mundklappe und Mangel des Pharynx weit mehr den Süßwasserbryozoen mit hufeisenförmiger Kopfscheibe, als den übrigen marinen Formen anschliesse. Der Bau des Tentakelapparates ist aber insofern eigenthümlich, als die beiden Schenkel des Hufeisens hier den After umfassen, und dieser dadurch auf die Kopfscheibe zu liegen kommt. Der Leberbelag des Magens ist in der kleinen Curvatur zu einer ansehnlichen Drüsenmasse entwickelt. Zwischen Oesophagus und Ganglion öffnet sich ein Flimmerkanal, dessen weiterer Verlauf nicht verfolgt werden konnte, vielleicht der Stamm eines Wassergefäßsystems. A monograph etc. p. 19 sq. Note (oder Edinb. new phil. Journ. VI. p. 155; Proc. Edinb. Soc. 1857).

Redfern hält auf der Britischen Naturforscherversammlung in Dublin einen Vortrag über den Bau von *Frustella*, ohne seine Beobachtungen jedoch in detaillirter Weise zu publiciren. Journ. micr. Sc. VI. p. 79.

Allman proponirt in der oben schon angezogenen Monographie (p. 10) folgende Eintheilung der Bryozoen:

- A. *Phylactolaemata*. (*Hippocrepia* Gerv. p. p.) Lophophore bilateral; mouth with an epistome.
 - 1. *Lophopea*. Arms of lophophore free or obsolete.
 - 2. *Pedicellinea*. Arms of lophophore united at the extremities.
- B. *Gymnolaemata*. (*Infundibulata* Gerv. p. p.).
 - 3. *Urnatellea*. Polypide only partially retractile?

4. *Paludicellea*. Polypide completely retractile; evagination of tentacular sheath imperfect.
5. *Cyclostomata*. Polypide completely retractile; evagination perfect; orifice of cell destitute of moveable appendage. (Adde: Position of the orifice of the cell terminal. Cells arise by gemmation one from the other.)
6. *Ctenostomata*. Polypide completely retractile; evagination perfect; a circle of setae attached to the invertible portion and acting as an operculum in the retracted state. (Adde: orifice terminal. Cells arise each separately from a common tubular stem, with whose cavity that of the cells communicates.)
7. *Cheilostomata*. Polypide completely retractile; evagination perfect; orifice of the cell with a moveable lip. (Adde: Position of the orifice of the cell sub-terminal. Cells arise by gemmation one from another.)

(Die Zusätze sind nach den Bemerkungen des Recensenten in dem Journ. micr. Sc. VI. p. 36 hinzugefügt.)

Die Süsswasserformen vertheilen sich dabei folgendermaassen:

Lophopea:

Fam. *Cristatellidae*. Conoecium free, locomotive.

Gen. *Cristatella* Cuv. Conoecium sacciform, hyaline, with a common flattened disc adapted for locomotion; orifices placed on the surface opposite to the disc, and arranged in several concentric marginal series. Statoblasts orbicular, with an annulus and marginal spines.

Sp. *Cr. mucedo* Cuv. (= *Cr. mirabilis* Dal.)

Fam. *Plumatellidae*. Conoecium rooted.

Gen. *Pectinatella* Leidy. Lophophore with two long arms. Conoecium massive; ectocyst gelatinoid; statoblast orbicular, with marginal spines.

Sp. *P. magnifica* Leidy.

Gen. *Lophopus* Dum. Lophophore with two long arms. Conoecium sacciform; ectocyst gelatinoid; statoblasts oval, destitute of spines.

Sp. *L. crystallinus* Pall.

Gen. *Alcyonella* Lam. Lophophore with two long arms. Conoecium tubular, tubes united; ectocyst pergamentaceous.

Sp. *Alc. fungosa* Pall., *Alc. Benedeni* Allm., *Alc. flabellum* van Ben.

Gen. *Plumatella* Lam. Lophophore with two long arms. Conoecium tubular, tubes distinct; ectocyst pergamentaceous.

Sp. *Pl. repens* Linn. (= *Pl. nitida* Leidy?) *Pl. stricta* Allm. (= *Pl. repens* van Ben.), *Pl. punctata* Hank., *Pl. vesicularis* Leidy,

Pl. fruticosa Allm., *Pl. coralloides* Allm., *Pl. emarginata* Allm., *Pl. diffusa* Leidy, *Pl. Allmanni* Hank., *Pl. elegans* Allm., *Pl. Dumortieri* Allm., *Pl. jugalis* Allm.

Gen. *Fredericella* Gerv. Arms of lophophore obsolete.

Sp. *Fr. sultana* Blumenb.

Urnatella.

Fam. *Urnatellidae*.

Gen. *Urnatella* Leidy (J. B. XXII. p. 405).

Sp. *U. gracilis* Leidy.

Paludicella.

Fam. *Paludicellidae*.

Gen. *Paludicella* Gerv. Conoecium membrano - corneous branched; branches composed of a series of claviform celles placed end to end and separated from one another by complete septa; orifices tubular, lateral, placed near the wide extremity of each cell. Lophophore orbicular, no epistome or calyx. Statoblasts not observed. Sp. *P. Ehrenbergi* van Bened. (= *P. procumbens* Hank.?).

Alle 21 Arten sind auf der nördlichen Halbkugel zu Hause.

Alder beschreibt in dem Quarterly Journ. micr. Sc. V. p. 247 folgende Bryozoen der engl. Küste:

Membranipora membranacea Linn., *M. lineata* Linn., *M. spinifera* Johnst., *M. craticula* n. sp., *M. Pouilletii* Aud., *M. unicornis* Flem., *Bugula fastigata* Fab., *Salicornia sinuosa* Hass., *Alcyonidium mamillatum* n. sp., *A. albidum* n. sp., *Farella pedicellata* n. sp. (Die drei letzten Species sind — nach Alder — schon früher von Busk beschrieben. Ibid. p. 24., J. B. XXIII. S. 213).

Derselbe liefert ferner Beschreibung und Abbildung einer neuen Art des Gen. *Bugula*, *B. turbinata* Ald. Ibid. p. 174.

Auch Hinks veröffentlicht Beobachtungen über einige neue britische Bryozoen: *Scruparia clavata* und *Alcyonidium hexagonum*. Ibid. p. 175, mit Bemerkungen über *Farella elongata* (Laguncula cl. van Bened.). Ibid. p. 250.

Weitere neue Bryozoen werden von Busk beschrieben (ibid. V. p. 172): *Onchopora Sinclairii* Neu-Seeland, *Lepralia thyreophora* ebendaher.

Macdonald handelt (Ann. and Mag. nat. hist. T. XIX. p. 390) über ein mit *Vesicularia* und *Bowerbankia* verwandtes neues Bryozoon der Australischen Küste.

Alder's Verzeichniss der an der Küste von Northumberland vorkommenden 86 Bryozoen (Transact. Tyneside Natur. Field Club 1856?) ist Ref. nicht zu Gesicht gekommen. Ebenso wenig Trask über Californische Bryozoen Proc. Cal. Acad. Vol. II.

II. Echinodermata.

Nach den Beobachtungen Köl liker's (Untersuch. zur vergl. Gewebslehre S. 40) tragen die Cylinderzellen des Tractus intestinalis bei den Echinodermen mehr oder minder stark verdickte Epithelialsäume und Flimmerhaare, doch scheint es, dass diese Bildungen mitunter auf verschiedene Zellen vertheilt sind. (Bei *Holothuria tubulosa* konnte keine Flimmerung gefunden werden.) Ganz ebenso verhalten sich auch die Epithelialzellen der Magenanhänge bei den Asteriden.

Auch auf der äusseren Körperhaut der Echinodermen liess sich an vielen Stellen, besonders den Füsschen und Pedicellarien, eine zarte Cuticula nachweisen. Ebendas. S. 59.

Williams überzeugt sich durch Beobachtungen und Experimente davon, dass der Madreporenkanal der Echinodermen nicht, wie man bisher annahm, zur Wassereinfuhr, sondern vielmehr zur Ausscheidung diene. Ann. and Mag. nat. hist. T. XIX. p. 55.

Verf. brachte einen lebenskräftigen Seestern in ein Gefäss, das er sodann bis an die Madreporenplatte mit Wasser füllte und sah nun, wie die Oberfläche des Wassers von Zeit zu Zeit durch Wellen, die von der Madreporenplatte ausgingen, in Bewegung gerieth. Ein Einstürmen des Wassers konnte nicht beobachtet werden. (Auch bei den Nemertinen soll durch die seitlichen Spaltöffnungen das Wasser austreten und keineswegs einströmen.)

Lütken publicirt (Separatabdruck aus den Vedenskab. Meddelelser for 1857. p. 1 ff.) „Oversigt over Grönlands Echinodermata samt over denne Dyreklasses geographiske og bathymetriske Udbredningsforhold i de nordiske Have“, Kjöbenhavn 1857 (109 Seiten in 8. mit 1 Karte), und liefert darin ausser einer sorgfältigen, mit zahlreichen kritischen Bemerkungen durchwebten Beschreibung der bisher an der Grönländischen Küste beobachteten Echinodermen (p. 1—56) eine Abhandlung über die geographische (p. 56—99) und bathymetrische Verbreitung dieser Geschöpfe, die in vielfacher Beziehung, nicht bloss als Beitrag zur Kenntniss der nordischen Fauna, unser Interesse in Anspruch nimmt.

Wir heben daraus die Bemerkung hervor, dass die Seesterne (Ophiuren und Asteriden) das arctische Clima besser ertragen, als die

Seeigel und Holothurien und einen weit grösseren Theil der nordischen Fauna ausmachen, als das in den tropischen Gewässern der Fall ist. Die grösste geographische Ausbreitung besitzen: *Cucumaria frondosa*, *Psolus phantopus*, *Echinus dröbachiensis*, *Cribrella sanguinolenta*, *Solaster endeca*, *S. papposus* und *Ophiopholis aculeata*, von denen einige sogar circumpolar sind, während die mehr südlich vorkommenden Arten entweder nur der westlichen oder der östlichen Hemisphäre angehören. Die genannten Arten leben alle in einer nur wenig beträchtlichen Tiefe, wie denn Verf. überhaupt der Ansicht ist, dass die Bewohner der grösseren Meerestiefen eine geringere geographische Verbreitung besitzen, als die mit Temperaturdifferenzen mehr vertrauten höher lebenden Arten.

Philippi giebt ein Verzeichniss der bis jetzt von Chili bekannten (9) Seeigel und (7) Seesterne und beschreibt dabei zugleich „vier neue Echinodermen des Chilesischen Meeres.“ Dieses Archiv 1857. I. S. 130.

Ebenso M'Andrew und Barrett über die von ihnen zwischen Drontheim und dem Nordkap mittelst des Schleppnetzes gefischten Echinodermen: 6 Holothurien, 8 Seeigel, 12 Asteriden und 7 Ophiuren. Die neuen Arten (1 Holothurie und 3 Asteriden) sind von Barrett beschrieben. Ann. and Mag. nat. hist. T. XX. p. 43 ff. Tab. IV.

Stimpson zählt in „the Crustacea and Echinodermata of the pacific shores of North America.“ Cambridge (92 S. mit 6 Tafeln, Separatabdruck aus Journ. Bost. Soc. nat. hist. Vol. VI) 12 Holothurien, 9 Seeigel und 10 Asteriden auf, unter denen mehrere neue Arten, für die wir auf die einzelnen Gruppen verweisen. Zwei Ophiurenarten, die derselben Fauna angehören, konnten nicht näher bestimmt werden.

1. Scytodermata.

Kölliker beschreibt eigenthümliche runde Körperchen von $\frac{1}{6}$ “, die an den Darm- und Lungengefässen der *Holothuria tubulosa* ansitzen und je zwei keimbläschenartige Gebilde in sich einschliessen. (Sind nach neueren Untersuchungen Gregarinen.) Zeitschrift für wissensch. Zoologie IX. S. 138.

Derselbe berichtet (Unters. zur Gewebslehre S. 78) über die Eier dieses Thiers und giebt an, dass die Micropyle

hier nicht durch Abschnürung der Eikapsel entstehe, sondern sich oftmals an dem der Anheftungsstelle gegenüberliegenden Pole bilde.

Von Held erhielten wir eine genaue Beschreibung und Abbildung der in der Haut der Synapten vorkommenden Kalkkörperchen. Nach Untersuchungen an *S. Duvernaea*, *S. digitata*, *S. Rappardi*, *S. Zebrina*, *S. Raynaldi*, *S. intestinalis*, *S. Beselii* und *S. Astrolabi*, die in mancherlei Weise durch Grösse und Form des Ankers, wie durch die Bildung der Platte mit ihrem Bügel von einander abweichen. (Vierteljahresheft der naturf. Gesellsch. in Zürich 1857. S. 243—272. Tab. II.)

Sars liefert (Middelh. Litt. Fauna l. c. p. 120—155. Tab. 1 u. 2.) eine sorgfältige, auf genaue Untersuchung und Vergleichung mit verwandten Arten gegründete Beschreibung folgender Mittelmeerischen Holothuriën:

Cucumaria doliolum Grube, *C. syracusana* Gr., *C. Dicquemarii* Cuv., *C. tergestina* n. sp., *C. cucumis* Risso?, *C. elongata* Dub. et Kor., *Thyone fusus* Müll., *Phyllophorus urna* Gr. (= *Hol. penicillus* delle Ch.), *Ph. granulatus* Gr., *Holothuria tubulosa* Gmel., *H. regalis* Cuv., *Synapta digitata* Mont. Eine besondere Berücksichtigung finden dabei die für unsere Thiere so charakteristischen Kalkkörperchen, die bei jeder Art untersucht und abgebildet wurden. Der Beschreibung folgt fast überall eine in lateinischer Sprache abgefasste Diagnose, die, nach des Verf's Untersuchungen, hier auch von Neuem, und zwar in folgender Weise, für das Grube'sche Gen. *Phyllophorus* aufgestellt wird:

Gen. *Phyllophorus* Gr. Corpus elongatum subcylindricum vel fusiforme, pedibus per totam superficiem sparsis. Tentacula 12—16, frondoso-ramosa, saepius inaequalia, et intra ea circulus tentaculorum 5—6 (saepissime 5) longe minorum. Annulus calcareus oris obconicus, e laminis 10 constans, quarum 5, alternantes latiores deorsum appendicibus duabus longis ornatae sunt. In cute corporis et laterum pedum laminae calcarcae aut rarae, sparsae, saepius fere nullae, aut in lateribus pedum dense accumulatae; in apice pedum semper discus calcareus reticulatus, in tentaculis aciculae sparsae occurrunt. Tubi genitales simplices; apertura genitalis in papilla conica in medio collo.

Ebenso beschreibt Lütken in seiner systematischen Uebersicht der Grönländischen Echinodermen folgende Holothuriën (p. 1—24):

Cucumaria frondosa Gunn. (= *Holothuria pentactes* Fabr.), *C. Korenii* n. sp., *C. minuta* Fabr. (= *Öcnus Ayresii* Stimps. J. B. XXIII.

S. 405), *Orcula Barthii* Trosch., *Psolus phantapus* Fabr., *Ps. Fabricii* Dub. et Kor. (= *Cuvieria squamata* Auct.). *Chirodota laevis* Fabr., *Myriotrochus Rinkii* Steenstr., *Eupyrgus scaber* n. gen. et n. sp. Das letzte neue Genus charakterisirt sich durch seinen keulenförmigen, fusslosen Körper, dessen vorderes Ende mit einem Kranze unverästelter Fühler besetzt ist. In der Haut eine dichte Lage durchlöcherter Kalkplatten, deren Ränder sich in eine kegelförmige rauhe Spitze erheben. Bei *Cucumaria minuta* und *Chirodota laevis* sind die in Kopenhagen vorhandenen Handzeichnungen von O. Fabricius in Holzschnitt wiedergegeben.

In einer Nachschrift (Vidensk. Meddel. p. 338) wird hervorgehoben, dass *Chirodota discolor* Eschsch. nicht, wie Verf. ursprünglich vermuthet hatte, mit *Ch. laevis* identisch sei. und sich besonders durch die beträchtlichen Grössenunterschiede der Kalkkrädchen als selbstständige Species erweise.

Ayres macht einige Bemerkungen über mehrere früher von ihm beschriebene Holothurien (J. B. Bd. XX. S. 389) und erklärt *Bothryodactyla grandis* jetzt für identisch mit *Pentacta frondosa*, so wie *Sclerodactyla briareus* für identisch mit *Anaperus carolinus* Troschl. *Duasmodactyla* Ay. soll nicht mit *Thyonidium*, sondern zumeist mit *Orcula* Troschl. übereinkommen, ohne Veränderung der Charakteristik damit aber nicht vereinigt werden können. Proceed. Californian Acad. nat. sc. Vol. I. (1854 u. 1855) p. 98.

Von neuen Arten ist weiter noch zu erwähnen:

Cuvieria antarctica Philippi, a. a. O. S. 133.

Holothuria californica und *Liosoma arenicola* Stimpson, l. c. p. 84.

Eupyrgus hispidus von Norwegen, Barrett, Annals and Mag. nat. hist. T. XX. p. 46.

2. Actinozoa.

Echinida.

M. de Serres überzeugt sich, dass *Echinus lividus* auch im Mittelmeere mitunter, freilich nur selten, Höhlen im Gesteine bildet und glaubt, wie Cailliaud, dass solches mittelst des Zahnapparates geschehe. Cpt. rend. T. XLIV. p. 72 (vgl. J. B. Bd. XXXIII. S. 218.)

Aus den weiteren Berichten von Cailliaud (ibid. T. XLV. p. 474) scheint in der That hervorzugehen, dass diese Bohrfähigkeit sehr allgemein unter den Echinen verbreitet sei. So namentlich bei *Echinus Dalandii* und *E. Blanchardii* Mus. Par. vom Cap und aus Neu-Holland, *E. tri-*

gonarius von Isle Maur., *Helicocidaris mexicana* und *Diadema turcarum*.

Für die Kenntniss der mittelmeerischen Echiniden und deren Unterscheidung von verwandten Arten besonders wichtig sind die Bemerkungen von Sars in dem *Nyt Mag. for Naturvidenskab.* l. c. p. 109—120.

Verf. beobachtete während eines längern Aufenthaltes in Triest, Messina und Neapel folgende Arten: *Cidaris hystrix* Lamk. (von der nordischen *C. papillata* Flem. wohl zu unterscheiden), *C. affinis* Phil. (= *C. Stokesii* Ag.), *Echinocidaris aequituberculatus* (= *E. neapolitanus* delle Ch.), *Echinus melo* Lamk. (von dem nordischen *E. esculentus* L. = *C. melo* Müll. verschieden), *E. Flemingii* Forb., *E. brevispinosus* Risso (dem *E. granularis* Lamk. nur mit Unrecht als Varietät zugerechnet wird), *Echinus lividus* Lam. Forb. (keineswegs mit dem nordischen *E. dröbachiensis* Müll. = *E. neglectus* Lamk. identisch), *E. microtuberculatus* Bl. (von dem nordischen *E. miliaris* verschieden), *Echinocyamus pusillus* Müll., *Brissus Scillae* Ag. (= *Spatangus carinatus* Gr.), *Amphidotus mediterraneus* Forb. (nicht = dem nordischen *A. cordatus* Penn.), *Schizaster canaliferus* Lamk., *Spatangus meridionalis* Risso (von dem nordischen *S. purpureus* Müll. verschieden).

Ueber *Echinus dröbachiensis* Müll. und dessen Vorkommen in Grönland vergl. Lütken. *Oversicht over Grönl. Echinod.* p. 24.

Echinus purpuratus n. sp. San Franzisko, Stimpson, l. c. p. 86.

Echinus magellanicus n. sp. und *Arbacia* (*Echinocidaris*) *Schythei* n. sp. beide aus der Magalläns-Str., Philippi, a. a. O. S. 131. Ebendas. Bemerkungen über *Echinocidaris spathuliger* Gay.

Barrett veröffentlicht einige Notizen über *Amphidotus gibbosus* Ag. *Ann. and Mag. nat. hist.* T. XIX. p. 33. Pl. VII. Fig. 2.

Grube über *Brissus panis* n. sp., dieses Arch. 1857. I. S. 344.

Asterida.

Nach Krohn geht bei den unter dem Namen *Brachiolaria* und *Bipinnaria* (von Triest und Marseille) bekannten Asteridenlarven der Larvenrest durch allmähliche Resorption und nicht durch Abstossung verloren. *Archiv für Anat. und Physiolog.* 1857. S. 374. Anm.

Mad. Power berichtet über die Nahrungsaufnahme der *Asterias aurantiaca* und giebt an, dass dieselbe grosse Quantitäten von Gasteropoden verzehre. *Ann. and Mag. nat. hist.* T. XX. p. 335.

Nach den Untersuchungen von Williams sollen die sog. Tracheen der Asteriden in gleicher Weise, wie die im Umkreise des Mundes bei den Echiniden stehenden sog. Kiemen, trotz den widersprechenden Angaben anderer Beobachter, als Respirationsorgane dienen. Rep. br. Assoc. 26. Meet. p. 101, l'Institut. 1857. p. 62.

Sars liefert ein Verzeichniss der von ihm im Mittelmeere beobachteten Arten und macht dabei zahlreiche Bemerkungen kritischer und diagnostischer Natur (Middelh. Littor. Fauna l. c. p. 100–109).

So besonders über *Luidia Savignyi* M. et Tr. und die nahe verwandte nordische *L. Sarsii* Dub. et Kor., über *Astropecten bispinosus* M. et Tr., *A. spinulosus* M. et Tr., *A. pentacanthus* M. et Tr., *A. subinermis* M. et T., *Ophidiaster ophidianus* M. et Tr., *Asteracanthion tenuispinus* M. et Tr.

In ähnlicher Weise handelt Lütken über folgende Grönländische Seesterne:

Asteracanthion polaris M. et Tr., *A. grönlandicus* Steenst., *A. problema* Steenstr., *Cribrella sanguinolenta* Müll. (= *Echinaster Sarsii* M. et Tr. mit zahlreichen Synonymen), *Solaster endeca* L., *S. papposus* L., *Pteraster militaris* Müll., *Ctenodiscus crispatus* Retz. (= *Ct. polaris et pygmaeus* M. et Tr.), Overs. over Grönland's Echinod. p. 27–48.

Stimpson beschreibt vier neue Asteriden aus Californien: *Asterias* (*Asteracanthion* M. et Tr.) *brevispina*, *A. gigantea*, *Linckia leviuscula* und *Mediaster* (n. gen.) *aequalis*. L. c. p. 87 ff. (Das neue Gen. *Mediaster*, das übrigens nicht näher charakterisirt wird, scheint zunächst mit *Ophidiaster* Ag. verwandt zu sein und dürfte sich davon vielleicht nicht einmal generisch abtrennen lassen.)

Grube diagnostieirt (Archiv für Naturgesch. 1857. I. S. 340) folgende neue Asteriden: *Astropecten ciliatus* Gr. von Puerto Cabello, *Asteropsis imbricata* Gr. von Sitcha, *Scytaster cancellatus* Asm. Gr., *Echinaster deplanatus* Asm. Gr., *Ech. rigidus* Asm. Gr., *Ech. lacunosus* Gr., *Oreaster lapidarius* Gr., die fünf letzten von unbekanntem Fundorte.

Ebenso Barrett (Ann. and Mag. nat. hist. T. XX. p. 46. Tab. IV) *Astropecten Lütkeni*, *Astrogonium aculeatum* und *A. boreale*, alle drei von der Norwegischen Küste.

Goniodiscus verrucosus n. sp. Philippi, a. a. O. S. 132.

Ophiurida.

Nach Krohn's interessanter Entdeckung (über einen

neuen Entwicklungsmodus der Ophiuren, Archiv für Anat. und Physiol. 1857. S. 369. Taf. XIV) giebt es Ophiuren, die sich in einer dem Gen. *Asteracanthion* und *Echinaster* ganz analogen Weise entwickeln.

Verf. beobachtete diese Entwicklungsweise bei zwei Arten, deren flimmernde Embryonen auf hoher See bei Madeira gefangen wurden. Der Embryo ist bei beiden Arten keulenförmig, gegen das eine Ende hin verschmächtigt und abgerundet, an dem andern entgegengesetzten Ende abgestutzt. Der hintere massige Leibesabschnitt wird immer grösser und verwandelt sich in den Seestern, dem dann das vordere Ende zapfenartig zwischen zweien Ecken aufsitzt. Seestern und Zapfen liegen übrigens nicht in derselben Ebene; sie stehen vielmehr unter einem bestimmten Winkel auf einander und zwar so, dass der Zapfen der Rückenfläche aufsitzt. Bei der einen Art wächst dieser Zapfen noch eine Strecke weit über die Anlage des Seesterns hinaus, so dass man denselben noch in einer späteren Zeit in Gestalt zweier ungleich langer Anhänge über den Rand des Pentagons hervorragend sieht. Die Mundöffnung entsteht sehr frühe, noch vor Abflachung des Sternes, am hinteren Ende des Embryo. Die Zapfen schwinden bei weiterer Ausbildung des Sterns und werden keineswegs abgeworfen.

Für die von J. Müller beobachtete „wurm förmige Asteridenlarve“ (J. B. XX. S. 397) vermuthet Verf., trotz der abweichenden Körperform, dieselbe Entwicklungsweise und ein gleiches Endziel der Metamorphose.

Sars liefert eine Reihe systematisch wichtiger Bemerkungen über die von ihm im Mittelmeere aufgefundenen Ophiuriden und beschreibt dabei zugleich einige neue Arten (Middelhav. Littor. Fauna l. c. p. 74—100. Mit Abbild.).

Die beobachteten Arten sind folgende: *Astrophyton arborescens* Müll. et Tr., *Ophiothrix fragilis* O. Fr. Müll. mit Var. (*O. tenuispina* Sars), *Ophiacantha scabra* n. sp. (mit *O. setosa* M. et Tr. nahe verwandt), *Ophianoplus annulosus* n. gen. et n. sp., *O. marmoreus* n. sp. von Tanager, *Ophiolepis squamata* delle Ch. (= *O. neglecta* Forb.), *Amphiura filiformis* O. Fr. Müll., *A. Chiajæ* Forb. (von der nahe verwandten *A. Sundevallii* M. et Tr. = *A. Holbölli* Lüt. spezifisch verschieden), *A. (Ophiactis) Lüt. neapolitana* n. sp., *A. (Ophiactis) virens* Sars = *Ophiolepis Ballii* M. et Tr. (nicht *Tompson*, dessen *O. Ballii* eine andere, selbstständige Art ist), *Ophiura ciliata* Retz., *O. albida* Forb. und *Ophioderma longicauda* M. et Tr. Den vom Verf. schärfer unterschiedenen Arten sind lateinische Diagnosen beigelegt. Ebenso dem neuen Gen. *Ophianoplus*, das folgenmaassen charakterisirt ist.

Gen. n. *Ophianoplus* Sars. Rimae genitales inter brachia binae. Fissurae orales ad partem aboralem papillis duris instructae; accervus papillarum dentalium sub columnis dentium. Discus omnino nudus et cute molli tectus, absque scutis radialibus. Brachia scutata, absque omni molliore integumento, spinis lateralibus laevibus. Papillae spiniformes ad poros tentaculares.

Für die Grönländischen Ophiuren verweisen wir auf Lütken, der diese Thiere schon früher einmal (J.B.XXII.S.409) untersuchte, jetzt aber weitere Bemerkungen mittheilt über:

Ophiura Sarsii Lütk. (dazu auch *O. coriacea* Lütk.), *O. squamosa* Lütk., *O. nodosa* Lütk., *O. Sturwitsii* n. sp., *Ophiocten Kroyeri* Lütk., *Amphiura Holbölli* Lütk., *Ophiopholis aculeata* Müll. (= *Oph. scolopendrica* M. et Tr.), *Ophiacantha spinulosa* Müll. et Tr. (synonym mit *O. grönlandica* und *O. arctica* M. et Tr.), *Ophioscolex* sp., *Astrophyton eucnemis* M. et Tr. Overs. over Grönl. Echinod. p.48—54.

Weitere neue Arten beschreibt Grube (dieses Arch. 1857. I. S.343): *Ophiocoma variabilis* von Woahu, *Ophiolepis limbata* von Rio Janeiro, *O. sexradia* von Honolulu, *Ophiothrix alba* aus der Südsee.

3. Crinoidea.

Beyrich handelt „über die Crinoideen des Muschelkalkes“ (Abh. der Berl. Akad. aus dem Jahre 1857. S. 1—51, mit 2 Taf.) und liefert dabei eine sehr detaillirte Beschreibung des *Encrinus liliiformis*.

Barrett beschreibt eine neue schöne und grosse Comatula: *C. Woodwardii* n. sp. Englische Küste. Ann. and Mag. nat. hist. T. XIX. p. 33. Pl. VII. fig. 1.

Ueber Comatula europaea Leach (*C. mediterranea* Lam.) und besonders deren Unterschiede von der nahe verwandten nordischen *C. petasus* Düb. et Kor. vgl. Sars, Middelh. Litt. Fauna l. c. p.73.

Lütken giebt einige Notizen über die Grönländische *Alecto Eschrichtii* Müll. Overs. over Grönl. Echin. p.55.

III. Coelenterata.

Schon der letzte Jahresbericht hat den Beweis geliefert, dass die natürliche Verwandtschaft der Akalephen und Polypen in immer weiteren Kreisen Würdigung und Aner-

kennung findet. Wir freuen uns, dieses Mal ein Gleiches berichten zu können.

Sars spricht (Middelhavets Littoral Fauna l. c. p. 72) von einem Kreise der Coelenteraten und der Echinodermen als natürlichen grossen Abtheilungen und Milne Edwards (hist. natur. des Coralliaires l. p. 4) unterscheidet in ähnlicher Weise Echinodermen und Coelenteraten als Unterabtheilungen der Radiaten, die ihrerseits mit der „Sarcodaires“ (den Spongien und Rhizopoden) zusammen die Gruppe der Zoophyten ausmachen. Die Coelenteraten zerfallen nach Milne Edwards am natürlichsten in zwei Gruppen: 1) die Akalephen mit den Classen der Medusen, Siphonophoren und Hydren, welche letztere von den hydroiden Medusenamen wohl zu trennen sind — wo die Ctenophoren oder Acalephes ciliogrades M. Edw. bleiben, ist nicht gesagt — und 2) die Corallen oder Polypen, welchen letzten Namen Verf. jedoch verwirft oder vielmehr nur in einem anderen Sinne, zur Bezeichnung der Weichtheile (Köpfchen) bei den Bryozoen, Hydroiden, Corallen, kurz allen früheren sog. „Polypen“, gebraucht wissen will.

V. Carus unterscheidet in der Abtheilung der Coelenteraten, jetzt gleichfalls, wie Ref., als Gruppen die Hydromedusen, Anthozoen und Ctenophoren, statuirt aber wegen des — freilich keineswegs constant vorhandenen — Magenschlauches zwischen den beiden letztern eine engere Beziehung. Icones zootomicae, einleitende Bemerkungen.

In Betreff der äusseren Bedeckungen der Coelenteraten ist die Bemerkung von Kölliker (Unters. zur vergl. Gewebslehre S. 80) hervorzuheben, dass die meisten dieser Thiere im ausgebildeten Zustande (Akalephen, Polypen) der Cuticula entbehrten und ein einfaches Epithel trügen, das nur bei den Quallenpolypen eine dicke und feste, geschichtete Cuticula absondere. (Auch das Achsenskelet der Gorgoniden dürfte wohl hierher gehören Ref.)

1. Ctenophora.

Kölliker liefert eine Abbildung der von ihm schon bei früherer Gelegenheit beschriebenen jungen Rippenquallen, Icon Zoot. von Carus, Tab. IV. Fig. 27–29.

Milne Edwards handelt über den Gastro-Vascular-apparat der Ctenophoren, besonders der *Chiaja Palermitana* n. sp., *Cestum Veneris* und *Cydidippe* sp., deren Gefässsystem ausführlich beschrieben und durch vortreffliche Abbildungen erläutert wird. (Ref., der über denselben Gegenstand specielle Studien gemacht hat, sieht sich im Stande, den Angaben des Verf. fast bis in's Detail hinein beistimmen zu können.) Verf. erklärt den betreffenden Apparat, wohl in Uebereinstimmung mit der grössten Mehrzahl der Anatomen, für ein Blutgefässsystem und sucht die entgegenstehenden Angaben von Will — wie das übrigens nicht Forbes, sondern Ref. zuerst gethan hatte — als irrthümlich nachzuweisen. Bei *Cestum* soll übrigens neben den oberen Rippengefässen in Wirklichkeit ein Canal vorkommen, der sich von Zeit zu Zeit durch einen Seitenast nach Aussen öffne, jedoch wird dieser Canal als ein Excretionsorgan in Anspruch genommen. Annal. des sc. nat. 1857. T. VII. p. 285 — 298. Tab. 14—16.

Ebendas. spricht Milne Edwards gelegentlich über das Gen. *Chiaja* Less. (= *Leucothoe* Mert.) und dessen drei bis jetzt bekannte Arten: *Ch. papillosa* delle Chiaje, *Ch. multicornis* Will und *Ch. Palermitana* n. sp. l. c. p. 286.

Sars berichtet über die von ihm in Messina beobachteten Ctenophoren (Middelhav. Litt. Fauna l. c. p. 70) und beschreibt als neu: *Mnemia elegans* (= *Eurhamphaea vexilligera* Gegenb. J.B. XXIV. S. 229) und *Cydidippe plumosa* (= *C. hemiphora* Gegenb.).

2. Hydrasmedusae.

Gegenbaur liefert in den einleitenden Bemerkungen zu V. Carus, Icon. zoot. eine sehr übersichtliche schematische Darstellung der Morphologie und des Generationswechsels bei den Hydrasmedusen. Wir empfehlen diese Darstellung namentlich denjenigen, die noch immer an der morphologischen Identität der sg. Geschlechtskapseln mit den sehr hoch organisirten, selbstständigen Medusen zweifeln. Auch die über Hydrasmedusen handelnden Tafeln (II und III) sind, mit Ausnahme weniger Figuren, nach Gegenbaur'schen, theilweise noch unedirten Zeichnungen zusammengestellt.

Acalephae.

Nach den Beobachtungen Kölliker's zeigen die in der Gallertscheibe von *Cassiopeia borbonica* vorkommenden Bindegewebskörperchen deutliche, aber nur langsame Contractionerscheinungen. Unters. zur vergl. Gewebslehre S. 121. Dasselbe sah Huxley auch an den Bindegewebskörperchen von *Cyanea* (engl. Uebersetzung von Kölliker's mikr. Anat. I. p. 46. Anm.).

Gegenbaur liefert auf Tab. II. Fig. 17 der *Icones zoot.* von Carus eine Abbildung von *Nausithoe albida* Ggbr.

Corbetteklärt die Geschlechtsorgane der phanerocarpen Medusen für Respirationsorgane und behauptet, dass dieselben durch besondere centripetale Gefässe versorgt würden. Rep. br. Assoc. 26. Meet. p. 91.

Sars bespricht in der Versammlung der skandinavischen Naturforscher in Christiania (dieses Archiv 1857. I. S. 117, *Nyt Mag. for Naturvidensk.* IX. p. 334) die zwischen Desor und ihm in Betreff der Medusenentwicklung (*Strobila-Scyphistoma*) obwaltenden Differenzen und findet den Grund derselben, wie Gegenbaur (J. B. XXIII. S. 234) und auch früher schon Ref. (J. B. XXII. S. 417), in dem Umstande, dass Desor nur ältere Entwicklungsstadien mit bereits abgelösten oberen Medusenscheiben vor Augen gehabt habe.

Sars giebt ein Verzeichniss der von ihm in Messina beobachteten Medusen (*Middelhavet's Littoral-Fauna* I. c. p. 57) und macht dabei auf das zwischen bestimmten kleinen Fischen und gewissen Medusenarten stattfindende Verhältniss aufmerksam, das er als eine Art Parasitismus auffassen möchte. Er fand unter der Scheibe von *Cassiopeia borbonica* drei Mal ein Paar kleine Fischchen, die als *Schedophilus medusophagus* Cocco erkannt wurden und bemerkt, dass Malm schon bei früherer Gelegenheit das Vorkommen junger Individuen von *Caranx trachurus* unter *Cyanea capillata* beobachtet habe. (Ebenso Peach, J. B. XXII. S. 412, der dieses Verhältniss freilich in etwas andrer Weise deutet. Ref. hat während seines letzten Aufenthaltes in Helgoland dieselbe Beobachtung gemacht und unter den grössern Exemplaren von *Chrysaora isoscela* fast regelmässig einige kleine Fische gefunden),

die nach Troschel's Untersuchung gleichfalls junge Individuen von *Caranx trachurus* sein dürften.

Hydroideae.

Proles medusiformis. Sars beobachtete bei *Geryonia proboscidalis* die von Gegenbaur entdeckten centripetalen Gefässanhänge des Ringkanales (J.B. XXIII S. 239) und giebt an, dass die Zahl derselben mit dem Alter — zwischen je 2 Radialgefässen — von 1 bis auf 5 steige. Middelhav. Littor. Fauna l. c. p. 58.

Bei einer frühern Gelegenheit hat Gegenbaur behauptet, dass der Stiel der *Geryonia* von einem einfachen canalförmigen Hohlraum durchzogen sei (J. B. XXIII S. 240); gegenwärtig publicirt derselbe dagegen eine Abbildung (in den Icon. zoot. von V. Carus Tab. II. Fig. 9), in welcher der Verlauf der aus dem Magengrunde entspringenden sechs Stielgefässerichtig angegeben ist. Auch die oben erwähnten centripetalen Gefässanhänger des Ringkanals sind deutlich zu sehen.

Ebendas. liefert Gegenbaur (Fig. 6, 7) auch eine Abbildung von *Cunina globosa* Eschsch.

Cobbold liefert Beschreibung und Abbildung einer neuen Thaumantiasart (*Eucope* Gegenb. *Phialidium* Lt.): *Th. achroa* Cobb. mit 5 Otolithen in jedem Randbläschen. Journ. micr. Sc. VI. p. 1—5. Pl. I.

Ueber die gleichfalls dem Gen. *Eucope* zugehörenden Medusensprösslinge von *Laomodea acuminata* und *Campanularia Johnstoni* vergl. die weiter unten ausgezogenen Beobachtungen von Wright.

Proles hydriformis. Schon in einem frühern Berichte haben wir (Bd. XX. S. 431) der von Allman über die Fortpflanzungsverhältnisse der Hydraspolypen publicirten Arbeiten Erwähnung gethan und hervorgehoben, dass derselbe einer der ersten Zoologen gewesen sei, welche die morphologische Uebereinstimmung der bei vielen dieser Thiere vorkommenden sg. Geschlechtskapseln mit den sonst von denselben aufgeamnten Medusen erkannt haben. Eine neue Arbeit unseres Verf. ist demselben Gegenstande gewidmet: on the reproductive Organs in certain hydroid polypes, new Edinb. phil. Journ. Vol. VII. p. 294—303.

Verf. sucht zunächst den neu gewonnenen Anschauungen eine neue Terminologie zu substituiren; er benennt die Geschlechtsknospen

der Hydraspolypen, ganz abgesehen von deren spezifischer Entwicklung, als Gonophoren und unterscheidet dieselben bald als Sporosacs (Geschlechtskapseln, sessile Geschlechtsthier), bald als Medusen (freie Geschlechtsthier). Wo diese Geschlechtsknospen einzeln vorkommen, da spricht er von einer Gonophora simplex, wo sie aber in grösserer Anzahl einem gemeinschaftlichen Stamme („blastostyle“) anhängen, von einer Gonoph. composita. Der letztere ist bald nackt, wie z. B. bei Tubularia, bald auch von einer besondern Kapsel umschlossen, z. B. bei Campanularia. (Verf. scheint hier zu übersehen, dass beiderlei Bildungen in morphologischer Beziehung schwerlich übereinstimmen, indem die von einer Kapsel umgebene Säule einem Polypenleibe entspricht, während der nackte Stiel an der Geschlechtsknospe der Tubularien nur eine strangartige Verlängerung an der Insertionsstelle des Geschlechtsthieres darstellt. Auch Gegenbaur's „monomere Kapseln“ sind in morphologischer Hinsicht vom Verf. nicht gehörig gewürdigt.) Für den sg. Mundstiel der Medusen und das entsprechende Achsenorgan vieler Geschlechtskapseln schlägt Verf. die Bezeichnung Manubrium vor. — Nach diesen Präliminarien schildert Verf. die Fortpflanzungskörper von Hydractinia echinata, Coryne ramosa, Clava multicornis, Tubularia coronata, Laomedea flexuosa, Antennularia antennina, Campanularia caliculata, Plumularia pinnata und Plumularia cristata, worauf er sodann die Resultate seiner Beobachtungen in folgenden Sätzen zusammenfasst. Die Gonophoren der beobachteten Arten zeigen einen dreifachen Typus; sie sind 1) einfach (Hydractinia, Cordylophora u. s. w.), 2) zusammengesetzt mit nacktem Stamm (Tubularia und Clava) und 3) zusammengesetzt mit eingekapseltem Stamm (Campanularia, Laomedea u. s. w.). Bei Plumularia cristata sind die einfachen Gonophoren in grösserer Menge zusammengruppirt und von einer gemeinschaftlichen durch Zweigm metamorphose entstandenen Kapsel eingeschlossen. Das Manubrium der Sporosacs erscheint unter vierfacher Form: 1) als einfaches Divertikel (Hydractinia, Laomedea u. s. w.), 2) unregelmässig gelappt (Plumularia pinnata), 3) mit vollständigen Gastovascularcanälen (Cordylophora), 4) als Gastovascularapparat ohne Centraltheil (Campanularia caliculata). Bei Tubularia soll die Entwicklung des Embryo nicht von dem ganzen Ei, sondern nur von einem Theile des Dotters ausgehen; doch dürfte es sehr zweifelhaft sein, ob Verf. nicht den im Umkreis des Manubrium gelegenen Eierstock für Dottermasse gehalten hat. (Beiläufig will Ref. auch bemerken, dass Tub. coronata van Ben. nach seinen Untersuchungen sich durch Bildung der männlichen und weiblichen Kapseln genau an die von Gegenbaur beschriebene Tubularia anschliesst. Vergl. Gegenbaur, Zur Lehre vom Generationswechsel u. s. w. S. 33. Die Embryonen entstehen einzeln, liegen aber doch nicht selten zu zweien oder dreien neben

einander in derselben Kapsel, dann aber immer von verschiedener Entwicklung und Grösse.)

Van Beneden schliesst sich jetzt gleichfalls der Ansicht an, dass die Geschlechtskapseln der Hydraspolypen und die Hydrasmedusen morphologische Aequivalente sind. Tageblatt der Bonner Naturforscherversammlung. S. 43.

Von Wright erhielten wir eine sehr genaue und ausführliche Darstellung von dem Bau der *Hydractinia echinata* (Edinb. new philos. Journ. V. p. 299—313 c. tab.), durch die unsere Kenntnisse über dieses Thier in mehrfacher Beziehung beträchtlich erweitert werden.

Besonders interessant sind des Verf.'s Angaben über die dem gemeinschaftlichen Mantel aufsitzenden Anhänge, die eine viel grössere Mannichfaltigkeit darbieten, als man früher wusste, und nach den hier vorliegenden Untersuchungen aus fünf verschiedenen Formen sich zusammensetzen: 1) aus den bekannten sterilen Polypenköpfen mit Mund und ausgebildeten Tentakeln (alimentary polyps), 2) den proliferirenden Polypen ohne Mund und ausgebildete Tentakel, aber mit männlichen und weiblichen Geschlechtsknospen (reproductive polyps), 3) aus besondern sessilen männlichen oder weiblichen Geschlechtsknospen, die ohne Weiteres auf dem gemeinschaftlichen Mantel aufsitzen, 4) aus cylindrischen langen Polypen ohne Mund und ausgebildete Tentakel, die wahrscheinlich zur Vertheidigung dienen und sich bei Berührung in Spiraltouren zusammenlegen (ophidian or spiral polyps) und 5) aus noch längeren, einfach cylindrischen Tentakeln (tentacular polyps). Die beiden letztern Formen haben eine beschränktere Verbreitung, als die übrigen, denn die Spiralpolypen finden sich nur in der Nähe der Schalenöffnung, an der unsere Hydractinien bekanntlich am liebsten ihren Wohnsitz aufschlagen, und ebenso die Tentakelanhänge nur an der Peripherie des Mantels. Dieser letztere wird in einer wesentlich mit Krohn übereinstimmenden Weise beschrieben, obwohl dem Verf. die Untersuchungen dieses Forschers (dies. Arch. 1851. I. S. 263) unbekannt geblieben sind. In histologischer Beziehung unterscheidet Verf. mit Allman, Huxley u. A. bei den einzelnen Theilen der Hydractinen ein Endoderm und ein Ectoderm, zwischen welche beide Schichten sich in vielen Fällen noch eine Lage glatter Muskelfasern einschleibt. Der hornige Polypenstiel bildet nur eine Ausscheidung des Ectoderm. Einen Zellenbau konnte Verf. übrigens nirgends auffinden, er glaubt die Gewebe unseres Thieres als Sarcodien bezeichnen zu dürfen. Aus den Eiern entwickelt sich, nachdem dieselben ihre Eikapseln verlassen haben, zunächst ein flimmernder Embryo, der bereits die späteren zwei Parenchymlagen erkennen lässt, auch eine Leibeshöhle im

Innern einschliesst. Wie es auch von andern Hyderoiden bekannt ist, verwandelt sich dieser Embryo sodann in einen Polypen mit Mundöffnung und (vier) Tentakeln, dessen unteres basales Ende durch Stolonenbildung sich zu dem sg. Mantel entwickelt. Trotz allen diesen That-sachen trägt Verf. übrigens kein Bedenken, die ausgewachsene Hydractiniencolonie als ein einziges Individuum in Anspruch zu nehmen, dessen Körper durch den gemeinschaftlichen Mantel repräsentirt werde und mit besonderen Organen für Ernährung, Fortpflanzung, Vertheidigung und Fang versehen sei. Die Richtigkeit dieser Auffassung sucht Verf. noch dadurch besonders zu beweisen, dass er unsre Hydroidcolonie mit einer Scheibenqualle vergleicht, und hervorhebt, dass bei dieser der Schirm ja gleichfalls einen Mantel darstelle, dem ein Ernährungsorgan (Mundstiel), Geschlechtskapsel und Tentakel in ähnlicher Weise aufsitze. (Eine noch weitere Ausführung dieser Ansichten giebt Verf. an einer spätern Stelle: l. c. VI. p. 87.)

Derselbe liefert auch eine Reihe von Beobachtungen über Britische Zoophyten („observations on british Zoophytes“). Die ersten dieser Beobachtungen handeln über *Clava* und *Eudendrium* und enthalten die Beschreibungen einiger neuer Arten mit besonderer Berücksichtigung der Fortpflanzungsverhältnisse (Edinb. new phil. Journ. VI. p. 79 sq. Tab. II u. III).

Von *Clava* (Coryne) beschreibt der Verf. drei neue Arten: *Cl. repens*, *Cl. membranacea* und *Cl. cornea*, die alle drei einen gemeinschaftlichen hornigen Polypenstiel besitzen, der auf Steinen oder Fucoiden hinkriecht, in seiner speciellen Bildung jedoch mancherlei Verschiedenheiten zeigt. Ihre Geschlechtskapseln stehen in grösseren Gruppen neben einander und enthalten meist je zwei Eier im Innern, die noch an ihrer Bildungsstätte in flimmernde Embryonen (planulae) sich verwandeln. Zwei kleine und unscheinbare neue Arten des Gen. *Eudendrium*, *E. pusillum* und *E. sessile*, beide mit einem kriechenden Stamme, produciren frei schwimmende Akalephen, die Verf. übrigens nicht als besondere Individuen und Nachkömmlinge des Polypenstocks, sondern bloss als besondere Entwicklungen desselben („as a free and independent extension of the polypary part of *Eudendrium*“) betrachtet wissen will.

Eine zweite Mittheilung (Ibid. T. VII. p. 108—117. Pl. I—III) handelt über *Laomedea acuminata* Ald., *Trichydra pudica* (n. gen. et n. sp.) und *Tubularia indivisa*.

Die proliferirenden Kapseln von *Laomedea* enthalten stets nur einen einzigen Sprössling, der als Meduse (Eucope) mit zwei langen und zwei stummelförmigen Tentakeln vor Auftreten der Geschlechtsorgane geboren wird. Während der Entwicklung dieser Meduse geht

der Achsenkanal der Kapsel, an dem die Knospung geschieht, allmählich durch Resorption verloren (wie es wahrscheinlich bei allen „monomeren Kapseln“ Gegenbaur's der Fall ist). Dabei ist die proliferirende Amme von Anfang an ohne Arme und Mundöffnung. — *Trichydra pudica* ist ein kleiner und zierlicher Corynoidpolyp mit kriechendem Stamme, dem von Zeit zu Zeit Becherchen aufsitzen, in die sich die mit 4—12 Tentakeln versehenen sehr dehnbaren Thierchen zurückziehen können. Ueber die Fortpflanzungsverhältnisse konnte nichts eruirt werden. — Die Stiele von *Tubularia* sind nicht, wie man bisher ganz allgemein annahm, von einem einfachen Kanale durchsetzt, sondern von acht Kanälen, die in radiärer Anordnung neben einander stehen und in die Höhle der Polypenköpfchen ausmünden. Die zwischen den beiden Tentakelkränzen gelegene Mundpapille zeigt bei lebenskräftigen Individuen ziemlich regelmässige Contractionen, die auf die Bewegung der Flüssigkeit im Innern dieses Röhrensystems nicht ohne Einfluss sind. In der Gefangenschaft gehen die Köpfchen meist verloren, aber nur, um sich nach vier oder fünf Tagen von Neuem zu bilden, wobei sich der Stiel zugleich um ein deutlich abgesetztes Stückchen verlängert. Männliche und weibliche Kapseln finden sich beständig an verschiedenen Stämmen, wie schon früher bekannt war.

In einer dritten Abhandlung über Britische Zoophyten (Ibid. p. 281—287. Pl. VII) beschreibt Verf. *Corvua gravata* n. sp., *Stauridia producta* n. sp. und die Medusenbrut von *Campanularia Johnstoni*.

Die erste hat durch Bau und Bildung der Medusensprösslinge eine auffallende Aehnlichkeit mit *Lovén's* *Syncoryne ramosa*, unterscheidet sich von dieser aber durch die Glätte ihres Stammes. Die Medusen, die immer nur in einfacher Anzahl vorhanden sind, erscheinen (♂) völlig geschlechtsreif und bleiben vielleicht, trotz Anwesenheit einer eignen Mundöffnung, beständig mit dem Mutterthier in Zusammenhang, wie Verf. daraus erschliesst, dass letzteres nicht selten einem vollständigen Resorptionsprocesse unterliegt. — Für *Stauridia* stellt Verf. nach seinen Beobachtungen folgende Charakteristik auf: Polypary sheathed in a tubular corallum or polypidom (branched, the apices of the branches) bearing polyps furnished with two or more whorls of dissimilar tentacles; the upper whorl or whorls capitate, the lower whorl filiform, four in number. Thread-cells very large, many-barbed. Die Tentakel sind mit langen und feinen Stacheln versehen, die einem rundlichen weichen Körper aufsitzen und vom Verf. für Gefühlswerkzeuge (palpocils) gehalten werden. Die Endanschwellung der oberen Fühler, die bei *St. producta* in zwei oder drei Kreisen stehen, sind gleichfalls stachlig, aber die Stacheln sind hier kürzer und dicker und je mit einem Angelorgan in Verbindung. Verf.

betrachtet dieselben als Greifapparate. — Die dem Gen. *Eucope* Gegenb. angehörnden Medusensprosslinge von *Campanularia Johnstoni* zeigen in alternirender Reihenfolge vier grosse und vier kleine stummelförmige Tentakel, sowie acht Gehörkapseln. Sie sind schon bei ihrer Geburt mit Geschlechtsorganen versehen, deren Producte sich nach acht Tagen zu einer *Campanularia* entwickeln.

Gosse beschreibt (Transact. Linn. Soc. 1857. Vol. XXII. Part 2. p. 113—116 cum Tab.) unter dem neuen Gennamen *Lar* einen interessanten kleinen Corynoidpolypen mit zwei Armen und einem saugnapfartig sich entfaltenden Köpfchen, der durch Form und Bewegung an einen gesticulirenden Menschen erinnert. Der Stamm bildet ein kriechendes Netzwerk und wurde auf dem Gehäuse einer *Sabella* beobachtet.

Diagn. gen. n. *Lar* Gosse. Zoophytum e familia Corynidarum nudum, associatum sed sciunctum, erectum, e filo radicali repente retiformi saliens, tentaculis duobus simplicibus filiformibus instructum. Sp. n. *Lar Sabellarum* Gosse. (Scheint zunächst mit der oben erwähnten *Trichydra* Wright verwandt und vorzugsweise nur durch die geringere Zahl der Tentakel verschieden.)

Eine Abbildung von *Eudendrium ramosum* mit Medusenköpfen s. Gegenbaur in Carus, Icon. zoot. Tab. II. Fig. 3. Ebendas. Fig. 1 auch die schon früher — ungenügend — publicirte Abbildung einer neuen *Campanularia* mit polymeren Medusenkapseln und *Thaumantias*artigem Abkömmling.

Alder liefert ein Verzeichniss der an der Küste von Northumberland und Durham vorkommenden Zoophyten (Transact. of the Tyneside Naturalist's Field Club) mit 65 Hydroiden, unter denen als neu beschrieben werden (vgl. Journ. micr. Sc. T. V. p. 245 ff.):

Vorticlava humilis, *Eudendrium confertum*, *E. capillare*, *Tubularia implexa*, *Sertularia tricuspidata*, *S. tenella*, *Laomedea neglecta*, *L. acuminata*, *Campanularia Johnstoni*, *C. Hincksi*, *C. gracillima*, *Grammaria ramosa*.

Cryptolaria (n. gen.) *prima* n. sp. Busk, Quarterly Journ. univ. Sc. V. p. 173 c. Tab.

Char. gen. n. *Cryptolaria* e fam. *Sertular.* Cells completely immersed in a cylindrical polypidom, composed of numerous tubes. Sp. Cr. *prima* Busk. Neu Seeland.

Die in den Proc. Cal. Soc. Vol. II. enthaltene Abhand-

lung von Trask über Californische Sertuluriaden ist Ref. noch nicht zu Gesicht gekommen.

Siphonophorae.

Sars macht einige Mittheilungen über die von ihm bei Neapel und Messina beobachteten Siphonophoren, besonders über *Physophora hydrostatica*, *Athorybia rosacea*, *Rhizophysa filiformis*, *Diphyes quadrivalvis*. Bei der ersteren fand er an den Tastern fadenförmige, eben nicht lange Tentakel, die bisher übersehen waren. Auch möchte er den Stamm derselben nicht als Blase, sondern, mit Vogt, als einen horizontal gewundenen kurzen und dicken Cylinder betrachtet wissen. Die von Kölliker bei *Athorybia* beschriebene zweite Form von Nesselknöpfen wurde mitunter vermisst, wie denn auch bei *Physophora* nur zwei Formen dieser Anhänge aufgefunden werden konnten. Kölliker's *Forskalia Edwardsii* hält Verf. für identisch mit *F. ophiura* Lt. (was freilich die Annahme in sich schliesst, dass Kölliker manche Organisationsverhältnisse, z. B. die Schuppenbildung an den Polypenstielen, irrthümlich dargestellt hat). Der vom Ref. beschriebene Zusammenhang der beiden Schwimglocken bei *Diphyes quadrivalvis* wird bestätigt, doch glaubt Verf., dass dieser Umstand zur Aufstellung eines besondern Gen. (*Galeolaria*) nicht ausreiche. Middelh. Littor. Fauna l. c. p. 60—69.

Unter den von Gegenbaur in Carus, Icon. zoot. Tab. III. publicirten Siphonophorenzeichnungen heben wir hervor: Fig. 2 Abbildung von *Agalma rubrum*, Fig. 3 von *Praya diphyes*, deren specifische Differenz von *Pr. maxima* Gegenb. für Ref. noch immer etwas problematisch ist. (Auch Sars scheint *Pr. diphyes* als eigene Species nicht anzuerkennen.) Die übrigen Abbildungen betreffen, so weit sie Originalien sind, die Bildung der einzelnen Anhänge des Siphonophorenstockes, ohne für diese jedoch Neues zu bieten. Bei Fig. 13 sind die Nesselknöpfe von *Agalma rubrum* irrthümlich als Fangfäden gedeutet und mit viel zu zahlreichen Windungen abgebildet. Ebenso fehlt bei den Nesselknöpfen von *Agalma Sarsii* (Fig. 10) die für diese Art charakteristische mantelförmige Umhüllung des Nesselfadens.

Nach neueren Untersuchungen von K ö l l i k e r (Zeitschr. für wissenschaftl. Zoologie IX. S. 138) entspringen die Luftgefässe von Velella entschieden nicht bloss aus der Centralkammer der Schale, sondern aus mehreren Kammern. Die Ursprungsstämmchen, deren Zahl bis 16 erreichen kann, verästeln sich theils nahe an ihrem Anfange, theils später 1, 2, 3 Mal, so dass schliesslich einige 60 Kanälchen entstehen, die mit freien Oeffnungen am Rande und an der untern Fläche der Leber zwischen den kleinen Polypen ausmünden.

3. Polypi.

Von Milne Edwards erhielten wir die beiden ersten Bände eines umfangreichen Werkes über die Naturgeschichte der Polypen: hist. nat. des Coralliaires ou Polypes proprement dits Paris 1857 (XXXVI. 326 und 633 Seiten in Octav mit Atlas). Dasselbe bildet einen Theil der bekannten Suites à Buffon und ist in wesentlich derselben Weise abgefasst, wie die gleichfalls demselben Unternehmen zugehörnde hist. natur. des Crustacées unseres Verf. Ein dritter und letzter Band steht in nächster Zeit zu erwarten. Die vorliegenden Bände enthalten ausser einer sehr sorgfältig gearbeiteten historischen Einleitung und einer Darstellung vom äusseren und inneren Baue der Polypen und des Polypenstockes, die Classification und Beschreibung sämmtlicher bis jetzt bekannt gewordenen Arten aus den Gruppen der Alcyonaires (Octectinien), Zoanthaires malacodermes (Actinien und Verwandte), Zoanthaires sclérobasiques (Antipahinen) und den zu der Gruppe der Zoanthaires sclérodermes (Madreporinen) gehörenden Familien der Turbinoliden, Dasmiden, Oculiniden und Astreiden. Der wesentliche Charakter des Buches ist compilatorisch, und sind dabei vorzugsweise die eigenen anatomischen und zoologischen Arbeiten des Verf's, so wie die mit J. Haime gemeinschaftlich publicirten Monographien (vergl. J. B. XX. S. 257, 465 ff.) zu Grunde gelegt. Uebrigens ist der Letztere auch bei dem vorliegenden Unternehmen vielfach thätig gewesen, bis der Tod ihn übereilte; die historische Einleitung, so wie der ganze zweite Band, die Madreporen enthaltend, ist wohl vorzugsweise das Werk dieses jungen, für

die Wissenschaft viel zu früh verstorbenen Forschers. Wir werden später noch Gelegenheit haben, auf dieses, für die Kenntniss und Bestimmung der Arten gewiss sehr wichtige Werk zurückzukommen und begnügen uns deshalb hier mit einigen wenigen Bemerkungen.

Den Hauptcharakter der Polypen oder, wie Milne Edwards lieber will, der Corallen, sucht Verf. theils in der sessilen Lebensweise der von Anwesenheit und Tentakeln im Umkreise des Mundes, theils auch in der Lage der Geschlechtsorgane im Innern der Leibeshöhle, durch welchen letztern Charakter sich dieselben von allen übrigen Coelenteraten unterscheiden sollen.

Die Darstellung des innern Baues repräsentirt im Wesentlichen den Zustand unserer heutigen Kenntnisse über diese Verhältnisse, bietet aber, bis auf einzelne wenige Bemerkungen (über Nesselorgane, Hautbedeckung u. s. w.) kaum etwas Neues. Die Mesenterialfilamente (*cordons pelotonnés*) werden als Anhangsorgane des Magens von unbekannter Bedeutung beschrieben und ebenso die sog. Pigmenthöcker gewisser Actinien als Hautdrüsen. Die Taschen der Leibeshöhle sollen mit einem Systeme capillärer Lacunen oder Gänge in Verbindung stehen, die in den Wandungen des Körpers sich verzweigen und oftmals zu zierlichen Netzen zusammentreten. Was Verf. über den Skeletbau und die typischen Wachstumsverhältnisse der Lamellen bei den Madroporen mittheilt, ist eine ausführliche Wiederholung seiner älteren Darstellungen.

Verf. theilt die Klasse der Polypen, wie Ref., in zwei Unterklassen, die Lucernarien und Anthozoen, nur dass diese hier als *Podactiniaires* und *Cnidaires* bezeichnet und — wie es Ref. scheint, in unzulänglicher und unrichtiger Weise — also unterschieden werden:

Cnidaires, ayant les tentacules tubulaires, disposés en couronne et communiquant librement avec la chambre viscerale;

Podactiniaires, ayant les tentacules non tubulaires (?), disposés par groupes isolés et ne communiquant pas librement avec la chambre viscerale (?) (p. 94).

Calycozoa.

Der dem ersten Bande von Milne Edwards hist. nat. des Coralliaires beigegebene Atlas enthält auf Pl. A. 6. eine Anzahl von Abbildungen zur Anatomie der Lucernarien, die von J. Haime gezeichnet sind. Die Hauptfigur (*L. quadricornis*) zeigt eine Ansicht, die mit den älteren Darstellungen von Sars und Ref. völlig übereinstimmt. (Die abweichende Darstellung, die Owen von der innern Organisation der *Luc. inauriculata* gab, vergl. J. B. XXII. S. 421, ist übrigens nicht minder begründet, wie Ref. sich neuerlich durch Untersuchungen lebender Exemplare dieser Art überzeugt hat. Die verschiedenen Arten des Gen. *Lucernaria* sind auffallender Weise nach zweien verschiedenen Typen organisirt, einem einfachern und einem zusammengesetzten, von denen der erstere sich an den Bau der Scheibenquallen, der andere sich mehr an den der Anthozoen anschliesst. Ref. wird darauf an einem andern Orte zurückkommen.)

Eine sehr ähnliche Durchschnittszeichnung von *Lucernaria quadricornis* findet sich bei Carus, Icon. zoot. Tab. IV. fig. 2.

Anthozoa.

Der Atlas von Milne Edwards, hist. nat. des Coralliaires enthält von der Hand J. Haime's einige Abbildungen zur Anatomie von *Saccanthus* n. gen. (Pl. A. 3) und *Cladocora cespitosa* (Pl. A. 4). Die erste Form schliesst sich in ihrem innern Baue an den sehr nahe verwandten *Cerianthus* an (J. B. XX. S. 422), unterscheidet sich von demselben aber durch Abwesenheit der Magenwülste und die gleichmässige Entwicklung aller Mesenterialfalten (T. I. p. 310). Die Abbildungen von *Cladocora* beziehen sich vorzugsweise auf die Organisation der äusseren Bedeckungen mit ihren Angelorganen, doch findet sich im Texte (l. c. II. p. 589) eine ziemlich vollständige Beschreibung dieses Thieres, aus der wir hier so viel hervorheben, dass die Tentakel an der Spitze von einer weiten Oeffnung durchbohrt sind, dass ferner der Magen ganz ausserordentlich kurz und

kaum von dem Lippensaume zu unterscheiden ist. Die Mesenterialfilamente sind von sehr einfacher Bildung und wie bei den Actinien fast ausschliesslich von Angelorganen zusammengesetzt.

Hogg macht die Beobachtung, dass isolirte Stücke vom Fusse der *Actinia dianthus* zu neuen Actinien auswachsen. Quarterly Journ. microsp. Sc. V. p. 238.

M'Donnell glaubt nach seinen Beobachtungen und nach Experimenten mit dem galvanoscopischen Froschschenkel den Actinien den Besitz elektrischer Kräfte vindiciren zu dürfen. New Edinb. phil. Journ. VII. p. 328.

Alder liefert ein Verzeichniss der an der Küste von Northumberland und Durham vorkommenden 14 Anthozoen (Transact. of the Thyneside Naturalist's field Club 1856?).

Polyactinia. Milne Edwards stellt nach dem Vorgange von Dana die bisher den Gorgoniden zugerechneten Antipathesarten mit ihren sechs cylindrischen Tentakeln zu den sog. Polyactinien oder „Zoanthaires“ und unterscheidet in der Abtheilung dieser Polypen drei Hauptgruppen (hist. nat. des Corall. I. p. 224):

Zoanthaires malacodermes ou *Actiniaires*, dont les téguments communs conservent toujours leur mollesse primitive et ne se transforment jamais en un polypier soit sclérenchymateux soit épithélial.

Zoanthaires sclérobasisques ou *Antipathaires*, dont le sclérenchyme ne se solidifie pas et constitue seulement un tissu coriace parsemé de spicules ou de filaments minéraux épars, mais donne naissance à un tissu sclérobasisque qui se superpose par couche et forme une tige solide dans l'axe du polypier, constitué par le coenenchyme.

Zoanthaires sclérodermes ou *Madrépaires*, dont l'appareil tégumentaire se solidifie de manière à donner naissance à un polypier proprement dit.

Holosarca Burm. (Actiniaires M. Edw.) die Gruppe der Fleischpolypen trennt Milne Edwards (l. c. p. 225) nach der Stellung der Fühler in zwei Familien:

Actinidae, dont les tentacules de différents cycles alternent entre eux et correspondent chacun à une loge périgastrique particulière.

Cerianthidae, dont les tentacules sont disposés d'une

manière opposée, sur deux cercles concentriques, et naissent ainsi au nombre de deux (un interne et un externe) sur chaque loge périgastrique.

Zu der letztern Familie gehören nur zwei Geschlechter: *Cerianthus* und *Saccanthus* n. gen., während die erstere in fünf Unterfamilien (Myniadinæ, Actininae, Thallassianthinae, Phyllactinae und Zoanthinae) zerfällt und eine sehr beträchtliche Menge von Genera einschliesst. Nur die eine Unterfamilie der Actininen, allerdings von allen die umfangreichste, enthält deren 23, die von unserem Verf. theils neu aufgestellt, theils auch neu umgrenzt sind. Wir geben im Folgenden eine Uebersicht dieser Genera.

Subfam. Myniadinæ, mit blasig aufgetriebenem, hydrostatischem Fusse.

Gen. *Mynias* Cuv. Tentakel einfach, Leib warzig (2 Arten).

Gen. *Plotactis* M. Edw. Tentakel einfach, Leib glatt (*P. flava* Les.).

Gen. *Nautactis* M. Edw. Tentakel kurz, mit Auswüchsen besetzt (*N. olivacea* Les.).

Subfam. Actininae, mit scheibenförmigem, mitunter rudimentairem Fusse und einfachen Tentakeln.

1. Fuss scheibenförmig, zur Befestigung dienend.

A. Seitliche Körperwände ohne Poren

α. und glatt;

a. Tentakel nicht zurückziehbar und

α. verlängert.

† Rand der Kopfscheibe mit Pigmenthöckern;

* Tentakel konisch . . . *Anemonia* Risso (6 Sp.)

** Tentakel spindelförmig . . . *Eumenides* Less. (1 Sp.)

†† Rand der Kopfscheibe ohne Pigmenthöcker.

* Körper kurz und cylindrisch *Comactis* Edw. (2 Sp.)

(In die Nähe von *Comactis*

auch *Siphonactinia* Kor. Dan.)

** Körper lang und konisch *Ceratactis* Edw. (2 Sp.)

β. sehr kurz und papillenförmig,

† ungleichartig; Kopfscheibe

gelappt *Metridium* Ok. (7 Sp.)

†† gleichartig; Kopfscheibe

einfach *Discosoma* Lt. (8 Sp.)

b. Tentakel zurückziehbar,

α. zugespitzt und

† ziemlich gleichartig,

* Körper nackt,

- Kopfscheibe mit Pigment-
 - höckern *Actinia* L. (26 Sp.)
 - Kopfscheibe ohne Pig-
 - menthöcker *Paractis* Edw. (15 Sp.)
 - ** Körper incrustirt *Capnea* Forb. (1 Sp.)
 - †† sehr ungleichartig *Dysactis* Edw. (4 Sp.)
 - β. ohne zugespitztes Ende,
 - † mit Köpfchen versehen,
 - * Mund vorspringend *Melactis* Edw. (2 Sp.)
 - ** Mund eingezogen *Corynactis* Allm. (5 Sp.)
 - †† geringelt *Heteractis* Edw. (2 Sp.)
 - β. und uneben,
 - a. warzig;
 - α. Kopfscheibenrand ohne Pig-
 - höcker *Cereus* Ok. (30 Sp.)
 - β. Kopfscheibenrand mit Pig-
 - menthöckern *Phymactis* Edw. (7 Sp.)
 - b. mittentakelartigen Anhängen, die
 - α. an der obern Körperhälfte
 - konisch, unten gerundet sind *Echinactis* Edw. (2 Sp.)
 - β. in ganzer Ausdehnung auf-
 - getrieben erscheinen *Cystiactis* Edw. (3 Sp.)
 - B. Seitenwände mit Oeffnungen zum
 Durchtritt von Nesselfäden:
 - α. an der obern Körperfläche *Nemactis* Edw. (3 Sp.)
 - β. an dem Basilartheile *Adamsia* Forb. (9 Sp.)
 - 2. Fuss rudimentär, frei.
 - A. Ohne Oeffnung am Körperende.
 - α. Aeußere Bedeckungen gleichmäs-
 - sig entwickelt.
 - a. Körper hinten verjüngt *Ilyanthus* Forb. (3 Sp.)
 - b. Körper hinten zusammenge-
 - gedrückt *Spenopus* Stnstrp. (1 Sp.)
 - β. Aeußere Bedeckungen in der obern
 - Körperhälfte lederartig *Edwardsia* Qtrf. (4 Sp.)
 - B. Mit Oeffnung am hintern Körperende *Peachia* Gosse (2 Sp.)
- Neu unter den hier aufgezählten Arten sind folgende: *Cera-*
tactis clarata von Bombay (p. 238), *Cystiactis Eydouxi* von Chili,
C. Gaudichaudi von Rio, *C. Reynaudi* vom Cap d. g. H. (p. 276).
- Subfam. *Phyllactinac.* mit einfachen und zusammengesetzten Tentakeln.
- Gen. *Phyllactis* Edw. Zusammengesetzte Tentakel am Rande der Kopfscheibe, Körperbedeckung glatt (Ph. praetexta Dana).
- Gen. *Oulactis* Edw. Ebenso, aber mit warziger Haut (4 Sp.).

Gen. *Rhodactis* Edw. Zusammengesetzte Tentakel zwischen zwei einfachen Tentakelkränzen (Rh. rhodostoma Ehrbg.).

Subfam. Thalassianthinae, ausschliesslich mit zusammengesetzten, verästelten oder papilliferen Tentakeln.

A. Tentakel gleichartig,

2. verzweigt,

α. Zweige schlank und vierfach ge-
fiedert Thassianthus Lt. (1Sp.)

β. Zweige verdickt, mit zerstreuten
Papillen besetzt . . . Actinodendron Blainv. (2 Sp.)

B. unverzweigt,

α. besetzt mit isolirt stehenden, ver-
ästelten Fäden *Actineria* Bl. (1 Sp.)

β. mit abgerundeten, haufenweis zusammengruppirten Papillen . . *Phymanthus* Edw.
(*Ph. loligo* Ehbgr.)

B. Tentakel von zweierlei Art,

U. die innern mit rundlichen Papillen
besetzt, die äussern gezackt *Sarcophianthus* Less. (1. Sp.)

B. die innern gezackt, die äussern mit
Höckern *Heterodactyla* Ehb. (1 Sp.)

Subfam. Zoanthinae, in Kolonien lebend, mit lederartigem Skelet.

Gen. Zoanthus Cuv. mit isolirten Stolonen (4 Sp.).

Gen. *Palythoa* Lamour. mit flächenhaft entwickeltem Polypenstocke (12 Sp.).

Das schon oben erwähnte neue Gen. *Saccanthus* unterscheidet sich von *Cerianthus* theils durch die Abwesenheit des hintern Porus und gewisse anatomische Charaktere, theils auch durch eine kürzere und gedrungene Gestalt. Sp. n. *S. purpurascens* von Nizza (p. 309).

Gosse's history of the british Sea-Anemones and Madrepores, deren erster Theil London 1857 erschienen, ist Ref. unbekannt geblieben.

Madreporaria. Nach dem Systeme von Milne Edwards und Jules Haime (Hist. nat. des Corall. II. p. 5) zerfallen die hieher gehörenden Formen zunächst in fünf Sectionen:

M. apores, dont la chambre viscérale est libre ou subdivisée transversalement par des traverses irrégulières; appareil cloisonnaire bien développé; sclérenchyme compacte.

M. perforés, dont la chambre bien développé;
sclérenchyme perforé.

M. tubulés, dont la chambre appareil cloisonnaire rudimentaire.

M. tabulés, dont la chambre viscerale est subdivisée en étages par des planchers; appareil cloisonnaire rudimentaire et appartenant au type hexaméral.

M. rugeux, dont la chambre appareil cloisonnaire bien développé et appartenant au type tétraméral.

Die erste dieser Gruppen, die einzige, die bisher (l. c. T. II) zur Untersuchung kam, zerfällt nach folgendem Schema in Familien:

A. Loges entièrement libres;

a. Cloisons indépendantes Turbinolides.

b. Cloisons trigéminées Dasmides.

B. Loges plus ou moins divisées transversalement;

a. divisées par des traverses lamelleuses;

α. cavité viscerale s'oblitérant de bas en haut Oculinides.

β. cavité viscerale ne s'oblitérant pas mais se subdivisant seulement;

† coelenchyme bien distinct formant une masse empâtante Stylophorines.

†† coelenchyme bien distinct formant un plateau basilaire foliacé Echinoporines.

††† pas de coelenchyme;

* murailles imperforées Astréides.

** murailles perforés Mérulinacées.

b. divisées par des synapticules Fongides.

(So nach der synoptischen Uebersicht unseres Verfs. Später, in der speciellen Ausführung, wird die kleine Gruppe der Stylophoriens als Unterfamilie den Oculiniden und die ebenfalls nur kleine Gruppe der Echinoporiens und Mérulinacées als Unterfamilie den Astréiden zugerechnet.) Man sieht, dass sich diese Gruppierung in mehrfacher Beziehung von dem früheren Systeme unseres Forschers (J. B. XX. S. 465) unterscheidet. Auch in der weiteren Eintheilung finden sich solche Differenzen; selbst die Genera sind hier und da anders umgrenzt, alte zusammengezogen, neue aufgestellt. Es würde uns jedoch zu weit führen, wenn wir hier auf alle diese Veränderungen specieller eingehen wollten; dieselben mögen im Originale, das bei dem speciellern Studium der Madreporinen nicht zu entbehren ist, selbst nachgesehen werden. Wir fügen nur noch hinzu, dass der Inhalt an einzelnen Arten so ziemlich derselbe geblieben und nur hier und da mit einer neuen lebenden oder fossilen Form bereichert ist.

Die in den Proc. Bost. Soc. Vol. VI enthaltenen Aufsätze über Corallen sollen im nächsten Jahresberichte noch nachträglich besprochen werden.

Antipatharia Edw. Nach den Untersuchungen von Gray sind die harten Einlagerungen in das Rindenskelet von *Antipathes* (*A. spiralis*?) durch Gestalt und chemische Reactionen von den gewöhnlichen Kalknadeln der Gorgoniden auffallend verschieden. Wie Verf. vermuthet, dürften dieselben aus Kieselsäure bestehen. Ann. and Mag. nat. hist. T. XX. p. 460 od. Proc. Zool. Soc. 1857. May. (Bekanntlich hat schon Haimé die Kieselsäure als Hauptbestandtheil des Rindenskelets bei einem *Antipathes* nachgewiesen, J. B. XXII. S. 460.)

Milne Edwards unterscheidet in dieser Gruppe der Antipatharier 6 Genera, von denen 3 neu sind:

Arachnopathes mit buschartig verschmolzenen Zweigen (*Ant. ericoides* u. *A. clathrata* Auct.), *Rhipidipathes* mit fächerförmig verschmolzenen Zweigen (*A. flabellum* u. *A. reticulata* Auct.), *Hyalopathes* mit halbdurchsichtigem, glasartigem Achsenskelet (*A. pyramidata* Auct. u. a.)

In die Gruppe der Edwardsischen Zoanthaires sclérodermes gehört sonder Zweifel auch das Gray'sche Gen. *Hyalonema*, dessen Achsenskelet aus feinen Kieselnadeln besteht, so wie das nahe verwandte, vielleicht damit identische Gen. n. *Hyalochaeta* Brdt., das gleichfalls ein aus Kieselfasern zusammengesetztes Achsenskelet hat und mit grossen zwölfarmigen Polypen besetzt ist. Die von Brandt beobachtete Art trägt den Namen *H. Possieti* (ohne Charakteristik) und ist an der Japanischen Küste gefischt. Mèlang. biol. Acad. St. Petersbg. 1857. T. II. Mai. (Extr. d'un mém. ayant le titre: de nova polyporum classis familia Hyalochaetidum nomine designanda.)

Octactinia. Die achtarmigen Polypen (Alcyonaires) zerfallen bei Milne Edwards (l. c. I. p. 102) in 3 Familien:

Alcyonides, à polypiéroide adhérent sans axe épithéliale,

Gorgonides, à polypiéroide adhérent, muni d'un axe épithéliale corné ou calcaire,

Pennatulides, à polypiéroide libre, creusé d'une cavité centrale, qui renferme presque toujours un axe formé par du tissu épithéliale,

und diese wieder in eine grössere Anzahl von Unterfamilien, für die wir auf das Original selbst verweisen müssen. Von neuen Arten werden aufgezählt: aus der Familie der Alcyoniden die zunächst mit *Cornularia* verwandte, solitäre *Heimeia* (n. gen.) *funebis* von der Algerischen Küste, (p. 104), aus der Familie der Gorgoniden *Primnoa plumatilis* von Isle Bourbon und *Pr. gravilis* von den Antillen (p. 141), *Muricea echinata* Val. von Panama, *M. fungifera* Val. von Neu Holland (p. 143), *Eunicea intermedia* und *E. Castelnaudi* von Bahia,

Eunicea crassa Lam. von unbekanntem Fundort (p. 148), *E. asperula* Val. von Martinique, *C. Rousseaui* ebendah., *Plexaura racemosa* Val. von den canarischen Inseln (p. 153), *Pl. salicornoides* von Martinique, *Pl. flexuosa* Val. von Guadeloupe, *Pl. rhipidalis* Val. von den Antillen, *Pl. friabilis* ebendah.; *Gorgonia vatricosa* Val. vom Archipel Bizagos (p. 158), *G. arida* Val. von Neu Holland, *G. miniata* Val. von den Antillen, *G. punicea* Val. von Brasilien, *G. ramulus* Val. von Panama, *G. discolor* Val. von Java, *G. papillifera* Val. von Archipel Bizagos, *G. citrina* Val. ebendah.; *Leptogorgia cauliculus* Val. Algier (p. 163), *L. porosissima* von unbek. Fundort, *L. aurantiaca* Val. von Calloa, *L. Boryana* Val. von Isle Bourbon, *L. virgea* Val. von den Antillen, *Pterogorgia Ellisiana* von Guadeloupe (= *Gorg. pinnata* Ell. et Sol.), *Pt. betulina* Val. von Senegal (p. 171), *Rhipidigorgia occatoria* Val. von Guadeloupe (p. 175), *Rh. plagalis*, *Rh. coarctata* Val. von Isle Bourbon, *Phyllogorgia foliata* Val. von Guadeloupe (p. 181), *Gorgonella verriculata* von Isle de France (p. 183), *Verrucella gemmacea* vom Rothen Meere (p. 185), *Juncella hystrix* Val. von Bahia (p. 196); *Coelogorgia* (n. gen.) *palmosa* von Tranquebar (p. 191); *Iris coralloides* aus der Südsee (p. 195), aus der Familie der Pennatuliden das neue Gen. *Lituarina* mit *L. phalloides* Pall. und *Cavernularia* (n. gen.) *obesa* aus Indien (p. 219.)

Zur Charakteristik der neuen Genera mag folgende Diagnose dienen:

Haimeia M. Edw. Coralliaire à polypiéroide cylindrique, fixé par sa base et ne donnant naissance ni à des stolons, ni à des expansions encroûtantes, ni à des bourgeons quelconques.

Coelogorgia M. Edw. Polypiéroide arborescent, dont l'axe est occupé par une cavité cylindrique commune au lieu d'une tige sclérobasique, comme si le tissu épithélial était avorté. Gehört zu der kleinen Gruppe der mit unvollständigem Achsenskelet versehenen Gorgoniden, zu den Gen. *Briareum* Blainv. *Solanderia* Duchassain et Michelin und *Paragorgia* M. Edw., das letztere aus dem alten *Alcyonium arborescens* Lin. gebildet und folgendermaassen charakterisirt:

Paragorgia M. Edw. Polypiéroide arborescent, composé d'une couche sclérenchymateuse corticale, mince et distincte, dans l'épaisseur de laquelle se trouve limitée la cavité viscérale des polypes et d'un axe fistuleux très-gros, formé d'un tissu spongieux, très-riche en spicules calcaires. Polypes réunis par groupes à l'extrémité des branches, ou sur des tubercules latéraux très-écartés entre eux et disposés irrégulièrement.

Lituarina M. Edw. Polypiéroide presque cylindrique, gros et court, avec les polypes disposés irrégulièrement tout autour de la portion moyenne et supérieure; la portion basilaire nue. Axe scléro-

basique très-développé. (Sehr nahe verwandt dem Gen. Kophobelemnon, J. B. XXIII. S. 250.)

Cavernularia M. Edw. Pennatuliens qui ressemblent aux Vértillies, mais qui manquent complètement d'axe sclérobasique et ont le centre du polypiéroïde occupé par un large tube fistuleux divisé longitudinalement en quatre cavités.

Unter den der Familie der Gorgoniden zugehörnden neuen Arten sind viele schon von Valenciennes (J. B. XXII. S. 427) unterschieden, bis jetzt aber noch unbeschrieben geblieben.

Auch Gray charakterisirt einige neue Genera aus der Familie der Gorgoniden:

Acanthogorgia. Coral branchy; branches free, cylindrical, slender, both of them almost entirely composed of transparent spicula; cells elegantly bell-shaped, contracted at the bottom, and less so rather below the aperture, spinulose, with eight equidistant lines of two or three series of diverging short spines; the mouth of the cell surrounded with numerous diverging, very slender, transparent, elongate spines, nearly as long as the cell. Axis horny, black, more slender and brown near the tips.

Sp. n. *A. hirsuta*. Gray, Ann. and Mag. nat. hist. P. XX. p. 461. (Proc. Zool. Soc. 1857. June.)

Sarcogorgia. The coral rather irregularly furcately branched on a single plane. The axis black, cylindrical, thick at the base, with slender flexible branchlets. The bark fleshy; in the dry state thin, like a continuous skin, smooth, without spicula, with rather close, more or less raised cells, strengthened with a quantity of sandlike, granular spicula.

Sp. n. *S. Phidippus*. Gray.

Subergorgia. Coral furcately branched, rather compressed, with a continued sunken groove up the middle of each side. Cells rather prominent convex, in two or three somewhat irregular series up each edge. Axis pale brown, wart-like, formed of rather loosely concentric fibrous laminae, containing a large quantity of calcareous matter and effervescing with muriatic acid. The bark when dry is rather thin, smooth, hard and granular within.

Sp. n. *S. suberosa*. Gray, ibid. p. 519. Alle drei von unbekanntem Fundort.

Ebenso erhielten wir auch von Macdonald eine Mittheilung über einen neuen Polypen aus der Familie der Alcyoniden, der sich durch einen dichotomisch verästelten Stamm auszeichnet und zunächst mit Sarcodyction verwandt zu sein scheint. Ann. and Mag. nat. hist. Vol. XIX. p. 391.

Porifera.

Liebkühn's „Beiträge zur Anatomie der Spongien“ (Archiv für Anat. und Physiol. 1857. S. 376—403 Taf. XV) enthalten die Fortsetzung der Untersuchungen unseres Verfs über den Bau der Spongillen mit einer kritischen Analyse der Angaben älterer Forscher, besonders von Laurent (Voy. autour du monde 1844), sowie einige Bemerkungen über *Spongia limbosa*, die trotz ihrer Unvollständigkeit doch wenigstens so viel beweisen, dass die Spongillen und Spongien in den wesentlichsten Organisationsverhältnissen mit einander übereinstimmen, dass die Spongillen, mit den Worten unsers Verfs, Spongien sind. Nach diesen neuen Untersuchungen ist der gesammte Leib der Spongillen von einer abstehenden äusseren Haut bekleidet, die von den Spitzen des Nadelgerüsts getragen wird und nur an den kegelförmig vorspringenden Osculis mit dem Körperparenchym zusammenhängt. Die histologischen Elemente dieser Umhüllungshaut sind die gewöhnlichen contractilen Zellen, wie denn überhaupt die ganze Masse des Spongillenkörpers denselben Zellenbau besitzt. Zwischen den Zellen der Haut bleiben feine, bald dichte, bald auch in grösseren Zwischenräumen stehende Poren, durch die das Wasser zunächst in die zwischen Körperhaut und Parenchym gelegene weite und sackförmige Höhlung hineintritt. Aus dieser gelangt das Wasser sodann erst in das Canalsystem der Spongille und zwar wiederum durch eine Anzahl kleiner Poren, die im ganzen Umfange des Körpers angebracht sind. In grösserer oder geringerer Entfernung von diesen Poren sind die Canäle mit besonderen Wimperorganen versehen, deren Thätigkeit die Strömung des Wassers unterhält. Es sind das besondere, den Canälen anhängende kuglige Räume, deren Innenfläche mit dichtstehenden Cilien besetzt ist. Die fremden Körper, die durch die Wasserströmung mit fortgerissen werden, bleiben eine Zeitlang in diesen Wimperräumen stecken, um dann von da entweder wieder in die gewöhnliche Strömung überzutreten und durch die röhrenförmigen Zapfen schliesslich ausgeführt zu werden; oder sie gelangen in das Zellenparenchym des Körpers, wo sie dann, von allen Seiten eng umschlossen, eine lange

Zeit verweilen. Zuweilen wurden auch Infusorien durch die Poren in den Körper eingeführt; sie geriethen, nachdem sie eine Weile in der sackförmigen Höhle umhergeschwommen waren, gleichfalls zwischen die Zellen des Körperparenchyms. Noch etwa eine halbe Stunde lang sah man hier das Spiel der contractilen Blase; einige Stunden später war das Infusorium so vollständig zerfallen, dass sich nichts mehr von ihm wahrnehmen liess. „Der Vorgang sieht in jeder Beziehung so aus, wie wenn ein Actinophrys sol ein Infusorium gefressen hat.“ Uebrigens ist das Canalsystem kein System von Gefässen mit eigenthümlichem Bau, sondern nur durch eine eigenthümliche Lagerung des gewöhnlichen Körperparenchyms gebildet. Die schon früher von Bowerbank (J. B. XXIII. S. 255) beschriebene Verschmelzung zweier oder mehrer Exemplare ist jetzt auch von unserm Verf. beobachtet; es bleibt vielleicht nur noch zu bemerken, dass dabei nicht selten eine Reduction in der Zahl der Ausführöffnungen stattfindet, dass letztere also keineswegs etwa für die Zahl der in einer Colonie vereinigten Individuen maassgebend ist. Bei *Spongia limbosa* liessen sich zwischen den contactilen Parenchymzellen gleichfalls die kugligen Wimperapparate an den Canälen, und zweierlei, bewimperte und unbewimperte Fortpflanzungskörper unterscheiden.

Die Beobachtungen von Lieberkühn finden in fast allen Punkten eine Bestätigung durch die neuesten Untersuchungen von Carter, der uns in seiner Abhandlung „on the ultimate structure of Spongilla“ (Ann. and Mag. nat. hist. Tome XX. p. 21 sq. Tab. I) eine vollständige Anatomie der *Sp. alba* n. sp. aus Bombay geliefert hat. Verf. beschreibt die Umhüllungshaut mit ihren Poren und dem darunter liegenden Hohlraum, die Entwicklung der Kieselnadeln im Innern der Zellen, das Canalsystem des Körperparenchyms mit den Wimperorganen. Die einzige wichtigere Differenz zwischen ihm und Lieberkühn besteht darin, dass er den Canalapparat des Spongillenkörpers in zwei Systeme zerfällt, in das System der einführenden und das der ausführenden Canäle, die beide keinen directen Zusammenhang besässen.

Die einführenden Canäle sollen in die Wimperorgane hineinleiten und hier endigen, während die ausführenden im

Umkreise dieser Gebilde selbstständig ihren Ursprung nehmen. Die Wimperorgane betrachtet Verf. als Mägen oder vielmehr als Thiere, die nach Art der Polypen in eine gemeinschaftliche Leibessubstanz eingesenkt wären. Er glaubt auch beobachtet zu haben, dass dieselben durch Metamorphose einer einzigen Zelle ihren Ursprung nehmen und will diese Metamorphose mitunter selbst an isolirten Schwammzellen gesehen haben. Ebenso giebt er an, dass diese Gebilde nach ihrer zufälligen Trennung von dem Schwammkörper allmählich zu einem amöbenartigen Wesen sich entwickelt hätten. (Bedeutet wohl nur so viel, dass Verf. die amöbenartigen Bewegungen isolirter Schwammzellen beobachtete.) Die Einfuhr des mit Nahrungsstoffen imprägnirten Wassers geschieht nach Verf. durch die Thätigkeit der Flimmerhaare, die je einzeln einer Zelle aufsitzen, während der Uebertritt in das ausführende Kanalsystem durch die gemeinschaftliche Action der von ihm in den cilientragenden Zellen entdeckten pulsirenden Bläschen bedingt sein soll. Die Nahrungsstoffe gelangen in das Innere der einzelnen Zellen hinein, wie in das Innere eines Rhizopodenkörpers. Sind die Wimpersäcke mit Nahrung angefüllt, so schliesst die Spongille für einige Zeit die Oscula, so wie die Oeffnungen der Umhüllungshaut, die gleichzeitig dicht auf das Körperparenchym zurückgezogen wird. Von Fortpflanzungskörpern wurden nur die Gemmulae beobachtet, die nach Verf. gleichfalls das Entwicklungsprodukt einer einzigen Zelle sind.

Die Untersuchungen von Bowerbank „on the anatomy and physiology of the spongiadae“ liegen einstweilen bloss im Auszuge vor, Ann. and Mag. nat. hist. Vol. XX. p. 298—301 (Proc. Roy. Soc. 1857. June). Verf. hebt darin namentlich hervor, dass eine sichere Diagnostik und Systematik der Spongiaden nur durch genaue Berücksichtigung der Skelettbildung (der bald hornigen, bald auch aus Kieselsäure bestehenden Fasern, so wie der Kieselnadeln) ermöglicht werde, so wie ferner den Umstand, dass die Kieselnadeln an den verschiedenen Stellen des Körpers auch bei derselben Species sehr allgemein die verschiedensten Formen besitzen. Tethea, Geodia und Dysidea hält Verf. fast für die einzigen natürlichen Genera unter den bis jetzt aufgestellten. Die

Kieselnadeln vertheilt Verf. nach ihrer Bildung in sechs Gruppen: Spicula of the skeleton, connecting spicula, defensive spicula, spicula of the membranes, spicula of the sarcode und spicula of the gemmules, die alle sechs einzeln beschrieben werden.

Meissner giebt an, dass er an einer kleinen Helgoländischen Spongie auf mechanische Reize oftmals entschiedene Zusammenziehungen bemerkt habe. Zeitschrift für rat. Med. 1857. I. S. 612. Anm.

Leidy beobachtete (Proc. Acad. nat. sc. Philad. VIII. p. 162 oder Silliman's Journ. Vol. XXIII. p. 281) einen dem Gen. Clione zugehörigen Bohrschwamm, der die Schalen von *Ostrea virginiana* und *Venus mercenaria* zwischen äusserer und innerer Fläche nach verschiedenen Richtungen durchsetzt, und letztere an einzelnen Stellen mit seinen Fortsätzen durchbricht. Diese Fortsätze sind zweierlei Art, die einen zum Eintritte, die andern zum Austritte des Wassers bestimmt, beide in auffallender Weise contractil.

Owen beschreibt eine neue, sehr eigenthümliche Art des schon früher (1841, Transact. Zool. Soc. III. p. 205) von ihm aufgestellten Spongiadengenus *Euplectella*, *E. cucumer*, und definirt das betreffende Gen. jetzt folgendermaassen: Körper cylindrisch, hohl, an dem einen weiteren Ende mit einem unregelmässigen Netzwerk verschlossen, an dem andern dünnern Ende mittelst eines Schopfes seidenartiger dünner Fäden, in welche die Fasern der Seitenwände sich auflösen, an fremden Gegenständen befestigt. Transact. Linn. Soc. Vol. XXII. P. 2. p. 117—123 cum tab. (Die alte Art trägt den Namen *E. aspergillum* und stammt von den Philippinen, während *E. cucumer* ein Geschenk des Königs der Seychellen an einen englischen Schiffscapitain ist.)

IV. Protozoa.

Cienkowsky's Abhandlung sur les algues inférieures et les Infusoires (Petersbg. 1856. Avec planches) behandelt ausser den Conferven und einzelligen Algen auch den Bau

und die Entwicklungsgeschichte der echten Infusorien und Rhizopoden. Verf. hebt mit besonderem Nachdruck die Analogie in den Lebenserscheinungen dieser beiderlei Organismen hervor und kommt schliesslich zu dem Resultate, dass eine feste Grenze zwischen Thier und Pflanze überhaupt nicht existire. Die eingekapselten Zustände der Infusorien werden den Algensporen parallelisirt. (Ref. bedauert, diese in ihren Einzelheiten gewiss recht interessante Abhandlung bis jetzt nur nach einem der Petersburger Akademie erstatteten Berichte zu kennen.)

Carter's Zusätze zu der im vorhergehenden Jahresberichte (S. 275) angezogenen Abhandlung über die Süswasserinfusorien von Bombay handeln vorzugsweise über die contractile Blase und die sg. Ovula von Euglena. In den letzten sah Verf. (wie auch früher schon Itzigson, Bot. Zeitung 1853. S. 879) die Entwicklung eines spiraligen Fadens, den er für eine junge Euglena zu halten geneigt ist. Die Schwärmsprösslinge von Acineten sah Verf., wie Lachmann und Cienkowsky (J. B. XXII. S. 432) immer nur wieder zu Acineten werden; nichts destoweniger hält derselbe einstweilen noch Stein's Acinetentheorie für wohl berechtigt. Ann. and Mag. nat. hist. T. XX. p. 34—38.

Wir haben schon im vorigen Jahresberichte (Bd. XXIII. S. 258) auf eine Reihe von Beobachtungen aufmerksam gemacht, nach denen sich im Innern gewissen Pflanzen und Pflanzenzellen infusorienartige Gebilde entwickeln. Die Erklärung dieser Erscheinung war eine verschiedene. Bald sollte hier eine abnorme Metamorphose des Zelleninhaltes stattgefunden haben, bald auch der infusorienartige Körper das Entwicklungsprodukt eines fremden Eindringlings sein. Die Beobachtungen dieser merkwürdigen Erscheinung haben sich gemehrt; der Zwiespalt ist derselbe geblieben. Cienkowsky, der hier vielleicht als bedeutendste Autorität anzusehen sein dürfte, glaubt die ganze Entwicklungsgeschichte dieser sonderbaren Wesen erkannt zu haben und steht nicht an, die betreffenden Bildungen für selbstständige, parasitische Geschöpfe zu halten. Derselbe beobachtete (Bot. Ztg. 1857. S. 787; vergl. auch Pringsheim's Jahrbücher für wiss. Botanik I. S. 371 ff.), wie monadenartige Geschöpfe

mit Durchbohrung der Zellwand in das Innere von Spirogyren eindringen, hier amöbenartig umherkrochen, auch Chlorophyll aufnahmen und sich schliesslich einkapselten. Die eingekapselte Monade bildet sodann Schwärmsprösslinge, die bis auf ihre Grösse der Mutter gleichen (sog. Pseudogonidien), nach ihrer Entwicklung auskriechen und durch die Wand der Spirogyra hindurch in's Freie gelangen.

Ganz anders dagegen Carter (Ann. nat. hist. Vol. XIX. p. 259), der früher allerdings gleichfalls an eine Einwanderung dachte, neuerdings sich aber — und zwar wiederum bei Spirogyra — auf das Bestimmteste von der Umwandlung des Protoplasma in Rhizopoden überzeugt haben will. Die Schicksale dieser Rhizopoden sollen nach den Umständen verschieden sein; nur bei einem Theile derselben wurde eine Fortpflanzung durch amöbenartige Schwärmsprösslinge beobachtet. Diese letzteren sollen sich nach dem Ausschlüpfen in Actinophrys sol verwandeln.

Hoffmann hat nach dem Berichte der Bot. Ztg. 1857. S. 762 gleichfalls eine Umwandlung des aus Pilzsporen hervorquellenden Inhaltes in amöbenartige Gelilde beobachtet. Uebrigens lässt es derselbe zur Zeit unentschieden, ob dieselben nicht etwa auf absterbende Infusorien zurückzuführen seien. Dieselben kommen in mehreren verschiedenen Grössen und bei Pilzen ganz verschiedener Abtheilungen vor, so bei Uredo Caricis u. s. w. Durch Zerdrücken der Sporen kann man zwar das Sporenplasma, wenn auch nicht ganz unversehrt, austreten machen; in diesem Falle aber treten nur sehr schwache Bewegungen von amöbenartigem Charakter ein.

Ehrenberg setzt seine Untersuchungen von Erd- und Meeresgrundproben fort und überzeugt sich von Neuem, dass letztere vorherrschend aus organischen, hauptsächlich animalischen Substanzen bestehen. Unter den hier aufgefundenen, mitunter noch mit ihren Weichtheilen sehr wohl erhaltenen Schalen und Skelettheilen befinden sich zahlreiche neue Formen, besonders aus den Gruppen der Polythalamien, Polycystinen und Poriferen, die Verf. grösstentheils als Repräsentanten einer besondern Fauna der Meerestiefe in Anspruch nimmt. Wir verweisen in dieser Beziehung nament-

lich auf die Mittheilungen unseres Verf's in den Berliner Monatsberichten von 1857. S. 142 und 538 ff.

Infusoria.

Lachmann's vortreffliche Abhandlung über die Organisation der Infusorien (J. B. XXII. S. 431) ist in's Englische übersetzt. Ann. and Mag. nat. hist. T. XIX. p. 113 ff.

Zwei andere grössere Arbeiten über denselben Gegenstand, die eine von Claparède und Lachmann, die andere von Lieberkühn sind von der französischen Akademie, der sie seit Ende 1855 vorlagen, mit dem grossen Preise für Naturwissenschaften gekrönt worden (Cpt. rend. T. XLVI. p. 279) und werden sobald, als der Stich der zahlreichen Tafeln es zulässt, publicirt werden. Da hierüber jedoch noch eine längere Zeit vergehen dürfte, so ist es doppelt erfreulich, dass Claparède und Lachmann uns bereits jetzt mit einer Uebersicht über die hauptsächlichsten Resultate ihrer Untersuchungen, so weit diese die Fortpflanzung der Infusorien betreffen, bekannt machen. Note sur la reproduction des Infusoires, Ann. des sc. natur. T. VIII. p. 221—244.

Besonders zahlreich und wichtig sind die Untersuchungen unserer Verff. über Acinetinen, die (nach einer Kritik der bekannten Stein'schen Theorie) als selbstständige Formen in Anspruch genommen werden. Schwärmsprösslinge wurden bei elf Arten beobachtet. Dieselben sind bei den einzelnen Species keineswegs übereinstimmend gebaut, bald nur mit einem einfachen Flimmerstreifen oder einer Wimperkappe versehen, bald auch in ganzer Ausdehnung mit Cilien bekleidet. Bei Podophrya quadripartita liess der Embryo nach seiner Befestigung auf den Stielen von Epistylis plicatilis von vorn herein die spätern Saugarme erkennen, wenn auch anfangs nur in starker Verkürzung; ja ein Mal beobachtete man bereits im Leibe der Mutter statt eines Schwärmsprösslings eine förmliche kleine, gestielte Podophrya. Die Cysten der Epistylis plicatilis, die Stein in Acineten übergeben lässt, enthalten bald blosse eingekapselte Köpfchen, die unter gewissen Verhältnissen nach Aussen wieder durchbrechen und dann aus der Tiefe der Cyste ein neues Stielchen treiben, bald aber auch einen über und über flimmernden Amphileptus (= Trachelius Meleagris Ehrbg.), der auf den Stöcken dieser Infusorien lebt und sich einkapselt, sobald er die noch auf ihren Stielen befestigten Köpfchen durch seine gewaltige Mundöffnung ver-

schluckt hat. Uebrigens wurde auch bei *Epistylis* und zahlreichen andern freischwimmenden Infusorien (*Stentor*, *Paramaecium* u. s. w.) eine Keimbildung beobachtet. In allen Fällen geht dieser Vorgang von dem Kerne aus, von dem sich ein Stückchen abschnürt, das dann entweder selbst zum Embryo wird oder auch eine grössere Menge kleinerer Embryonen in sich erzeugt. Auch bei der Theilung geht eine Abschürung des Kerns vor sich, während bei der Knospenbildung, die jedoch sonst nur durch unwesentliche Merkmale von der Theilung verschieden ist, der Kern der Knospe durch Neubildung entstehen dürfte. Uebrigens scheint es, als wenn ein bestimmter Wechsel in diesen verschiedenen Fortpflanzungsarten stattfände, indem Theilung (oder Knospenbildung) mehr den jungen Individuen, Keimbildung dagegen mehr den älteren zukommt. Verfasser halten es auch nicht für unmöglich, dass die letztere erst Folge einer geschlechtlichen Entwicklung sei, müssen diese Frage jedoch einstweilen noch aus Mangel entscheidender Beobachtungen offen lassen. Ebenso wenig lässt sich schon jetzt mit Bestimmtheit darüber entscheiden, ob die von unsern Verff. mehrfach, auch bei *Carchesium*, beobachtete Copulation zweier und mehrerer Individuen mit der Fortpflanzung irgendwie einen direkten Zusammenhang habe.

In einer Nachschrift (aus dem Frühlinge 1857) heben die Verff. hervor, dass sie, wie J. Müller (*J.B.* XXIII. S. 261), und zum Theil schon vor demselben, bei einigen Infusorien, besonders *Chilodon* und *Paramaecium*, im Innern des Kernes zahlreiche Stäbchen oder Fäden gesehen hätten, die trotz ihrer Bewegungslosigkeit möglicher Weise Samenfäden sein könnten. Aehnliche Fäden wurden auch bei *Stentor* gesehen und zwar beweglich, doch blieb deren Beziehung zum Thiere unbekannt, da dieselben, wie es schien, frei im Innern lagen. Uebrigens kommen auch *Paramaecien* vor, bei denen die Fäden entweder alle, oder theilweise gleichfalls in der Leibeshöhle gefunden werden. Lieberkühn, der dieselbe Beobachtung machte, glaubt diese Fäden bei *Paramaecium* auch im Innern des sog. Nucleolus gesehen zu haben.

Auch von d'Udekem erhielten wir eine Abhandlung über die Entwicklung der Infusorien, gleichfalls vorzugsweise nach Beobachtungen an *Epistylis plicatilis* (*Rech. sur le développement des Infusoires in den Mém. de l'Acad. roy. de Belg. T. XXX. 1857.*) Ref. kennt dieselbe bis jetzt nur aus dem von der Belgischen Akademie darüber abgestellten Berichte, *Bull. Acad. Belg. 1856. Août; l'Institut. 1857. p. 99.*

Verf. glaubt auf das Bestimmteste sich von der Richtigkeit der Stein'schen Angabe über die genetischen Beziehungen zwischen

Vorticellinen und Acineten überzeugt zu haben, lässt aber die letztern nicht direkt aus den erstern hervorgehen, sondern schiebt zwischen beide noch ein Mittelglied ein, ein flimmerndes Infusorium, das einer Opalina verglichen wird. Diese Opalina soll aus den auf ihren Stielen sich einkapselnden Epistilisköpfchen sich bilden, nach ihrer Bildung ausschwärmen und später nach Verlust ihrer Cilien in eine Acinete auswachsen. (Es scheint Ref., dass dem ersten Theile dieser Angabe jene Thatsachen zu Grunde liegen, die durch die Beobachtungen von Lachmann und Claparède ihre Erledigung gefunden haben.) Die Schwärmsprösslinge der Acineten entstehen nach Verf. durch Umwandlung des Kerns, geben aber, wie das auch von andern Seiten constatirt ist, keine Vorticellinen, sondern neue Actineten.

Die dem Journ. de Med. de Bruxelles 1857. Oct. inserirte Abhandlung desselben Verf. über die Metamorphosen der Vorticellinen ist Ref. eben so wenig zu Gesicht gekommen, dürfte aber vielleicht bloss eine Wiederholung der voranstehenden Mittheilungen sein.

Die Infusorien auf der Protozoentafel (Tab. I) der Icones zootomicae von Carus sind theils Copien des bekannten Stein'schen Werkes, theils auch nach Originalien dieses Forschers bearbeitet. Unter den letztern erwähnen wir die Abbildungen von *Prorodon teres* mit Kern und ansitzendem Kernkörperchen, *Stylonychia mytilus*, von *Vorticella microstoma* in verschiedenen Entwicklungszuständen, von *Vaginicola crystallina*, *Opercularia articulata* und deren vermeintlichen Acinetenzuständen. Als neu erscheint dabei die Angabe, dass der Schlundtrichter von *Prorodon* eine längsgefaltete Röhre darstelle und keineswegs aus getrennten Stäbchen zusammengesetzt sei.

Cohn macht einige Mittheilungen über *Nassula elegans*, besonders die bei derselben vorkommenden Pigmentanhäufungen (die nach dem Verf. aus Phykochrom bestehen und wahrscheinlich von den gefressenen Oscillatorien herrühren) und die Fortpflanzung. Letztere wird durch einen oder zwei Sprösslinge vermittelt, die im Innern einer nach Aussen offenen Höhle liegen, statt der Wimpern aber bloss einige strahlenartige Fortsätze tragen. Verf. erinnert dabei an die Behauptung von Stein (J. B. XXIII. S. 362), dass die Schwärmsprösslinge verwandter Formen sich in Acineten

verwandelten. Zeitschr. für wissenschaftl. Zoologie IX. S. 143. Mit Abbild.

Nach den Beobachtungen von Lieberkühn (Arch. für Anat. und Phys. 1857. S. 403) findet sich bei den Stentoren unterhalb der eigenthümlich gestreiften äusseren Bedeckung ein System scharf contourirter körnchenfreier Fasern, die sich in der Längsrichtung des Körpers zwischen der Wimperscheibe und dem Saugnapfe ausspannen und ihrer physiologischen Action nach als Muskelfasern gedeutet werden müssen.

Gegenbaur macht einige Mittheilungen über den Bau von *Trachelius ovum* (Archiv für Anat. und Physiolog. 1857. S. 309, Ann. and Mag. nat. hist. T. XX. p. 201) die, so weit sie den sog. Darm und die contractilen Blasen betreffen, genau mit den — dem Verf., wie es scheint, unbekannt gebliebenen — Angaben von Cohn (Ztschr. für wissenschaftl. Zool. IV. S. 266, Jahresbr. XXI. S. 94) übereinstimmen. Der sg. Darm besteht aus feinkörnigen Strängen oder Fäden, die Cohn sehr richtig mit den Plasmafäden in den Zellen der Tradeskantienhaare vergleicht, also aus einer soliden Masse, in die sich die genossene Nahrung aus der Mundöffnung hineindrückt. (Lachmann ist geneigt, diesen Apparat als einen verzweigten Darmkanal anzusehen; Müller's Arch. 1856. S. 360; eine Annahme, die wohl eben so irrig ist, wie die im letzten Jahresberichte S. 435 erwähnte Beschreibung von dem Darmkanale der *Noctiluca*, der sich nach den Untersuchungen des Ref. genau so verhält, wie bei *Trachelius*.) Der Zwischenraum zwischen diesen Sarcodesträngen ist nach Gegenbaur von Wasser erfüllt, das wahrscheinlicher Weise durch eine besondere, vor dem Munde gelegene Flimmeröffnung eintritt und gelegentlich auch, bei einer kräftigen Contraction der Körperwände, nach aussen entleert wird.

J. Samuelson hat sich jetzt (vgl. J. B. XXIII. S. 262) davon überzeugt, dass auch bei *Glaucoma* u. a. Infusorien eine Rotation der Nahrungsballen vorkommt, die freilich sehr viel langsamer sei als bei *Nassula* u. s. w. Gleichzeitig bestätigt derselbe die Anwesenheit eines mit der contractilen Blase zusammenhängenden Gefässsystems, das besonders bei *Amphileptus* sehr deutlich sei. Bei *Glaucoma*

bilden sich nach der Entleerung der (überall) sehr oberflächlich gebogenen Blase in der Tiefe des Körpers mehrere kleinere Hülfsbläschen (auxiliary vesicles). Quarterly Journ. V. p. 104—106.

Derselbe glaubt behaupten zu dürfen, dass Kerone eine höhere Entwicklungsform von Glaucoma darstelle und sich in encystirten Glaucomen ausbilde. Zugleich hebt derselbe hervor, dass der Einfluss gefärbter Lichtstrahlen auf das infusorielle Leben ein sehr verschiedener sei, dass namentlich blaue und rothe Strahlen dasselbe heben, gelbe Strahlen aber herabdrücken. Rep. br. Assoc. 26. Meet. p. 98.

Brigtwell publicirt Beobachtungen des Lieutenant Colonel Baddeley, durch welche die Annahme, dass sich Noctiluca durch Theilung vermehre, bestätigt und bewiesen wird. Aller Wahrscheinlichkeit nach geht die Theilung zunächst von dem Kerne aus. In einem Anhange von Tuffen West wird das Bewegungsorgan der Noctilucen als eine quergestreifte Muskelfaser in Anspruch genommen. Quarterly Journ. micr. Sc. V. p. 185—191.

G. Wagner liefert (Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Eingeweidewürmer Tab. XXV) eine ausgezeichnete Abbildung von dem in Anodonta schmarotzenden Paramaecium compressum Ehrbg.? und macht darauf aufmerksam, dass dieses und andere schmarotzende Infusorien, auch die Opalinen, durch Anwesenheit von contractilen Räumen und den in ihnen vorkommenden Infusorienkern von den wimpernden Trematodenembryonen wesentlich verschieden seien (helminthologische Bemerkungen a. a. O. S. 89).

In Betreff der Bursarien des Froschdarmes hält es dagegen Pagenstecher (Trematoden und Trematodenlarven S. 37) für wahrscheinlich, dass sie der Entwicklungsreihe gewisser Trematoden zugehören.

Ebendasselbst handelt Pagenstecher auch über andere parasitische Infusorien des Frosches, besonders über Amöben und stiellose Vorticellen (d. h. Trichodinen).

Durch Malmsten's Beobachtungen wird der Nachweis geliefert, dass bei gewissen pathologischen Zuständen, bei chronischen Diarrhöen mit Ulceration der Schleimhaut, in dem Dickdarme des Menschen mitunter ungeheure Mengen von

unzweifelhaft echten Infusorien auftreten. Verf. bezeichnet die Form als *Paramaecium* (?) *coli*; nach den beigegegebenen Abbildungen dürfte man darin wohl eine Bursaria oder Leucophrys erkennen, deren Arten bekanntlich auch sonst als Darmschmarotzer leben. In dem entleerten Kothie gehen die Thiere schon nach wenigen Stunden zu Grunde, wie denn überhaupt der Darmkanal der genuine Aufenthaltsort unserer Thierchen zu sein scheint. Verf. vermuthet sogar eine causale Beziehung zwischen ihnen und den begleitenden Krankheitserscheinungen. Virchow's Arch. für pathol. Anat. XII. S. 302. Mit Abbild. (Aus schwedischen Mittheilungen auch im Auszuge übergegangen in Bibl. univ. de Genève T. XXXIV. p. 371.)

Claparède und Lachmann erwähnen in der oben bereits angezogenen Mittheilung über die Fortpflanzung der Infusorien (l. c.) eine ganze Anzahl neuer und doch wenigstens noch unbenannter Arten, besonders aus den Gen. *Podophrya* und *Acineta*.

Podophrya cyclopum, *P. carchesii*, *P. quadripartita* (= *Acineta* *Epistylidis* St.), *P. pyrum*, *P. cothurnata* (= diademartige *Acineta* St.), *P. Troid*, *A. patula* und *A. cucullus*, die drei letzten Arten von der Norwegischen Küste. Die genannten Genera, die früher nur unvollständig charakterisirt wurden, unterscheiden sich nach unsern Verff. durch die Anwesenheit (*Acineta*) oder den Mangel eines Panzers (*coque*). Ein drittes verwandtes Genus wird von unsern Verff. als *Ophryodendron* neu aufgestellt, *O. abietinum* n. sp. auf Campanularen der norwegischen Küste. Ebenso *Paramaecium putridum* n. sp.

Dieselben Beobachter machen darauf aufmerksam (Ibid. p. 233), dass die von Ehrenberg zur Unterscheidung der Stentorarten hervorgehobenen Charaktere — Farbe, Bildung des Nucleus und Anwesenheit oder Mangel des wimpernden Längskammes — keineswegs beständig seien und nach dem Entwicklungszustande derselben Individuen vielfach wechseln.

Auch von Wright erhielten wir Beschreibungen einiger neuer mariner Infusorien: *Lagotia* (n. gen.) *viridis*, *L. hyalina*, *L. atro-purpurea*, *Vaginicola valcata*, *Ephelota* (n. gen.) *coronata*. Edinb. new phil. Journ. Vol. VIII. p. 277 c. tab.

Die erste vom Verf. den Ophryidinen zugerechnete Form — Ref. möchte dieselbe wegen Anwesenheit eines uniformen Flimmerkleides eher den Stentoren anreihen — zeichnet sich namentlich durch

Anwesenheit eines hufeisenförmig entwickelten Flimmerapparates aus, und bietet dadurch ein interessantes Gegenstück zu der oben (S. 103) erwähnten Annelidform *Phoronis*. Der überall flimmernde Körper steckt in einem retortenförmig gekrümmten hellen Gehäuse und ist mittelst des letzteren auf Muschelschalen befestigt.

Vaginicola valvata trägt hinter der Oeffnung des Gehäuses einen klappenartig beweglichen, an der Wand befestigten Deckel, der beim Hervorstrecken des Thieres sich aufhebt, beim Zurückziehen aber den untern Raum des Gehäuses mit dem Insassen abschliesst.

Ephelota ist schon früher von Alder beobachtet und (Ann. nat. hist. 1851) mit einigen andern verwandten, theils auf *Sertularia*, theils auf *Paludicella* lebenden Arten (*Podophrya ovata* und *pyriformis*) beschrieben, auch von Prichard später mit einem neuen, aber bereits vergebenen Genusnamen (*Alderia apiculosa*) in die zweite Auflage seines Infusorienwerkes aufgenommen. *Ephelota coronata* hat eine becherförmige Gestalt und ist mittelst eines langen und dicken, glashellen Stieles an fremden Körpern (in der Oeffnung der von *Pagurus* bewohnten Schneckenschalen) befestigt. Der vordere Körperraum trägt einen Kranz von dicken und spitzen Tentakeln, die ein Bündel fester Haarfäden in sich einschliessen und eine nur geringe Beweglichkeit besitzen.

Huxley beschreibt unter dem Namen *Dysderia* (n. gen.) *armata* ein sehr ausgezeichnetes mit *Euplotes* (bes. *O. macrostylus* Ehb.) und *Chlamidodon* verwandtes pelagisches Infusorium, dessen wesentlichster Charakter in dem Besitze eines zweiklappigen, aber unsymmetrisch entwickelten Schalenapparates, eines zapfenförmigen, von der Bauchfläche abgehenden Fusses und eines sehr mächtigen und complicirten Masticationsapparats besteht. Ein Nucleus konnte nicht aufgefunden werden, dagegen sah Verf. ein Mal ein Exemplar im Zustande der Zweitheilung (wobei der Masticationsapparat verschwunden war). Quarterly Journ. micr. Sc. V. p. 78 —82. c. tab.

Gosse, der dasselbe Thier beobachtete und es möglicherweise für identisch mit Ehrenberg's *Chlamidodon Mnemosyne* hält, stellt dessen Infusoriennatur in Abrede und glaubt es den Rotatorien überweisen zu müssen. Dabei giebt er dem Gen. *Dysderia* folgende Diagnose:

Lorica bivalvis, inaequalis, fere tota margine hiantē. Corporis facies capitales et ventrales ciliatae. Apparatus masticatorius valde elongatus, in mastace diagnoscenda non inclusus. (Cavitas digestiva

amplissima, simplex?) *Pes inarticulatus, indivisus, spathulatus, compressus.* Ibid. p. 138.

Anhangsweise erwähnen wir hier auch die merkwürdigen, in früherer Zeit mehrfach, besonders von Erdl und Kölliker, untersuchten Parasiten an den Venenanhängen der Cephalopoden, *Dicyema* Köll., die vielleicht am besten den Infusorien angereicht werden können und von G. Wagener (Archiv für Anat. u. Physiol. 1857. S. 354—368 mit Abbild.) sehr sorgfältig beschrieben sind.

Die *Dicyemen* sind bekanntlich langgestreckte, flimmernde Schläuche mit einem deutlich abgesetzten, zur Befestigung an den Venenanhängen dienenden Kopfende. Die Leibeshöhle enthält zweierlei Keime, bald „infusorienartige Embryonen“, bald auch wurmförmige, den Mutterthieren identische Junge, die aber niemals beide zusammen, sondern immer nur jede Art für sich, in besonderen Individuen zu treffen sind (Kölliker). Verf. beobachtete zwei Formen dieser merkwürdigen Thiere, die eine, *D. Eledones* (= *D. paradoxum* Köll.?) aus *Eledone moschata*, die andre, *D. gracile* n. sp. aus *Sepia officinalis*, beide durch eine abweichende Bildung ihres Kopfendes und die Gestalt ihrer infusorienartigen Embryonen leicht von einander zu unterscheiden. Die äussere Körperwand derselben besteht aus drei von einander verschiedenen Schichten, zweien, wie es scheint, structurlosen Grenzsichten und einer dazwischen liegenden Körner- oder Zellschicht, die freilich bei den einzelnen Individuen eine sehr verschiedene Dicke hat. Die Körnermasse dieser letzten Schicht sammelt sich nicht selten, besonders bei *D. Eledones*, an einzelnen Stellen zu warzenförmigen Hervorragungen an, die leicht abfallen und sich dann schnell auflösen (Knospen Köll.) In den Seitentheilen des Leibes bemerkt man zwei helle und durchsichtige Streifen, die sich an den Körperenden verlieren und weder Verbindungen mit einander, noch Contractionen erkennen lassen. Bei den jüngern, besonders den noch im Mutterleibe befindlichen *Dicyemen*, den sg. wurmförmigen Embryonen, ist der Körper völlig solide. Die Leibeshöhle wird hier von einem eigenthümlichen „Kerne“ ausgefüllt, einem festen, von Querscheidewänden durchsetzten Gebilde. Später lösen sich die beiden Enden dieses Kernes in einen tranbig verbundenen Haufen von Kugeln auf, die aus einander fallen und sich sodann durch Furchung und eine weitere, daran sich anschliessende Metamorphose in die beiderlei Keime verwandeln. Die infusorienartigen Embryonen zeigen einen Kopf und einen kurzen stummelförmigen Hinterleib, von denen bei *D. Eledones* (wie *D. paradoxum*) nur der letztere flimmert, während bei *D. gracile* die ganze Oberfläche mit Cilien besetzt ist. Dafür aber enthält der Kopf bei *D. Eledones* (wie *D. paradoxum*) im

Innern ein sehr eigenthümliches schalenartiges Organ (Blase Köll.), dessen Concavität nach dem Bauche zu gekehrt ist, und oberhalb desselben, dem Rücken zugewandt, zwei (oder mehrere) scharf contourirte Kalkkörperchen. Die völlig ausgebildeten Embryonen bohren sich einzeln durch die Leibeswand der Mutter hindurch, ohne dass diese dadurch in merklicher Weise verändert wird.

Eine dritte Form von *Dicyema*, *D. Mülleri* n. sp., wurde von Claparède an den Venenanhängen von *Eledone cirrosa* beobachtet und in einem Zusatze zu der voranstehenden Abhandlung mit ihren Embryonen beschrieben. A. a. O. S. 364.

Von einem Kern wurde nichts wahrgenommen; das schalenartige Organ der infusorienförmig, wie bei *D. Eledones* gestalteten Embryonen als ein von durchsichtiger Hülle umgebenes rundes Gebilde gedeutet. Statt zweier Kalkkörper findet sich ein ganzer Haufen runder stark lichtbrechender Körner. Die wurmförmigen Embryonen erschienen vollkommen starr und unbeweglich und niemals bewimpert, auch von etwas abweichender, zugespitzter Gestalt und mit gleichmässigem Inhalt.

In der Leibeshöhle von *Hydatina* beobachtete Leydig einen mit *Distigma tenax* verwandten Parasiten, der fast keinem einzigen Exemplare fehlte. Im Innern des gallertartigen weichen Körpers fanden sich viele fettartig glänzende Kugeln, die nach Druck mit dem Deckgläschen eine ziemlich intensive indigoblaue Färbung annahmen, ausserdem im Vorderende ein oder zwei helle kernartige Körper und ganz vorn endlich ein röthlicher Augenfleck. Die Bewegungen waren sehr lebhaft, doch liess sich kein Flimmerhaar entdecken. Müller's Arch. für Anat. u. Physiol. 1857. S. 415 (Ob die im Monat März nicht selten gleichfalls bei *Hydatinen* beobachteten parasitischen Bildungen, deren Verf., a. a. O. S. 410, als „scharf contourirte kuglige Körper mit feinem Haarbesatze“ Erwähnung thut, vielleicht in den Entwicklungskreis dieser Geschöpfe gehören?)

Ciliata. Cohn handelt über Keimung und Entwicklung der *Volvocinen* (Bot. Ztg. 1857. S. 764) und beruft sich dabei auf Beobachtungen über *Stephanosphaera pluvialis*, die seitdem in den Verhandl. der K. Leopold. Carol. Akademie Vol. XXVI. P. 1 ausführlich veröffentlicht sind. Wir heben daraus Folgendes hervor:

Es folgen bei *Stephanosphaera* immer mehrere Generationen beweglicher Familien, bevor eine ruhende Generation eintritt. Diese

entsteht, indem die einzelnen Primordialzellen ihre flimmernden Fäden verlieren und sich mit einer derben, dicht anliegenden Cellulosemembran umgeben, so dass sie dann den gewöhnlichen Protococcuszellen gleichen. In diesem Zustande der Ruhe sind die Zellen auch eines bedeutenden Wachstums fähig. Sind dieselben ausgewachsen, wobei sich ihre grüne Farbe gewöhnlich in Roth umwandelt, so entwickeln sie sich nicht weiter, es müsste denn sein, dass sie durch Verdunstung des umgebenden Wassers einem völligen Austrocknen unterlägen. Geschieht letzteres und werden die Zellen dann auf's Neue mit Wasser übergossen, so beginnt in ihnen nach wenigen Stunden die Entwicklung beweglicher Generationen. Der Inhalt der ruhenden Zellen theilt sich nämlich successiv nach bestimmten Richtungen in 2, 4, wohl auch in 8 Portionen, während die Membran sich auflöst. Die einzelnen Abtheilungen werden frei und bewegen sich mit Hülfe von zwei Flimmerfäden, umgeben sich sodann mit einer zarten Cellulosemembran und verwandeln sich durch Theilung des Inhalts schliesslich in die bekannten achtzelligen Familien.

Stein giebt Abbildungen von *Euglena viridis* im freien und eingekapselten Zustand, in letzterm auch mit Zwei- und Viertheilung. Carus, Icon. zoot. Tab. I. Fig. 11—16.

Rhizopoda.

Pick liefert (Verh. des zoolog. bot. Vereins in Wien VII. S. 35—38) „einige Mittheilungen über die lebenden Rhizopoden Wiens“ und schildert dabei den seit Rösel nicht wieder gesehenen Theilungsprocess von *Amoeba diffluens*, der Verf. übrigens auch die *A. princeps* und *A. verrucosa* Ehrbg.'s anreihen möchte.

Lachmann und Claparède beobachteten bei einem zu den Rhizopoden gehörenden neuen Thiere, das als Parasit auf *Epistylis plicatilis* lebt, *Urnula Epistylidis*, dieselbe Keimbildung aus dem Kern, wie bei den echten Infusorien. L. c. p. 233. Auch Theilung findet sich bei *Urnula*, aber dieser Vorgang ist dadurch ausgezeichnet, dass sich das eine Theilstück dabei (was auch für *Acineta mystacina* gilt) mit Wimperhaaren bedeckt. Ibid. p. 235 Note.

Carus theilt auf Tab. I seiner *Icones zootomicae* zwei von Stein gezeichnete Abbildungen von *Arcella vulgaris* und *Diffugia oblonga* mit (Fig. 57 u. 58). In beiden ist ein Kern, bei ersterer sogar constant ein doppelter Kern mit zahlreichen contractilen Blasen vorhanden.

Macdonald liefert auf zwei Tafeln die Abbildungen der von ihm bei den Feejee-Inseln aus Grundproben (Tiefe von 1020 und resp. 440 Faden) zusammengelesenen Polythalamien und beschreibt bei einigen lebend von ihm beobachteten Operculinen und Nummulinen einen förmlichen Stiel, mittelst dessen Hülfe dieselben (wie schon früher einmal von Clark behauptet ist, J. B. XXI. S. 106) bewegungslos auf fremden Gegenständen befestigt seien. Der Stiel soll in manchen Fällen durch Farbe und Aussehen dem Stiele junger Lepaden gleichen, öfters aber auch nur kurz und mit Kalkkörnchen durchsetzt sein. Ann. and Mag. nat. hist. XX. p. 193.

An einer andern Stelle (Ibid. p. 266) bemerkt derselbe Verfasser, dass er niemals bei einer Polythalamie die nach Aussen hervorgestreckten sg. Pseudopodien, noch eine Ortsbewegung beobachtet habe, wogegen jedoch Gosse (ibid. p. 365) mit Recht hervorhebt, dass bei der grössern Mehrzahl der betreffenden Thiere die Existenz sowohl einer Ortsbewegung wie auch der Pseudopodien nicht bezweifelt werden könne.

Von Parker und R. Jones erhielten wir Beschreibungen und Abbildungen zahlreicher norwegischer Polythalamien, die, nach den Bestimmungen unserer Verff., zum Theil mit fossilen Formen identisch sind (Ann. and Mag. nat. hist. T. XIX. p. 273—304. Tab. X u. XI). Die beschriebenen Arten sind folgende:

Lagena laevis Walk. und Mont., *Entosalenia globosa* Mont. (in 4 Varietäten), *Nodosaria laevigata* d'Orb., *N. communis* d'Orb., *Poly-morphina communis* d'Orb., *Spirillina vivipara* Ehrbg. (= *Cornuspira perforata* Schultze), *Operculina complanata* Basterot, *Nonionina crassula* Mont., *N. communis* d'Orb., *N. bulloides* d'Orb., *N. asterisans* Fichte u. Moll, *N. striato-punctata* Fichte u. Moll, *Polystomella crispa* Linn., *Cristellaria calcar* Linn., *Globigerina bulloides* d'Orb., *Rosalina vesicularis* Lam., *Truncatulina lobatula* d'Orb., *Anomalina coronata* n. sp., *Valvulina triangularis* d'Orb., *Bulimina marginata* d'Orb., *Uvigerina pygmaea* d'Orb., *Textularia sagittula* Sold., *Biloculina ringens* Lam., *Quinqueloculina seminulum* Linn., *Triloculina* (?) *oblonga* Mont., *Placopsilina canariensis* d'Orb.

Ehrenberg entdeckt in mittelmeeerischen, aus bedeutender Tiefe aufgehobenen Grundproben 101 verschiedene Polythalamienformen, von denen etwa die Hälfte neu ist,

einstweilen aber bloss dem Namen nach aufgeführt wird. Monatsber. der Berl. Akad. 1857. S. 555.

Ebenso 36 verschiedene Polycystinen mit 12 Sp. n. Ebendas. S. 559.

Auch die von Bailey vorgenommenen mikroskopischen Untersuchungen bestätigen das häufige, zum Theil selbst massenhafte Vorkommen von Polythalamien und Polycystinen in Grundproben. Silliman's Journ. Art. and Sc. 1857. Vol. XXIII. p. 153—157.

Macdonald untersucht den Darminhalt der Salpen und findet darin eine Menge von Thier- und Pflanzengerüsten, die sich nach den beigegebenen Abbildungen zum Theil auf Polythalamien (Globigerina) und Polycystinen (Eucyrtidium, Acanthometra u. s. w.) zurückführen lassen. Annals and Mag. nat. hist. T. XX. p. 264. Tab. VIII.

Gregarinae.

Stein liefert in Carus, Icon. zoot. Tab. I. Fig. 1—4 vier Abbildungen von Didymophyes gigantea St., Monocystis agilis St., Stylophryne oligacanthus v. Sieb., Didymophyes paradoxa St.

Die von Kölliker an den Darm- und Lungengefässen von *Holothuria tubulosa* aufgefundenen parasitischen Bildungen (Ztschr. für wiss. Zool. IX. S. 138) sind nach Schneider's Untersuchungen Gregarinen mit zwei Kernen, die in besonderen Aussackungen der Gefässe liegen.

Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Entomologie während des Jahres 1857.

Von

Dr. A. Gerstaecker,

Privatdocenten an der Universität in Berlin.

I. Insekten.

Die Entwicklungsgeschichte der Insekten mit vollkommener Metamorphose bot während der verschiedenen Perioden des Eies, der Larve und Puppe nach den bisherigen Erfahrungen mit wenigen Ausnahmen (Pupiparen) eine so vollständige Uebereinstimmung und Gleichförmigkeit dar, dass ein so paradoxer Vorgang, wie er von Fabre (*Mémoire sur l'hypermétamorphose et les mœurs des Mélodies*, *Annales des sciences naturelles*, 4. sér. VII. p. 299—365) in der Entwicklung der Larven von *Sitaris* und *Meloë* beobachtet und in äusserst scharfsinniger Weise erläutert worden ist, die grösste Beachtung verdient. Zwar waren schon von Newport in seiner Entwicklungsgeschichte des *Meloë cicatricosus* (*Transact. Linnean soc.* Vol. XX) einige Andeutungen über die hier obwaltenden Verhältnisse gegeben worden, indem durch ihn festgestellt wurde, dass die junge Larve, wie sie aus dem Ei schlüpfe, eine von der erwachsenen durchaus verschiedene Form darbiete; dagegen war einerseits der Uebergang dieser ersten Form in die spätere, andererseits die verschiedenen Metamorphosen, welche der letzteren vorbehalten sind, völlig unbekannt geblieben. Fabre hat dagegen die ganze Entwicklungsgeschichte der *Sitaris humeralis* vom Ei bis zum Ausschlüpfen des Insektes und in fast ebenso erschöpfender Weise die von *Meloë* beobachtet und dargestellt. Aus dem Ei der *Sitaris humeralis* schlüpft die

erste Form der Larve (larve primitive), ein kleines, schlankes, horniges, mit sechs schlanken Beinen, langen, fadenförmigen Fühlern und vier Ocellen versehenes Insekt, welches der bekannten jungen Meloë-Larve (*Pediculus apis* Lin.) gleicht. Dieselbe kriecht im Herbst aus, überwintert ohne Nahrung zu sich zu nehmen, klammert sich im Frühjahre an die Haare des Halsschildes der Männchen von *Anthophora pilipes* fest, geht bei der Begattung dieser Biene auf den Körper des Weibchens über, lässt sich von diesem in eine seiner Zellen tragen und setzt sich in dem Augenblicke, wo das Bienen-Weibchen die Zelle mit einem Ei belegt, auf diesem fest. Nachdem die Biene die Zelle verschlossen hat, beisst sich die junge Larve in das Bienen-Ei ein, saugt seinen Inhalt aus, schwimmt nach einiger Zeit auf der dem Honig aufliegenden Eihaut und verwandelt sich sodann nach Berstung ihrer hornigen Körperbedeckung in eine weiche, plumpe Made, welche eine von der ersten ganz verschiedene Körperform zeigt; die Fühler und Fusspaare sind ganz kurz, stummelartig, die Augen fehlen. Während der ersten Larve jede Berührung mit dem in der Bienenzelle angesammelten Honig tödtlich ist, nährt sich die jetzt entstandene einzig und allein von demselben und erreicht durch Aufnahme desselben in ihren Körper ihr vollendetes Wachsthum; Fabre nennt diese Entwicklungsstufe „seconde larve.“ Nach kurzer Zeit hebt sich von dieser Larve die sehr dünne Körperhaut, ohne jedoch zu bersten, ab und in ihrem Innern zeigt sich eine hornige, puppenartige Form, welche mit der vorhergehenden Larve zwar Aehnlichkeit hat, sich aber dadurch unterscheidet, dass an der Stelle der drei Fusspaare nur warzenartige Erhöhungen, an der des Kopfes nur ein kleiner, kugliger Wulst übrig bleibt: diese Form (pseudo-chrysalide) ist vollkommen unbeweglich. Auch die Hülle dieser Entwicklungsform hebt sich von ihrem Inhalte als hornige Kapsel ab und umschliesst nunmehr abermals eine Larve (troisième larve), welche der „seconde larve“ fast in jeder Beziehung, mit Ausnahme der abgeflachten Bauchseite, ähnlich ist. Diese letzte Form der Larve verwandelt sich in gewohnter Weise in eine Puppe, welche den Coleopteren-Puppen ganz analog ist und das vollkommene Insekt liefert.

Zur richtigen Auffassung dieser sonderbaren Vorgänge ist zuvörderst eines Umstandes zu erwähnen, welcher schon in der vorjährigen Notiz des Verf. (vergl. Jahresbericht 1856. p. 12) von ihm angedeutet, aber in irreleitender Weise aufgefasst worden ist; Fabre fand nämlich die dritte Form der Larve bald mit dem Kopf-, bald mit dem After-Ende gegen den Kopfpol der „pseudo-chrysalide“ hin gewendet, was den Ref. verleitete, in ihr einen der zweiten Larve fremden Organismus zu vermuthen. Dieses Räthsel hat sich nun aber durch fernere Untersuchungen des Verf. dahin aufgelöst, dass bei regelrechter Lage der „pseudo-chrysalide“ in den Zellen der Anthophora eine solche verschiedenartige Einbettung der „troisième larve“ niemals vorkommt, sondern dass sie nur durch Umdrehung der Larve um ihre eigene Achse in solchen „pseudo-chrysalides“ bewirkt wurde, welche zur Beobachtung vom Verf. aus den Bienenzellen herausgenommen und zufällig auf ihrem Kopfende zu stehen gekommen waren. Trotzdem bleibt aber die Verwandlung der ausgewachsenen Larve in eine tonnenartige Puppe und die Bildung einer dritten, der vorhergehenden ähnlichen Larve innerhalb dieser Puppe eine so paradoxe Erscheinung, dass eine Erklärung aus der Analogie gänzlich wegfallen muss, vielmehr nur aus den speziellen hier obwaltenden Verhältnissen vorgenommen werden kann. Zuerst glaubte Fabre dabei an eine Metagenese, besonders durch die früher irrig aufgefasste Lage der dritten Larve in der „pseudo-chrysalide“ veranlasst; er wollte für die Dauer der Entwicklung vom Ei bis zum ausgebildeten Insekte zwei Individualitäten annehmen, eine ungeschlechtliche, welche mit der „pseudo-chrysalide“ abgeschlossen wäre und eine darauf folgende geschlechtliche, die durch Keimung innerhalb der Puppe entstände und durch die „troisième larve“ repräsentirt würde. Einer solchen Annahme widersprach jedoch die Untersuchung der anatomischen Verhältnisse der „pseudo-chrysalide“, welche sich in Betreff des Mangels von Geschlechtsorganen als ganz übereinstimmend sowohl mit der zweiten als dritten Larvenform zu erkennen gab. Es blieb daher nur übrig, die verschiedenen Verwandlungen, welche die Meloiden-Larven durchmachen, mit den gewöhnlichen Häutungen der Insekten-Larven in Vergleich zu bringen und die sehr beträchtlichen Form-Verschiedenheiten der ersten und zweiten Altersstufe als nothwendige Folge von den sehr heterogenen äusseren Lebensbedingungen (auf dem Bienenkörper und nachher in der mit Honig gefüllten Zelle) anzusehen; freilich bleibt dabei der Zweck der „pseudo-chrysalide“ und der daraus entstehenden dritten Larvenform unerklärt, denn man kann wohl nicht annehmen, dass so wesentliche Veränderungen der Körperbedeckung unbedingt nothwendig seien, um so geringe Unterschiede in der Körperform, wie sie die zweite und dritte Larvenform darbieten, hervorzubringen.

Wenn man also auch die Häutung der zweiten Larvenform und das Abheben der Puppenhülle von der dritten als die Analoga der späteren Häutungen bei den regulären Insekten-Larven ansehen wollte, so könnte dies eben nur in Betreff der Aufeinanderfolge, aber nicht in Rücksicht auf den dadurch erzielten Zweck geschehen, da das bei der regulären Larven-Häutung zu Grunde liegende Wachsthum im gegenwärtigen Falle mangelt. Bei Meloë, deren Entwicklungsgeschichte von Fabre (a. a. O. p. 344) ebenfalls in den Hauptstadien genau verfolgt worden ist, zeigen sich übrigens die bei Sitaris beobachteten Erscheinungen schon etwas modificirt, indem hier sowohl die Larvenhaut der „deuxième larve“ beim Uebergange zu der „pseudo-chrysalide“, als auch die Kapsel der letzteren bei dem Erscheinen der eigentlichen Käferpuppe bersten und ihren neu gebildeten Inhalt zum grossen Theile frei hervortreten lassen. Zu bemerken ist hierbei, dass das, was Newport die Pseudolarve von Meloë nennt, die Pseudo-chrysalide Fabre's ist, während ersterer die eigentliche (zweite) Larve gar nicht gekannt hat; die „troisième larve“ von Meloë ist keinem von beiden Autoren bekannt geworden, doch hat Fabre aus ihrer der Puppe noch ansitzenden Haut erkennen können, dass sie wie bei Sitaris der zweiten Form im Wesentlichen ähnlich ist. (Näheres über die Meloë-Larven siehe unter Vesicantia.) — Die verschiedenen Entwicklungsstufen der Sitaris- und Meloë-Larven sind auf der die Fabre'sche Abhandlung begleitenden pl. 17. fig. 2—9 abgebildet.

Dass die v. Siebold'sche Arbeit über Parthenogenesis bei den Insekten das Interesse der Forscher in hohem Grade in Anspruch nehmen würde, liess sich bei der Wichtigkeit des Gegenstandes von vorn herein erwarten; wie sehr dieselbe die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, ergiebt sich nicht nur aus den zahlreichen Auszügen, welche das Werk in allen wissenschaftlichen Journalen des Auslandes erfahren hat, und aus einer Uebersetzung ins Englische „On a true Parthenogenesis in moths and bees, a contribution to the history of reproduction in animals, by C. v. Siebold, translated by W. S. Dallas.“ (London, van Voorst 1857. 8), sondern auch aus dem Umstande, dass von verschiedenen Seiten Mittheilungen über ähnliche Fälle ungeschlechtlicher Fortpflanzung oder über Insekten, wo eine solche zu vermuthen steht, gemacht worden sind. Von verschiedenen Mitgliedern der Entomological society in London wurden z. B. mehrere Lepidopteren, wie *Lasiocampa quercus*, *Orgyia antiqua*, *Psyche fusca*, *Fumea nitidella*, *Arctia*

Caja, *Liparis dispar* als solche bezeichnet, bei denen man aus unbefruchteten Eiern sich Raupen entwickeln sah (Proceed. entom. soc. IV. p. 37) und Haliday nahm Gelegenheit, in der Natural history review (Vol. IV. Proceed. of soc. p. 166 ff.) auf die eigenthümliche Bildung der weiblichen Geschlechtsorgane bei der Diapriden-Gattung *Labolips*, von der ihm überdies nur weibliche Individuen bekannt geworden sind, als solche hinzuweisen, welche eine Fortpflanzung auf ungeschlechtlichem Wege mit Wahrscheinlichkeit vermuthen lasse. Die Eierstöcke zeigen nämlich bei dieser Gattung eine eigenthümliche sphärische Form, enthalten eine grosse Anzahl mit einem Kern versehener, gleich grosser Bläschen (Eier?), welche ihrer Oberfläche ein körniges Ansehen verleihen und ein *Receptaculum seminis* wird an dem gemeinschaftlichen Ausführungsgang vermisst.

Als Beitrag zur Parthenogenesis der Psychiden mag auch noch ein Aufsatz von Millièrre „Création d'un genre nouveau *Apteron* et histoire des *Inséctes*, qui le composent“ (Annales de la soc. Linnéenne de Lyon IV. 1857. p. 181 ff.) erwähnt werden, der, wenn er auch sonst sich keineswegs dem Standpunkte der Wissenschaft in dieser Frage anpasst, doch eine interessante Beobachtung enthält, nämlich die, dass *Psyche helicinella*, von welcher der Verf. ebenfalls nur Weiber gekannt und diese in der Regel zahlreiche Eier hat ablegen gesehen, ausnahmsweise auch lebendige Larven gebären kann.

Von zahlreichen Puppen-Gespinnsten der genannten und einer zweiten Art (*Apteron pinastrella* Mill.), die behufs genauer Beobachtung in einzelne Glasbehälter vertheilt worden waren, blieben einige zurück, ohne dass das Weibchen daraus hervorkam; die Gespinnste wurden aufgeschnitten, darin das entwickelte Weibchen vorgefunden und bei der Sektion desselben zahlreiche lebende Larven in seinem Abdomen angetroffen. — Wenn der Verf. aus seinen Beobachtungen, die mit den seit längerer Zeit bekannten über das Ablegen unbefruchteter, aber entwicklungsfähiger Eier bei den Psychiden genau übereinkommen, den Schluss ziehen will, dass hier ein Hermaphroditismus vorliege, so braucht auf das Unzureichende dieser Folgerung nach der über die sexuellen Verhältnisse der Psychiden durch wissenschaftliche Untersuchungen festgestellten Thatfachen nicht weiter hingewiesen zu werden; wie bei vielen anderen Arten

wird wahrscheinlich auch bei *Psyche helicinella* das Männchen einen sehr verschiedengeformten Sack haben und daher der Beobachtung bisher entgangen sein. In sofern ist auch natürlich die Begründung einer eigenen Gattung auf drei *Psyche*-Arten, die der Verf. für hermaphroditisch oder nur in einem Geschlechte existirend ansieht, durchaus unbegründet.

Als Beitrag zur Fortpflanzungsgeschichte der Blattläuse erwähnte C. von Heyden (Entomol. Zeitung p. 83 f.) eine interessante Beobachtung, die auf den ersten Blick die Ueberzeugung gewähren könnte, dass dasselbe Individuum, welches eine Zeit lang als Amme lebendige Junge zur Welt gebracht hat, im Herbste sich zum wirklichen Weibchen, welches Eier legt, umwandeln kann. Der Verf. fand im Oktober unter Eichenrinde eine 20 Individuen starke Colonie von *Lachnus quercus*, sämmtlich Weibchen; eins derselben gebar im Beisein des Beobachters ein kleines (ebenfalls ungeflügeltes) Männchen, während die übrigen ein eben solches Männchen, mit dem sie in Begattung waren, auf dem Rücken trugen; letztere legten während der Begattung Eier ab, deren Entwicklung aber nicht abgewartet wurde. Aus dieser Beobachtung zieht v. Heyden den allerdings sehr nahe liegenden Schluss, dass die Männchen, welche mit den Weibchen in Begattung gefunden wurden, von diesen selbst geboren worden seien, oder, was dasselbe ist, dass das von dem einzelnen Weibchen geborene Männchen sich ohne Zweifel später mit seiner eigenen Mutter begattet haben würde, wie es die übrigen thaten.

So täuschend diese Beobachtung erscheinen mag und so sehr sie für das Zusammenfallen des Ammengebürens und Eierlegens bei einem und demselben Individuum sprechen könnte, ist sie doch keineswegs geeignet, ein solches Faktum sicher hinzustellen; denn es fehlt die direkte Beobachtung, dass das vom Weibchen geborene Männchen sich mit ersterem begattet habe und ebenso, dass die mit den Weibchen in Begattung gefundenen Männchen von diesen geboren worden seien. Vielmehr liegt die Vermuthung nahe, dass die in Copula betroffenen Individuen die geschlechtlich entwickelte Nachkommenschaft einer Amme seien, und dass andererseits als Amme das Weibchen anzusehen sei, welches unter den Augen des Beobachters das einzelne Männchen gebar. Die äussere Uebereinstimmung im Körperbau zwischen dem einzelnen Weibchen (der muthmasslichen Amme) und den geschlechtlichen (in Copula getroffenen) Weibchen kommt hier

nicht weiter in Betracht, da beide nach Burnett (vergl. Jahresbericht 1854. p. 160) bei gewissen Blattläusen keine in die Augen fallenden Unterschiede zeigen. Dass aber eine Blattlaus-Amme sich mit der Zeit in ein eierlegendes Weibchen verwandle, ist nach den von v. Siebold und Leydig nachgewiesenen Unterschieden in der Bildung der Genitalapparate beider Formen nicht gut denkbar. Ref.

Ueber die Copulation verschiedener aber nahe verwandter Insekten-Arten einer und derselben Gattung, wie sie schon vielfach bekannt geworden ist, wurden auch in diesem Jahre verschiedene Mittheilungen gemacht, und zwar betreffen zwei derselben die fruchtbare Vermischung von *Smerinthus populi* und *ocellatus*. In einem Falle (Th. Hagne in „The Entomologist's weekly intelligencer for 1857,“ Vol. II. p. 188 und 197) ergab die Zucht der daraus entsprungenen Raupen eine Anzahl von Bastarden, welche die verschiedenen Form- und Färbungsverhältnisse beider Arten in allen möglichen Combinationen und Abstufungen zeigten. In dem anderen Falle, von A. de Roo van Westmaas „Eene hybride sort uit het genus *Smerinthus*“ (Mémoires d'entomologie, publiés par la soc. entom. des Pays-Bas I. p. 154 ff.) mitgetheilt, fand zwar nach der Begattung eines Männchens von *Smer. ocellatus* mit einem Weibchen von *Smer. populi* ebenfalls ein Ablegen von zahlreichen Eiern, so wie die Zucht einer Anzahl von Raupen bis zur Verpuppung statt, indessen kamen aus den Puppen, welche denen von *Smer. populi* gleichen, keine Schmetterlinge zum Vorschein; beim Oeffnen derselben fanden sich darin die Imagines vollständig entwickelt aber todt vor, stimmten übrigens dem Anscheine nach vollkommen mit der Mutter (*Sm. populi*) überein.

Eine Copulation, die zu den aussergewöhnlicheren gehört, wurde zwischen einer Eule, *Noctua vaccinii*, und einem Spanner, *Hibernia progemma*, beobachtet und im Bulletin de la soc. entomol. V. p. XLI zur Sprache gebracht. Bei der Trennung beider Arten blieb das männliche Begattungsorgan im Abdomen des Weibchens zurück, ein Ablegen von Eiern erfolgte nicht. — Diese Mittheilung gab (ebenda) zur Erwähnung ähnlicher Fälle Veranlassung: *Bombyx dispar* wurde mit *Pieris brassicae*, ein *Elater* mit einem *Telephorus*, *Otiorhynchus unicolor* mit *Oreina senecionis* in coitu angetroffen.

Eine gewiss seltene Zwitterbildung hat Ruthe (Entomol. Zeitung p. 160) bei einem Braconiden, dem *Blacus maculipes* Wesm. beobachtet und Notizen darüber mitgetheilt; das Thier ist nach der Bildung der Fühler, Flügel und des Körpers auf der linken Seite männlich, auf der rechten weiblich.

Eine andere Abnormität legte Smith (Proceed. of the entomol. society IV. p. 34) der Entomologischen Gesellschaft zu London in einem Exemplar von *Cybister limbatus* vor, welches einen Larven-Kopf hatte und mit diesem lebendig bei Hongkong schwimmend gefangen wurde. Westwood bemerkte hierzu, dass dieser Fall bei den Coleopteren bisher nicht bekannt geworden sei, dagegen wäre von Schmetterlingen schon eine *Nymphalis populi* vorgekommen, welche ebenfalls den Kopf einer Raupe gehabt hätte.

Yersin hat seine im vorigen Jahresberichte p. 13 erwähnten Untersuchungen über die Funktionen des Nervensystems bei den Gliederthieren weiter fortgesetzt und die Resultate derselben jetzt in ausführlicherer Weise im Bulletin de la société Vaudoise des sciences naturelles No. 41 (im Separat-Abdruck 23 pag. in 8.) mitgetheilt.

Der Verf. bringt die von ihm angestellten Versuche unter vier Categorien und beschreibt darunter die dabei erhaltenen Resultate: 1) Eine einzelne Durchschneidung beider Nervenstränge in gleicher Höhe und zwar a) eine einzelne Durchschneidung, wodurch die Ganglien-kette nur in zwei Theile getrennt wird (hierunter α) Durchschneidung zwischen dem Ganglion supra- und suboesophageum, β) zwischen dem zweiten Kopf- und dem ersten Thoraxganglion, γ) zwischen den Ganglien des Thorax oder denen des Hinterleibs). — b) Zwei Schnitte durch beide Stränge auf einmal, um ein Ganglion vollständig von der übrigen Kette zu isoliren (das letzte Hinterleibsganglion, das Ganglion suboesophageum, die Thoraxganglien werden isolirt). — c) Durchschneidungen der beiden Stränge in der Art, dass zwei oder mehrere Ganglien zugleich von der übrigen Kette isolirt werden. 2) Verletzung der Kopfganglien. 3) Durchschneidung eines einzelnen Stranges an einer einzigen Stelle der Ganglien-kette (zwischen den Kopfganglien, zwischen Kopf und Thorax, zwischen Pro- und Mesothorax, zwischen Meso- und Metathorax, zwischen Metathorax und Hinterleib). 4) Vereinigungen von Schnitten durch einen einzelnen und durch beide Stränge, in verschiedener Weise angestellt.

Auch Faivre legte der Akademie der Wissenschaften zu Paris (Comptes rendus, 6. Avril 1857, Rev. et Magas. de Zoologie IX. p. 185) eine Notiz über das Gehirn der Dytiscen, in Bezug auf die Ortsbewegung betrachtet, vor. Die Ganglia supra- und suboesophagea und die sie verbindenden Stränge repräsentiren nach ihm das Gehirn und üben einen deutlichen Einfluss auf die Ortsbewegung aus; der über dem Oesophagus liegende Theil des Gehirns soll der Sitz des Willens und der Bestimmung der Bewegungen sein, der unter demselben liegende der Sitz der erregenden Ursache und der coordinirenden Kraft.

Ein vortreffliches Handbuch der vergleichenden Physiologie und Anatomie des Menschen und der Thiere hat Milne Edwards unter dem Titel: „Leçons sur la physiologie et l'anatomie comparée de l'homme et des animaux“ (Paris, Masson 1857. 8.) begonnen. Dasselbe hat zum Zweck, den gegenwärtigen Umfang unserer Kenntnisse auf diesem Gebiete, welches dem Verf. selbst zahlreiche und wichtige Beiträge zu verdanken hat, hinzustellen und erfüllt denselben in der vollständigsten und eingehendsten Weise. Wie sich aus den bis jetzt vorliegenden Abschnitten des Werkes, von dem im J. 1857 der erste und zweite, im J. 1858 der dritte Theil erschienen ist, ersehen lässt, ist dasselbe auf eine grössere Anzahl von Bänden berechnet, als man gewöhnlich an Handbüchern gewohnt ist. Was die Hauptanlage desselben betrifft, so geht der Verf. von den einzelnen physiologischen und anatomischen Organsystemen, also dem der Cirkulation, Respiration u. s. w. als den Hauptabschnitten aus und handelt unter diesen jedesmal nach den allgemeinen Eigenschaften und Funktionen diejenigen der einzelnen Thierklassen und Gruppen ab. Dass unter letzteren gerade den Artikulaten eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt ist, braucht bei den bekannten Forschungen des Verf. im Bereiche der Crustaceen kaum erwähnt zu werden und es sind die den Artikulaten gewidmeten Abschnitte des Werkes für den wissenschaftlichen Entomologen von ebenso grosser Wichtigkeit, wie das Ganze dem Zoologen unentbehrlich ist. — Der erste Band handelt von der histologischen und chemischen Zusammensetzung des Blutes, seiner quantitativen Analyse und der Blutmenge im Körper, ferner

vom Prozesse der Respiration und den dazu dienenden Organen im Allgemeinen; der zweite Band geht auf die Art der Respiration bei den einzelnen Thierklassen und die Struktur der Athmungswerkzeuge derselben ein und zwar ist in demselben die 11. und 12. Vorlesung (p. 116—198) den Crustaceen, Arachniden, Insekten und Myriapoden gewidmet; der dritte endlich beschäftigt sich mit der Circulation des Blutes, zuerst im Allgemeinen, dann bei den einzelnen Thierklassen und hier ist es die 23. und 24. Vorlesung (p. 178—232), welche auf den Kreislauf der Arthropoden eingeht.

Die von V. Carus in Verbindung mit anderen namhaften Zootomen herausgegebenen *Icones zootomicae* enthalten in ihrem ersten, den wirbellosen Thieren gewidmeten Theile (Leipzig, Engelmann 1857. fol., 23 tab.) zahlreiche Erläuterungen des inneren und äusseren Baues der Arthropoden auf Taf. X—XVI. Für die Crustaceen sind 2, für die Myriapoden und Arachniden ebenfalls 2, für die Hexapoden 3 Tafeln verwandt; die Abbildungen sind zum grössten Theil den besten Spezial-Arbeiten früherer Autoren entlehnt und mit Einsicht ausgewählt, eine kleinere Anzahl ist jedoch auch nach Originalzeichnungen von Stein angefertigt. Zu letzteren gehören u. a. die Mundtheile der Myriapoden und Coleopteren und ganz besonders die Darstellung der Genitalapparate beider Geschlechter von Insekten der verschiedensten Ordnungen, letztere gleichsam als Supplement zu der bekannten Arbeit des Verf. über die weiblichen Genitalien der Käfer. — Im Verhältnisse zu anderen Systemen scheint dem Ref. die Darstellung des Hautskelettes der Insekten, besonders aber des Thorax und der Mundtheile der saugenden Insekten etwas gar zu dürftig ausgefallen zu sein; für letztere wären genau angefertigte Abbildungen um so zweckmässiger gewesen, als deren in fast allen Lehrbüchern ein grosser Mangel ist und besonders erscheint die Copie von so wenig instruktiven und noch dazu unrichtigen, wie z. B. die Newport'sche von *Eristalis* (Tab. XIV. fig. 40) ist, unzweckmässig. — Die Ausstattung des Werkes und die Ausführung der Tafeln sind in jeder Beziehung vortrefflich und sorgsam.

Durch F. Leydig's „Lehrbuch der Histologie des Men-

schen und der Thiere“ (Frankfurt a. M., Meidinger 1857. gr. 8., 551 pag. mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzschnitten) ist eine der wesentlichsten Lücken in der wissenschaftlichen Zoologie, die in dem Mangel einer übersichtlich abgefassten Darstellung der vergleichenden Gewebelehre bestand, in ausgezeichneter Weise beseitigt worden, indem anerkannter Maassen wohl Niemand zu einem solchen Unternehmen in gleicher Weise befähigt war, wie der durch seine zahlreichen in dieses Feld einschlagenden Arbeiten bewährte Verfasser. Was das Werk besonders werthvoll macht und wodurch es sich von zahlreichen Handbüchern über verwandten Zweige der Wissenschaft unterscheidet, ist, dass der Verf. sich nicht auf die Beobachtungen früherer Autoren stützt, sondern fast durchweg seine eigenen Untersuchungen vorlegt und zwar neben denjenigen, die schon in speziellen Abhandlungen von ihm bekannt gemacht worden sind, auch sehr zahlreiche, zur Herausgabe des vorliegenden Werkes eigens angestellte neue. Das Buch zerfällt in einen allgemeinen und einen speziellen Theil, von denen der erstere sich mit der Untersuchung der Zelle und der Gewebe im Allgemeinen beschäftigt, der letztere auf die einzelnen Organe und Organsysteme eingeht und deren histologische Zusammensetzung bei den verschiedenen Thierklassen darstellt. Als besonders zweckmässig ist die Einrichtung zu rühmen, dass die Darstellung des Gegenstandes nirgends durch Anmerkungen und Citate unterbrochen wird, diese vielmehr an das Ende eines jeden Abschnittes verwiesen sind, wo sie sich gleich durch abweichenden Schriftsatz kenntlich machen; überhaupt ist die Ausstattung des Werkes und besonders die Erläuterung des Dargestellten durch zahlreiche, vortrefflich ausgeführte Holzschnitte nur zu rühmen. — Natürlich muss Ref. darauf verzichten, die zahlreichen Beobachtungen des Verf. im Bereiche der Arthropoden hier vollständig anzuführen, kann sich indessen nicht versagen, auf einzelne besonders interessante Einzelheiten, die ihm bei Durchsicht des Werkes auffielen, in Kurzem hinzuweisen.

Zu diesen gehören z. B. die Untersuchungen Leydig's über die sogenannten „Rektaldrüsen“ im Mastdarme der Insekten (p. 337 ff.), welche er an einer Reihe von Insekten verschiedener Ordnungen an-

gestellt hat; der Verf. hält dieselben nicht für Drüsen, sondern für eigenthümlich gebildete Papillen und Falten des Darms, indem sie sich mit Bestimmtheit als Einstülpungen des Darmrohrs nach innen herausstellen. Besonders in den Fällen, wo sie, wie bei *Gryllus*, *Locusta* u. a., länglich gestaltet sind, lässt sich ihre Analogie mit den auch sonst vorkommenden Längsfalten des Dickdarmes erkennen; dagegen spricht gegen ihre Drüsennatur nicht nur der Mangel einer Oeffnung auf ihrer Oberfläche, sondern auch das Faktum, dass sie durch Einstülpung der Darmwand hervorgebracht sind, was bei Drüsen nie der Fall ist, — endlich auch die Anwesenheit eines im Hohlraume der Einstülpung gelegenen Zapfens, der nur aus Bindesubstanz und einem dichten Tracheen-Netze besteht. Einen besonders glücklichen Wurf für die Aufklärung der Natur jener Rektalgebilde hat der Verf. aber jedenfalls durch die Untersuchung ihrer Struktur bei *Phryganea* gemacht, indem dieselben hier eine Art Uebergang zu den Mastdarm-Kiemens der Libellenlarven erkennen lassen; sie sind nämlich von bedeutendem Umfange und länglicher Gestalt, zeigen regelmässig gestellte häutige Septen, die von beiden Seiten her in das Innere hervorspringen und zum Tragen von Tracheenausbreitungen dienen. Es ist daher, wie dies schon die Analogie der Lage und oft auch der Form muthmassen lässt, sehr wahrscheinlich, dass die sogenannten Rektaldrüsen mit der Respiration durch die Darmfläche in naher Beziehung stehen. — Die bisherigen Angaben über die Zusammensetzung der Tracheen aus einer äusseren Peritonealhülle, einer inneren Schleimhaut und dem zwischen beiden liegenden Spiralfaden weist L. als unrichtig nach; es existiren nur zwei Häute, eine äussere, die durch das Verwachsen derselben Zellen, welche den Fettkörper bilden, entstanden ist und einer inneren, einer homogenen Chitinhaut, die den Spiralfaden ihrerseits erzeugt, so dass er nicht als selbstständiges Gebilde zu betrachten ist; diese Chitinhaut ist irriger Weise als eine aus Pflasterepithelium bestehende Schleimhaut angesehen und die auf ihr zuweilen vorkommenden Stachelborsten, welche wie die Spirale nur Auswüchse und Verdickungen der Chitinhaut sind, sogar als Flimmer-Organen angesprochen worden. Wenn bei den Arachniden-Tracheen der Spiralfaden bisher geleugnet worden ist, so existirt doch wenigstens ein Analogon desselben darin, dass die Chitinmembran innerhalb ringförmig vorspringende Leisten bildet, zwischen denen sich abermals feine Plättchen erheben. (p. 386 ff.) — Von ganz besonderer Wichtigkeit scheint mir in Rücksicht auf die divergirenden Ansichten, welche noch immer über die Natur der Vasa Malpighi obwalten, die Entdeckung des Verf. zu sein, dass unter denselben zwei heterogene Elemente vorkommen, von denen die einen als Harngefässe, die anderen als Gallengefässe anzusehen sind (p. 472). Erstere sind weisslich, bei *Gryllotalpa* in Minderzahl vorhanden, und

lassen in ihrem Lumen ziemlich grosse Concretionen erkennen, die gegen die Mündung hin an Umfang zunehmen; letztere sind gelblich, bei *Grylotalpa* an Zahl sehr überwiegend, bei *Melolontha* gefiedert mit gabligen Seitenästen, ihre Sekretionszellen schliessen einen gelbkörnigen Inhalt ein, es fehlt jede Spur von Concretionen im Lumen. Bei der Raupe einer *Gastropacha* hat Verf. die beiderlei Canäle in Continuität mit einander gesehen, bei *Carabus* überhaupt nur eine Art Malpighi'scher Gefässe beobachtet, in denen jedoch ganz deutlich zweierlei Sekrete, ein röthlich braunes und ein aus schwarzen Körnchen bestehendes, zu erkennen waren.

Ueber die Leuchtorgane der Lampyriden machte Kölliker (Monatsberichte der Akad. der Wissensch. zu Berlin p. 392) die Bemerkung, dass sich Nerven in dieselben erstrecken und dass das Leuchten derselben ganz unter dem Einflusse des Willens und des Nervensystems stehe; alle Nervenreize brächten nämlich helles Leuchten zu Wege, Narcotica dagegen machten es verschwinden. Es sei also kein Leuchtstoff vorhanden, der chemisch das Leuchten erzeuge.

Die Leuchtorgane sind nach K. zartwandige Kapseln, welche mit polygonalen Zellen ausgefüllt sind, von denen die einen, welche leuchten, durchsichtig, blass und mit feiner Molekularmasse angefüllt, die anderen mit weissen Körnchen vollgepfropft erscheinen; zwischen ihnen verästeln sich zahlreiche Tracheen. Der Fettkörper der Lampyriden leuchtet nicht und die in demselben beschriebenen Leuchtkörner (Leydig) sind nicht Phosphor, sondern harnsaures Ammoniak.

Hicks hat in den Halteren der Dipteren ein eigenthümliches Organ aufgefunden, von dem er vermuthet, dass es dem Geruchssinne als Substrat diene. („On a new organ in Insects“ by John Braxton Hicks, Journ. of the Proceedings of the Linnean society, Zoology I. p. 136 ff. pl. 5.) Bei *Rhingia rostrata* beobachtete der Verf. zuerst an der Basis der Halteren jederseits ein an einer Erhabenheit liegendes längliches Organ, welches aus etwa zwanzig Reihen kleiner Bläschen, die nur durch geringe Zwischenräume und feine Borstenhaare getrennt waren, bestand; die Bläschen-Reihen verlaufen in querer Richtung gegen die Längsaxe der Halteren, die Bläschen selbst sind durchsichtig, häutig und die zwischen ihnen stehenden Härchen so angeordnet, dass je zwei einem der Bläschen entsprechen. Eine gleiche oder nahe übereinstimmende Bildung zeigte sich an den Halteren anderer Dipteren

der verschiedensten Familien; ähnliche Bläschen, obwohl nicht in derselben Weise angeordnet, sondern viel vereinzelter zeigten sich ferner in den Vorderflügeln der Dipteren, nahe der Basis der Subcostal-Vene und ebenso an der Basis der Flügel bei den übrigen Insekten-Ordnungen, besonders deutlich bei Bombyciden und Noctuen. Auf der beifolgenden Tafel sind die bezeichneten Bildungen, wie sie sich bei verschiedenen Dipteren und anderen Insekten gezeigt haben, stark vergrössert dargestellt.

Was die von Hicks aufgefundenen Organe selbst betrifft, so lassen sie sich z. B. bei *Rhingia campestris*, welche Ref. darauf zu untersuchen Gelegenheit nahm, an der Basis der Halteren sehr deutlich und leicht erkennen; sie liegen übrigens nicht, wie aus der H.'schen Beschreibung hervorzugehen scheint, frei auf der Oberfläche der Halteren, sondern von der Lederhaut derselben bedeckt und dieser scheinen auch die oben erwähnten Borstenhaare anzugehören, welche bei Zerreissung der Haut an den freigelegten Bläschen-Reihen nicht zu bemerken sind. Dass die an der Basis der Vorderflügel von *Rhingia* sichtbaren Bläschen mit denen der Halteren-Organen irgend welche Analogie erkennen liessen, glaubt Ref. bestreiten zu müssen; weder ihre Form noch ganz besonders ihre Anordnung bieten nur die geringste Aehnlichkeit mit jenen dar. — Für die Annahme, jene Bläschengruppen der Halteren seien Geruchsorgane, bringt der Verf. wohl nicht einen einzigen genügenden Grund vor; sein Schluss, dass der aus dem Thoraxganglion zu den Halteren verlaufende starke Nerv ein sensitiver und kein motorischer sein könne, da die Halteren keine Muskeln besässen, ist gewiss nicht zutreffend, denn wie sollten die Halteren ohne Muskeln ihre äusserst schnellen Schwingungen ausführen können. Dass der Halteren-Nerv zu dem beschriebenen Organe in irgend welcher Beziehung stehe, ist nicht nachgewiesen und es ist eine solche auch nicht in die Augen fallend. Dass die Halteren bei ihren lebhaften Bewegungen sehr geeignet für die Aufnahme von Gerüchen seien, mag wohl zugegeben werden können; es würden indessen dann eigenthümliche Bildungen auf der Oberfläche des Schwingerkolbens, von welchen der Verf. nichts erwähnt, die aber bei *Rhingia campestris* sehr deutlich wahrzunehmen sind, sowohl ihrer Struktur als Lage nach sich weit eher als Geruchsorgane anpreisen lassen. Es zeigen sich nämlich auf den Kolben der Halteren in ziemlich weiten Zwischenräumen grosse Poren, die von einem erhabenen, hornigen Ringe eingefasst sind, an dessen Aussenrand jedesmal eine starke, dornähnliche Borste entspringt. Ref.

Weitere Beobachtungen über diesen Gegenstand hat derselbe Verf. in den Transactions of the Linnean society of

London, Vol. XXII. pt. 2. p. 141 ff. c. tab. 17. 18. („Further remarks on the organs found on the bases of the halteres and wings of Insects,“ by J. B. Hicks) mitgetheilt. Er geht hier nur auf die Bläschen an der Basis der Flügel verschiedener Insekten (*Strangalia*, *Melolontha*, *Carabus*, *Ophion*, *Tenthredo*) ein, welche er stark vergrössert darstellt und durch einen Nerv mit feinen Aestchen versehen lässt. Die Flügel sind mit *Terpentinspiritus* und *Canada-Balsam* behandelt, wodurch die Verästelungen des Nerven an die bewussten Bläschen deutlich hervortreten sollen.

Auch an den Fühlern der Insekten will Hicks eine angeblich neue Struktur aufgefunden haben. („On a new structure in the antennae of Insects,“ *Transact. Linn. soc. of London* XXII. pt. 2. p. 147 ff. c. tab. 29, 30.) Er beschreibt an einer Reihe von Insekten verschiedener Ordnungen die schon vor zehn Jahren von *Erichson* (*de fabrica et usu antennarum*) nachgewiesenen, von einem Ringe eingefassten und mit einer zarten Membran bedeckten Poren an den Endgliedern der Insektenfühler, will aber ausserdem gefunden haben, dass sich im Innern des Fühlers an jede solche Pore ein rückwärts erweiterter Sack anschliesst, an den der Fühlernerv jedesmal ein Aestchen abgiebt, und der mit Flüssigkeit angefüllt ist. Der Verf. muthmasst in diesen Organen ein Analogon der Gehörwerkzeuge der *Crustaceen* und glaubt ihnen daher vorläufig ebenfalls die Function des Hörens zusprechen zu können. Von Interesse sind die Abbildungen, die der Verf. von diesen angeblichen Gehörwerkzeugen bei einer grösseren Anzahl verschiedener Insekten giebt, und besonders ist auch die Mannichfaltigkeit, welche nach seinen Zeichnungen die Form der hinter den Poren liegenden Säckchen darbietet, bemerkenswerth; überhaupt würden seine Beobachtungen die früheren von *Erichson* in mehrfacher Beziehung vervollständigen.

Murray gab in einer Abhandlung „On Insect-vision and blind Insects“ (*Edinburgh new philosoph. journal*, new ser. VI. p. 120 — 138) eine durch in den Text eingedruckte Holzschnitte erläuterte Darstellung der verschiedenen Modifikationen des Insekten-Auges nach den Beobachtungen früherer Autoren und ging dabei zugleich auf die in den unterirdi-

schen Höhlen lebenden augenlosen Insekten ein, von denen er eine (übrigens unvollständige) Aufzählung liefert. Um festzustellen, ob nicht bei diesen augenlosen Thieren diejenigen Stellen des Kopfes, welche sonst die Augen einnehmen, eine Struktur zeigten, welche auf die Möglichkeit einer Lichtempfindung hinwiesen, hat der Verf. vorzugsweise die Chitinbedeckung der Kopfseiten und des Thorax von *Anophthalmus* untersucht und ihre Struktur im Holzschnitte dargestellt. Die hexagonalen Zellen erscheinen auf dem Thorax und der Mitte des Kopfes sehr in die Quere gezogen, je näher aber dem Centrum der Augenwülste, desto mehr nehmen sie die regelmässige, hexagonale Form der Cornea-Facetten an; ob dies nur von der stärkeren Wölbung der Augenwülste abhängt, oder auf ein atrophirtes Gesichtsorgan hindeutet, bleibt dahingestellt. Die inneren Theile des Kopfes konnten nicht untersucht werden, da dem Verf. nur ein ausgetrocknetes Exemplar zur Untersuchung vorlag.

Ein Artikel von Lubbock „How Insects breathe“ (*Entomologist's Annual for 1857. p. 135–153*) liefert eine kurz gefasste Darstellung der verschiedenen Respirations-Modi bei den Insekten und der ihnen zu Grunde liegenden Organe, wie sie durch die bisherigen Untersuchungen bekannt geworden sind; Neues ist darin nicht enthalten.

Dasselbe ist mit einem Aufsatze von Westwood „Notes on the wingveins of Insects“ (*Transact. of the entomol. soc. III. p. 225 ff.*) der Fall, dessen Zweck nur ist, die von Newman vertretenen Ansichten über die Bedeutung und das Wesen der Flügeladern der Insekten zu widerlegen.

Mikroskopische Untersuchungen über die Struktur der Insektenhaut hat Maslowsky im *Bulletin de la soc. imp. des naturalistes de Moscou 1857. III. p. 161–173. Tab. IV* veröffentlicht; dieselben enthalten ergänzende Beobachtungen zu den früheren Arbeiten von Meyer, Leuckart, Leydig u. a. über denselben Gegenstand und betreffen die verschiedenen Schichten der Insektenhaut (Epidermis, Cutis, innerste Schicht) nebst ihren Anhängen (Haare, Schuppen).

In der Struktur der Epidermis hat der Verf. zehn verschiedene Modifikationen angetroffen, die übrigens zum Theil mit einander sehr nahe verwandt sind und sich unter folgende Categorieen bringen

lassen: a) Die Epidermis besteht aus einer Schicht platter, aneinanderliegender, polygonaler Zellen, in denen entweder undeutliche Kerne vorhanden sind, oder in denen solche fehlen. (No. 1 u. 2 des Verf.) b) Die Zellen der Epidermis liegen nicht aneinander, sondern in Reihen dachziegelartig übereinander und sind entweder von einander getrennt (No. 3, 6, 7 des Verf.) oder fliessen zu Längsreihen zusammen (No. 4, 5 u. 8). c) Die Epidermis erscheint amorph, ist jedoch in diesem Falle noch zuweilen mit hervorragenden Papillen besetzt (No. 9 u. 10 des Verf.). Diese verschiedenen Modifikationen der Epidermis bilden allmähliche Uebergänge an demselben Insekte und zeigen daher, dass die Oberhaut im Allgemeinen aus Zellen entsteht; für die Mehrzahl der Fälle nimmt der Verf. an, dass dieselbe chitinisirtes Epithelium sei, wogegen sie nur selten als Cuticula, d. h. als ein Produkt der unter ihr liegenden Hautschicht, anzusehen ist. — Bei der Cutis erörtert der Verf. die verschiedenen Modifikationen, welche sich in der gegenseitigen Lagerung der sie zusammensetzenden Schichten und ferner in der Lagerung der diese Schichten bildenden Prismen kundgeben und stellt die merkwürdigsten dieser Bildungen auf Taf. IV. Fig. 9—14 dar. An den oberen Schichten der Cutis von *Cleonus* kreuzen sich die Prismen, welche je in Mehrzahl zu Bändern vereinigt sind, in den verschiedenartigsten Richtungen; nicht selten liegen die Schichten nicht dicht aneinander, sondern lassen zwischen sich Höhlungen frei, in welchen oft hohle Körper, die aus mehreren concentrischen Schichten zusammengesetzt sind, liegen (Fig. 12, *Nepa*). Die Canäle, welche die Cutis durchsetzen, öffnen sich auf den Flügeldecken nur an ihrer oberen Fläche, erreichen auch zuweilen (*Lethrus*) nicht ihre Aussenfläche; bei Anwesenheit von Haaren öffnen sich die Canäle nicht immer an deren Basis. Auch über die Anheftung der Haare und Schuppen macht der Verf. einige Bemerkungen.

Sehr interessante Beobachtungen über die Bildung der Flügel, Schuppen und Haare bei den Lepidopteren hat C. Semper (Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie VIII. p. 326 ff. Taf. XV) bekannt gemacht. Der Verf. hat seine Untersuchungen an Puppen von *Saturnia carpi* und *Sphinx pinastri* angestellt; indem es hauptsächlich sein Zweck war, das Verhältniss der verschiedenen äusseren Anhänge (Flügel, Schuppen, Haare) zu der Epidermis festzustellen, musste eine Untersuchung der ersten Anfänge dieser Gebilde während der Ausbildung des Schmetterlings in der Puppe vorgenommen werden. Die Flügel selbst entstehen in einem Hohlraume, der sich zwischen den beiden Flügelscheiden, welche aus einer äusseren, nicht chitinisirten, einer inneren

chitinisirten Lage und aus einer der letzteren nach innen anliegenden Zellenlage zusammengesetzt sind, befindet. In diesem Hohlraume befinden sich Fettkörper, Nerven und Tracheen; der Fettkörper wird durch einzelne, grosse Zellen repräsentirt, aus denen allmählig das Fett verschwindet, die sich durch Theilung vermehren und dann einen homogenen, durchsichtigen Inhalt haben. Durch die Verbindung solcher Zellen zu soliden Strängen, welche allmählig hohl werden, entstehen die grossen Tracheenstämme, welche die Grundlage für das Flügelgeäder abgeben. Der erste Anfang zur Bildung des Flügels selbst zeigt sich in der Entstehung einer Membran, welche alle Nerven, Tracheen und Bildungszellen einschliesst und dadurch von Wichtigkeit ist, dass sie später der Epidermis als Stütze dient; diese hebt sich nämlich, nachdem jene Membran durch allmählig dichtere Verstrickung ihrer ursprünglichen Zellen homogen geworden ist, von der inneren Flügelscheide ab und legt sich derselben fest an. Zu dieser Zeit zeigen sich auch die ersten Anfänge der Rippen, welche im Anfange weite Röhren, aus einer einzigen Lage platter, polygonaler Zellen bestehend, darstellen und in ihrem Lumen einen feinen Strang, der offenbar ein Nerv ist, erkennen lassen; diese Rippen legen sich stets äusserlich an die grossen Tracheenstämme, welche ihren Verlauf bestimmen, an. Nachdem sich die Grundmembran mit der Epidermis, deren Zellen sich zu grossen Cylinderzellen ausgebildet haben, vereinigt hat, zieht sie sich später wieder von ihr zurück und es entsteht so zwischen beiden ein Hohlraum, in dem sich grosse Kernzellen vorfinden; diese setzen sich in einen feinen, langen Stiel fort, der sich durch die Epidermiszellen hindurchdrängt und ausserhalb in eine grosse Blase endigt, welche die Grundlage der späteren Schuppen abgiebt. Letztere bilden sich aus dieser Blase durch Zerschlitzen des Vorderrandes derselben und durch Verkürzung des Stieles, welcher zwischen den Epidermis-Zellen eingefügt bleibt. Ganz analog ist die Bildung der Haare, welche der Verf. z. B. an den männlichen Fühlern von *Saturnia carpinii* beobachtet und dargestellt hat; durch Ausscheidung der Cuticula an ihrer Oberfläche und zugleich an derjenigen der Epidermis gewinnen dieselben

nach ihrer Entstehung an Festigkeit der Verbindung mit letzterer. — Die Bildung der beiden Chitinmembranen des Flügels, welche von der Epidermis ausgeschieden werden, erfolgt erst zu der Zeit, wo die Schuppen schon ihre bleibende Form erlangt haben; sie legt sich wegen Mangel an Raum in der Flügelscheide in zahlreiche Falten, die beim Auskriechen sich allmählig verwischen. Mit der Abscheidung der Chitinhäute geht zugleich die fernere Ausbildung der Flügelrippen vor sich, indem die Zellen, aus denen ihre Wand besteht, auswendig mit den Epitelzellen der sie begleitenden Tracheen verschmelzen und inwendig eine Cuticula ausscheiden. Das schnelle Wachsthum der Flügel nach dem Auschlüpfen des Schmetterlings wird zugleich durch den Eintritt des Blutes in die Gefässe und der Luft in die Tracheen bewirkt.

Als von besonderem Interesse sind noch folgende Einzelheiten aus der Abhandlung des Verf. hervorzuheben: Was den Schmetterlingspuppen die dunkelbraune oder schwärzliche Färbung giebt (der Verf. hat die Sphingiden, Bombyciden u. s. w. im Sinne), ist ein eigenthümlicher Stoff, der erst nach dem Abstreifen der Raupenhaut ausgeschieden wird und zuerst farblos und weich erscheint; er zeigt in seiner Ausbildung ein ganz verschiedenes Verhalten gegen Reagentien vom Chitin, indem er sich beim Kochen in Schwefel- und Salpetersäure auflöst und dieselben färbt, dagegen in Salzsäure durch Kochen vollständig unlöslich ist. — Eigenthümliche Bildungen zeigen die feinsten Tracheenzweige während der ersten Anlage des Schmetterlingsflügels, indem sie zu Knäueln zusammengeschlungen und von einer feinen, strukturlosen Membran umgeben sind; wahrscheinlich werden sie erst bei der Entfaltung des Flügels durch den Eintritt der Luft vollständig nach ihrer ganzen Länge ausgedehnt; auch bei einigen Raupen (*Bomb. chrysorrhoea*) kommen solche Knotenbildungen am Ende der Tracheenäste vor, doch fehlt hier die umhüllende Membran. — Am Schlusse seiner Abhandlung unterwirft der Verf. noch die von Newport, Hollard und Menzel veröffentlichten Untersuchungen über die Epidermoidalgebilde einer Beurtheilung und weist die von ihnen begangenen Irrthümer nach.

Ein Verzeichniss der Thiere, auf welchen Schmarotzer-Insekten leben, stellte Gurlt (dies. Archiv f. Naturgesch. XXIII. 1. p. 276—311) zusammen; Vervollständigungen erhielt dasselbe ausserdem durch Schilling. — Dies Verzeichniss erstreckt sich vorläufig nur auf die Gattungen und

Arten der Säugethiere und Vögel, welche in alphabetischer Ordnung aufgeführt und unter denen jedesmal die betreffenden Parasiten verzeichnet sind. Am Schlusse ist ein alphabetisches Register der Schmarotzer selbst nach den Gattungen gegeben.

So nützlich und dankenswerth diese Zusammenstellung der Schmarotzer-Insekten ist, ermangelt sie doch in vielen Theilen der Vollständigkeit. Im Grunde sind nur die Pediculinen, Philopteriden, Liotheiden und Puliciden in Betracht gezogen, die parasitischen Dipteren dagegen mit einigen Ausnahmen ganz unberücksichtigt geblieben. Als von Oestraceen bewohnt hätten z. B. *Cervus Tarandus* (*Cephenemyia trompe*, *Oedemagena tarandi*), die Amerikanischen Hasen und Kaninchen (*Cuterebrae spec.*) angeführt werden müssen; auch fehlen die Oestraceen des Edelhirsches (*Cephenemyia auribarbis*, *picta*, *Oestrus lineatus*) u. s. w. Von Coriaceen ist z. B. die Gattung *Hippobosca* (verschiedene Arten auf Einhufern) ganz weggeblieben, die Ornithomyien und Nycteribien (von letzteren sind zahlreiche Arten durch Westwood bekannt gemacht worden) sehr dürftig vertreten; die Gattungen *Strebila*, *Raymondia*, *Carnus* u. a. wären ebenfalls nachzutragen. — Es wird demnach der durch Troschel ergangenen Aufforderung, das Verzeichniss durch Nachträge zu vervollständigen, leicht nachgekommen werden können.

Die auf Fledermäusen parasitisch lebenden Arthropoden hat Kolenati in einem selbstständigen Werkchen, betitelt: „Die Parasiten der Chiropteren von Prof. Dr. Kolenati, nebst 4 Tafeln. Dresden 1857.“ 8. 51 pag. zusammengestellt und beschrieben. Der Verf. erstreckt sich in seinen Untersuchungen auf sämmtliche in und am Körper der Fledermäuse lebenden Parasiten, daher ausser den Insekten und Arachniden auch auf die Eingeweidewürmer. Was die Insekten betrifft, so gehören sie mit Ausnahme eines Hemipteron (*Acanthia pipistrelli* Jenyns) sämmtlich den Dipteren und zwar den Familien der Coriaceen und Aphanipteren an; die parasitischen Arachniden fallen sämmtlich der Ordnung Acarina zu. Auffallend ist das gänzliche Fehlen der Anopluren bei den Fledermäusen. Wie bekanntlich unter den Coriaceen die Gattung *Nycteribia* ausschliesslich auf die Fledermäuse beschränkt ist, so ist es in Gleichem unter den Acarinen mit der Gattung *Pteroptus* der Fall; während erstere den Pelz bewohnen, beschränken sich letztere auf die Flughäute, und beide Gattungen machen ihre ganze Metamorphose an den

von ihnen bewohnten Chiropteren durch, welchen sie dem Verf. zufolge Lymphe, Blut und das Excret der Hautbälge absaugen.

Was die Vertheilung der einzelnen Parasiten-Gattungen auf die Wohnthiere betrifft, so finden sich die Pteroptus - Arten an den meisten Chiropteren, Ancyrostropus nur an Rhinopoma, Ixodes an Rhinolophus, Nycteribia an Vespertilio, Rhinolophus, Rhinopoma u. a., auch an Pteropus, die Aphanipteren an den meisten Vespertilionen. — Die Zahl der von Chiropteren bekannt gewordenen parasitischen Insekten und Arachniden ist sehr bedeutend, von ersteren nämlich 25, von letzteren 44; wenn unter den Coriaceen es an unbekannten und neu zu beschreibenden Formen nicht fehlte, so boten die Aphanipteren und Acarinen einen so grossen Reichthum, dass das früher Bekannte unter dem neu Entdeckten fast verschwindet. Bei den betreffenden Familien ist auf dasselbe näher eingegangen worden. — Die vier beifolgenden lithographirten Tafeln geben eine Darstellung einiger Hauptformen von Fledermaus-Parasiten.

Während die Nycteribien ausschliesslich eine parasitirende Lebensweise führen, sind sie ihrerseits ebenfalls von Parasiten heimgesucht. Kolenati (Wiener Entomol. Monatsschrift I. p. 66) fand am Thorax derselben kleine Eingeweidewürmer haften, welche er als neue Gattung der Acanthocephalen unter dem Namen Arthrorhynchus beschreibt; er unterscheidet deren zwei Arten: A. Westrumbii (an Nyct. Westwoodii) und Diesingi (an Nyct. Montagui). Ob sich diese Würmer in die Nycteribien selbst einbohren, ist dem Verf. nicht bekannt geworden.

Auch in der Entomologischen Gesellschaft zu Paris wurden einige Fälle, wo Eingeweidewürmer (Filarien) in vollkommen entwickelten Insekten beobachtet wurden, mitgetheilt (Bulletin de la soc. entomol. p. CXLII ff.). Rattet erhielt eine Filaria aus Vanessa prorsa, var. porima (der Fall ist in seiner Richtigkeit jedoch zu beanstanden, da der Wurm an einem seit langer Zeit getrockneten Exemplare, das wahrscheinlich auf feuchtem Sande aufgeweicht wurde, vorkam), Boisduval aus Noctua Desyllesi, Migneaux aus einem Harpalus, Guérin aus Melolontha vulgaris, Laboulbène fünf Mermis aus Asilus crabroniformis; letzterer fand auch kleine fadenförmige Würmer im Innern des Darmkanals von Geotrupes.

Die Erforschung derjenigen pflanzlichen Parasiten, welche bei Krankheiten des Thier- und Pflanzenreichs eine Rolle spielen, sei es, dass sie zur Erzeugung derselben beitragen oder als Produkt derselben auftreten, hat in neuerer Zeit die Naturforscher vielfach beschäftigt und es wurde bereits im vorigen Jahresbericht p. 30 und p. 136 der Untersuchungen von Frey und Lebert über die Krankheit der Seidenraupe und der von Cohn über die Pilzbildungen bei der Stubenfliege erwähnt. Eine Abhandlung, die ebenfalls auf diese beiden Krankheiten näher eingeht und zugleich eine Uebersicht der an Insekten bekannt gewordenen Pilzbildungen enthält, ist von Lebert in Virchow's Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie XII. p. 69—79 und p. 144—171. c. tab. VI unter dem Titel: „Ueber die Pilzkrankheit der Fliegen und die neueste in Oberitalien herrschende Krankheit der Seidenraupen mit Parasitenbildung, nebst einer Zusammenstellung der wichtigsten pflanzlich-parasitischen Krankheiten, welche von Insekten und Myriapoden bekannt sind“ veröffentlicht worden. Die Pilzkrankheit der Fliegen hat derselbe Verf. ausserdem noch in einer ausführlicheren Arbeit, welche hier nur im Auszuge mitgetheilt ist, in den Denkschriften der allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für Naturwissenschaften, deren neuester Band dem Ref. noch nicht zur Einsicht vorliegt, abgehandelt; der dieselbe erzeugende Pilz, von Cohn als *Empusa Muscae* bezeichnet, wird von Lebert mit dem Namen *Myiophyton Cohnii* belegt. Die übrigen bekannt gewordenen Pilzkrankheiten der Insekten, welche der Verf. mit denjenigen der Stubenfliege in Vergleich stellt, sondert er in Ectophyten und Entophyten lebender Insekten; ein näheres Eingehen auf dieselben ist hier nicht am Orte, da der Gegenstand nicht in das Bereich der Entomologie gehört.

Ueber die Krankheit der Seidenraupe handelte derselbe Verf. zugleich in einem Aufsätze „Esquisse de la vie du ver à soie et l'histoire de la sériciculture“ (Biblioth. univers. de Genève XXXV. p. 221—248), in welchem zugleich von der Entwicklung der Seidenraupe, der Bildung der Seide und der Geschichte der Seidenkultur die Rede ist.

Ueberhaupt beschäftigt die jetzt weit verbreitete Krank-

heit der Seidenraupe sowohl die Praktiker als die Naturforscher in allen Ländern und besonders ist man in Frankreich mit verschiedenen Vorschlägen zur Abwehr des Uebels und zur Verbesserung der Seidenzucht hervorgetreten. Besonders viel hierauf Bezügliches findet sich in den *Comptes rendus de l'acad. impér. de l'Institut de France* v. J. 1857 und in Guérin's *Revue et Magas. de Zoologie* IX. p. 109 ff. Martin schlägt hier die Zucht im Freien auf Maulbeerbäumen, die mit grossmaschigem, dünnen Zeuge zu umspannen seien, vor; im Departement de l'Hérault wenigstens hätten die Raupen jeden Witterungswechsel gut ertragen, die Schmetterlinge seien besonders lebhaft gewesen und die Graines vorzüglich ausgefallen (*Rev. et Magas.* p. 109). Barthélemy räth an, die Erziehung der Schmetterlinge in den Herbst zu verlegen, indem zu dieser Zeit die Männchen zahlreicher und kräftiger entwickelt aufträten und die Lebensdauer beider Geschlechter eine längere sei (ebenda p. 459 u. 585 ff.); auch Quatrefoes setzt die Vortheile einer beschleunigten Zucht auseinander.

In der Abhandlung von Barthélemy „*Observations et expériences sur l'éducation du Ver à soie et sur la conservation de la graine par les éducations d'automne*“ findet sich die Bemerkung, dass der Grund, weshalb die Anzahl der Männchen im Herbst eine bedeutend grössere sei, darin liege, dass nur im Sommer eine Fortpflanzung durch Parthenogenesis erfolge, im Herbst hingegen die Befruchtung durch das Männchen stets nothwendig sei, um Raupen aus den abgelegten Eiern zu erhalten; er nimmt also als eine Thatsache an, was nach v. Siebold noch keineswegs festgestellt ist, dass die im Sommer ausschlüpfenden männlichen Raupen, welche die Herbstgeneration liefern, aus unbefruchteten Eiern hervorgegangen sind und bringt die Häufigkeit der männlichen Individuen im Herbst mit der analogen Erscheinung bei den Daphnien in Vergleich.

Andere Abhandlungen, welche sich mit demselben Gegenstande beschäftigen, sind: Dumas, *Remarques sur la composition et la température de l'air des chambres et des lières pendant l'éducation des vers à soie* (*Rev. et Magas. de Zool.* p. 412). — Dumas, *Second rapport sur la maladie des Vers à soie* (*Comptes rendus*, 20. Avril., *Rev. et Magas.* p. 186). — Quatrefoes, *Résultats d'une éducation hâtive des vers à soie* (*Rev. et Magas.* p. 584). — Guérin,

Note sur les éducations pour graine qu'il conviendrait de faire aujourd'hui pour atténuer les désastreux effets de l'épizootie des vers à soie (ebenda p. 172 ff.). — Guérin, Note sur les éducations des vers à soie destinées à la confection de la graine faite en 1857 dans la Suisse, les montagnes des Basses-Alpes et d'autres localités, où l'épidémie n'a pas paru (ebenda p. 325 ff.).

Wenn man immer mehr darnach trachtet, neben der Cultur der *Bombyx mori* noch die einiger Asiatischen Saturnien in Europa einzuführen, so liegt diesem Beginnen gewiss nicht allein die Sucht nach Neuerungen, sondern zum Theil wenigstens auch die Befürchtung zu Grunde, es möchte die alte Seidenwurm-Race, welche das cultivirte Europa so lange Zeit mit seinem Produkte versehen hat, durch die unter derselben grassirenden Epidemieen allmählig ihrem Verderben entgegengeführt werden. Besonders ist es die unter dem Namen *Bombyx ricini* bekannt gewordene Art, deren Zucht gegenwärtig von vielen Privatmännern und den zahlreichen Acclimatisationsvereinen, welche die neuere Zeit hervorgeufen hat, eifrig betrieben wird. Isid. Geoffroy St. Hilaire stattete der Pariser Akademie der Wissenschaften (Comptes rendus, 19. Octbre, Revue et Magasin de Zoologie IX. p. 453 ff.) einen Bericht über die Fortschritte ab, welche die Zucht dieser Art in den verschiedenen Ländern gemacht hat; ausser in verschiedenen Theilen (besonders des südlichen) Europa's wird die Cultur der Raupe auch in Algier, Aegypten und sogar in Brasilien, wohin sie aus Europa eingeführt worden ist, mit Erfolg betrieben. Die Cocons sind leicht zu bearbeiten, der Faden ist glatt, weiss, glänzend, stark und geschmeidig, die Seide wird ohne Zweifel allen Färbungsversuchen entsprechen. — Guérin (Comptes rendus, 16. Novbre, Rev. et Magas. de Zoologie IX. p. 521 ff.) theilte auch die Resultate seiner Untersuchungen über den Seidengehalt der Cocons der *Bomb. ricini* mit: Auf ein Kilogramm kommen durchschnittlich 700 Cocons (von *Bomb. mori* etwa 600); das Cocon enthält circa 9,4 Proc. Seidenstoff, bei *B. mori* 11—14 Proc. Die einzelnen Cocons wiegen bei der ersteren Art etwa $1\frac{1}{3}$ Centigramm, bei *B. mori* $1\frac{2}{3}$. (Vergl. auch Bulletin de la soc. entomol. p. CXXXVIII).

Uebrigens ist nach Guérin (ebenda p. CXVII) die *Saturnia Cynthia* aus China von derjenigen aus Bengalen wahrscheinlich spezifisch verschieden; die Raupe frisst nicht *Ricinus*-Blätter, sondern *Aylanthus glandulosa*, womit sie in Turin gefüttert worden ist; auch die Coccons zeigen Unterschiede in der Farbe. Die Chinesische Art hält G. für die wirkliche *Sat. Cynthia* der Autoren, wogegen die aus Bengalen stammende den von Milne Edwards gegebenen Namen *Sat. Arrindia* erhalten soll.

Ueber die Seidenzucht in China machten endlich noch Gaschkewitsch und v. Motschulsky in den *Etudes entomologiques* VI. p. 82 ff. („*Sur la sériciculture en Chine*“) Mittheilungen.

Virlet d'Aoust und Guérin haben in der Akademie der Wissenschaften zu Paris Mittheilungen über massenhafte Ablagerungen von *Corisa*-Eiern in Mexiko gemacht, welche dort von den Eingebornen als Nahrungsmittel benutzt werden und die nach dem ersten der beiden Verf. zur Oolithen-Bildung in den Kalklagern der Sümpfe Mexiko's Anlass gegeben haben. (*Comptes rendus de l'acad. de l'Institut de France*, 23. Novbre et 7. Decbre. *Revue et Magasin de Zoologie* IX. p. 522 ff. u. 582. *Bulletin de la soc. entomol.* p. CXLVIII ff. *Annales des scienc. natur.* 4. sér. VII. p. 366.)

Es sind zwei *Corisa*-Arten, welche ihre Eier in stehenden Gewässern auf einer Binsen-Art, die von den Mexikanern „*Toulé*“ genannt wird, in grosser Menge ablegen; die eine ist *Corisa mercenaria* Say, die andere eine neue Art, welche von Guérin als *Corisa femorata* bezeichnet wird. Mit ihnen zugleich legt auch eine *Notonecta*-Art (*Not. unifasciata* Guér. nov. spec.) ihre bei weitem grösseren Eier ab. Die Insekten selbst heissen bei den Mexikanern „*Moschitos*“, werden getrocknet und als Vogelfutter benutzt; die mit Eier belegten Binsen werden gesammelt, getrocknet und geklopft, um die Eier davon abzulösen. Letztere reinigt und siebt man aus, thut sie in Beutel und verkauft sie an das Volk, welches sich davon Kuchen, welche „*hautlé*“ genannt werden, backt; dieselben sollen wohlschmeckend sein, übrigens eine Art Fisch-Geschmack haben.

Als ein in therapeutischer Beziehung wichtiges Insekt pries Guérin der Akademie der Wissenschaften in Paris die *Cetonia aurata* an, welche er nach mehreren ihm mitgetheilten Fällen als ein ausserordentlich wirksames Mittel gegen die Hundswuth ansieht. (*Comptes rendus*, 24. Août et 9. Novbre. *Revue et Magas. de Zool.* IX. p. 367 u. 473 ff.)

Die Mittheilungen, welche Guérin über die spezifische Wirksamkeit der Cetonien gegen *Rabies canina* erhalten hat, beschränken sich darauf, dass Jagdliebhaber in Russland ihren Hunden als Präservativ gegen die Krankheit zuweilen eine halbe Cetonia, zu Pulver zerstoßen und mit Wein oder Brod vermenget, eingeben und ferner, dass ein Mensch in einem Falle von Hundswuth mit Pillen geheilt worden sei, die aus Pflanzen und einem Pulver, das wahrscheinlich (!) das einer zerstoßenen Cetonia gewesen, bestanden haben. Dass die Akademie auf die eindringlichen Vorstellungen Guérin's, über die Wirksamkeit dieses für das Wohl der Menschheit so wichtigen Mittels Versuche anzustellen, nicht hat eingehen wollen, wie dies aus der Berichterstattung Duméril's (*Comptes rendus*, 9. Octbre, Rev. et Magas. de Zool. IX. p. 457) hervorgeht, ist in Rücksicht auf die von G. angeführten, für die Wirkung des Mittels nichts beweisenden Fälle wohl mehr als begreiflich. Dergleichen mittelalterliche Spezifika sind dem heutigen rationellen Standpunkte der Therapie nicht mehr angemessen und überdies kann das Mittel nicht einmal als neu angesehen werden, da die Canthariden längst gegen die Hundswuth angewendet werden, diese aber das Cantharidin, welches in den Cetonien allein wirksam sein kann, bekanntlich in viel grösserer Menge enthalten.

Ueber die Erzeuger der Harzgallen an *Pinus picea* und *sylvestris* und ihre Schmarotzer machte L. Kirchner (*Lotos*, 6. Jahrg. p. 9 ff.) Mittheilungen; der Aufsatz ist betitelt: „Die Harzgallen der Nadelhölzer um Kaplitz.“

Die Erzeuger der Harzgallen sind *Tortrix resinana* und *cosmophorana* und *Cecidomyia pini*: bemerkenswerth ist die Gesetzmässigkeit, nach welcher die von ihnen gebildeten Gallen durch Parasiten angegangen werden, indem, so lange sie noch klein sind, nur kleine Schmarotzer, wie *Platygaster*, *Pteromalus*, *Entedon* dieselben anstechen; bei fortschreitender Grösse geschieht dies von *Campoplex*, *Aphidius* und *Rogas*, bei vollkommener Ausbildung von grossen Schlupfwespen, wie *Pimpla*, *Lissonotus* und *Glypta*. Aus den Gallen der *Tortrix resinana* erzog der Verf. während ihrer verschiedenen Entwicklungsstufen 18 verschiedene Schmarotzer, aus denen der *Tortrix cosmophorana* 2, aus denen der *Cecidomyia pini* ebensoviele; diese Schmarotzer werden einzeln namhaft gemacht.

Eine Beobachtung über massenhaftes Auftreten von Eichengallen bei Elberfeld, zuweilen 17—20 auf einem Blatte, theilte Cornelius (*Entomol. Zeitung* p. 410) mit.

Sehr interessante Mittheilungen über springende Cynipis-Gallen von *Quercus Cerris* machte Kollar in den Verhandlungen des zoolog.-botan. Vereins in Wien VII. p. 513 ff. Die Gallen sind kaum über eine Linie lang, oval, beiderseits

zugespitzt und sitzen an der Unterseite der Mittelrippe des Blattes fest; sind sie vollkommen ausgebildet, so trennen sie sich selbst und zwar mit ziemlicher Gewalt von ihrer Ansatzstelle, indem sie einen förmlichen Sprung in die Höhe und zur Seite des Blattes machen. Abgelöste Gallen bewegten sich auf einem Tische theils durch Rollen, theils durch Sprünge von 1 Zoll Weite und 3 Linien Höhe weiter, bis sie sich vom Rande der Tischplatte auf die Erde schnellten. Die darin enthaltene Cynips-Larve liegt kreisförmig zusammengerollt und äussert, von ihrer Hülle befreit, nicht die geringste Bewegung; das vollkommene Insekt ist vorläufig nicht bekannt, doch schlägt K. dafür den Namen Cynips saliens vor. Eine Abbildung der Gallen und der Larve ist auf Taf. XI gegeben.

A. Costa hat eine grössere Abhandlung über die Italienischen Insekten, welche dem Olivenbaum, den Obstbäumen, dem Weinstock, den Hülsenfrüchten und dem Getreide schädlich werden, unter folgendem Titel veröffentlicht: *Degl' Insetti che attaccano l'albero ed il frutto dell' Olivo, del Ciliegio, del Pero, del Melo, del Castagno e della Vite e le semenze del Pisello, della Lenticchia, della Fava e del Grano, loro descrizione e biologia, danni che arrecano e mezzi per distruggerli, per Achille Costa. Opera coronata. Napoli 1857. (4. 197 pag. c. tab. X color.)* — Der Verf. handelt in dieser mit vielem Fleisse abgefassten und durch zahlreiche Abbildungen sehr instruktiven Arbeit die einzelnen Insekten-Arten nach den Gewächsen, welche sie zerstören, ab, giebt eine Darstellung ihrer Lebensweise in den verschiedenen Entwicklungsperioden, geht auf die Merkmale ein, welche die Pflanzen als Zeichen der Anwesenheit jener Insekten darbieten und verbreitet sich endlich über die Mittel und Wege, um die Pflanzen von ihnen zu befreien. Die Tafeln gehen in allen diesen Beziehungen mit dem Texte Hand in Hand, indem sie die verschiedenen Lebenszustände der Insekten vom Ei bis zum ausgebildeten Thier in stark vergrössertem Massstabe und ausserdem die von ihnen abgefressenen Theile der Pflanzen darstellen. — Wenn die Arbeit auch im Ganzen wenig Neues enthält, so ist sie doch schon wegen der Zusammenstellung der im Süden Europa's

als schädlich auftretenden Arten von Interesse und verdient wegen der darauf verwandten Mühe Anerkennung; die darin abgehandelten Insekten sind, nach ihren Nahrungspflanzen aneinandergereiht, folgende:

Auf dem Oelbaum: *Phloeotribus oleae* Fab., *Hylesinus oleiperda* Fab., *Psylla oleae* Fonsc., *Oecophora oleaella* Fab., *Dacus oleae* Fab., *Coccus oleae* Oliv., *Coccus Pollini*, *Thrips oleae*. — Auf dem Kirschbaum: *Trypeta cerasi* Lin. — Auf Birn- und Aepfelbäumen: *Hyponomeuta malinella* Zell., *Carpocapsa pomonana* Tr., *Tingis pyri* Lin. — Auf der Kastanie: Ein Curculionide, nur im Larvenzustande bekannt; *Carpocapsa splendana* Hübn. — Auf dem Weinstock: *Rhynchites beetuleti* Fab., *Procris ampelophaga* Hübn., *Sinoxylon muricatum* Fab. — Auf Hülsenfrüchten: *Bruchus pisi* Lin., *Bruchus signaticornis* Schh., *Bruchus rufimanus* Schh. — Auf dem Getreide: *Bruchus granarius* Lin., *Sitophilus granarius* Lin., *Sitophilus oryzae* Lin., *Trogosita mauritanica* Lin., *Sylvanus frumentarius* Fab., *Anacampsis cerealella* Oliv., *Tinea granella* Lin.

Notes pour servir à l'histoire des Insectes nuisibles à l'agriculture dans le département de la Moselle, par J. B. Géhin. No. 2. Insectes qui attaquent les blés. Metz 1857. (8. 35 pag.). — Die Schrift handelt in ausführlicher Weise über den beträchtlichen Schaden, welche eine *Cecidomyia*-Art, die der Verf. für verschieden von *Cecid. tritici* hält und in Ermangelung einer sicheren Bestimmung vorläufig mit dem Namen *Cecidomyia mosellana* belegt, im Departement de la Moselle dem Getreide auf den Feldern zugefügt hat. Vorausgeschickt wird eine Zusammenstellung von 44 Insekten von verschiedenen Ordnungen, welche nach Angabe verschiedener Autoren dem Getreide auf dem Felde und in Magazinen schädlich sind. (In einer dritten erschienenen Nummer, ebenfalls v. J. 1857, die dem Ref. nicht vorliegt, behandelt der Verf. die dem Birnbaume schädlichen Käfer, deren Verzeichniss im Thomson's Archives entomologiques I. p. 389 ff. abgedruckt ist; die Zahl der dort angeführten Arten beläuft sich auf 52.)

Auch Goureau (Bulletin de la soc. entomol. V. p. XII) erwähnt einer *Cecidomyia*, nach ihm *Cecid. tritici*, welche drei Jahre lang in verschiedenen Gegenden Frankreichs in solcher Menge auftrat, dass ein Viertheil bis ein Drittheil der Erndte an Getreide verloren ging; im letzten Jahre wurde

eine Verminderung ihrer Schädlichkeit dadurch bewirkt, dass die Larven der Fliege von zahlreichen Parasiten heimgesucht wurden.

Die Parasiten der Cecidomyien-Larven waren besonders *Platygaster scutellaris* Nees (fem. *P. muticus* Nees) oder auch andere Arten derselben Gattung, wie *Plat. punctiger* Nees, deren Larven nur jedesmal eine Cecidomyia-Larve verzehren; ausserdem eine von Gravenhorst nicht beschriebene Art seiner Gattung *Colocentrus*, welche thätiger eingriff, indem ihren Larven je circa 20 Larven der Cecidomyia zur Nahrung dienten. — Ueber das Verhältniss der Parasiten- und Cecidomyien-Larven zu einander bemerkte Aubé (ebenda p. XIV), dass die *Platygaster*-Arten nicht ihre Eier in die Larven der Cecidomyien legten, sondern dass die Eier beider in die Pflanze abgelegt würden; die früher sich entwickelnde Cecidomyia-Larve wird von der später ausschöpfenden der Parasiten angegriffen.

Goureaux machte ferner (ebenda p. XXVIII) Mittheilungen über die Verwüstungen, welche *Hylotoma enodei* an *Berberis vulgaris* und *Nematus ribis* an *Ribes grossularia* anrichteten, deren Blätter von den Larven derselben in einem Jahre zweimal gänzlich abgeweidet wurden.

Während erstere Art sich in zwei aufeinanderfolgenden Jahren in gleicher Menge zeigte, verschwand letztere im zweiten Jahre gänzlich; sie wurde durch drei Parasiten: *Tryphon armillatorius* Grav., *Pigostolus sticticus* Halid. und *Degeeria flavicans* G. vollständig beseitigt.

Waga (Bullet. de la soc. entomol. p. CXXVI ff.) theilte Beobachtungen über einige in Polen als schädlich auftretende Insekten mit; es sind *Jassus 6-notatus* Herr.-Sch. für Hafer und Gerste, *Agrotis tritici* für Weizen, *Noctua gilvago* Lin. für Kartoffeln, letztere in den Stengeln der Pflanze lebend und durch ihre Menge eine vollständige Vernichtung der Erndte in einigen Gegenden bewirkend. Besonders grosser Schaden wurde auch im J. 1850 durch das massenhafte Auftreten von *Pezotettix pedestris* Fisch. angerichtet.

In Betreff der beiden erwähnten Noctuen machte Boisduval (ebenda p. CXXIX) die Bemerkung, dass die dem Weizen schädliche nicht *Agrotis tritici*, sondern *A. basilinea*, *infesta* oder eine diesen verwandte Art sei; ebenso sei die den Kartoffeln schädliche Art nicht *N. gilvago*, sondern *N. flavago*, deren Raupe im Stengel sehr verschiedener Pflanzen lebe.

Zur Vertilgung der unter der Erde lebenden, dem Getreide und den Feldfrüchten schädlichen Raupen und Larven schlug Mo c q u e r y s (ebenda, p. LXXI) eine Verbreitung der Maulwürfe vor.

Als schädlich für Kartoffel- und Maisfelder erwies sich in der Gegend von Presburg auch *Epicauta dubia*, indem sie durch Abfressen der Blätter den grössten Theil der Erndte vernichtete. (Verhandl. d. Vereins für Naturkunde zu Presburg II. Jahrg. 2. Heft p. 24.)

Ueber den Schaden, welchen *Cylas turcipennis* Schh. und andere Insekten in den Pflanzungen von Ceylon anrichten, machte J. Nietner (Entomol. Zeitung XVIII. p. 36 ff.) nähere Mittheilungen.

N. beobachtete den *Cylas turcipennis* als den Verwüster ausgedehnter Felder von *Batatas edulis*, deren Knollen von den Larven des Käfers in grosser Anzahl bewohnt und im Innern gänzlich zerstört wurden; der Verlust, welchen dies Insekt an der Erndte verursachte, betrug $\frac{19}{20}$. — Die Reisfelder in Ceylon wurden durch gewisse Hemipteren aus der Familie Coreodes, eine andere Getreide-Art, *Eleysine Caracana* durch schwarze Aphiden angegriffen; *Calandra oryzae* findet sich häufig im aufgespeicherten Getreide aller Art. *Phymatea punctata* zerstörte gelegentlich den Tabak und frass einmal die gigantischen Blätter des Cocos-Baums, die sich unter ihrer Last neigten, bis auf die Rippen gänzlich ab; die schlimmsten Feinde dieses Baumes sind aber die Larven des *Sphenophorus planipennis* Schh. und *Oryctes Rhinoceros*, unter deren Angriffen ziemlich fünf Procent der Bäume zu Grunde gehen. — Der Schaden, welcher durch alle diese Insekten hervorgerufen wird, ist übrigens gering gegen den, welchen eine *Coccus*-Art „Coffeebug“ (von N. sonderbarer Weise als „Filzlaus“ bezeichnet) den Kaffeeplantagen zufügt; durch Aussaugen der Säfte schwächt das Insekt den Strauch und giebt zugleich zur Bildung eines schwarzen Pilzes Veranlassung, an dem ganze Felder zu Grunde gehen; aus diesen *Coccus* entwickelten sich kleine Chalcidier.

v. Motschulsky machte in einem Artikel „Entomologie appliquée, Insectes utiles et nuisibles“ (Etudes entomol. VI. p. 76 ff.) Bemerkungen über die Nützlichkeit und Schädlichkeit folgender Insekten:

Anisoplia austriaca, *fruticola*, *Euphoria melancholica* (Neu-Orleans), *Leucoscelis stictica*, *Epicauta erythrocephala*, *ambusta*, *lemniscata* (Nord-Amerika), *Xyletinus chinensis*, *Anobium paniceum*, *Apate frumentaria*, *Anthrenus museorum*, *Cassida nebulosa*, *Oedipoda migra-*

toria, *Agrotis valligera*, *Ennomos subsignaria* (Neu-York), *Hyponometa cognatella* und *padella*, *Tortrix Bergmanniana*, *Butalis Zea-Mais*, *Coccus ceriferus*, *Phora spec.* (aus *Polyphylla fullo* erzogen).

Léon Dufour gab (*Annales de la soc. entomol.* V. p. 49) eine Aufzählung der Insekten, welche im Innern der Blüthenköpfe von *Centaurea nigra* leben; es sind theils solche, welche sich von den Blüthentheilen selbst nähren, theils solche, die in letzteren parasitiren, im Ganzen 17 Arten:

Rhinocyllus latirostris, *Tephritis jaceae*, *Urophora quadrifasciata*, *Acinia laticauda*, *eluta*, *Tinea spec.*, *Diplolepis spec.*, *Chirocera abrotani*, *Misocampus saphyrinus* Walk., *Cynips acutiventris* und *brevis* Duf., *Eurytoma* (?) *exilis* und *pubicornis* Duf., *Bracon* 2 spec., *Homalura tarsata* (?) Meig. und *Thrips spec.*

Laboulbène, „Note sur les siliques de Colza, attaquées par des insectes“ (*Annales de la soc. entomol.* V. p. 791—797) beobachtete vier verschiedene Insekten in den Schoten von *Brassica campestris*.

1) Eine dicke, weissliche Curculionen-Larve, welche das Innere der Körner ausfrisst und an der dem Korne entsprechenden Stelle die Schote durchbohrt; der Käfer ist nicht genau bekannt, doch glaubt der Verf. nicht, dass es *Ceutorhynchus assimilis* sei. 2) Eine grüne Raupe mit schwarzen Haaren, welche fast die ganzen Körner mit der Epidermis auffrisst und oft an einer anderen Stelle, als wo sie gelebt, herausgeht; es entwickelte sich daraus *Tinea xylostella* Lin. 3) Eine weisse Dipteren-Larve, welche ein Extravasat des Saftes hervorruft und die Körner verhindert, sich zu entwickeln; es ist die Larve der *Cecidomyia brassicae* Winn. 4) Insekten, welche die Cuticula und das äussere Parenchym der Schoten annagen, sind verschiedene *Haltica*-Arten.

Der Bericht, welchen Guérin der Société impériale et centrale d'agriculture im Namen der Sektion für landwirthschaftliche Naturgeschichte über die Arbeiten entomologischen Inhalts, die während der Jahre 1856—57 eingesandt worden sind, abstattete, enthält zum Theil ebenfalls Beobachtungen über schädliche Insekten und die von ihnen angerichteten Verwüstungen; derselbe ist in der *Revue et Magasin de Zoologie* IX. p. 317—325 abgedruckt.

Die erste Arbeit „Rapport sur le Taraudeur des cannes,“ von Bojer und Fropier, betrifft die Verwüstungen, welche der sogenannte „Borer“ in den Zuckerplantagen auf der Insel Mauritius anrichtet und giebt die Mittel zu seiner Vertilgung an die Hand. Der Schmetterling, der sich aus dieser Raupe entwickelt, ist nach Bojer

eine Art der Gattung *Proceras* Hübn. (*Proceras sacchariphagus* Bojer) — wurde jedoch nach Westwood (siehe Jahresbericht 1856. p. 177) schon von Fabricius als *Phalaena saccharalis* beschrieben. Ref. Der Schaden, den diese Art auf der Insel Mauritius angerichtet hat, ist so gross, dass an einigen Orten zwei Dritttheile der Erndte durch sie verloren gegangen sind, und dass der Gouverneur der Insel einen Preis von 50,000 Francs für ein wirksames Mittel gegen diese Plage ausgesetzt hat. — Eine zweite Arbeit von Th. Bruand „Notice sur une chenille de Tinéide, qui dévaste le maïs dans le canton d'Audeux (Doubs)“ giebt Nachricht von den Verwüstungen, welche eine Schmetterlingsraupe durch das Durchbohren und Ansfressen der Stengel und Trauben des Mais anrichtet; sie hat ebenfalls an einigen Orten die Erndte bis auf ein Dritttheil der früheren Jahre herabgedrückt. Der Schmetterling ist von Bruand bis jetzt nicht gezogen worden, doch glaubt er, dass derselbe zu den Crambiden gehören wird, da die Raupe viele Aehnlichkeit mit der von *Myelophila pusilla* hat. Sollte die Raupe mit derjenigen, welche in Italien den Mais verwüstet hat, identisch sein, so würde sie zu *Botys silacealis* (nach Passerini) gehören. — Von A. Bernède ist eine dritte Abhandlung „Notice sur les papillons diurnes, *Pieris brassicae* et minor (letztere ist *Pieris napi*) et sur les ravages que les chenilles de ces lépidoptères ont exercés en 1855 et 56 sur les choux dans les départements de l'Ouest. — Die vierte Arbeit ist von Antoine in Rheims über das Eingraben der Bienenstöcke zur Ueberwinterung der Bienen; der Verf. hat festgestellt, dass bei Ausübung dieses Verfahrens wenigstens im Norden Frankreichs man sehr wenig Bienen verliert, dass sie weniger verzehren und dass die Königin früher mit der Brutablegung beginnt. (Ueber dieses Verfahren hat auch Guérin in den Annales de la société entomol. V. p. 33 ff. eine „Note sur le procédé d'enfouissement des ruches, pratiqué depuis plusieurs années par M. Antoine pour l'hibernation des Abeilles“ veröffentlicht.)

Als schädliche Insekten sind während des Russischen Feldzuges in der Krim gewissermassen auch *Sirex*-Larven aufgetreten, indem dieselben in Kartätschen-Schüssen und Kugeln eingebohrt gefunden wurden. Der Marschall Vaillant zeigte eine Kugel mit darin befindlichen Insektenlarven in der Akademie der Wissenschaften zu Paris vor und zugleich die Imagines, welche sich daraus entwickelt hatten; Duméril wies letztere in seinem über diesen Fall abgestatteten Bericht als eine Art der Gattung *Urocetus* nach. (*Comptes rendus*, 7. et 14. Septbre, Rev. et Magas. de Zoologie IX. p. 416—420).

Nach dem von Guérin (Rev. et Magas. p. 418) gegebenen Bericht scheint es, als sei Duméril der Ansicht, diese Insekten haben das Blei der Kugeln mit ihrer Legeröhre angebohrt und auf diese Art seien aus den hineingelegten Eiern die Larven in die Kugeln gekommen. Dass diese Erklärung alle Wahrscheinlichkeit wider sich habe, hebt Guérin ganz richtig hervor und vermuthet seinerseits, dass in den Wänden der Holzkisten, welche die Kugeln enthielten, sich schon Urocetus-Larven befunden haben, die sich nur nach innen durchgefressen hätten und so in die Kugeln gelangt seien.

Einen analogen Fall, wo die Larven von *Sirex gigas* Bleiplatten von $1\frac{1}{2}$ Zoll Dicke durchbohrten, theilte Kollar (Sitzungsberichte des zoolog.-botan. Vereins in Wien VII. p. 155) mit.

Dass sich Insektenlarven übrigens ausnahmsweise in Substanzen und Organismen begeben, welche ihnen ursprünglich nicht zum Wohnorte und zur Nahrung dienen, ist schon in mehreren Fällen nachgewiesen worden; es gehören dazu auch diejenigen, wo Larven als Eindringlinge in den gesunden oder kranken menschlichen Organismus beobachtet wurden. In Paris sind neuerdings wieder zwei solche Fälle zur Kenntniss gekommen: Sichel (Bullet. de la soc. entomol. V. p. XLIX) berichtete über eine Fliegenmade, wahrscheinlich der *Sarcophaga carnaria* angehörig, welche aus der Conjunctiva eines menschlichen Auges herausgezogen wurde und Legrand du Saulle (Comptes rendus de l'acad. de France, 19. Octobre, Revue et Magas. de Zoologie IX. p. 458) theilte eine „Observation de larves vivantes dans les sinus frontaux d'une jeune fille de neuf ans“ mit.

Der letztere Fall zeigte folgenden Verlauf: Nach mehreren Wochen heftigen Stirnschmerzes entleerte ein junges Mädchen durch Schnauben aus der Nase mehrere Insektenlarven und wiederholte dasselbe nach einigen Monaten. Abermals nach drei Monaten traten erneuter heftiger Kopfschmerz, Besinnungslosigkeit und epileptische Zufälle ein und unter Erscheinungen von Wahnsinn wurden zum dritten Male Larven ausgeleert. Durch die Anwendung arsenicirter Cigarren, deren Rauch durch die Nase getrieben werden musste, gingen schliesslich die übrigen Larven todt mit dem Nasenschleime ab und es trat völlige Genesung ein.

Eine lesenswerthe Abhandlung von Maeklin ist dessen „Beitrag zur Kenntniss der geographischen Verbreitung der Insekten im Norden, mit besonderer Berücksichtigung der

Fauna Skandinaviens und Finlands,“ welche ursprünglich in schwedischer Sprache (Helsingfors 1853) geschrieben, gegenwärtig in deutscher Uebersetzung von v. Osten-Sacken in der Entomolog. Zeitung p. 171—192 abgedruckt worden ist. Der Verf. entwickelt darin zuvörderst die Gründe für die bekannte Thatsache, dass die geographische Verbreitung der Thiere im Norden allgemein eine weit grössere sei als in den wärmeren Strichen der Erdoberfläche; sie lassen sich in der grösseren Gleichförmigkeit des Terrains, in der geringeren Mannigfaltigkeit der Vegetation und endlich auch darin suchen, dass die Ländermassen hier mehr zusammenhängende Strecken (der Breite nach) bilden, als dies gegen den Aequator hin der Fall ist. Daher ist in den Polargegenden die Verbreitung einer und derselben Art von Island, Skandinavien oder Lappland über ganz Sibirien bis Grönland, Canada und Labrador nichts Ungewöhnliches; und zwar sind es einerseits spezifisch nordische Thierformen, welche sich in dieser Art ausbreiten, andererseits aber auch solche, die eine bedeutende Verbreitung bis gegen den südlichen Theil Europa's erkennen lassen. Der Verf. weist die Allgemeinheit dieser Thatsache im Vorübergehen an einigen Beispielen aus den Wirbelthieren, den Mollusken und Crustaceen nach und geht sodann ausführlicher auf die Insekten ein, für deren Verbreitung im Norden ihm ein werthvolles und ausgedehntes Material zu Gebote steht. In Betreff der Fauna Skandinaviens kommt die von Nilsson angeregte Frage in Betracht, ob der südliche Theil dieses Landes bereits nach der Zerstörungsperiode, welche diese Halbinsel heimsuchte, mit Norddeutschland verbunden war und von dort seine jetzige Fauna erhalten hatte, während der nördliche Theil damals nicht von lebenden Wesen bewohnt sein konnte, sondern diese erst in einer späteren Periode aus Russland und Sibirien durch Einwanderung erhalten habe. Der Umstand, dass sich gerade in den nördlichen Theilen Skandinaviens und Finlands eine grosse Anzahl von Insekten nachweisen lässt, welche über Russland und Sibirien weit verbreitet sind, erhebt diese Annahme zur grössten Wahrscheinlichkeit; diese Arten sind gerade solche, welche früher als spezifisch Skandinavische, d. h. dem mittleren

Europa fremde angesehen wurden. Auf der anderen Seite ist hervorzuheben, dass sich von denjenigen Europäischen Arten, welche im nördlichen Skandinavien, Finland und Lappland fehlen, äusserst wenige bis nach dem nördlichen Sibirien hinein erstrecken. Nachdem der Verf. die Insekten-Fauna Skandinaviens und Finlands einerseits in ihren Eigenthümlichkeiten, andererseits in ihren Uebereinstimmungen sowohl mit Europäischen als Asiatischen Verbreitungsbezirken durch Anführung der auffallendsten Arten charakterisirt hat, geht er dazu über, diejenigen Insekten aufzuzählen, welche für Lappland oder Finland und zugleich für Nord-Amerika als gemeinschaftlich festgestellt worden sind. Es sind dies 79 Coleoptera, 16 Lepidoptera, 2 Neuroptera, mehrere Hymenoptera, 15 Diptera (nach Zetterstedt). Hierauf folgt noch ein sehr ausgedehntes Verzeichniss von Coleopteren, welche von Nord-Europa bis in das östliche Sibirien (Irkutsk, Kiachta) sich hineinerstrecken, und dieses wird abermals noch mit ungefähr 300 solchen Arten vermehrt, welche sich nur bis in das westliche Sibirien hinein ausdehnen.

Eine zweite Abhandlung desselben Verfassers, „Beitrag zur Kenntniss der sogenannten vicariirenden Formen unter den Coleopteren des Nordens“ v. J. 1855 (ebenda p. 321—348 in deutscher Uebersetzung von v. Osten-Sacken mitgetheilt) bildet gleichsam eine Fortsetzung der vorigen und kann hier um so mehr gleich mit in Betracht gezogen werden, als auch in jener die Coleopteren das hauptsächlichste Material für die Betrachtungen des Verf. abgeben. — Unter vicariirenden Formen versteht der Verf. nur solche Arten, welche wie z. B. manche Sibirische und Nord-Amerikanische einzelnen Europäischen Arten auf den ersten Blick täuschend ähnlich sehen, sich aber bei genauer Betrachtung als in mehreren Punkten verschieden herausstellen. Interessant ist das Verhältniss dieser vicariirenden Formen zu der geographischen Verbreitung der einzelnen Arten, indem im westlichen Sibirien, wo noch zahlreiche Europäische Arten unverändert vorkommen, die vicariirenden Formen selten sind, indem ihre Zahl im östlichen Sibirien schon beträchtlich zunimmt und indem in Nord-Amerika, wo die Zahl

der Europäischen Arten schon eine viel geringere ist, die der vicariirenden sich in demselben Maasse steigert. Es bilden daher in dem speciellen Theil der Arbeit, in welchem der Verfasser die einzelnen Arten, welche er als vicariirende Formen ansieht, aufzählt und bespricht, auch vorzüglich die des östlichen Sibiriens und Nordamerika's im Vergleich mit den Europäischen den Gegenstand der Betrachtung und zwar ist es ganz besonders die Familie der Carabicingen, welche der Verf. in recht ausführlicher und eingehender Weise behandelt. Die zahlreichen Notizen, welche der Verf. hierbei über viele Sibirische Arten, die zum Theil wegen der ungenügenden Beschreibungen den Deutschen Entomologen wenig bekannt sind, einfließt, sind von um so grösseren Interesse, als sie keineswegs dem Verfahren derjenigen, welche ähnliche und schwer zu unterscheidende Arten als unbedeutende Local-Varietäten abzufertigen suchen, das Wort reden.

Dass bei der Besprechung vicariirender Formen vor Allem eine sichere Feststellung von Arten und Varietäten nöthig ist, versteht sich von selbst, da eine solche der ganzen Betrachtung zur Grundlage dienen muss; daher spricht sich denn der Verf. auch ganz besonders gegen die Leichtfertigkeit, mit der heut zu Tage selbstständige Arten zu lokalen Abänderungen degradirt werden, aus. „Man vermengt oft vollkommen verschiedene und unähnliche Thierarten, um den Grund ihrer Unähnlichkeit in der Verschiedenheit ihrer Wohnplätze nachzuweisen.“ — „Ueberhaupt wird mit den sogenannten geographischen Varietäten und lokalen Artveränderungen oft Unfug getrieben.“ — „Die meisten nordeuropäischen Thierarten, welche bis zum Baikalsee, bis Kamtschatka und noch weiter vordringen, zeigen nämlich überhaupt keine Formveränderung, weder unter verschiedenen Breitengraden, noch an physisch ungleichen Wohnorten; es wäre demnach etwas ganz Besonderes, wenn gerade der Baikalsee oder die ziemlich schmale Behrings-Strasse das Vermögen besässen, die Form einer Thierart auf einmal wesentlich zu ändern, nachdem dieselbe ihre eigenthümliche Beschaffenheit in ihrer Ausbreitung von dem nördlichen Theile Schottlands oder Skandinaviens bis zum östlichen Sibirien behalten hatte. Ich habe Gelegenheit gehabt, manche Amerikanische Repräsentanten von entsprechenden Europäischen Arten in mehreren Hunderten von Exemplaren aus verschiedenen Lokalitäten der Russischen Besitzungen in Nordamerika zu untersuchen und zu vergleichen, ohne dabei die geringste Andeutung eines Uebergangs von einer Europäischen zu einer Asiatischen oder Amerikanischen Form finden zu können.“ —

„Nimmt man dagegen an, dass diese den nordeuropäischen Thierarten verwandten Repräsentanten in den nördlichen Theilen von Asien und Amerika keine geographischen Varietäten, sondern ursprünglich besondere in verschiedenen Welttheilen, aber unter ziemlich gleichen klimatischen und anderen äusseren Naturverhältnissen entstandene Arten sind, so braucht man keine dem bekannten Verhalten in der Natur widerstreitende Hypothese zu Hülfe zu nehmen.“ — Diese und zahlreiche andre Stellen aus der äusserst gediegenen Abhandlung des Verf. möchten dem unbefangenen Beurtheiler wohl jedenfalls lichtvoller erscheinen, als diejenigen, auf welche in derselben Zeitschrift p. 308 ff. durch renommistische „Eingesandts“ zu wiederholten Malen hingewiesen wird.

Ueber das schaarenweise Ziehen von Insekten und die dasselbe bedingenden oder begünstigenden Umstände hat van Bemmelen (Handelingen der Nederlandsche Entomologische Vereeniging I. Deel, 3. Stuk, Leyden 1857, p. 1—23) unter dem Titel „Waarnemingen over het trekken van Insekten“ Mittheilungen gemacht. Der Verf. beschreibt mehrere Fälle, wo *Libellula quadrimaculata* in Holland zu grossen Schwärmen und zwar zuweilen über das Meer hin Züge unternommen habe, und reiht hieran eine Zusammenstellung der Beobachtungen früherer Autoren, welche dasselbe Phänomen theils ebenfalls an Libellen, theils an anderen Insekten und zwar besonders Schmetterlingen (*Pieris brassicae*, *Vanessa cardui* u. a.) wahrgenommen. Beim Vergleich der Jahreszahlen, die für dergleichen Erscheinungen bisher angemerkt worden waren, stellte sich eine etwaige Periodicität für solche Insektenzüge nicht heraus, nur kam mehrmals der Fall vor, dass sie in zwei aufeinander folgenden Jahren stattgefunden hatten. Dagegen stimmten alle Beobachtungen, welche mit einiger Genauigkeit und mit Berücksichtigung der Witterungsverhältnisse angestellt worden waren, darin überein, dass die Richtung der Schwärme stets mit der augenblicklichen Windrichtung correspondirte; auch wurden die meisten Libellen-Züge im Monat Juni beobachtet.

Doengking erörterte in einer „Uebersicht periodischer Erscheinungen aus dem Thierreiche der Umgegend Kischinew's (Bullet. de la soc. des natur. de Moscou 1857, III. p. 249 ff.) auch das Auftreten einiger Insekten während der

Jahre 1845 — 56. Es sind: *Cetonia hirta*, *Gryllus migratorius*, *Lethrus cephalotes*, *Lytta vesicatoria* und *Melolontha vulgaris*.

J. Thomson hat unter dem Titel „Archives entomologiques, ou recueil contenant des illustrations d'insectes nouveaux ou rares“ (Paris 1857, gr. 8. planch. color.) ein Prachtwerk begonnen, welches vorzüglich zur Bekanntmachung ausgezeichnete neuer exotischer Insekten, unter denen die Käfer eine besonders ausgedehnte Berücksichtigung erfahren haben, bestimmt ist. Das Werk ist wie die Westwood'schen *Arcana entomologica* auf zwei starke Bände berechnet, welche in Lieferungen von zwei bis drei Bogen Text und einigen Kupfertafeln erscheinen. Von dem ersten Bande, welcher die Jahreszahl 1857 trägt, ist die Hälfte des Textes übrigens erst im folgenden Jahre und die dazu gehörigen Kupfertafeln sogar bis jetzt noch nicht vollständig herausgegeben. Wenn die Publicationen des Herausgebers, der sich mit besonderer Vorliebe der Familie der Cerambycinen zugewandt hat, gleich den grössten Theil des Werkes in Anspruch nehmen, so sind doch andre Pariser Entomologen nicht ganz ohne Theilnahme an demselben geblieben, und ausser Beschreibungen einzelner neuer Arten durch Buquet, Chabrillac, Chevrolat, Guérin u. s. w. finden sich darin sogar einige anatomische Darstellungen von Laboulbène und L. Dufour. In Betreff der Fülle des darin bekannt gemachten Materials und in Rücksicht auf den Reichthum an ausgezeichneten und seltenen neuen Formen, die in ihm enthalten sind, wird sich das Werk nothwendig als eine reiche Fundgrube bei der Determination grösserer Sammlungen herausstellen und diesen daher unentbehrlich werden; auch stellen es seine vorzüglich schön ausgeführten Abbildungen ohne Frage in die Reihe der iconographischen Werke ersten Ranges, a sogar über die meisten bisher erschienenen. Wie es aber vielen Werken der Art eigen ist, dass nämlich in Rücksicht auf die Hülfe, welche die Abbildungen beim Bestimmen gewähren können, die Beschreibungen nur nebenbei und damit sie nicht fehlen, entworfen sind, so hat auch bei dem vorliegenden unter der glänzenden Ausstattung der Tafeln die Brauchbarkeit des Textes gelitten und bei Bestimmung von Arten,

welche nur durch Beschreibungen bekannt gemacht sind, wird man nicht selten in Ungewissheit über dieselben bleiben. Ref., der in dem vorliegenden Jahresbericht den ersten, im Text vollständigen Theil des Werkes berücksichtigt, und die einzelnen Abhandlungen desselben gehörigen Orts näher besprochen hat, nahm hierbei Veranlassung, die als neu beschriebenen Gattungen und Arten des Verf. auf die hiesige Königl. Sammlung zu prüfen; in manchen Fällen stellte sich eine Identität mit bereits bekannten heraus, in viel zahlreicheren aber die Unmöglichkeit, nach den Beschreibungen des Verf. eine sichere Bestimmung zu treffen, so dass man ihm fast rathen möchte, alle seine Publicationen durch so zahlreiche und schöne Abbildungen, wie er sie z. B. bei *Tragocephala*, *Anacolus* und *Composoma* gegeben hat, zu illustriren. Das Werk gewährt übrigens noch dadurch ein besonderes Interesse, dass es die interessantesten und neuesten Entdeckungen verschiedener Englischer und Französischer Reisenden, wie Wallace, Fortune, Bates, Deyrolle u. a., deren beste Ausbeute der Verf. stets zu acquiriren scheint, in verhältnissmässig kurzer Zeit zur Kenntniss bringt.

Eine zweite periodische Publication, welche u. a. die Bekanntmachung der reichen Entomologischen Schätze des Leydener Museums in Aussicht stellt, ist unter dem Titel: *Mémoires d'Entomologie, publiés par la société entomologique des Pays-Bas sous la direction de J. van der Hoeven, C. Verloren et Snellen van Vollenhoven* (I. Vol. La Haye 1857, 8°. 194 pag. c. tab. 12 color.) erschienen. Der erste vorliegende Band enthält ausser der Beschreibung und Darstellung interessanter exotischer Insektenformen, die meist den Niederländischen Besitzungen auf den Sunda-Inseln angehören, auch mehrfache werthvolle Beiträge zur Biologie und Metamorphose, einem Felde, welches von den Niederländischen Entomologen von je her mit Glück cultivirt worden ist. Die Zeitschrift beschränkt sich nicht nur auf die eigentlichen Insekten, sondern nimmt auch Arbeiten im Bereich der übrigen Arthropoden-Classen auf.

Ausserdem haben sich auch in Brüssel, Berlin und Wien Liebhaber und Sammler inländischer Insekten dazu vereinigt, durch Herausgabe periodischer Schriften „die Wissenschaft

zu fördern.“ Zusammenstellungen von Lokalfaunen, Beschreibungen einzelner neuer Arten und Gattungen, Uebersetzungen und Auszüge aus ausländischen Publicationen, Referate über einzelne Werke und Zeitschriften machen ihren Inhalt aus. Die Titel dieser Zeitschriften sind: *Annales de la société entomologique Belge* (Tome I. Bruxelles 1857. 8°. 173 pag.). — *Berliner Entomologische Zeitschrift*, herausgegeben vom Entomologischen Verein in Berlin. (1. Jahrg. 1857. Berlin, 8°. 206 pag. 1 Taf.) — *Wiener Entomologische Monatsschrift*. (I. Bd. Wien 1857. 8°. 194 pag. 1 Taf.)

Staudinger machte (Entomol. Zeit. p. 209—289) ausführliche Mittheilungen über seine im Jahre 1856 zu entomologischen Zwecken unternommene Reise nach Island, welche in so fern die grösste Beachtung verdienen, als von den Insekten Islands bis jetzt so gut wie Nichts bekannt war. Aus den vom Verf. vorausgeschickten Bemerkungen über die climatischen und geognostischen Verhältnisse des Landes ist hervorzuheben, dass die zwischen dem $63^{\circ} 35'$ und $66^{\circ} 30'$ liegende Insel im Süden eine mittlere Temperatur von 4° , im Norden von 0° R. besitzt, dass ihre Witterung im Allgemeinen sowohl nach den Jahren als nach den einzelnen Lokalitäten eine sehr veränderliche ist, dass der Sommer sich aber im Ganzen durch ausserordentlich vielen Regen hervorthut; nicht selten regnet es im Juni und Juli vier volle Wochen hintereinander, in manchen Jahren sogar den grössten Theil des Sommers hindurch. Der Verf. selbst hat im Süden Islands einen besonders milden und trocknen Sommer angetroffen, aber trotzdem von Ende Mai bis Ende Juni jeden Tag Regen gehabt; die Temperatur war im Mai und Juni des Morgens 4° — 6° und stieg im Laufe des Tages bis auf 10° ; zu Ende Juli's und im August zeigte das Thermometer im Schatten 15° — 16° . Der Aufenthaltsort des Verf. war Thingvellir, acht Meilen im Innern von der an der Südküste gelegenen Hauptstadt Reykjavik entfernt, an dem etwa 5 Meilen im Umfang messenden See Thingvalla vatn gelegen; die Vegetation war hier reichhaltig, wie aus der Zusammenstellung, welche der Verf. von den dort beobachteten Pflanzen giebt, hervorgeht, bestand aber ausser zwei Birken- und einigen Weidenarten nur aus einjährigen Gewächsen; sehr allgemein

verbreitet und oft ausschliesslich grosse Strecken des Bodens bedeckend, sind die Laubmose (*Sphagnum*), aus denen sich hin und wieder Gramineen hervorarbeiten. Weit ausgedehnte Wiesen mit üppigem Graswuchs und Torfmoore wechseln mit blosliegendem vulkanischen Gestein, hin und wieder mit Lagen gelben Lehmcs bedeckt, ab; das Terrain ist durch tiefe Klüfte eigenthümlich zerrissen und steigt allmählig bis zur Höhe von 2500' 3000' an, wo auf den ausgebrannten Vulkanen der Schnee erst im August schmilzt. — Die von Staudinger (in Verbindung mit zwei gleichzeitig im Norden der Insel reisenden Sammlern) auf Island gemachte entomologische Ausbeute beläuft sich im Ganzen auf 312 Insekten-Arten der verschiedenen Ordnungen; dass diese Zahl, wenn auch keine absolut vollständige, doch der in Wirklichkeit existirenden wenigstens nahe kommt, ist aus zwei Gründen anzunehmen, indem 1) von St. alle Insekten, die ihm überhaupt vorkamen, mitgenommen worden sind, und 2) die im Norden veranstalteten Sammlungen überhaupt nur 12 nicht im Süden aufgefundene Arten enthielten, woraus hervorzugehen scheint, dass die Fauna der Insel überall eine grosse Gleichförmigkeit darbietet. Was die einzelnen Ordnungen betrifft, so sind die Dipteren mit 110 Arten am zahlreichsten vertreten; ihnen zunächst stehen die Coleopteren mit 81 Arten, dann folgen die Hymenopteren mit 61, die Lepidopteren mit 33, die Neuropteren mit 9, die Hemipteren mit 8, die Parasiten mit 6, die Poduren mit 3—6 Arten; die Orthopteren fehlen gänzlich. Die grösste Anzahl der Arten ist zugleich im nördlichen und mittleren Europa vertreten, einige stimmen mit Grönländischen, Labradorischen und Lappländischen überein, andre sind zugleich auf den hohen Gebirgen Mittel-Europa's heimisch, der geringste Theil endlich ist neu, vielleicht auch specifisch Isländisch. Charakteristisch ist für viele Arten (besonders Lepidopteren und Dipteren) eine starke Veränderlichkeit in Farbe und Zeichnung und vorzüglich eine sehr hervortretende Neigung zur Melanose, wie denn überhaupt eine düstere Färbung vorwaltet. Den climatischen Verhältnissen angemessen ist das vollständige Fehlen der Tagfalter und Schwärmer (übrigens auch der Bombyciden) unter den Lepidopteren.

Nach diesen Vorbemerkungen über die Insektenfauna Islands im Allgemeinen geht der Verf. (a. a. O. p. 228 ff.) auf eine ausführliche Beschreibung der von ihm daselbst aufgefundenen 33 Lepidopteren ein. Von denselben gehören 9 zur Familie der Noctuen (*Episema graminis*, *Agrotis islandica* n. sp., rava, *Noctua conflua*, *Triphaena pronuba*, *Hadena exulis*, *Sommeri*, *Mamestra pisi* und *Plusia interrogationis*), 10 zur Familie der Geometriden (*Cidaria truncata*, *munitata*, *propugnata*, *caesiata*, *thulearia*, *alchemillata*, *Eupithecia scoriata* n. sp., *satyrata* und *valerianata*), 3 zu den Tortrices (*Teras maccana*, *Tortrix pratana* und *Penthina betuletana*), 9 zu den Tineiden (*Crambus pascuellus*, *extinctellus* n. sp., *Pempelia carbonariella*, *Tinea rusticella*, *Plutella cruciferarum*, *Dalella septentrionum* n. sp., *Gelechia Thulella* n. sp., *Endrosis lacteella*) und 1 (*Pterophorus Islandicus* n. sp.) zu den Pterophoriden. Neben der Charakteristik der neuen oder unvollständig bekannten Arten, so wie ihrer zahlreichen Farben-Abänderungen werden Notizen über ihr Vorkommen, die Zeit ihres Erscheinens, so wie über die ersten Stände mehrerer gegeben. — Sodann folgt (pag. 282 ff.) eine Aufzählung der Coleopteren Islands mit Angaben über ihr Vorkommen; sie vertheilen sich auf die einzelnen Familien folgendermassen: 11 Carabicingen, 3 Dytisciden, 3 Palpicornen, 1 Silphide, 35 Staphylingen, 6 Cryptophagen, 1 Mycetophagide (*Typhaea*), 3 Byrrhii, 1 Lamellicorne (*Aphodius*), 1 Elateride (*Cryptohypnus*), 2 Malthinen, 1 Ptinus, 9 Curculionen, 2 Chrysomelinen, 2 Lathridier, 1 Mycetaea. Davon sind neu 3 Staphylingen, die hier charakterisirt werden. — Ueber die Hemipteren ist p. 228 eine kurze Notiz gegeben; es sind drei Heteropteren (*Anthocoris*, *Salda*, *Corisa*) und von Homopteren 1 Jassus, 1 Dorthesia und einige Aphis-Arten. — Ueber die ihm zur Ansicht vorliegenden Dipteren kann Ref. vorläufig mittheilen, dass unter circa 40 Nemoceren die Gattungen *Tipula*, *Limnobia*, *Erioptera*, *Trichocera*, *Macrocera*, *Sciophila*, *Mycetophila*, *Tanypus*, *Chironomus*, *Thaumalea*, *Scatopse*, *Ceratopogon*, *Psychoda*, *Simulia*, *Bibio* und *Sciara* vertreten sind; von den übrigen Familien kommen auf die Empiden 3, Dolichopoden 2, Syrphiden 13, Muscarien 45, Pupiparen 2 Arten. Von den einzelnen Gattungen sind am stärksten *Chironomus* (12), *Syrphus* (10), *Anthomyia* (18 Arten) vertreten; unter den Acalypteren sind besonders die Gattungen *Coelopa* und *Orygma* erwähnenswerth.

Hagen (Entomol. Zeit. p. 381) bemerkt zu der vorstehenden Abhandlung über die Insektenfauna Islands, dass in Th. Gliemann's „Geographische Beschreibung von Island“, Altona 1824, 8°. ein Verzeichniss dort lebender Insekten enthalten sei, welches 82 Arten verschiedener Ordnungen enthält; dieselben werden von H. einzeln namhaft gemacht.

Ueber die Insektenfauna der im Südosten von Neu-Guinea liegenden Insel Woodlark (westlich von den Salomons-Inseln) hat der Missionär Montrouzier eine grössere Abhandlung „Essai sur la faune de l'île de Woodlark ou Moïou“ in den *Annales des sciences physiques et naturelles, publiées par la société d'agriculture de Lyon* VII, 1. p. 1—114 und VIII. p. 393—411 veröffentlicht, deren bis jetzt vorliegender Theil sich auf die Ordnungen der Coleopteren, Orthopteren, Hemipteren, Lepidopteren und einige Hymenopteren erstreckt. Der Verf. liefert eine systematische Aufzählung sämtlicher von ihm auf der Insel Woodlark gesammelten Arten, eine in einzelnen Fällen genügende, meist aber sehr kurze und unzureichende Charakteristik derjenigen, welche er für neu ansieht und ergänzende Bemerkungen zu einzelnen von Fabricius und Boiduval beschriebenen Species. Da die beiden genannten Autoren überhaupt fast die einzigen sind, welche der Verf. bei der Prüfung der ihm vorliegenden Arten gekannt und berücksichtigt hat, so versteht es sich bei den umfangreichen Publicationen der Neuzeit über die entomologische Fauna der Inseln des stillen Oceans von selbst, dass seine Arbeit auch nach der literarischen Seite hin viel zu wünschen übrig lässt, und es lässt sich eine Identität der von ihm als neu aufgestellten Arten mit bereits bekannten in vielen Fällen um so eher vermuthen, als es durch die Erfahrung festgestellt ist, dass nicht nur jene Inseln unter sich, sondern auch zum Theil mit dem Festlande Neu-Holland's eine grosse Uebereinstimmung in ihrer Fauna darbieten. Mit diesem Mangel an einer genügenden Durcharbeitung der vorhandenen Literatur hängt auch die Nomenklatur des Verf. zusammen, in welcher sich mehrfach Gattungs- und Artnamen nachweisen lassen, die schon anderweitig verwendet worden sind. Es giebt kaum eine Fauna, die in entomologischer Beziehung einer gründlicheren Bearbeitung bedürfte, als die des stillen Oceans, da durch mehrere französische Werke, welche dieselbe behandeln, schon ohnehin viel versehen worden ist: und andererseits ist kaum eine zweite in Rücksicht auf die Reichhaltigkeit an interessanten und merkwürdigen Formen einer gründlichen Bearbeitung so werth, als gerade diese. Es kann daher nur bedauert werden, dass die hier

in Rede stehende Fauna der Insel Woodlark nicht eine eingehendere Behandlung erfahren hat.

Was den Charakter der Insektenfauna der Insel Woodlark im Allgemeinen betrifft, so giebt der Verf. darüber in einer Einleitung einige Andeutungen. Die Insel ist klein, niedrig, die Vegetation im Ganzen mager, die Regenmenge gering, die Temperatur mässig, indem sie selten auf 36° Cels. steigt; der Mangel an vierfüssigen Thieren bedingt z. B. das Fehlen der meisten Insektenformen, welche von Cadavern leben, und überhaupt ist die Fauna nicht als eine besonders reichhaltige zu bezeichnen. Als besonders bemerkenswerth sind einige ausgezeichnete Phasmoden-Formen (*Euryacantha* Boisd.) hervorzuheben; auch unter den Schmetterlingen kommen einige ausgezeichnete neue, besonders farbenprächtige Arten vor. Unter den Coleopteren überwiegen an Menge ganz besonders die Curculioniden, und ihnen schliessen sich als die artenreichsten Familien die Lamellicornen, Cerambyciden und Tenebrioniten an.

Einen kleineren Beitrag zur Kenntniss der Australischen Insektenfauna hat Newman „Characters of a few apparently undescribed Insects collected by James Gibbon at Moreton - Bay“ (Transact. of the entomol. soc. IV. p. 51—57) geliefert. Derselbe enthält Beschreibungen einer Anzahl neuer Arten aus den Ordnungen der Coleopteren, Dipteren und Lepidopteren.

Ferner machte P. Edwards (Edinburgh new philosoph. Journ., new ser. V. p. 351 ff.) in einem Briefe an Jones Mittheilungen über die Insektenfauna von Melbourne in Neu-Holland. „Entomology of the vicinity of Melbourne, Australia; communicated in a letter to Mr. Jones, by P. Edwards.“ — Der Verf. giebt darin eine gedrängte Uebersicht der Hauptformen aus den verschiedenen Insekten-Ordnungen, die bei Melbourne einheimisch sind; für die Coleopteren, die noch am eingehendsten behandelt sind, ist bemerkenswerth, dass die Zahl der Individuen, in der sie auftreten, zuweilen enorm ist, wie z. B. für *Schizorrhina punctata* und *Australasiae*, welche der Verf. zu Tausenden beisammen traf.

Zur Kenntniss der Japanischen Insekten-Fauna lieferte v. Motschulsky (Etudes entomol. VI, p. 25—41) Beiträge. Von Coleopteren werden 24 neue Arten, die zum Theil auch eignen Gattungen angehören, beschrieben, ausserdem eine Anzahl schon bekannter namentlich aufgeführt; von Hymeno-

pteren ist nur eine neue *Vespa* charakterisirt, von Lepidopteren werden 44 bereits bekannte Arten aufgezählt.

Der zoologische Theil von Ramon de la Sagra's Werk über die Insel Cuba, von dem bisher mehrere Bände, welche die Wirbel- und Weichthiere enthalten, erschienen waren, ist im Jahre 1857 mit dem 7. Bande, die Artikulaten umfassend, fortgesetzt worden. Der Titel heisst: *Historia fisica, politica y natural de la Isla de Cuba, por D. Ramon de la Sagra. Segunda Parte: Historia natural. Tomo VII. Crustaceos, Aragnides é Insectos.* Paris, en la libreria de Arthus Bertrand. 1856. — Der vorliegende Folio-Band umfasst XXXII und 371 Seiten Text und 20 colorirte Tafeln; der Text ist in Spanischer Sprache abgefasst, die Diagnosen der bereits beschriebenen Arten sowohl als der neu aufgestellten jedoch lateinisch. Wie der Titel besagt, umfasst das Werk nicht nur die Insecta hexapoda, sondern auch die übrigen Arthropoden, nämlich die Crustaceen, Myriapoden und Arachniden. Ein Vorwort von Guérin-Ménéville benachrichtigt uns davon, dass ihm die Redaction dieses Theiles der Zoologie vom Herausgeber des Werkes übertragen worden sei, und eine Nachschrift des letzteren (Ramon de la Sagra), vom September 1857 datirt, deutet darauf hin, dass das Erscheinen des Bandes nicht in das Jahr 1856, wie der Titel angiebt, sondern in das folgende und zwar in das Ende desselben fällt. An der Bearbeitung der einzelnen Classen und Ordnungen der Gliederthiere haben sich ausser Guérin mehrere der französischen Entomologen betheiligt, wie dies aus folgender Uebersicht des Inhalts hervorgeht: pag. V—XXIII Crustaceen, von Guérin; p. XXIV—XXXII Arachniden und Myriapoden von Lucas; pag. 1—136 Coleoptera von Jacquelin du Val; pag. 136—148 Orthoptera von Guérin; pag. 149—182 Hemiptera von Guérin; pag. 183—201 Neuroptera (fast ausschliesslich Libellulinen) von de Sélys-Longchamps; pag. 202—313 Lepidoptera von Lucas (mit Benutzung eines Manuscripts über Cubensische Schmetterlinge von Lefébvre, dessen Beschreibungen darin aufgenommen sind); pag. 314—327 Hymenoptera von Lucas, die Vesparien jedoch von de Saussure; pag. 328—349 Diptera von Bigot. — Was das Material betrifft, welches der Ausarbeitung des Werkes zu

Grunde gelegt worden ist, so ist ausser dem von de la Sagra bei seiner Durchforschung der Insel Cuba zusammengebrachten auch Manches von Poey in Habana eingeschickt worden und ausserdem haben mehrere der bedeutenderen Pariser Sammlungen das Ihrige zur Vermehrung beigetragen. Trotzdem ist die Zahl der aufgeführten und beschriebenen Arten im Verhältniss zu den aus Cuba bisher bekannten und z. B. auch zu den in der hiesigen Königl. Sammlung befindlichen eine sehr geringe, und während in letzterer die Zahl der unbeschriebenen Arten nicht unbeträchtlich die der bereits bekannten übertreffen möchte, bleibt sie in der vorliegenden Fauna weit hinter den letzteren zurück. — Die beifolgenden Tafeln sind sowohl in der Zeichnung als im Colorit gut ausgeführt und enthalten neben der bildlichen Darstellung der als neu beschriebenen Formen nebst den sie erläuternden Detail-Zeichnungen auch zahlreiche schon früher bekannt gemachte Arten; den Crustaceen sind 3, den Arachniden 2, den Coleopteren 6, den Orthopteren und Hemipteren je 1, den Lepidopteren 4, den Hymenopteren 2 und den Dipteren 1 gewidmet; die erste Hymenopteren-Tafel enthält zugleich die Abbildung von 2 Agrioniden.

Um auf die einzelnen Theile des Werkes specieller einzugehen, so beschränken sich die aufgeführten Crustaceen fast ausschliesslich auf die Abtheilung der Decapoden, indem ausser diesen nur 3 Stomatopoden, 1 Isopode und 1 *Limulus* die einzigen Vertreter der umfangreichen übrigen Ordnungen sind; unter den Decapoden sind von Interesse die schon früher von Guérin beschriebene Gattung *Hypconcha* und einige Larven-Formen von Brachyuren, die unter den Gattungen *Zoëa* und *Zoëides* beschrieben und abgebildet werden. — Unter den Arachniden befinden sich einige Scorpioniden und Solifugen, die übrigen gehören der Abtheilung der Araneiden an. — Von Myriapoden: 1 *Spirobolus* und 2 Scolopendren, sämmtlich bereits bekannt. — Von Coleopteren sind nahe an 100 neue Arten beschrieben, welche durchweg in bereits bekannten Gattungen untergebracht sind, wenn auch zum Theil in solchen, die (wie mehrere der in Dejean's Catalog aufgeführten) noch nicht näher begründet wurden. Ueberhaupt hat hier für den Verf. öfter der Dejean'sche Catalog als genügende Autorität für Gattungen gegolten, die seitdem von Anderen charakterisirt worden sind, so wie er sich auch öfter damit begnügt hat, Arten unter unrichtigen Gattungen, denen sie zuertheilt worden sind, zu belassen; z. B. *Eriphus Lanieri*, *dimidiatus* und *dimidiatipennis*, welche alle drei

mit der Gattung *Eriphus* nichts gemein haben. — Unter den Orthopteren sind 8 Arten aus den Forficularien und Blattinen als neu beschrieben, die übrigen bekannte. — Grösser ist die Zahl der neuen Arten unter den Hemipteren, wo sie sich gegen 50 beläuft; bei weitem die meisten derselben fallen den Heteropteren zu und auf einige interessantere Formen derselben wurden auch neue Gattungen begründet (*Coreodes*, *Capsini*). — Die Neuropteren (*Pseudo-Neuropteren*), sämmtlich Libellulinen, sind mit 14 neuen Arten bereichert; von ächten Neuropteren sind nur 2 *Ascalaphus*-Arten angeführt. — Von besonderem Interesse ist das Verzeichniss der Lepidopteren, welches durch Lucas' Zusammenstellung recht reichhaltig erscheint; es sind in dasselbe die zahlreichen Cubensischen Lepidopteren, welche von Poey in zwei Werken (*Memorias sobre la historia natural de la Isla de Cuba I. und Centurie des Lépidoptères de l'île de Cuba*, beide wenigstens in Deutschland nicht bekannt geworden) beschrieben und abgebildet worden sind, nach ihren Diagnosen aufgenommen, so dass dieselben jetzt zur allgemeinen Kenntniss kommen. Die Fülle an Rhopaloceren ist nach dieser Aufzählung sehr gross und in faunistischer Hinsicht ist dieser Theil des Werkes daher ohne Zweifel der interessanteste; auch die Zygaeniden und Sphingiden sind noch reichhaltig vertreten, die übrigen Familien dagegen sehr dürftig und die Microlepidopteren fehlen gänzlich. Die als neu beschriebenen Arten, deren grösster Theil von einem Manuscript Lefébvre's herrührt, belaufen sich auf 34; die meisten gehören zu den Rhopaloceren, einige den Zygaeniden, 1 den Sphingiden und 1 den Bombyciden an. — Die Hymenopteren sind wieder schwach vertreten und mit Ausnahme zweier neuer Apiarien bereits bekannt. Am dürftigsten sind jedoch sowohl in Betreff der Artenzahl als in Rücksicht auf die ungenügende Beschreibung der neuen die Dipteren davongekommen; die Zahl der letzteren beträgt 23 und bei den bereits bekannten hat sich der Bearbeiter nicht einmal die Mühe gegeben, die Bände, in welchen sie von Macquart und Wiedemann beschrieben worden sind, anzuführen. — In Bezug auf die Ausstattung des Werkes ist zu bedauern, dass der Text von den grössten Druckfehlern förmlich wimmelt, besonders in einzelnen Theilen; auf p. 113 ist z. B. in einer Diagnose der *Passus* „*altera ante apicem magis obliqua*“ statt einmal dreimal nach einander gedruckt; Citate von Autoren mit Auslassung der pag. oder tab. und fig., wie z. B. auf p. 110 wiederholen sich ebenfalls öfter.

Ueber einzelne Faunengebiete Europa's wurden folgende kleinere Mittheilungen, welche theils allgemeiner, theils specieller Natur sind, gemacht:

Dohrn (*Entomol. Zeitung* p. 355—372) berichtete über eine zu entomologischen Zwecken nach Italien bis Neapel von ihm unternommene Reise; die Notizen, welche der Verf.

giebt, betreffen einerseits die in verschiedenen Städten Italiens befindlichen öffentlichen und Privatsammlungen, andererseits die Lebensweise und das Vorkommen einzelner interessanter Insekten, besonders Coleopteren, welche er selbst zu sammeln und zu beobachten Gelegenheit hatte.

A. Costa, De quibusdam novis Insectorum generibus descriptis iconibusque illustratis (Memorie della Reale Accademia delle scienze di Napoli, Vol. II. p. 219—233, c. tab. I). — Der Verf. liefert Beschreibungen und Abbildungen einiger interessanter neuer Gattungen aus den Ordnungen der Coleopteren, Neuropteren, Hymenopteren, Hemipteren und Dipteren, sämmtlich aus dem Königreich Neapel stammend. Dieselben sind gehörigen Orts einzeln aufgeführt worden.

Six erörterte in einem Aufsätze, betitelt: „Eene entomologische wandeling in Augustus in de omstreken van Driebergen“ (Mémoires d'entomologie publ. p. l. soc. entom. des Pays-Bas I. p. 14) die interessantesten Insekten der Umgegend von Driebergen, welche er im August daselbst gesammelt und beobachtet hat; besonders sind es die Ordnungen der Coleopteren, Dipteren und Hymenopteren, aus denen die bemerkenswertheren und seltneren Arten hervorgehoben und besprochen werden.

Boheman (Oefversigt af Kongl. Vetensk. Akad. Förhandl. XIV, p. 15—24) behandelte in gleicher Weise die von ihm auf einer Reise nach Umeå-Lappmarken erbeuteten und beobachteten Insekten.

Perris hat (Annales de la soc. Linnéenne de Lyon IV. 1857, p. 83—180) unter dem Titel: „Nouvelles excursions dans les Grandes Landes“ seinen früheren Mittheilungen über die an jener Lokalität vorkommenden Insekten eine dritte (in Briefform an Mulsant abgefasst) hinzugefügt, welche wie die vorhergehenden ein interessantes Bild der dortigen Insektenfauna liefert und mannigfache werthvolle Beobachtungen über Biologie einzelner Arten u. s. w. enthält. Der allgemeinen Darstellung lässt der Verf. eine Aufzählung der von ihm gesammelten Insekten aus den Ordnungen der Coleopteren, Orthopteren, Neuropteren, Hymenopteren, Hemipteren und Dipteren nebst Bemerkungen über ihre Lebensweise und ihr Vorkommen folgen (von Lepidopteren sind nur wenige, sel-

tenere Arten angeführt); von Coleopteren und Hemipteren sind zugleich diejenigen, welche sich als neu ergeben haben, beschrieben worden.

Fairmaire (Annales d.l. soc. entom. V. p. 619—647) machte Mittheilungen über eine von der Société entomologique nach Montpellier unternommene Excursion und gab eine Aufzählung der daselbst von mehreren Mitgliedern gesammelten Insekten aus den Ordnungen der Coleopteren (567 Arten), Hemipteren (28 A.) und Lepidopteren (97 A.); von Coleopteren werden einige Arten zugleich als neu beschrieben.

„Entomological notes“ by H. Haliday (Natural history review, IV. Proceed. of societ. p. 31 ff.) enthalten Bemerkungen über das Vorkommen und die Lebensweise der seltneren und interessanteren Insekten verschiedener Ordnungen aus der Umgegend von Dublin.

In Bielz's „Handbuch der Landeskunde Siebenbürgens, eine physikalisch - statistisch - topographische Beschreibung dieses Landes“ (Hermannstadt 1857, 8^o.) findet sich p. 118 ff. bei der Erörterung der Fauna Siebenbürgens auch eine Zusammenstellung der seltneren und zum Theil dem Lande eigenthümlichen Insekten, besonders aus den Ordnungen der Coleopteren und Lepidopteren; die aufgeführten Arten sind mit Angaben über ihre speciellen Fundorte versehen, bei einzelnen (Carabus) die geographische Verbreitung erörtert.

Schmidl gab in seiner Beschreibung der Baradla-Höhle in Ungarn auch Nachrichten über die in derselben vorkommenden Thiere (Sitzungsberichte der mathemat. naturwiss. Classe der Akad. d. Wissensch. zu Wien XXII. p. 579 ff.). Von Gliederthieren (p. 592) werden 2 Dipteren, 1 Staphylin, 2 Acarinen und 1 Isopode, sämmtlich schon aus anderen Höhlen bekannt und beschrieben, namhaft gemacht.

Von A. Becker ist im Bulletin de la soc. imp. des naturalistes de Moscou 1857, I. p. 250—272 ein „Naturhistorischer Bericht aus der Umgegend von Sarepta v. J. 1855 und einige Bemerkungen über das Tödtten der Insekten“ erschienen. Der Verf. giebt darin Nachricht über die Erscheinungszeit von Insekten aller Ordnungen und macht mannigfache Mittheilungen über ihr Vorkommen und ihre Lebensweise bei Sarepta; auch die vorzüglichsten Raupenfeinde aus

der Ordnung der Hymenopteren werden besonders berücksichtigt. Der Aufsatz ist sehr inhaltreich und für die geographische Verbreitung der Insekten von besonderem Interesse, vorausgesetzt, dass man sich auf die richtige Determination der angeführten Arten verlassen darf.

Notizen über die Lebensweise verschiedener Insekten, die zum Theil nicht ohne Interesse sind, lieferte von Motschulsky (Études entomol. VI. p. 74 ff.).

Die erwähnten Arten sind: *Ludius germanus*, *Lampyris splendida*, *Serropalpus barbatus*, *Gibbium scotias*, *Acherontia atropos*, *Harpyia vinula*, *Micana sparsana*, *Heliothis scutosa*, *Acarus lactucae*.

Boie theilte (Entomol. Zeitung p. 192—200) Beobachtungen und Bemerkungen über die Lebensweise und Entwicklungsgeschichte verschiedener Insekten mit, die an ihrem Ort einzeln vermerkt worden sind.

Heeger setzte seine Beiträge zur Naturgeschichte der Insekten (Sitzungsberichte der mathem. naturwiss. Classe der Akad. d. Wissensch. zu Wien XXIV, p. 315—334, mit 6 Taf.) mit einem 16. Theile fort, welcher sich diesmal auf die Ordnung der Coleopteren beschränkt; wie gewöhnlich sind darin die ersten Stände und die Verwandlungsgeschichte von 6 Arten erörtert.

Als Handbuch für das Anfänger-Studium der Entomologie ist zu nennen: *Elements of Entomology, an outline of the natural history and classification of British Insects*, by W. Dallas. London, J. van Voorst 1857. (8°. 424 pag.).

Der Verf. beabsichtigt mit diesem Werk eine Lücke auszufüllen, die darin bestehe, dass bisher kein Werk über Entomologie existire, in welchem eine Uebersicht der Gruppen der einheimischen Insekten in populärer Weise gegeben sei; mag dem sein, wie ihm will, so ist die vorliegende Arbeit von Dallas jedenfalls eine sehr brauchbare, sei es um Anfänger in das wissenschaftliche Studium der Entomologie einzuführen, sei es um dem Laien die nöthigsten Kenntnisse auf diesem Felde zu verschaffen. Der Verf. beginnt mit einer gedrängten Darstellung des gesammten Körperbaues der Insekten und ihrer Metamorphose (p. 1—50), lässt dann eine Eintheilung in Ordnungen, welche er in die Abtheilungen der Metabola, Hemimetabola und Ametabola bringt, folgen (p. 51—59). Unter der ersten Abtheilung begreift der Verf. sechs Ordnungen, nämlich ausser den Coleopteren, Hymenopteren, Lepidopteren und Dipteren die als gleichwerthig

hingestellten Strepsipteren und Aphanipteren; die Strepsipteren werden als zunächst mit den Coleopteren verwandt neben diesen abgehandelt, obwohl sie bei gründlicher Abwägung ihrer Charaktere unter allen Insekten gerade mit diesen am wenigsten Verwandtschaft darbieten. Unter die Hemimetabola rechnet der Verf. noch die gesammten Neuropteren im Sinne der älteren Autoren, sowohl die mit vollkommener als mit unvollkommener Metamorphose. — Bei den einzelnen Ordnungen geht der Verf. auf die Charaktere und die Naturgeschichte der einheimischen Familien ein und erwähnt unter denselben jedesmal die bekannteren Gattungen und Arten.

In paläontographischer Beziehung sind zwei Libellen-Reste aus dem lithographischen Schiefer von Solenhofen zu erwähnen, welche von Giebel (Zeitschrift f. d. gesammte Naturwiss. IX. p. 373 ff.) bekannt gemacht wurden. Der eine besteht in einem vollständig erhaltenen Vorderflügel einer Aeschna, welche *Aeschna multicellulosa* genannt, der zweite in den noch am Körper haftenden vier Flügeln eines Insektes, das als *Calopteryx lithographica* bezeichnet wird; letzterer Abdruck ist nach der auf Taf. 5 gegebenen Abbildung nur undeutlich und könnte wohl zu verschiedenen Deutungen Anlass geben.

Von Wichtigkeit für die Entomologische Bibliographie ist die von Hagen (Entomol. Zeitung XVIII. p. 5—12 und p. 200 ff.) gelieferte Zusammenstellung der Entomologischen Arbeiten Thunberg's, welche in den meisten Bibliotheken fehlend, nur wenig Berücksichtigung von den ausserschwedischen Autoren erfahren haben. Mit der Aufzählung der zahlreichen Werke Thunberg's, welche H. selbst zu durchmustern Gelegenheit hatte, wird eine genaue Angabe des Inhalts bis auf die beschriebenen Arten herab verbunden.

Thomson (Archives entomol. I. p. 91—104) schrieb eine „Histoire d'Aristote et de ses oeuvres“, in welcher er die Insekten-Namen des Aristoteles aufzählt und bespricht.

Ueber die Entomologischen Arbeiten v. J. 1853—54 hat Boheman der Akademie der Wissenschaften zu Stockholm einen Bericht abgestattet: Berättelse om framstegen i Insekternas, Myriapodernas och Arachnidernas Naturalhistoria för 1853 och 1854 till Kongl. Vetenskaps Akademien afgifven af C. H. Boheman (Stockholm 1857, 8°. 295 pag.).

Coleoptera.

Léon Dufour hat in den *Annales des sciences naturelles*, 4. sér. VIII. p. 11—17 und p. 365—376, pl. I. und VIII. „Fragments d'anatomie entomologique“ veröffentlicht, in denen er anatomische Untersuchungen über einzelne Organsysteme verschiedener Coleopteren mittheilt. Von *Brachyderes lusitanicus* ist das Nervensystem, welches nach der Auffassung des Verf. mehrfache Eigenthümlichkeiten darbietet, erörtert (p. 11 ff.), von einigen Elateriden der weibliche Genitalapparat (p. 365 ff.), von *Melandrya serrata* der Digestionsapparat und ebenfalls die weiblichen Genitalien (p. 373), von *Cebrio Carrenoi* der Digestionsapparat und die männlichen Geschlechtstheile (p. 374 f.).

Das Nervensystem des *Brachyderes lusitanicus* zeigt, wie dies bereits von anderen Curculionen bekannt geworden ist, die Eigenthümlichkeit, dass die Thorax- und Abdominal-Ganglien stark concentrirt sind, ein Umstand, der dem Verf. nicht bekannt zu sein scheint und der ihn zu unrichtigen Deutungen verleitet hat. Das erste auf das Gehirn folgende Ganglion bezeichnet er als erstes Thoraxganglion (es liegt nach ihm im Prothorax eingeschlossen), obwohl es augenscheinlich als Ganglion infraoesophageum anzusprechen ist, was schon daraus hervorgeht, dass es nicht die Nerven an das erste Beinpaar abgiebt. Das zweite Thoraxganglion (nach Dufour), in Wirklichkeit aber das erste, ist in den Mesothorax gerückt, schickt jedoch zwei Schenkelnerven zum ersten Beinpaar; das dritte und vierte, mit einander verschmolzen und die Nerven zu den beiden hinteren Beinpaaren abgebend, sind als zweites und drittes Thoraxganglion anzusehen und der ausser den Beinnerven daraus entspringende Nerv, dessen Natur dem Verf. unklar ist, gehört offenbar den Flügeldecken an. Sowohl diese beiden verschmolzenen Ganglien, als zwei sich ihnen eng anschliessende liegen nach Duf. im Metathorax; die letzteren beiden sind, wie aus der Zeichnung hervorgeht, die nach vorn gerückten und verschmolzenen Abdominalganglien, welche also nicht, wie der Verf. es glauben möchte, bei *Brachyderes* fehlen, sondern sich wie gewöhnlich bei den Curculionen den Thoraxganglien nähern.

Die Elateriden, deren weiblichen Genitalapparat der Verf. beschreibt und auf Taf. 8 abbildet, sind *Elater sanguineus*, *Ludius ferrugineus* und *Laeon murinus*. Während bei letzterem die Ovarien je zwei gesonderte Bündel von Eiröhren besitzen, haben die der ersteren sie zu einem einzigen Bündel (wie gewöhnlich) vereinigt. (Bei der Beschreibung der einzelnen Theile der Ovarien setzt der Verf. seine frühere Terminologie v. J. 1824 auseinander, was wenigstens in sofern zweckmässig ist, als sie sonst wenig verständlich wäre; die Vorzüge derselben vor

der von Stein und v. Siebold angewandten, die der Verf. als unzweckmässig bezeichnet, möchten wohl Niemanden als ihm selbst einleuchten!).— Von besonderem Interesse sind die sehr eigenthümlichen Formen der Anhangsdrüse der Bursa copulatrix (Receptaculum seminis?) bei den genannten drei Arten, welche untereinander sehr verschieden sind; bei *Elater sanguineus* besteht diese Drüse aus zahlreichen, einfach verästelten Schläuchen, welche alle dicht neben einander in das äusserste Ende der „Bursa copulatrix“ münden, bei *Ludius ferrugineus* ist sie dreilappig, jeder Lappen mit kleinen Blinddärmchen wie gefranzt, und durch einen gemeinsamen Ausführungsgang mit der „Bursa copulatrix“ verbunden. Die ganz absonderliche Form derselben bei *Lacon murinus*, schon aus den früheren Untersuchungen des Verf. bekannt, wird hier nochmals erörtert und abgebildet.

Bei *Melandrya serrata* sind Speicheldrüsen in Form eines dünnen, capillaren Gefässes jederseits vorhanden; der Oesophagus ist sehr kurz, der Chylusmagen cylindrisch, fast gerade; am Darm sind Intestinum, Coecum und Rectum unterschieden, letztere beide von gleicher Länge; von Gallengefässen sind sechs vorhanden. — Die Ovarien sind verhältnissmässig gross, aus sehr zahlreichen und viellappigen Eiröhren bestehend; am Ovidukt sitzt linker Hand eine ovale Bursa copulatrix, rechts eine gestielte „glande sébifique“ (?) an. — Die Tracheen sind durchweg röhrenförmig.

Bei *Cebrio Carrenoi* finden sich röhrenförmige Tracheen, drei Thorax- und sechs Abdominal - Ganglien; der Tractus intestinalis ist etwa doppelt so lang als das Insekt, der Oesophagus kurz und dünn, der Chylusmagen fast gerade, cylindrisch, der Darm capillarisch dünn und schlingenförmig zurückgebogen; nur vier Vasa Malpighi vorhanden. Die Mittheilungen über den männlichen Geschlechtsapparat sind nur fragmentarisch; zwei „vesiculae seminales“, eine grössere, keulenförmige, kürzere und dickere, eine zweite kleinere, nach hinten gebogene, sind vorhanden; der Ductus ejaculatorius ist ziemlich dick, cylindrisch und von mässiger Länge.

Der vierte Band von Th. Lacordaire's „Genera des Coléoptères“ (Paris, Roret 1857) behandelt in der bei Gelegenheit der früheren Theile näher bezeichneten Weise die auf die Lamellicornen folgenden Familien der Buprestiden, Throsciden, Eucnemiden, Elateriden, Cebriioniden, Cerophytiden, Rhipiceriden, Dascylliden, Malacodermen, Cleriden, Lymexylonen, Cupesiden, Ptinioren, Bostrichiden und Cissiden. — Wenn sich schon bei den früheren Theilen des Werkes der ungemeine Nutzen, welchen die systematische Kenntniss der Coleopteren durch diese ebenso mühsame als in ihrer Ausführung vortreffliche Arbeit des Verf. erhält, genugsam her-

ausstellte, so wird derselbe erst in seiner vollen Bedeutung an dem vorliegenden vierten Bande klar, in welchem der Verf. sich zum grossen Theile solchen Familien zuwenden musste, die entweder einer zusammenhängenden systematischen Bearbeitung noch ganz entbehrten oder durch vollständig unberufene Hände eine derartige erfahren hatten, welche, wie z. B. die Laporte und Gory'sche der Buprestiden, noch viel schlimmer als gar keine ist. Dergleichen dilettantische Versuche in eine wissenschaftliche Form zu bringen, ist entschieden der mühevollste, undankbarste und zeitraubendste Theil eines Werkes, wie das vorliegende; um so höher ist aber die Consequenz und Arbeitskraft seines Verf. anzuschlagen, durch welche ein so glückliches Ueberwinden dieser Klippen in so kurzer Zeit zu Stande gebracht werden konnte. Schon aus den Namen der oben angeführten Familien, unter denen einerseits mehrere bisher nicht als solche aufgestellte figuriren, andererseits einige, die längere Zeit üblich gewesen sind, fehlen, lässt sich zur Genüge erschen, wie weit sich der Verf. in das Studium des ihm für diesen Band vorliegenden Materials vertieft hat: ganz abgesehen davon, dass innerhalb dieser Familien das systematische Skelett von den Gattungen aufwärts fast ganz und gar seine Arbeit war, für die ihm nur hier und da in früheren Werken einzelne Bruchstücke vorlagen.

Um in Kurzem auf die Hauptzüge der Systematik des Verf. in Betreff des Umfangs und der weiteren Gliederung der einzelnen Familien einzugehen, so sei bemerkt, dass er für die Eintheilung der Buprestiden in sehr glücklicher Weise die von Erichson zuerst hervorgehobenen Modificationen in der Porenbildung der Fühler (bekanntlich als Geruchsorgane angesprochen) verwerthet hat; es stellen sich darnach drei Gruppen: Julodides, bei denen die Poren zerstreut und durch eine eigenthümliche Pubescenz bedeckt sind, Chalcophorides, bei denen dieselben ebenfalls zerstreut, aber an beiden Seiten der Fühlerglieder deutlich sichtbar und wahre Buprestiden, bei denen die Poren in einer Grube jedes Fühlergliedes concentrirt sind, heraus. Zu den Julodiden gehören hiernach nur die Gattungen Sternocera und Julodis, zu den Chalcophoriden die Gattungen Steraspis, Catoxantha, Chrysochroa, Cyria (Untergruppe der Chrysochroiden), — Euchroma, Chalcophora, Halecia, Pelecopselaphus, Chrysesthes (Untergruppe der eigentlichen Chalcophoriden), — Psiloptera, Latipalpis, Capnodis und Cyphosoma (Untergruppe der Psilopteriden), zu den eigentlichen Bu-

prestiden endlich alle übrigen Gattungen. — Die Familie der Throsciden hat der Verf. für die beiden Gattungen *Throscus* und *Lissomus* (womit *Drapetes* zusammenfällt) festgehalten. — Aus der Familie der Eucnemiden schliesst der Verf. nach Latreille's Vorgang die Gattung *Cerophytum*, auf die er eine eigne Familie *Cerophytides* (zwischen Cebrioniden und Rhipiceriden eingeschaltet), gründet, aus und theilt dieselbe sodann in drei Gruppen: *Melasides* (Gattungen *Melasis* und *Tharops*), *Eucnémides vrais* (die übrigen der Familie angehörigen Gattungen umschliessend) und *Pérothopides* (für die Gattung *Perothops* Esch., die bisher den Elateriden beigezählt wurde, errichtet). In Betreff der Nomenklatur der Gattung *Pterotarsus* Esch. sei erwähnt, dass auf sie der Name *Ptilodactyla* Illig. zu beziehen ist, indem die *Ptilodactyla elaterina* Illig. nach Ausweis des hiesigen Musei mit der *Melasis tuberculata* Dalm. zusammenfällt; mit der Gattung *Ptilodactyla* Latr. hat, wie schon Erichson erwähnt, die Illigersche Gattung gleiches Namens nichts gemein. (Vgl. Lacordaire, *Genera* IV. p. 279. Anmerkung.) — Durch lange fortgesetztes Studium der Elateren-Familie ist der Verf. zu dem Resultat gelangt, dass wesentliche Charaktere zur Begründung einer rationellen Eintheilung derselben nicht aufzufinden sind; er nimmt acht Gruppen an, welche von Candèze in seiner Monographie dieser Familie (siehe *Elaterides*!) festgehalten worden sind. — Die Cebrioniden trennt L. mit Recht als Familie von den Elateriden ab, indem er die Gattung *Physodactylus* nach Latreille's Vorgang dazu heranzieht. — Die Rhipiceriden sind in dem von Laporte und Guérin festgestellten Umfang geblieben. — Die Dasylliden zerfallen in 5 Gruppen: *Artematopiden* (Gattung *Artematopus*), eigentliche *Dasylliden*, *Ptilodactyliden*, *Eucinetiden* (Gatt. *Eucinetus*) und *Eubriaden* (Gatt. *Eubria*). — Unter dem Latreille'schen Familiennamen *Malacodermata* (mit Ausschluss einiger fremden Elemente) vereinigt der Verf. die in Deutschland seit längerer Zeit getrennten Familien der Lyciden, Lampyriden, Telephoriden, Driliden und Melyriden, indem er denselben nur den Rang von Gruppen einer und derselben Familie zuertheilt; ein wie grosses und unbrauchbares literarisches Material der Verf. u. a. auch hier zu bewältigen hatte, ergiebt die Notiz, dass er die 64 von von Motschulsky unter den Lampyriden aufgestellten Gattungen geprüft, aber davon nur zwei als begründet befunden hat. — Für die Eintheilung der Clerier in zwei Gruppen: eigentliche Clerier und *Enopliiden* nimmt der Verf. das von Klug zuerst hervorgehobene Merkmal der pentamerischen oder tetramerischen Tarsen an und zieht zur Begründung dieser Gruppen den von Spinola angegebenen Unterschied in Bezug auf die mit dem Pronotum verwachsenen (Clerier) oder die von demselben getrennten Pleuren (*Enopliiden*) heran. — Auf die kleine Familie der *Lymexylonen* folgt (ebenfalls nach Latreille's

Beispiel) die der Cupesiden, auch jetzt noch auf die einzige Gattung Cupes beschränkt. — Die Ptiniores theilen sich nach der Einfügung der Fühler auf der Stirn oder am Vorderrand der Augen in die Gruppen der Ptinides und Anobiides; getrennt werden von denselben als eigne Familie unter dem Namen Bostrichides die mit Apate verwandten Gattungen; den Schluss des Bandes bildet die Familie der Cissiden.

Von monographischen Arbeiten über ganze Familien der Coleopteren ist de Marseul's „Essai monographique sur la famille des Histérides“, welcher die letzten Jahrgänge der Annales de la société entomologique gefüllt hat, nunmehr im 5. Bande p. 109 und 397 ff. durch einen allgemeinen Theil und nachträgliche Berichtigungen und Zusätze abgeschlossen worden. Zugleich sind in diesem Jahre zwei andre ähnliche Arbeiten begonnen worden, von denen

M. E. Candèze's „Monographie des Elatérides“ (Tome I. Liège 1857, 8°. 400 pag. 7 tab. lith.) in durchaus wissenschaftlichem Sinne angelegt, sich den trefflichsten systematischen Werken, besonders denen von Lacordaire über die Phytophagen und Erotylenen würdig zur Seite stellt. Das Werk ist in den Mémoires de la soc. royale des sciences de Liège (Tome XII.) publicirt, unter obigem Titel jedoch auch selbstständig erschienen; dasselbe wird mindestens drei Bände füllen.

Die zweite Arbeit von J. Thomson, „Monographie des Cicindélides ou exposé méthodique et critique des tribus, genres et espèces de cette famille“ (Paris, gr. 4°. 1.—3. Livr. 1857) ist ein iconographisches Prachtwerk, welches in ähnlicher Weise wie die früheren Französischen von Laporte und Gory über die Buprestiden und Clytus, von Gory und Percheron über die Melitophilen u. a. hauptsächlich eine bildliche Darstellung der Arten zum Zweck hat, jene aber an Vollkommenheit der Abbildungen weit überragt.

Jacquelin du Val „Note sur les familles des Cucujides, Cryptophagides et suivantes“ (Ann. d. l. soc. entom. V. p. 100 ff.) machte Bemerkungen über die Abgränzung der von ihm als verwandte Familien angesehenen Passandriden, Cucujiden, Brontiden, Silvaniden, Mycetaciden, Mycetophagiden, Latridier und Cryptophagiden. Die Ansichten des Verf. über den Umfang dieser Familien weichen von denen Erichson's

in mehrfacher Beziehung wesentlich ab, sind aber keineswegs der Art, dass sie durch ihre Abweichungen Beifall gewinnen könnten, ganz abgesehen davon, dass nur auf die wenigen inländischen Formen Rücksicht genommen worden ist.

Die Passandriden des Verf. beschränken sich auf die Gattung *Prostomis*, die Cucujiden auf *Cucujus* und *Laemophloeus*; zu den Brontiden wird ausser den bisher dazu gerechneten Formen *Lyctus* gebracht: die Silvaniden umfassen ausser *Silvanus* und *Psammoeus* die Gattungen *Telmatophilus*, *Byturus*, *Diphyllus*, *Diplocoelus* und *Orestia* (*Byturus* gehört entschieden zu den Melyriden, *Orestia* ist eine Chrysomeline. Ref.); die Mycetaciden bestehen aus *Mycetaea*, *Symbiotes*, *Leiestes*, *Myrmecixenus* und *Lithophilus* (die drei ersten Gattungen sind Endomychiden, *Lithophilus* gehört zu den Coccinellinen. Ref.).

Die von der Regierung der Vereinigten Staaten veröffentlichten „Reports of Explorations and Surveys for a Railroad route from the Mississippi River to the Pacific Ocean“ enthalten in ihrem 9. Bande (Vol. 9. printed in June, 1857) einen von J. Le Conte verfassten „Entomological Report on route adjacent to 47th parallel.“, der eigentlich nur die von Dr. Cooper und Suckley auf der bezeichneten Expedition in das Oregon-Gebiet gesammelten Arten enthalten sollte. Der Verf. hat seine 72 pag. in gr. 4. umfassende und mit 2 Tafeln ausgestattete Arbeit, die gegenwärtig sich ausschliesslich auf die Ordnung der Coleopteren beschränkt, jedoch dahin erweitert, dass er ein Verzeichniss der von der ganzen Westküste Nord-Amerika's, von den Russischen Besitzungen bis nach Californien hin, bekannt gewordenen Käfer zusammengestellt hat und diesem dann die Beschreibung der neuen Arten, die ihm sowohl aus dem Oregon-Gebiet als auch aus verschiedenen Theilen Californiens zugekommen sind, folgen lässt. Zur Feststellung vieler Arten haben dem Verf. zahlreiche typische Exemplare der von Mannerheim und Eschscholtz aus dem Russischen Nord-Amerika und Californien beschriebenen Arten gedient und er hat diese einerseits zu synonymischen Berichtigungen, andererseits zu einer erneuten Beschreibung, wo diese nöthig war, benutzt. — In einer Einleitung zu dieser Arbeit geht der Verf. noch einmal, wie er es schon in den *Proceed. of the American associat.* 1851 gethan, auf die geographische Verbreitung der Arten

und Gattungen an der Westküste Nord - Amerika's ein und erläutert dieselbe in 4 tabellarischen Uebersichten, in welchen das Zahlenverhältniss der Amerikanischen Formen untereinander (in Russisch-Amerika, im Oregon-Gebiet und Californien) und zweitens im Vergleich zu den auf Amerika übergehenden Arten der östlichen Hemisphäre dargestellt wird.

Die Zahl der von der Westküste Nord - Amerika's bekannten Coleopteren beläuft sich nach dem von Le Conte gegebenen Verzeichniss gegenwärtig auf 1168 Arten, welche auf die einzelnen Familien folgendermassen vertheilt sind: Cicindelidae 8, Carabici 254, Amphizoidae 1, Dytisci 46, Gyrini 2, Hydrophilidae 21, Silphales 39, Scydmaenidae 7, Pselaphidae 8, Staphylinidae 109, Trichopterygidae 6, Scaphidii 1, Histerini 18, Phalacri 4, Nitidulariae 23, Trogositidae 6, Colydii 2, Cucujides 8, Cryptophagides 17, Lathridii 24, Mycetophagidae 2, Dermestini 10, Byrrhii 9, Parnidae 1, Heteroceridae 1, Lamellicornia 28, Buprestidae 17, Elaterides 78, Atopidae 1, Cyphonidae 2, Lampyrides 2, Telephoridae 11, Lycides 2, Melyrids 8, Clerii 15, Ptiniore 12, Tenebrionites 71, Melandryadae 7, Pyrochroidae 2, Mordellonae 5, Anthicini 13, Oedemeritae 5, Salpingidae 3, Curculionides 89, Cerambycini 68, Chrysomelinae 68, Coccinellina 27, Endomychidae 1. — Die zahlreichen neuen Staphylinen-Arten sind in dieses Verzeichniss nicht aufgenommen und auch in der nachfolgenden Beschreibung der neuen Arten vorläufig nicht charakterisirt worden, da der Verf. sie in einer zusammenhängenden Synopsis der Staphylinen Nordamerika's mit in Betracht zu ziehen gedenkt; ebenso sind die Curculioniden nur in dem Fall beschrieben, wo sich die Gattung nach Schönherr genau feststellen liess. Die übrigen von Le Conte als neu beschriebenen Arten sind an ihrem Orte aufgeführt worden.

A. Murray, Descriptions of new Coleoptera from the Western-Andes and the neighbourhood of Quito (Edinburgh new philosoph. journ. new ser. V. p. 220—234, pl. III). Die hier beschriebenen Arten aus der Gegend von Quito gehören den Lamellicornen an und sind zum Theil recht ausgezeichnete Formen.

Rojas machte Mittheilungen über die Lebensweise und das Vorkommen einiger Käfer aus Venezuela. (Observations sur quelques Coléoptères de la republique de Venezuela, in den Annales de la soc. entomol. V. p. 329—339.)

Steirastoma depressa Fabr. findet sich in grosser Anzahl an den Stämmen des Cacao-Baumes, dessen Rinde sie durchbohrt und unter dieselbe ihre Eier ablegt; durch den Frass der Larven beginnen die

Bäume zu vertrocknen und sterben endlich ab. Die entwickelten Käfer werden durch die reifen Früchte, deren öligen Saft sie lieben, angelockt; in anderen kälteren Gegenden, wo der Cacaobaum ganz fehlt, findet man sie auf frisch geschlagenem Holze. — An *Lixus vitatus* und *Euchroma columbica* hat der Verf. die Beobachtung gemacht, dass sich der puderartige Staub der Oberfläche an solchen Exemplaren, die ihn verloren haben, schnell wiederersetzt, wenn man dieselben einer erhöhten Temperatur aussetzt, natürlich nur, so lange die Insekten leben. — *Acrocinus longimanus* bewohnt nur kältere Gegenden und lebt auf *Ficus glabrata*, deren Saft er leckt und in deren Stamm die Larve frisst. *Psilidognathus Friendii* findet sich auf einer *Cedrelacea*-Art, von der sich auch die Larve nährt; der Käfer fliegt in der Dämmerung auf Bergen um die Wohnungen herum, im Mai und Juni. — *Scarabaeus Neptunus* findet sich auf einer alme, jedoch nur alle zwei Jahre, woraus R. schliesst, dass die Larve so lange zur Entwicklung bedürfe. *Golofa Porteri* lebt im Norden und Nord-Osten von Caracas auf einer Graminee, im Süden in Mais-Pflanzungen. *Trachyderes succinctus* lebt bei Caracas vom Harz der *Hermesia castaneifolia*, an der Küste von La Guayra vom Mais, in anderen Gegenden vom Harz der *Erythrina umbrosa* und *velutina*. *Calandra palmarum* findet sich in kälteren Gegenden auf einer Palme, *Carica papaya*, deren Saft sie leckt; in La Guayra (sehr heiss) lebt sie an den Stämmen von *Cocos nucifera*. *Allorrhina scabriuscula* nährt sich bald vom Harz der *Hermesia castaneifolia*, anderwärts (an der Küste von La Guayra) vom Mais. *Scarabaeus Hercules* (*Dynastes Agelaus*?) bewohnt am Orinoco eine Graminee (*Juajua* genannt), im Osten von Caracas auf den Stämmen des Cacao-Baumes. — Der Verf. führt diese Beispiele an, um zu zeigen, dass gewisse Arten sich nur von bestimmten Pflanzen ernähren, während andere je nach der Lokalität verschiedene zu ihrer Nahrung wählen.

Boheman's Bearbeitung der von Wahlberg in Süd-Afrika gesammelten Coleopteren (*Insecta Caffrariae*, annis 1838—1845 a J. A. Wahlberg collecta, amici auxilio suffultus descripsit Carolus H. Boheman. Pars II. cum tab. 1. Coleoptera. Scarabaeides. Holmiae 1857. 8. 395 pag.) ist nach sechsjähriger Unterbrechung mit dem zweiten Theile fortgesetzt worden, welcher die Beschreibung der Lamellicornen enthält. Der Verf. hat sich, wie früher, in der Beschreibung der Arten mit Fahraeus, dem dieser Band zugleich gewidmet ist, getheilt. Während die Familie der Lamellicornen durch die vorliegende Arbeit keinen besonderen Zuwachs an neuen typischen Formen erhält — es sind im Ganzen nur vier neue Gattungen darin aufgestellt, — so

ist die Anzahl der neuen Arten eine desto grössere, nämlich unter 396 überhaupt aufgezählten 284 bisher nicht beschriebene. Wie im ersten Bande sind die bekannten Arten mit einer Diagnose und Synonymen aufgeführt, zum Theil jedoch auch, wenn die früheren Beschreibungen sich nicht als genügend herausstellten, gleich wie die neuen ausführlich beschrieben; dasselbe ist auch in den Fällen geschehen, wo die Bestimmung einer Art nur mit Zweifel zu bewerkstelligen war. Die neu aufgestellten Gattungen sind auf einer beifolgenden Tafel nebst ihren charakteristischen Theilen dargestellt worden.

Die aufgeführten 396 Arten vertheilen sich auf die einzelnen Gruppen der Lamellicornen folgendermassen: Dynastiden 14 (5 neu), Cetonien 70 (24 neu), Ruteliden 23 (18 neu), Melolonthiden 84 (74 neu), Copriden 150 (120 neu), Aphodiiden 37 (28 neu), Orphniden 1 (neu), Hybosoriden 2 (1 neu), Geotrupiden 5 (neu), Trogiden 8 (7 neu), Lucaniden 3 (1 neu). Von den bereits bekannten Arten gehört die grosse Mehrzahl dem Cap an oder hat überhaupt eine weite Verbreitung in Afrika; doch fanden sich auch mehrfach Arten, die nur von Abyssinien, Mossambique und Angola bekannt waren, im Caffernlande wieder. Am auffallendsten ist der Artenreichtum bei den Melolonthiden, von denen sich $\frac{7}{8}$ als neu herausstellten, obwohl diese Gruppe kürzlich in zwei Monographien bearbeitet worden war; dass sich unter den Copriden ebenfalls $\frac{4}{5}$ der Arten als neu erwiesen, ist bei dem grossen Reichthum der tropischen Formen und dem Mangel einer Bearbeitung der Gruppe erklärlicher.

A. Murray, „List of Coleoptera received from Old-Calabar, on the West-Coast of Afrika“ (Annals and magazine of nat. hist. XIX. p. 153, 313 und 443 ff., pl. 12. 13. XX. p. 117 ff.) begann damit, eine Aufzählung der ihm von Old-Calabar in Guinea zugesandten Coleopteren zu geben, von denen er die bereits bekannten mit Diagnosen und Bemerkungen über ihr Vorkommen u. s. w. versieht, die neuen dagegen ausführlich beschreibt. Die bemerkenswertheren Arten sind ausserdem auf zwei beifolgenden Tafeln, andere durch Umrisse im Holzschnitte dargestellt. Die Aufzählung erfolgt in systematischer Reihenfolge und die vorliegenden Theile der Arbeit behandeln die Cicindelen und einen Theil der Carabicingen.

V. Wollaston machte (Annals and magaz. of natur. hist. XX. p. 503—506) Mittheilungen über einige auf den

Cap Verdischen Inseln gesammelten Coleopteren: „On certain Coleopterous Insects from the Cape de Verde Islands.“

Es sind im Ganzen 15 Arten, welche auf St. Vincent im December 1856 während eines eintägigen Aufenthalts von J. Gray und H. Clark gesammelt wurden, und zwar gehören von den drei darunter befindlichen neuen Arten 1 den Staphylinen, 1 den Elateren und 1 den Melasomen an; von den übrigen sind 7 Melasomen (*Opatrum fuscum* Herbst, 2 *Oxyura* spec., *Hegeter elongatus* Oliv., 3 mit *Cerandria*, *Opatrum* und *Pedinus* verwandte Formen), 1 Histeride (*Saprinus equestris* Er.), 1 der *Dermestes lupinus* Esch., 2 Carabici-
nen (*Cicindela littoralis* Fab. und *Amblystomus viridulus* Er.) und 1 Curculionide (*Brachytarsus*).

Ein Verzeichniss der im British Museum befindlichen Coleopteren Madeira's ist vom Vorstande dieses Instituts veröffentlicht worden: *Catalogue of the Coleopterous Insects of Madeira in the collection of the British Museum, by T. Vernon Wollaston.* London, printed by order of the Trustees. 1857. (8. 234 pag. c. tab. l.) Dieses Verzeichniss enthält eine in mehrfacher Beziehung berichtigte Aufzählung sämtlicher von Wollaston in seinen „*Insecta Maderensia*“ beschriebenen Coleopteren nebst Hinzufügung von 100 fernerer Arten, welche seit der Veröffentlichung jenes Werkes von verschiedenen Sammlern entdeckt worden sind und hier sorgsam beschrieben werden. Mit Hinzufügung dieser 100 Arten, von denen 63 sich als neu herausgestellt haben, und andererseits nach Abzug einiger Arten, die gegenwärtig vom Verf. als Abänderungen anderer angesehen werden, stellt sich die Zahl der überhaupt bekannt gewordenen Maderenser Coleopteren auf 580. Der Verf. hat sich damit beschäftigt, zu ergründen, welche von diesen Arten auf Madeira eigentliche Autochthonen, und welche dahin eingeführt sind; das Resultat dieser Untersuchungen ist dahin ausgefallen, dass von den 580 Arten 45 entschieden in neuerer Zeit importirt, mindestens 75 durch verschiedene zufällige Ursachen seit der Colonisation der Insel auf dieselbe übertragen und die übrigen 460 eigentliche Eingeborne derselben sind; von diesen können abermals 194 Arten möglicher Weise auf natürlichem Wege von den benachbarten Ländern eingewandert sein, so dass als entschiedene Ureinwohner von Madeira 266 Arten übrig bleiben. — In der Aufzählung

der Arten schliesst sich das vorliegende Werk genau an das erste des Verf. an und ihm entsprechend werden auch die hinzugekommenen Arten, gleichviel ob bereits bekannt oder neu, ausführlich charakterisirt und in ihrer Synonymie erörtert. Die bereits im ersten Werke beschriebenen Arten werden nur namentlich mit Hinzufügung der vollständigen Citate aufgeführt und mit Bemerkungen über ihre Verbreitung und ihr Vorkommen begleitet. Unter den als neu charakterisirten Arten stellten sich einige als Repräsentanten eigener Gattungen heraus; dieselben sind auf einer von Westwood gezeichneten Tafel dargestellt.

Lucas (Bullet. de la soc. entomol. p. LV) gab vorläufige Notizen über einige neue, südlich von Algier in der Sahara von Marès gesammelte Käfer, deren Charaktere er kurz hervorhebt und denen er auch provisorische Namen beilegt; eine ausführliche Charakteristik derselben bereitet der Verf. für die Annales de la soc. entomol. vor.

Die erwähnten Arten heissen: *Oxythyrea deserticola*, *Cleonus Maresii*, *Pimelia liliputana* und *Cirsa* (neue Gattung bei Micipsa) *striaticollis*.

J. Nietner's „Entomological papers, being descriptions of new Ceylon Coleoptera“ sind mit einer 5. Nummer fortgesetzt worden, die mit den vier vorhergehenden jetzt ein zusammenhängendes Heft (Colombo, Ceylon 1857, reprinted from the Journal of the Ceylon branch of the Royal Asiatic society for 1856—57) bilden; der Inhalt der vier ersten Nummern ist in dieser neuen Ausgabe in so fern modificirt, als eine Anzahl von Arten, die vom Ref. als bereits anderweitig beschrieben nachgewiesen worden waren, jetzt weggelassen sind. Die Zahl der im Vorliegenden überhaupt charakterisirten Ceylonesischen Coleopteren beläuft sich auf 68, die letzte (5. Nummer) enthält deren 27, die sämmtlich der Familie der Carabicingen angehören. — Die Beschreibungen des Verf. sind ausser in dem oben bezeichneten Separathefte auch im Journal of the Asiatic society of Bengal Vol. XXV. Calcutta 1857 und in den Annals and magazine of natural history 1857 und 1858 abgedruckt worden.

Die von Wallace auf seinen Reisen im Asiatischen Archipel (Sunda-Inseln, Molukken u. s. w.) gesammelten Käfer

hat Thomson in den Archives entomologiques I. p. 425—458 nach Familien zu verzeichnen und zu beschreiben begonnen. („Wallace, Voyage dans l'Asie orientale. Fragments entomologiques renfermant la description de Coléoptères nouveaux ou rares.“) Von den Lamellicornen sind die Cetonien, von den Cerambycinen die Lamien, von den Curculionen die Anthribiden und die Eupholus-artigen Formen, ausserdem auch einige Buprestiden abgehandelt.

Reiche und de Saulcy haben die Beschreibung der von letzterem im Orient gesammelten Coleopteren mit den Familien der Malacodermen, Melyriden, Ptinioren, Heteromeren und Curculionen in den Annales de la soc. entomol. V. p. 169—276 und p. 649—695 fortgesetzt; ein Theil der als neu beschriebenen Arten ist auf pl. 5 abgebildet. („Espèces nouvelles ou peu connues de Coléoptères, recueillies par M. F. de Saulcy dans son voyage en Orient et décrites par L. Reiche et F. de Saulcy.“)

Von Jacquelin du Val und J. Migneaux's „Généra des Coléoptères d'Europe“ (Paris, Deyrolle, gr. 8.) ist im Jahre 1857 der zweite Band mit der Familie der Staphylinen begonnen worden, welche die 45. bis 54. Lieferung ausmacht und auf 12 Bogen Text und 28 colorirten Kupfertafeln abgehandelt ist. Wenn eine hübsche Ausstattung des Werkes in Betreff der dasselbe begleitenden Tafeln schon an den früheren Lieferungen gerühmt werden konnte, so gilt dasselbe in noch höherem Maasse von den jetzt vorliegenden, in denen die Abbildungen der Staphylinen-Gattungen als ganz besonders gelungen bezeichnet werden dürfen; eine sehr exakte Wiedergabe der Form und des eigenthümlichen Habitus verbindet sich hier fast durchweg mit dem saubersten Colorit. Die beifolgenden Detailzeichnungen beschränken sich hier ausschliesslich auf die Mundtheile und zwar besonders auf die Unterlippe und Maxillen. — Für die Charakteristik der Gattungen, den eigentlichen Zweck des Werkes, hat der Verf. eingehende Studien gemacht und weicht daher auch in manchen Spezialangaben von den früheren Autoren ab; das Bestreben, nur wirklich begründete Gattungen aufrecht zu erhalten, zeigt sich darin, dass er die neuerdings auf Kosten von Silusa, Lomechusa, Oxypoda,

Calodera, Phloeopora u. a. errichteten Aleocharinen - Gattungen, deren differentielle Charaktere nach seiner Ansicht nicht stichhaltig oder von untergeordneter Bedeutung sind, verwirft und jene Erichson'schen Gattungen in ihrem früheren Umfange beibehält. Nur in einzelnen Fällen hat sich der Verf. selbst zur Aufstellung neuer Gattungen in den Abtheilungen der Tachyporinen, Staphylinen u. s. w. veranlasst gefunden, welche, wie die wenigen als neu beschriebenen Arten, an ihrem Orte aufgeführt worden sind. Am Schlusse des die Familie behandelnden Textes folgt, wie früher, eine synoptische Tabelle der Gruppen und Gattungen, welche zur leichteren Bestimmung derselben dienen soll; das Verzeichniss der Arten liegt dem Ref. bis jetzt noch nicht vor.

Der selbe (Annales de la soc. entom. V. p. 94 ff.) machte synonymische Mittheilungen über eine Anzahl Coleopteren, welche von Costa in einer 1827 erschienenen Abhandlung „Degl' Insetti nuovi e rari della provincia di terra d'Otranto“ beschrieben worden sind; mehrere in dieser Abhandlung beschriebene Arten werden als identisch mit denen früherer Autoren nachgewiesen.

L. Redtenbacher hat von seiner „Fauna Austriaca, die Käfer nach der analytischen Methode bearbeitet,“ deren erste im Jahr 1849 erschienene Auflage vollständig vergriffen war, eine zweite, vielfach veränderte und vermehrte herauszugeben begonnen, welche im Augenblicke dem Ref. zwar schon abgeschlossen vorliegt, deren zweite Hälfte jedoch ihrem Erscheinen nach erst in das Jahr 1858 fällt. Das Werk hat sich einer so weiten Verbreitung und eines so allgemeinen Beifalls zu erfreuen gehabt, dass ein nochmaliges Hinweisen auf seine Vorzüge beim Erscheinen der zweiten Auflage überflüssig sein würde; es wird daher die Bemerkung genügen, dass der Verf. auf die Bearbeitung derselben Alles verwandt hat, um ihr eine gleich grosse Brauchbarkeit für die Gegenwart, wie sie die erste für ihre Zeit hatte, zu verleihen. In dieser Beziehung ist nicht nur die veränderte Reihenfolge der Familien nach einem natürlicheren, jetzt allgemein angenommenen Systeme, sondern auch die Einschaltung der ausserhalb Oesterreich vorkommenden Deutschen Arten bei den einzelnen Gattungen und die bei-

gefügte Charakteristik sämmtlicher Europäischen Gattungen, die der Deutschen Fauna abgehen, hervorzuheben. Alle Vermehrungen, welche die einheimische Coleopteren-Fauna seit dem Erscheinen der ersten Auflage erfahren hat, und die vielfachen Notizen, welche für die Feststellung der Arten und ihrer Synonymie in dieser Zwischenzeit bekannt gemacht worden sind, hat der Verf. mit Sorgfalt und in möglichster Vollständigkeit für die Verbesserung und Bereicherung seines Werkes verwerthet, ausserdem aber auch die verbessernde Hand vielfach da eingreifen lassen, wo seine früheren Angaben ihm Ungenauigkeiten oder Lücken zu enthalten schienen; letzteres zeigt sich ganz besonders in der oft wesentlich modificirten oder vervollständigten Charakteristik der Gattungen. Ein gleiches Fortschreiten mit den Ergebnissen der Wissenschaft wäre vielleicht auch für die Abgränzung der einzelnen Familien, die nach des Ref. Ansicht zum Theil (Cryptophagidae, Dermestini u. a.) recht heterogene Elemente enthalten, vortheilhaft gewesen, wenngleich die Systematik von den Gattungen aufwärts für Handbücher, wie das vorliegende, im Ganzen von geringerer Wichtigkeit ist. — Dass die Oesterreichische Fauna bei ihrem besonderen Reichthum an Arten und der eifrigen Nachforschung vieler Sammler, die dem Verf. ihr Material zu Gebote gestellt haben, durch manche neue Arten in dieser zweiten Auflage bereichert worden ist, braucht kaum erwähnt zu werden; in Gleichem hat der Verf. auch mehrfach Gelegenheit gefunden, neue Gattungen einzuführen, sei es, dass dieselben sich überhaupt erst bei genauerer Untersuchung wenig beachteter Arten ergaben, sei es, dass solche, die bisher nur dem Namen nach (aus Catalogen und Sammlungen) bekannt gewesen waren, durch ihn zuerst eine Charakteristik erfahren haben. — Die vier ersten im Jahre 1857 ausgegebenen Hefte des in gleich vortheilhafter Ausstattung, wie bei der ersten Auflage, erscheinenden Werkes enthalten die Bearbeitung der Familien von den Carabicingen bis zum Schlusse der Elateriden; die analytischen Tabellen zur Bestimmung der Familien und Gattungen hat der Verf. bis zum Schlusse des Werkes aufgespart.

Von der Fortsetzung der Erichson'schen Naturgeschichte

der Insekten Deutschlands, Coleoptera, sind im J. 1857 neue Lieferungen erschienen: I. Band, 2. Lief. (Schauum) enthält die Fortsetzung der Carabiden mit den Gruppen der Scaritiden, Brachiniden, Dryptiden, Qdacanthiden, Lebiiden, Loriciden, Panagaeiden, Chlaeniiden und Liciniden. — II. Bd., 3. u. 4. Lief. (Kraatz) die der Staphylinen mit den Gruppen der Tachyporini, Staphylinini, Paederini und Stenini (Anfang). — IV. Band, 1. Lief. (v. Kiesenwetter) beginnt mit der Familie der Buprestiden, welche darin zugleich abgeschlossen wird.

J. Sturm's „Deutschlands Fauna in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen“ ist in der Abtheilung der Insekten mit dem 23. Bändchen der Käfer (Nürnberg 1857) fortgesetzt worden. Es enthält Tafel 409—424, welche, wie früher, in äusserst sorgsamer und sauberer Manier ausgeführt, die Abbildung von 14 Arten der Gattung *Elmis*, 1 *Stenelmis*, 1 *Macronychus*, 14 *Heterocerus*, 1 *Osmoderma*, 1 *Gnorimus*, 2 *Trichius* und 1 *Valgus* enthalten. Die einzelnen Gattungen sind stets durch Darstellung ihrer charakteristischen Körpertheile, so wie auch der Larve und Puppe, wo dieselben bekannt sind, erläutert.

Ein neues Verzeichniss der bisher in Oberschlesien aufgefundenen Käferarten stellte Roger (Breslauer Zeitschrift für d. Entomologie X.) zusammen; dasselbe ist auch im Separat-Abdrucke (132 pag. 8., Breslau 1857) erschienen. Durch die eifrigen Nachforschungen des Verf. ist in diesem Verzeichnisse die Zahl der Ober-Schlesischen Käfer um mehr als 400 Arten gegen das im J. 1846 von Kelch herausgegebene vermehrt worden, und zwar betrifft dieser Zuwachs hauptsächlich die schwierigen Gattungen der Microcoleopteren. Der Verf. hat für eine sichere Bestimmung der Arten nach den besten Quellen Sorge getragen und bei jeder einzelnen Notizen über ihre Fundorte, Futterpflanzen, Seltenheit u. s. w. gegeben. Das Verzeichniss enthält auch die Beschreibung einer neuen Curculionen-Gattung und einer Art der Gattung *Hister*.

Ein entsprechendes Unternehmen für die Provinz Preussen ist ein von Lentz herausgegebenes „Neues Verzeichniss der Preussischen Käfer“ in den Neuen Preussischen Provin-

zial-Blättern XI. Heft 1, 2 u. 4, auf Kosten des Vereins für die Fauna der Provinz Preussen auch besonders abgedruckt (170 pag. 8., Königsberg 1857). Dasselbe weist die bedeutende Anzahl von 2674 Arten auf, die also seit d. J. 1847, in welchem das v. Siebold'sche Verzeichniss erschien, um 906 vermehrt worden ist. Auch in diesem Verzeichnisse sind die einzelnen Arten mit speziellen Angaben über Fundorte, so wie mit synonymischen Bemerkungen versehen worden.

Ueber die Käferfauna Ost- und Westpreussens hat auch O. Pfeil (Entomol. Zeitung p. 52—60) Mittheilungen gemacht; die Eigenthümlichkeit derselben besteht darin, dass sie neben den Formen des nördlichen Deutschlands auch solche enthält, welche theils dem höheren Norden (Schweden, nördl. Russland), theils Süddeutschland und selbst Ungarn eigen sind. Der Grund hiervon liegt zum Theil in der Bodenbeschaffenheit (grosse Waldstrecken, ausgedehnte Sümpfe und Viehtriften), anderentheils in den Temperaturverhältnissen (besonders sehr heisse Sommer). Der Verf. stellt die den Preussischen Provinzen eigenthümlichen, ferner die sonst nur dem höheren Norden oder dem Süden zukommenden, endlich auch die seltneren und bemerkenswertheren Arten zusammen.

Die Käfer des Steigerwaldes verzeichnete J. Kress (Dritter Jahresbericht des Naturhistor. Vereins zu Bamberg, p. 49—68); es werden im Ganzen 1182 Arten aufgezählt, die mit Bemerkungen über ihr Vorkommen versehen sind.

Clasen setzte seine Uebersicht der Käfer Meklenburgs mit einer dritten Abtheilung (Archiv d. Vereins d. Freunde der Naturgesch. in Meklenburg XI. 1857. p. 96—118) fort, welche, wie früher, in einer Aufzählung der Arten nebst Angaben über ihr Vorkommen, Nahrungspflanzen u. s. w. besteht. Es werden hier die Familien der Cerambycinen und Chrysomelinen abgehandelt, welche zusammen durch 213 Arten vertreten sind.

Märkel (Allgem. Deutsche Naturhist. Zeitung 1857. p. 164 ff.) machte Mittheilungen über die Lebensweise und das Vorkommen einer Anzahl interessanter Käfer der Säch-

sischen Schweiz, unter denen auch einige als neu hervorgehoben, andere in ihren früheren Ständen erörtert werden.

Dietrich „Einiges aus dem Gebiete der Schweizerischen Käferfauna“ (Entom. Zeit. p. 117—138) machte gründliche Untersuchungen über eine Reihe Schweizerischer Käfer, besonders aus den Gattungen Telephorus und Apion bekannt.

V. Gredler verzeichnete (Zeitschrift des Ferdinands, Naturgeschichtliche Abtheilung, Insbruck 1857) die Käfer von Passeier nach Familien, welche ohne Ordnung auf einander folgen; einen Theil dieses Verzeichnisses hat der Verf. schon im J. 1854 veröffentlicht, ein dritter noch herauszugebender soll dasselbe beschliessen. Die einzelnen Arten sind mit Bemerkungen über Lebensweise, Vorkommen u. s. w. versehen, einige als neu angesehene werden beschrieben.

Snellen van Vollenhoven, Naamlijst van Nederlandsche Schildvleugelige Insekten (Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland II. p. 1—70) lieferte eine systematische Zusammenstellung der in den Niederlanden vorkommenden Coleopteren; die Arten sind mit einigen Citaten aus den gangbarsten Werken, die seltneren mit Angabe des näheren Fundorts versehen. Die Gesamtzahl der bis jetzt bekannten Arten ist 1185; einige als neu angesehene werden im Anhang kurz beschrieben.

Ein Verzeichniß der Coleopteren Belgien's hat die Entomologische Gesellschaft dieses Landes in den von ihr herausgegebenen Annales de la société entomologique Belge I. p. 113—170 zu veröffentlichen begonnen. Bei der Zusammenstellung der daselbst aufgefundenen Arten sind u. a. besonders die von Putzeys hierfür gesammelten Notizen verworthen worden und vorläufig die Familien der Cicindelen, Caraben, Dytiscen und Gyrinen abgehandelt. Die erste dieser Familien ist durch 5, die zweite durch 326, die dritte durch 104, die vierte durch 10 Arten vertreten, welche mit Synonymen und Angaben über Fundorte versehen sind.

C. G. Thomson, Skandnaviens Coleoptera, synoptiskt bearbetade. Häftet I. Carabici. Lund, 1857. (8. 64 pag.) — Der Verf. hat hiermit eine Bearbeitung der Skandinavischen Coleopteren in der Art begonnen, dass er eine analytische

Charakteristik der Gruppen und Gattungen der einzelnen Familien in Lateinischer, eine ergänzende Beschreibung derselben in Schwedischer Sprache giebt und unter den Gattungen jedesmal die in Schweden vorkommenden Arten mit Hinzufügung eines oder einiger Citate aufführt; eine Beschreibung oder Diagnosticirung der Arten erfolgt nur in dem Falle, wo sie unbekannt oder von früheren Autoren unrichtig beurtheilt sind. Das erste vorliegende Heft, welches eine Bearbeitung der Carabicingen (mit Einschluss der Cicindelen) enthält, ist in Betreff einiger systematischer Abweichungen, mehrerer synonymischer Ergänzungen und der Beschreibung einiger neuer Arten der Beachtung zu empfehlen. (Siehe Carabicingi!)

Janson (Entomologist's Annual 1857. p. 69—84) zählte 54 in England neu aufgefundenen Käfer auf, unter denen eine Art der Gattung *Adelops*, die als neu beschrieben wird, hervorzuheben ist, — Derselbe „Observations on the Myrmecophilous Coleoptera or Ants-nest beetles of Britain (ebenda p. 85—95) berichtete über seine Ausbeute an Myrmecophilen und zählte die in England aufgefundenen Arten (36 an Zahl) mit Angabe der Ameisen-Art, bei der sie leben, auf.

Mulsant's *Histoire naturelle des Coléoptères de France* ist im Jahre 1857 mit einem neuen Hefte fortgesetzt worden, in welchem der Verf. die Familie der *Vesicantia* bearbeitet hat; die Arbeit umfasst 200 pag. in 8., mit 1 Tafel und ist ein Separatabdruck aus dem 4ten Bande der *Annales de la soc. Linnéenne de Lyon* (Année 1857), p. 209—409. Auch die Bearbeitung dieser Familie ist ganz nach dem Beispiele der bisher vom Verf. herausgegebenen ausgeführt und zeichnet sich, wie jene, durch eben so sorgfältige und ausführliche Beschreibung der Gruppen, Gattungen und Arten, als auch ganz besonders durch umfassende Verwerthung der früheren Literatur aus. Ueber den näheren Inhalt des vorliegenden Heftes vergl. *Vesicantia*!

Eine Aufzählung von 86 in den Basses-Alpes bei Larche gesammelten Käfern lieferten Fairmaire und Reiche (*Annales de la soc. entomol.* V. p. 597 ff.).

Fairmaire, *Miscellanea entomologica*, 2. partie (*Annales de la soc. entomol.* V. p. 725—745) fährt fort, neue

Arten aus Südfrankreich und zum Theil auch aus anderen Gegenden Süd-Europa's zu beschreiben; ebenso Peyron, „Description de quelques Coléoptères nouveaux et observations diverses“ (ebenda p. 715—723) und Levrat, „Description de Coléoptères nouveaux“ (Annales de la soc. Linéenne de Lyon IV. p. 417 ff.).

Einen Beitrag zur Käferfauna Griechenlands durch Zusammenstellung der dort bis jetzt aufgefundenen Arten mit synonymischen Bemerkungen und Beschreibung der als neu angesehenen lieferte Schaum (Berlin. Entom. Zeitschr. I. p. 116—158). Abgehandelt sind die Familien der Cicindelen (9 A.), Carabicingen (210 A.), Dytisciden (31 A.), und Gyrinen (3 A.).

K. Fuss hat (Programm des Gymnasiums zu Hermannstadt v. J. 1857. p. 1—36) eine Bearbeitung der Käfer Siebenbürgens begonnen, in welcher er für die Bestimmung der Gattungen sowohl wie der Arten die analytische Methode anwendet. Der erste Theil dieser Siebenbürgischen Käferfauna erstreckt sich auf den Anfang der Carabicingen und umfasst die Gattungen Cicindela, Odacantha, Drypta, Cymindis, Demetrius, Dromius, Lebia, Brachinus, Clivina, Dyschirius, Cychnus, Procrustes, Carabus, Calosoma, Leistus und Nebria. — Eine Fortsetzung dieser Arbeit (in einem entsprechenden Programm v. J. 1858. p. 1—65), welche dem Ref. gegenwärtig ebenfalls schon vorliegt, mag hier zugleich mit erwähnt werden: sie führt die Bearbeitung der Carabicingen zu Ende, indem sie die Gruppen der Elaphrini, Licinini, Anchomenini, Pterostichini, Harpalini und Trechini umfasst.

H. Müller machte ausführliche und interessante Mittheilungen über die Lebensweise der augenlosen Käfer in den Krainer Höhlen (Entomol. Zeitung p. 65—74), welche er auf einer Reise durch Kärnten, Krain und Istrien in ausgedehnter Weise zu beobachten Gelegenheit nahm. Die Gattungen, welche der Verf. einer Besprechung in Betreff ihres Vorkommens und ihrer Eigenthümlichkeiten während des Lebens unterwirft, sind Leptoderus, Adelops, Anophthalmus, Troglorhynchus, Glyptomerus und Anommatus.

Die beiden Leptoderus-Arten (L. Hohenwartii und angustatus) fand M. nicht an den Stalaktiten emporkriechend, sondern in grösser-

rer Anzahl (gegen 30 Exemplare an einem Tage) etwa eine Spanne hoch über dem Boden an der Wand von Tropfsteinkammern, welche jedesmal das Ende einer Höhle bildeten und ganz vom Lichte abgeschlossen waren; sie krochen aus einem Verstecke, der sich am Boden in unmittelbarer Nähe der Wand befand. nach einander hervor; der Boden war hier feucht und mit zahlreichen Stücken verfaulten Holzes bedeckt. Ein frisch entwickeltes Exemplar fand sich in der vorderen Abtheilung einer Höhle, in welche schon das Tageslicht eindrang, unter einem grossen Steine auf feuchter schwarzer Erde sitzend. Keins der Thiere zeigte irgend welche Empfindlichkeit gegen das Licht. — Von *Adelops* fand M. 4 Arten, darunter besonders *A. montanus*, *Khevenhülleri* und *pilosus*; letztere Art war sehr häufig an Fledermauskoth, der von den an der Höhlendecke haftenden Fledermäusen in grosser Menge herabgeworfen wurde; *A. khevenhülleri* fand sich in grosser Anzahl unter Steinen auf feuchter Erde, welche mit verfaulten Holzstückchen bedeckt war. — Die *Anophthalmus*-Arten leben in Grotten mit grossem Eingange, in welchen Rinder und Pferde Ruhe zu halten pflegen und deren Boden daher vom Miste dieser Thiere bedeckt ist; unter den dabei liegenden Steinen liessen sich in einigen Stunden über 100 Exemplare sammeln. Sie entfliehen beim Aufheben der Steine mit grosser Schnelligkeit, um sich einen neuen Schlupfwinkel zu suchen; Lichtempfindung scheinen sie jedoch ebenfalls nicht zu besitzen, wie sich dies schon in der Planlosigkeit ihres Laufens bemerkbar macht. — *Troglorhynchus* fand sich in einem Exemplare an der Unterseite eines Steines, welcher auf feuchter Erde lag, während die übrigen Theile derselben Höhle, deren Boden steinig war, keine Exemplare des Thieres lieferten; die Art ist übrigens von Kokeil auch in der Zwergkiefer-Region unter altem Holze gefunden worden.

Von Perris' „Histoire des Insectes du pin maritime“ ist in den Annales de la soc. entomol. V. p. 341—395. pl. 8 u. 9 eine neue Fortsetzung erschienen, in welcher die Familien der Melasomen, Melandryaden und Oedemeriten abgehandelt und die Kenntniss ihrer Entwicklungsgeschichte so wie das genauere Studium ihrer Larven vom Verf. in gewohnter Weise wesentlich gefördert worden sind. Von Melasomen leben in *Pinus maritima*: 1 *Platydema*, 1 *Uloma*, 1 *Phthora*, 2 *Hypophloeus*, 1 *Tenebrio*, 1 *Helops*, 1 *Prionychus*, von Melandryaden: 2 *Hallomenus*, von Oedemeriten: 1 *Xanthochroa*, 1 *Nacerdes*. Das Nähere siehe bei den einzelnen Familien.

v. Motschulsky setzte seine Notizen „sur les collections coléoptérologiques de Linné et de Fabricius“ in den

Etudes entomologiques VI. p. 44 ff. mit den Familien der Pausiden, Staphylinen, Pselaphiden und Scydmaeniden fort.

Synonymische Mittheilungen über einige Käfer machten Schaum und Kraatz (Berlin. Entomol. Zeitschrift I. p. 175 ff.).

Cicindeletae. J. Thomson, Monographie des Cicindélides ou exposé méthodique et critique des tribus, genres et espèces de cette famille. (Paris, 4. pl. color.). Von diesem Prachtwerk liegen dem Ref. am Schlusse des Jahres 1858 die ersten drei Lieferungen vor, welche sämmtlich mit der Jahreszahl 1857 versehen sind, von denen jedoch die beiden letzten erst im folgenden Jahre in den Buchhandel gekommen zu sein scheinen. Sie enthalten zusammen 10 Bogen Text und eben so viele colorirte Kupfertafeln, ersteren mit besonderer Eleganz gedruckt, letztere von ebenso meisterhafter Zeichnung als Colorit; diese Tafeln übertreffen in gleicher Weise wie die der Archives entomologiques des Verf. an Sauberkeit der Ausführung so wie an Treue der Auffassung alle bisher publicirten iconographischen Werke über Coleopteren, die dem Ref. bekannt sind. In Rücksicht auf die Vollendung dieser Abbildungen und darauf, dass fast sämmtliche in den Text aufgenommene Arten auf den Tafeln repräsentirt sind, lässt sich die Kürze der Art-Charakteristiken, wie sie der Verf. in dieser Monographie eingeführt hat, wohl rechtfertigen, wenn auch ein näheres Eingehen auf die charakteristischen Merkmale keineswegs der Arbeit geschadet hätte; unumgänglich nothwendig wäre jedoch ein solches zur Erkennung derjenigen Arten gewesen, welche nicht abgebildet worden sind. Ausführlicher hat sich der Verf. auf die Gattungen eingelassen, deren Charaktere theils nach früheren Autoren, theils nach eigenen Untersuchungen auseinandergesetzt und durch Detail-Zeichnungen auf den Tafeln erläutert werden. Auch die Familien-Charaktere haben zu Anfang des Werkes eine kurze Darstellung erfahren, die jedoch wohl Manches zu wünschen übrig lässt; Angaben von „sechs Tastern“ und „viergliedrigen Lippentastern“ sind nur so bedingt richtig, dass sie eher als unrichtig bezeichnet werden könnten, denn weder ist die äussere tasterförmige Lade der Maxillen als Taster, noch sind die freigewordenen Fulcrä der Lippentaster als erste Glieder der letzteren anzusprechen, indem sich beide Bildungen bei einem Vergleiche mit der den beissenden Insekten im Allgemeinen zukommenden Konstruktion der Mundtheile nur als vereinzelte Modifikationen des constanten Typus herausstellen. Auch irrt der Verf. darin, wenn er angiebt, Erichson habe in den „Käfern der Mark Brandenburg“ die Lippentaster der Cicindelen als viergliedrig angenommen, indem er gerade diese von Latreille gebrauchte Terminologie als eine zu modificirende bezeichnet. — Der spezielle Theil beginnt mit der Gruppe der Manticoriden, die aus

fünf Gattungen: *Manticora*, *Agrius*, *Platycheila*, *Amblycheila* und *Omus* besteht. Unter *Manticora* zieht der Verf. *Mant. granulata* Klug als Weibchen zu *M. tuberculata*, und *herculeana* Kl. als grosse Varietät zu *M. scabra* Kl., eine Ansicht, mit der sich Ref. nach Untersuchung der Original-Exemplare nur einverstanden erklären kann. Eine neue Art ist *M. Sichelii* vom Caffernlande. — Die Art, welche der Verf. als *Platycheila pallida* Fab. beschreibt und abbildet, ist offenbar eine neue Art, die von der Fabricius'schen (in der hiesigen Königl. Sammlung in einem männlichen Exemplare vorhanden) durch die ausserordentlich langgedornten Hinterecken des Thorax und breiteren Körperbau sehr wesentlich abweicht. Fabricius' Angabe „*thoracis angulis posticis porrectis, subspinosus*“ würde auf das Exemplar des hiesigen Museums, bei dem die Hinterecken kurz gedorn sind, aber nicht auf die Thomson'sche Art passen. — Die zweite Gruppe der Megacephaliden umfasst die Gattungen *Megacephala* mit 4, *Tetracha* mit 39, *Metriocheila* n. g. (auf *Tetr. nigricollis* Reiche, *succincta* Erichs. begründet) mit 1, *Aniara* mit 1, *Raminagrobis* n. g. (auf *Oxych. oxyomus* Chaud. begründet) mit 2, *Pseudoxycheila* mit 1 und *Oxycheila* mit 8 Arten. Letztere drei Gattungen werden von den vorhergehenden als eigene Unterabtheilung „*Oxycheilites*“ abgegränzt. Dass die Arten der schwierigen Gattung *Tetracha* besonders in synonymischer Hinsicht vom Verf. vollständig aufgeklärt sind, scheint dem Ref. zweifelhaft; die *Tetr. occidentalis* Klug führt derselbe z. B. einmal als Synonym von *Tetr. carolina*, ein zweites Mal unter *Tetr. acutipennis* Dej. an, während sie von beiden ganz verschieden ist; dagegen beschreibt er diese Art von Neum als *Tetr. virgula* Thoms., die daher den Klug'schen Namen wieder erhalten muss. Ausser dieser sind 6 neue Arten der Gattung beschrieben, die zum Theil sehr ausgezeichnet und charakteristisch gefärbt sind.

In den Archives entomol. I. p. 129 ff. beschrieb derselbe ausserdem folgende neue Arten: *Cicindela Myrrha* von Borneo, *afrita* von Pt. Natal, *Egaënsis* und *Odontocheila Trilbyana* vom Amazonenstrom, *Collyris albitarsis*, *Sarawackensis* und *cribripennis* von Borneo.

v. Motschulsky (Etnudes entomolog. VI. p. 108 ff.): *Habroscelis obliquata* und *Cicindela calochroides* aus Nicaragua, *Japana* aus Japan, *Myriochila Dohrnii* aus Ostindien, *Tricondyla granulifera* von Ceylon, *Collyris gibbicollis* aus Assam. Die Arten sind auf einer beifolgenden Tafel im Umrisse dargestellt.

Murray (Annals and magaz. of nat. hist. XIX. p. 154 ff.) aus Old-Calabar: *Cicindela Lowei* u. A. und unter dem Namen *Cic. confusa* und *obliteranda* zwei Varietäten der *Cic. vicina* Dej.

Montrouzier (Annales d. scienc. phys. de la soc. d'agricult. de Lyon VII. 1. p. 6 f.): *Cicindela Cristorallensis* und *hemicycla* von der Insel Woodlark.

Le Conte (Entomol. Report p. 27) gab nochmalige vergleichende Diagnosen der drei Arten der Gattung *Omus* und zugleich Abbildungen derselben auf Taf. I. Fig. 1—3.

Von Laboulbène ist (Archives entomol. I. p. 105 ff.) eine Mittheilung über den Aufenthalt und die Lebensweise der Larve von *Cicindela hybrida* gemacht worden. Die Gänge, welche die Larve im Sande gegraben hatte, waren senkrecht, bis $1\frac{1}{2}$ Fuss tief; bei den Larven fanden sich Ueberbleibsel von Käfern, die ihnen zur Nahrung gedient hatten, besonders Flügeldecken von Coccinellen.

Carabici. v. Chaudoir hat sein Mémoire sur la famille des Carabiques im Bulletin de la soc. imp. des naturalistes de Moscou 1857. III. p. 1—64 mit einem 6. Theile fortgesetzt, in welchem er zunächst die im vorigen Jahre begonnene Bearbeitung der Chlaenier-Gruppe zu Ende führt. Die hier abgehandelten Gattungen sind: 1) *Harpostomus* n. g., auf *Chlaen. opulentus* Gory begründet. 2) *Anomoglossus* n. g., auf die beiden Nord-Amerikanischen Arten *Chlaen. emarginatus* Say und *pusillus* Say beschränkt. 3) *Ceroglossus* n. g. auf *Chlaen. laevigatus* Dej. errichtet, ausserdem noch drei neue Arten enthaltend: *C. politus* (Chl. lugubris Dej.?) aus Kordofan, *opacus* aus Nord-Indien, *obscurus* aus Ober-Egypten. 4) *Hololeius* Laf. 2 A. (*H. punctulatus* aus China n. A.). 5) *Rhopalopalpus* Laf. 1 A. — Der Gruppe der Chlaenier folgt in gleicher Weise eine Bearbeitung der „Oodiens“, deren Charaktere vom Verf. ausführlich besprochen werden, und von welchen er den *Oodes bipustulatus* Dej. ausschliesst. (Auf diese Art, welche die männliche Tarsenbildung der Féroniens zeigt und auch in der Anlage der äusseren Flügeldecken-Streifen abweicht, wird im Anhang eine neue Gattung *Metaxys* gegründet, welche ausführlich charakterisirt und mit einer zweiten neuen Art, *M. bisignatus* vom Senegal bereichert wird.) Unter den „Oodiens“ nimmt v. Chaudoir zehn Gattungen an, deren Charaktere in einer Tabelle analysirt werden: 1) *Anatrichis* LeC. 1 Art. 2) *Systolocranus* n. g. auf *Oodes giganteus* Chaud., *Goryi* Buq., *grandis* Dej. und *sulcatus* Laf. begründet. 3) *Oodes* Bon. 21 Arten, davon neu: *O. submetallicus* vom Senegal, *chalcus* aus Ostindien, *vilis* aus China, *madagascariensis* aus Madagascar, *moerens* ebendaher, *sulcatulus* von den Neelgherries. 4) *Stenous* n. g. auf *Oodes cupreus* Chaud. und *tibialis* Chevr. begründet, mit 10 Arten; davon sind neu: *St. Lecontei* aus Louisiana, *flavipes* vom Amazonenstrom, *velox* (*fuscipes* Dej.?). 5) *Stenocrepis* n. g., für *Oodes egregius* Chaud., *robustus* Brullé, *Leprieuri* Buq. errichtet, mit 6 Arten, wovon *S. Sahlbergii* von Rio Janeiro und *pauper* aus Columbien neu sind. 6) *Chaetocrepis* n. g., von der vorigen Gattung durch die mit den Paraglossen bis zur Spitze verwachsene Zunge und die Form der erweiterten Tarsenglieder des Männchens unterschieden; die drei ersten Glieder der Vor-

dertarsen sind schwächer erweitert, das erste sehr langgestreckt dreieckig, unten kaum an der äussersten Spitze schwammig, das zweite und dritte länger viereckig, das vierte breiter, unten schwammig, mit langen Borsten besetzt, an der Spitze gespalten. Eine Art: *Ch. Besckii* von Neu-Freiburg in Brasilien. 7) *Crossocrepis* n. g. auf *Oodes* 14-striatus Chaud. (*picipes* LeC., *stenocephalus* Laf.) begründet. 8) *Dercylus* Lap. 1 A. 9) *Hoplolenus* Laf. 1 A. 10) *Coptocarpus* n. g., für *Oodes australis* Dej. errichtet. — Zum Schlusse liefert der Verf. noch einen Nachtrag zu seiner Bearbeitung der Scaritiden, in welchem er *Oxylobus asperulus* n. A. aus Ceylon, *Coptolobus* n. g. (mit *Haplotrachelus* verwandt, von dem er durch die Form der Lappen des Kinnes, der Mandibeln u. s. w. abweicht) mit einer Art: *C. glabriculus* von Ceylon und *Macromorphus* n. g., auf *Scarites elongatus* Klug, Laf. errichtet, charakterisirt.

Derselbe hat in der Entomol. Zeitung XVIII. p. 75—82 „Einige Bemerkungen“ zu der von Schaum gelieferten Bearbeitung der Deutschen Laufkäfer (Insekten Deutschlands I, 1.) veröffentlicht, in welchen er abweichende Ansichten über die richtige Auffassung einer Reihe von Arten und Gattungen kundgibt. Einzelne Arten werden aus den Gattungen *Cicindela*, *Notiophilus*, *Blethisa*, *Leistus*, *Nebria*, *Carabus* und *Procrustes* besprochen, von letzterer Gattung *Procrustes anatolicus* von Brussa und *obtritus* aus Griechenland als neue Arten beschrieben. Von Gattungen will v. Chaudoir die auf *Blethisa arctica* begründete *Diachila* Motsch. als zwischen *Elaphrus* und *Blethisa* die Mitte haltend aufrecht erhalten wissen, ebenso die Gattung *Trachypachus* Motsch., von welcher er eine genaue Charakteristik liefert; letztere weicht von *Blethisa* sehr wesentlich durch die Zunge mit den Paraglossen, die Oberlippe, die Fühler, die Tarsen und den Kopf ab und schliesst sich vielmehr an *Pelophila*, *Metrius* und *Brachycaelus* an. Die Gattung *Brachycaelus* würde am passendsten zwischen *Nebria* und *Metrius* zu stellen sein; *Pelophila* und *Nebria* sind nach v. Chaudoir als selbstständige Gattungen festzuhalten. Von *Carabus* ist die auf *C. glyptopterus* Fisch. begründete Gattung *Eupachys* Chaud. zu trennen, indem ihre Charaktere, welche der Verf. auseinandersetzt, mehr different sind als die zwischen *Carabus* und *Calosoma* bestehenden.

Auf diese Bemerkungen v. Chaudoir's hat Schaum (ebenda p. 348—355) Erwiderungen gemacht, die a. a. O. nachgelesen werden mögen.

Murray (Annals of nat. hist. XIX und XX) beschrieb folgende neue Gattungen und Arten von Old-Calabar: 1) *Rhaphidognatha* n. g. aus der Gruppe der *Pericallidae*; Körper flachgedrückt, Thorax hinten stumpf abgeschnitten; Mandibeln und Oberlippe vorgestreckt, Maxillen an der Spitze spindelförmig, Fühler kurz, fadenförmig, leicht

zusammengedrückt, ihr zweites Glied kaum kürzer als das dritte; Kinn ohne Zahn, Paraglossen mit der Ligula verbunden; Augen hervorragend; Tarsen mit einfachem vierten Gliede, die Klauen nicht gekämmt; Flügeldecken an der Basis rechtwinklig, kaum breiter als der Thorax, seitlich gleich breit. Art: *Rh. trimaculata* (pl. 12. fig. 2). 2) *Stereostoma* n. g., mit der folgenden Gattung zur Gruppe der Morionidae gehörend; Oberlippe kurz, quer, Mandibeln kräftig, spitz, ohne Zahn am Innenrande, Endglied der Kiefertaster cylindrisch-eiförmig, der Lippentaster dick, beilförmig, Kinn kurz, quer, tief ausgeschnitten, mit einfachem Mittelzahn, Ligula kurz, schmal, abgestutzt, keine Paraglossen. Fühler kurz, perlschnurartig, die Glieder an der Spitze befilzt, zusammengedrückt; Vorderschienen erweitert, unten ausgehöhlt, Tarsen kurz mit queren Gliedern; Abdomen mit fünf sichtbaren Ringen, die beiden ersten verschmolzen. Zwei Arten: *St. Whitei* (pl. 13. fig. 6) und *solidum*. — 3) *Buderes* n. g. von breiterer Körperform als die vorige Gattung, mit quadratischem Halsschild, das den Flügeldecken an Breite gleich kommt; durch das längliche, schmale Endglied der Lippentaster, den zweispitzigen Mittelzahn des Kinnes u. s. w. verschieden. Art: *B. Oberti*. — Neue Arten sind ausserdem: *Tefflus planifrons*, *Dendrocellus (Drypta) pectoralis*, *Galerita femoralis*, *gracilis*, *Pheropsophus minor*, *Lebia bisbinotata*, *clavicornis* (pl. 12. fig. 1) *Nycteis Championi*, *Belonognatha rugiceps*, *obesa*, *quadrinotata* (pl. 12. fig. 3), *Catascopus compressus*, *Nycteis intermedia*, *Goniotropis Wylicii*, *Scarites Hercules* (pl. 12. fig. 4), *Ajax* (fig. 5), *Patroclus*, *rotundicollis*, *clivinoides*, *Craspedophorus conicus*, *strangulatus*, *arcuatocollis*, *Lafertei*, *Symeii*, *vicinus*. — Die Gattungen *Nycteis* und *Belonognatha* betrachtet Verf. als Gruppen einer und derselben Gattung, die er *Nycteis* nennt und die er von *Coptodera* durch den Mangel des Mittelzahnes am Kinne unterscheidet. (a. a. O. XIX. p. 443.) Auch über einige andere Gattungen und die sie charakterisirenden Merkmale werden Bemerkungen beigebracht.

Thomson beschrieb (Archives entomol. I): *Agra cytherea* vom Amazonenstrome und *Helluomorpha (?) Batesii* aus Neu-Holland (p. 134), *Carabus Tientei* und *Hienfoungi* aus Nord-China (p. 165), *Herinnis* n. g. mit einer neuen Art *Her. Chabracillacii* von Rio-Janeiro (p. 166); diese Gattung wird den *Helluoniten* beigezählt, von denen sie sich übrigens durch die Form der Taster unterscheidet, indem das Endglied derselben weder beilförmig, noch angeschwollen, noch dreieckig, sondern allmählig zugespitzt und länger als das vorhergehende ist. — *Pericalus presidens* von Celebes, *cupripennis* von Singaporc, *Catascopus Celebensis* von Celebes, *Cycloloba acuticollis* von Pt. Natal (p. 281 ff.) — *Piezia pilosorittata* von Port Natal (p. 395). — *Agra Megacera* und *formicaria* vom Amazonenstrome, *Aulacinia* n. g., eine der ausgezeichnetsten und merkwürdigsten bis jetzt bekannt ge-

wordenen Carabicingen-Formen, in Gestalt und Skulptur gewissen Colydiern gleichend, durch die fingerförmig gezähnten Vorderschienen, die perlschnurartigen Fühler und den flachgedrückten Körper zu den Scaritinen gehörend und hier mit *Cryptomma* zunächst verwandt. Der Kopf erscheint dadurch sehr eigenthümlich, dass die Wangentheile hinter den Augen stark angeschwollen und nach hinten verbreitert sind, so dass ihre Breite hier die des Halsschildes übertrifft; Thorax mit vier Längsreihen von Tuberkeln, zwei mittleren und zwei seitlichen, gezeichnet. Art: *Aul. rhyssodoides* (pl. 21. fig. 2) aus Brasilien (p. 399 ff.).

Von Nietner (Entomological papers p. 58 ff.) wurden folgende neue Gattungen und Arten von Ceylon beschrieben: *Distrigus costatus* (ist nach Original-Exemplaren des Verf. vollständig identisch mit *D. atratus* Dej.), *submetallicus*, *rufo-piceus*, *aeneus*, *Dejeani*, *Drimostoma Ceylanicum*, *Casnonia punctata*, *pilifera*. — *Symphysus* n. g., zur Gruppe der Féroniens vom Verf. gestellt, ist die bekannte Gattung *Rembus* Latr.; die Art: *Symph. unicolor* scheint neu zu sein und würde sich dem *R. politus* Dej. (von welcher Art *R. politus* Fabr. spezifisch verschieden ist) zunächst an die Seite stellen. — *Calodromus* n. g. aus der Harpalinen-Gruppe ist ebenfalls eine schon bekannte Gattung, nämlich *Bradybaenus* Dej., wie dies nicht nur der Habitus und die Färbung der Ceylonesischen Art: *Calodr. exornatus*, die sich hierin den Afrikanischen ganz eng anschliesst, sondern auch die Uebereinstimmung aller Körpertheile mit Einschluss der Unterlippe, die Nietner zufolge abweichen soll) leicht erkennen lässt. — *Zuphium pubescens*, *Bembidium opulentum*, *truncatum*, *tropicum*, *triangulare*, *Ceylanicum*, *Klugii*, *ebeninum*, *orientale*, *emarginatum*, *ornatum*, *scydaenoides*. — *Megaristerus* n. g. aus der Harpalinen-Gruppe: mit *Amblystomus* nahe verwandt, von dieser Gattung sowohl als von *Acupalpus* dadurch unterschieden, dass das erste Glied an den vier vorderen Tarsen des Männchens unten unbefilzt, dass die linke Mandibel bedeutend plumper und stärker als die rechte ist und daher vor der Oberlippe hervorragt, während die rechte darunter verborgen ist; Oberlippe vorn tief ausgerandet, Fühler kaum über die Schultern hinausreichend, fadenförmig, das zweite Glied wenig kürzer als das dritte. — Drei Arten: *M. mandibularis*, *stenolophoides* und *Indicus*. — *Spathinus* n. g. zur Pogonus-Gruppe vom Verf. gebracht, in der Bildung der Unterlippe mit *Bembidium* übereinstimmend, die Endglieder beider Tasterpaare aber konisch zugespitzt, die vorderen Tarsen beim Männchen leicht erweitert und unten mit Schüppchen besetzt. Art: *Spath. nigriceps*. — *Euplynes Dohrnii*.

v. Motschulsky (Etudes entomologiques VI. p. 25 ff.) errichtete auf zwei Japanesische Carabicingen zwei neue Gattungen: *Trigonognatha* n. g. zu *Catadromus* gestellt; Zunge sehr hervortretend,

an der Spitze frei, dreieckig, vorn gerade abgestutzt, Paraglossen so lang als die Zunge, dreieckig, zugespitzt; Kinn stark ausgerandet mit stumpfem Mittelzahn, Mandibeln dreieckig, ohne Zähnelung, Maxillen schmal, in einen starken Zahn endigend, Oberlippe quer, nicht ausgerandet, Lippentaster mit stark beilförmigem Endglied; Maxillartaster ziemlich kurz mit cylindrischem, an der Spitze abgestutzten Endglied; Fühler mit dickem Basalglied, das etwas kürzer als die beiden folgenden zusammengenommen ist; Körper wie bei *Poecilus* verlängert und flachgedrückt, die drei ersten Tarsenglieder beim Männchen erweitert. Art: *Trig. cuprescens*, $8\frac{1}{2}$ lin. — *Megrammus* n. g. zur Harpalinen-Gruppe gehörig; Tarsen an der Unterseite mit langen Haaren bekleidet, die mittleren beim Männchen erweitert, vorletztes Glied bei beiden Geschlechtern an den Vorder- und Mitteltarsen stark zweilappig; Kopf klein, dreieckig, Kinn ohne Mittelzahn, Zunge frei, vorspringend, schmal, abgerundet und mit zwei langen Endborsten, Paraglossen etwas länger, schmal, an der Spitze abgerundet; Maxillen schmal, gekrümmt mit langem Endhaken, Mandibeln stark gebogen, ohne Zähne, Palpen mit langem, verbreiterten und gebogenen zweiten Gliede, das dritte schmal, lang eiförmig, schwach abgestutzt; Fühler schlank, länger als Kopf und Thorax zusammengenommen; Körperform wie *Stenolophus*. Art: *Meg. circumcinctus* von Japan.

Derselbe (ebenda p. 110) beschrieb unter dem Namen *Selina Westermanni* eine neue Gattung und Art aus Ostindien, die mit *Casnonia* und *Ega* in nächster Verwandtschaft steht; die Gestalt des kleinen Thierchens erhält etwas Eigenthümliches durch den in einen dünnen, stielförmigen Hals endigenden Kopf, die kuglige Gestalt des Thorax und die länglich viereckigen, gewölbten Flügeldecken; die Fühler verdicken sich gegen die Spitze und die Glieder sind hier beträchtlich länger als an der Basis (eine Eigenthümlichkeit, die in der Beschreibung nicht erwähnt wird); das vorletzte Glied der Kiefertaster kegelförmig, erweitert, kürzer als das zweite, das letzte beilförmig, kurz; das vorletzte Glied der Lippentaster kurz, fast kegelförmig angeschwollen, das letzte beilförmig, sehr dünn und fast so lang als das vorhergehende. — Die Art hat die Grösse der *Ega Sallei* und ist von Westermann mehrfach verschickt worden. — Eine zweite Gattung und Art aus Chile ist *Notioxenus bilunulatus* genannt und soll *Notiophilus* mit *Trachypachus* verbinden, indem sie mit letzterer Gattung die kurze, gedrungene Form, mit ersterer die Punktirung, Form der Palpen und der Füsse gemein hat; Vorderschienen stark gezähnt am Aussenrande, Fühler mit allmählig gegen die Spitze verdickten Gliedern, ohne indessen perlschnurartig zu sein, wie bei *Trachypachus*. — *Carabus japonicus* neue Art aus Japan, wie die beiden vorhergehenden auf der beifolgenden Tafel abgebildet.

Derselbe (ebenda p. 94 ff.) besprach die von v. Chaudoir

aufgestellten Scaritinen-Gattungen und zerfällte dieselben als in dem ihnen gegebenen Umfang nicht haltbar noch weiter; auf diese Art werden aus der früheren Gattung *Scarites* neunzehn Gattungen gemacht, die der Verf. auf analytischem Wege charakterisirt; die neuen sind: *Pleurogenius* (*Taeniolobus circumductus* Chaud.), *Stigmapterus* (*madagascariensis* Motsch.), *Glyptomorphus* (*Scar. excavatus* Kirby), *Scallophorites* (*Scar. striatus* Dej.), *Harpalites* (*Scar. laevigatus* Fab.), *Distichus* (*Scar. planus* Bon.), *Lophogenius* (*Scar. 8-punctatus* Dej.), *Broscomorphus* (*Scar. arenarius* Dej.), *Parallelomorphus* (*Scar. eurytus* Fisch.), *Paramecomorphus* (*Scar. cylindrinotus* Fald.). Dass diesen Gattungen keine generellen Charaktere zu Grunde liegen, braucht wohl nicht erst erwähnt zu werden.

Le Conte (Proceed. of the acad. of natur. scienc. of Philadelphia 1857. p. 75—83) lieferte eine „Synopsis of the species of *Clivina* and allied genera inhabiting the United States.“ Der Verf. giebt darin analytische Tabellen für die Arten der Gattungen *Dyschirius* (28 A.), *Acephorus* Le C. (1 A.), *Ardistomis* Putz. (4 A.), *Aspidoglossa* Putz. (1 A.), *Clivina* (27 A.) und *Schizogenius* Putz. (6 A.). Am Schlusse jeder Gattung wird die Synonymie einiger Arten erörtert und folgende als neu beschrieben: *Dyschirius basalis* und *gibbipennis* aus Californien, *truncatus* aus Illinois, *erythrocerus* aus Pennsylvania, *sellatus* von New-Yersey, *filiformis* und *dentiger* von New-York, *rufiventris* aus Louisiana, *setosus* aus Massachusetts, *pilosus* von New-Orleans, *Ardistomis Schaumii* aus Louisiana.

Derselbe (ebenda p. 2 ff.) stellte einen „Catalogue of the species of *Bembidium* found in the United States and contiguous Northern Regions“ zusammen, hauptsächlich aus dem Grunde, mehrere früher von ihm aufgestellte Arten einzuziehen und die zahlreichen Nord-Amerikanischen Bembidien in Gruppen zu vertheilen. Ein Versuch, dieselben den von den Europäischen Autoren angenommenen Abtheilungen, u. a. auch denen von Jacquelin du Val unterzuordnen, ist dem Verf. missglückt; er stellt daher seinerseits 19 auf die Hauptunterschiede der Arten gegründete Gruppen auf, unter welchen er die 75 ihm bekannten Bembidien Nord-Amerika's aufzählt und dieselben in ihrer Synonymie erörtert. Von den früher von *Bembidium* abgezweigten Gattungen hält Le Conte jetzt nur noch *Pericompsus* fest, zieht dagegen *Hydrium* und *Ochthedromus* wieder ein. Am Schusse folgt die Beschreibung von drei neuen Arten: *Bembidium lugubre*, *fraternum* und *pedicellatum*.

Derselbe (Entomol. Report p. 28 ff.) beschrieb als neue Arten aus Californien und dem Oregon-Gebiete: *Stenolophus limbalis*, *anceps*, *tener* und *Californicus*, *Calosoma discors* und *Notiophilus nitens*, stellte den *Anchomenus lenis* Mann. zur Gattung *Pristodactyla* Chaud. und gab Abbildungen (Taf. I. fig. 4—10) von *Agasoma cali-*

fornicum Mén. (welches er ohne Grund als von *Stenomorphus* Dej. generisch verschieden ansieht), *Promecognathus laevissimus* Dej., *Cychnus tuberculatus* Harr., *Carab. taedatus* Fab. (*baccivorus* Fisch.), *Calosoma cancellatum* Esch. (*aenescens* Le C.), *discors* Le C. und *Trachypachys inermis* (*Holmbergi* Mann.).

Eine neue Gattung *Acanthophthalmus* errichtete Montrouzier (*Annales d. scienc. phys. de la soc. d'agriculture de Lyon* VII, 1. p. 8) für eine Carabicingen-Form des stillen Oceans (von St. Cristoval), welche in der Gestalt Aehnlichkeit mit *Helluo* und *Anthia* hat, die sich aber durch die nicht abgestutzten Flügeldecken und die nicht verlängerten Palpen von ersterer unterscheidet. Ihre Charaktere werden folgendermassen angegeben: Kopf länger als das Halsschild, Mandibeln kräftig, hervortretend, zweizählig, Oberlippe breit, quer viereckig, Taster fast von gleicher Länge, kurz, Endglied länglich und fast cylindrisch, Fühler die Flügeldecken erreichend, ihre Glieder umgekehrt kegelförmig, kurz, fast knopfartig, das zweite kürzer als das dritte; Augen hervorspringend, der Kopfrand neben ihnen zahnartig ausgezogen, Flügeldecken parallel, hinten abgerundet, Vorderschienen tief ausgeschnitten, Tarsen ohne Sohlenbürsten, mit sehr langem Endgliede. Art: *A. tricostatus*, $7\frac{1}{2}$ lin.

Thomson (Skandinaviens Coleoptera, Häftet I. Carabici) theilt die Schwedischen Carabicingen in drei Hauptgruppen: *Cicindelides* *Carabides* und *Harpalides* und unterscheidet die beiden letztern, die von den ersteren sich durch die Insertion der Fühler abgränzen, dadurch, dass bei den *Carabides* (mit den Tribus der *Omophronini*, *Trachypachini*, *Carabini*, *Nebriini* und *Cychnini*) das Mesosternum vorn leistenartig zusammengedrückt, bei den *Harpalides* (mit den Tribus der *Clivinini*, *Elaphrini*, *Trechini*, *Licinini*, *Feroniini*, *Panagaeini*, *Lebiini*, *Brachinini*, *Broscini*, *Loriccerini*, *Chlaeniini* und *Harpalini*) dagegen vorn abgeflacht und nicht carinirt ist. Die Schwedische Carabicingen-Fauna umfasst im Ganzen 262 Arten, die zum grössten Theile nur namentlich aufgeführt werden und mit Bemerkungen über Fundorte versehen sind; weniger bekannte Arten werden mit Diagnosen versehen und in ihrer Synonymie erörtert, für einige auch ältere, von Schwedischen Autoren aufgestellte Namen wieder eingeführt. Als neue Arten werden beschrieben: *Dyschirius lapponicus* (*Clivina thoracica* Zett.), *sylvaticus*, *Bembidium lapponicum* (*impresum* var. Zett.), *Patrobus clavipes*, *rubripennis* (*Harp. picicornis* var. b. Zett.), *Amara littorea*, *cyanocnemis*, *nigricornis* (*Harp. vulgaris* var. b. Zett.); für *Blethisa arctica* Gyll. wird eine eigene Gattung *Arctobia* errichtet.

Jacquelin du Val (*Historia fisica de la isla de Cuba* VII. p. 4 ff.) beschrieb *Cymindis sulcicollis*, *Dromius Poeyi*, *Dyschirius insularis*, *Clivina limbipennis*, *Oodes insulanus*, *Bembidium apicale*

als neue Arten von der Insel Cuba; einige derselben so wie von bereits bekannten Arten *Galerita erythrodera*, *Calleida rubricollis* und *Clivina bipustulata* sind auf Taf. VI abgebildet.

Derselbe (Annales d. l. soc. entomol. V. p. 103 ff.): *Bembidium inustum* von den Alpen Piemont's, *bipartitum* aus Sardinien und *brevicorne* Chaud. aus Piemont.

Wollaston (Catal. of Coleopt. Ins. of Madeira p. 1 ff.): *Tarus Maderae* (lineatus Woll. antea), *Dromius alutaceus*, *Leistus ellipticus*, *Olisthopus acutangulus*, *Trechus laevis*, *signatus* und *Bembidium dubium* als neue Arten von Madeira.

Als neue Arten aus Griechenland wurden von Schaum (Berl. Entomol. Zeitschr. I. p. 121 ff.) beschrieben: *Nebria Heldreichii*, *Clivina lernaea*, *Dyschirius bacillus*, *importunus*, *Blechrus exilis*, *Aprius reticulatus*, *opacus*, *Singilis fuscipennis*, *Chlaenius fuscitarsis*, *Pogonus reticulatus*, *Agonum lucidulum*, *Platysma protensa*, *Omaseus Zebei*, *Zabrus brevicollis*, *Acupalpus longicornis*, *pumilio*, *planicollis*, *Trechus pallidipennis*, *Bembidium subtile*, *inoptatum*. — Ausserdem sind die synonymischen Bemerkungen über bekannte Arten einzusehen.

Einzelne als neu aufgestellte Arten sind ferner folgende:

Von Fairmaire (Annales d. l. soc. entomol. p. 725 ff.): *Dromius capitalis* von Beziers in Frankreich, mit *D. longiceps* verwandt, *Carabus Thomsonii* aus Sicilien, (zur Gruppe des *C. morbillosus* gehörend und von Dahl unter dem Namen *C. extensus* Koll. versandt, Ref.), *trabuccarius* aus Südfrankreich von der Catalanischen Gränze, zur Gruppe des *C. helluo* gehörend, *Feronia sicana* aus Sicilien; Abbildung der beiden *Carabus*-Arten auf pl. 14. — *Carabus cychrocephalus* aus Marocco, vorläufig durch Diagnose bekannt gemacht im Bullet. d. l. soc. entomol. p. CLVII.

Von L. Dufour (Archives entomol. I. p. 382. pl. XV): *Cychnus spinicollis*, ausgezeichnete neue Art aus Spanien.

Von Friwaldszky (Verhandl. d. zoolog.-botan. Vereins in Wien VII. p. 44): *Anophthalmus Redtenbacheri* n. A. aus der Igritzer Grotte in Ungarn.

Von Levrat (Annales d. l. soc. Linnéenne de Lyon IV. p. 417): *Argutor sculus* n. A. aus Sicilien.

Von Peyron (Annales d. l. soc. entomol. p. 715): *Bembidium (Tachys) metallicum* n. A. von Cairo.

Von Reiche (Bullet. d. l. soc. entomol. p. VIII): *Patrobus Napoleonis* von der Insel Feroe, *Platysma arctica* aus Island und Lappland.

Von Delarouze (ebenda p. XCIV): *Anophthalmus gallicus* und *Pterostichus microphthalmus* aus einer Grotte bei Betharram in den Basses-Pyrénées.

Von Gautier des Cottés (ebenda p. CXXXV): *Anchomenus ruficollis* n. A. von Beziers.

Eine Notiz über das bisher unbekannte Weibchen von *Carabus* (Macrothorax) Anmontii von Tanger in Nord-Afrika gab Lucas im Bullet. d. l. soc. entomol. p. CLVI.

Scriba (Entomol. Zeitung p. 378 ff.) sieht *Carabus violaceus* und *purpurascens* als zwei eigene Arten an, die durch äussere Merkmale und Lebensweise sicher unterschieden seien.

Nach Jacquelin du Val (Annales d. l. soc. entomol. p. 96) ist *Harpalus crassiusculus* Fairm. Laboulb. auf ein abnormes Exemplar des *Harp. cribicollis* Dej. gegründet.

Nach Schaum's Meinung (Bullet. d. l. soc. entomol. p. LXXX) wäre *Brachinus hebraicus* Reiche = *Br. caspicus* Dej., was von Reiche ebenda p. CLXII nach Vergleich beider Arten widerlegt wird, und *Cymindis Osiridis* Peyron = *C. tessellata* Dej., was von Peyron ebenda p. CX ebenfalls zurückgewiesen wird. — Dagegen ist nach Reiche (ebenda p. XCV) der von ihm beschriebene *Olisthopus orientalis* = *O. Graecus* Brullé und derselbe Verf. bestätigt (ebenda p. CLXIII) die Vermuthung Schaum's, dass *Nomius graecus* Lap. kein Europäisches Insekt, sondern mit der Nord-Amerikanischen *Haplodrilus* (Morio) *pygmaea* Dej. identisch sei.

Dawson „Notes on British Geodephaga with descriptions of four new species“ (Entomologist's Annual 1857. p. 69—84) besprach und beschrieb einige für England neue Carabiden.

v. Motschulsky (Etudes entomol. VI. p. 73) machte auf die gelben Flecke am Hinterleibe von *Scarites laevigatus*, *arenarius* und *terricola* aufmerksam und warf die Frage auf, ob dieselben nicht Leuchtorgane seien.

Overdijk machte briefliche Mittheilungen über die Lebensweise der *Mormolyce phyllodes*, welche in den Mémoires d'entomol. publ. p. l. soc. entomol. des Pays-Bas I. p. 41 ff. abgedruckt sind. Das Thier hält sich in Java ausschliesslich in bergigen Gegenden von 2000—4000' Höhe auf; es wurde im Fluge beobachtet und wie es sich auf einen Schwamm, der häufig auf verschiedenen Bäumen vorkommt und von den Eingebornen „Grammoer“ genannt wird, niederliess. In diesem Schwamm lebt die Larve und Puppe, erstere offenbar anderen darin befindlichen Insekten-Larven nachstellend; die Larve lebt 8—9 Monate, der Puppenzustand dauert 8 bis 10 Wochen. Die Imago erscheint meist vom August bis November und heisst bei den Javanesen „Bibiolah'an.“

Von Fr. Loew (Sitzungsberichte der mathem.-naturwiss. Classe der Akad. d. Wissensch. zu Wien XXII. p. 298—305) wurde eine Charakteristik der von ihm entdeckten Larve der *Nebria picicornis* geliefert und dieser zugleich eine vergleichende Schilderung der be-

reits bekannten Larven dieser Gattung angeschlossen. Die Larve der *N. picicornis* wurden anfangs April am Ufer der Donau mit grosser Schnelligkeit im Wellsande zwischen Steinen umherlaufend, ein Exemplar auch unter Steinen im Wasser gefunden; am Leben erhalten grub sich eine Larve Mitte Aprils einen Gang in den Sand hinein und entwickelte sich am 20. Mai zum Käfer. Abbildungen der Larve und ihrer einzelnen Theile auf beifolgender Tafel, nach Zeichnungen von F. Brauer.

Amphizoidae. Le Conte (Entomological Report p. 32 ff.) gab eine verbesserte Charakteristik der von ihm aufgestellten, abnormen Californischen Gattung *Amphizoa* (vergl. Jahresbericht 1853. p. 18) und bildete die Art *A. insolens* auf Taf. I. Fig. 11 ab. Seine frühere Ansicht, dass *Amphizoa* eine eigene Gruppe unter den *Dytisciden* zu bilden habe, hat der Verf. jetzt dahin geändert, dass die Gattung einerseits wegen ihrer Abweichungen von dieser Familie und andererseits wegen ihrer Analogieen mit den *Carabicingen* zwischen beiden als eigene Familie einzuschalten sei. Die Charaktere derselben stellt er folgendermassen fest: „*Coleoptera pentamera, pedibus ambulatoriis, antennis filiformibus; prothoracis episternis a nota sutura divisis, acetabulis anticis postice hientibus; coxis anticis et mediis globosis, posticis transversis ad marginem corporis extensis, contiguis, antice truncatis, postice ad insertionem pedum elevatis; mento magno, emarginato, cum gula omnino connato (sutura nulla); maxillis lobo interno curvato, acuto, intus parce spinoso, galea elongata, palpiformi, exarticulata; abdomine sex-articulato, articulis anterioribus tribus connatis.*“ Reelle Verwandtschaften der Gattung mit den *Tenebrioniten*, welche von anderer Seite her geltend gemacht worden sind, hat der Verf. nicht auffinden können, vielmehr reduciren sich dieselben nach ihm auf oberflächliche Aehnlichkeiten in der Bildung einzelner Theile. Die fünf dem Verf. vorliegenden Exemplare der Gattung zeigten keine äusseren sexuellen Unterschiede.

Dytiscidae. Neue Arten dieser Familie sind: *Colymbetes trivittatus* und *hamatus* Montrouzier (Annales d. scienc. phys. de la soc. d'agriculture de Lyon VII. 1. p. 8 f.) von Woodlark, *Agabus brevicollis*, *Acilius latiusculus* und *Dytiscus sublimbatus* Le Conte (Entomol. Report p. 34) aus dem Oregon-Gebiete und Californien, *Hydroporus Lyellii* Wollaston (Catal. of Coleopt. Ins. of Madeira p. 26) von Madeira, *Haliplus rubidus* Perris (Annales soc. Linnéenne de Lyon IV. p. 117) aus den Grandes-Landes, *Agabus sexualis* Reiche (Bullet. soc. entomol. p. IX) aus Island und Schottland, *Haliplus pyrenaicus* Delarouze (ebenda p. XCIV) aus Südfrankreich, *Hydroporus lernaeus* und *saginitus* Schaum (Berl. Entomol. Zeitschr. I. p. 153) aus Griechenland. — Nach letzterem (Bullet. soc. entom. p. LXXX) ist *Hydrocanthus diopthalmus* Reiche identisch mit *H. notula* Er.

Gyrinites. Ueber die Larven von *Gyrinus natator* und ihre Lebensweise machte Mulder (Mémoires d'entomol., publ. p. l. soc. entom. des Pays-Bas I. p. 35 f.) einige Mittheilungen. Die Begattung der Käfer findet in der ersten Hälfte des April, auch etwas später statt, die Eier werden vom Weibchen in Reihen dicht an einander gelegt, die Larven sind in der Jugend beinahe farblos, später auf dem Rücken gefleckt; sie frassen Würmer, auch in das Wasser geworfene Tortrix-Raupen; ihre Schwimmbewegung ist sehr schnell.

Palpicornia. Als neue Arten wurden aufgestellt: *Hydrophilus intermedius*, *violaceo-nitens* und *Hydrous tenebrioides* Jacquelin du Val (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 22 ff.) von Cuba, *Ochthebius rugulosus*, *subpictus* und *Hydrobius Marchantiae* Wollaston (Catal. of Coleopt. Ins. of Madeira p. 28 ff.) von Madeira, *Sphaeridium melanopterum* Montrouzier (Annales d. l. soc. d'agriculture de Lyon VII. 1. p. 19) von Woodlark.

Jacquelin du Val (Annales soc. entom. de France p. 88 f.) setzte noch einmal die differentiellen Merkmale von *Hydrophilus piceus* und *pistaceus* Cast. (inermis Luc.) auseinander und führte gegen Reiche im Bullet. d. l. soc. entom. p. LIV Gründe für die Vereinigung der Gattungen *Helochares* und *Philhydrus* an; Reiche erwiderte darauf ebenda p. LXXVII.

Silphales. Lespès, Note sur quelques insectes des grottes de l'Ariège (Annales des scienc. natur. 4. sér. VII. p. 278—284. pl. 17) entwarf eine Schilderung der unterirdischen Höhlen in der Umgegend von Tarascon und beschrieb zwei in denselben aufgefundenen augenlose Käfer, *Adelops pyrenaeus*, eine auffallend grosse Art von $3\frac{1}{2}$ —4 mill. Länge, welche sich am Boden unter den weggeworfenen Ueberbleibseln von Strohfackeln fand und *Leptoderus Querilhaci*, $3\frac{1}{2}$ mill. lang, an den Stalaktiten heraufkriechend gefunden. Dass letztere Art nicht der Gattung *Leptoderus* angehört, sondern zu *Pholeuon* Hampe zu bringen sei, liess sich schon aus der von Lespès gegebenen Beschreibung und Abbildung ersehen; gegenwärtig findet Ref. dies durch ein der hiesigen Königl. Sammlung zugekommenes Exemplar bestätigt.

Friwaldszky (Verhandl. d. zoolog.-botan. Vereins in Wien VII. p. 44 ff.) beschrieb *Pholeuon leptodirum* und *Drimeotus Kraatzii* als neue Arten aus den unterirdischen Grotten [im Bihar Comitate Ungarn's.

Fairmaire (Annales d. l. soc. entomol. V. p. 729 ff.): *Catopsimorphus Marquetii*, *Colon confusus* und *Adelops asperulus* aus Frankreich.

Peyron (ebenda p. 717): *Choleva formicetorum* von Marseille, mit *Ch. alpina* Gyll. verwandt.

Delarouzée (Bullet. d. l. soc. entomol. p. CXIV): *Adelops*

speluncarum n. A. aus einer Grotte bei Betharram in den Basses-Pyrénées.

Janson (Entomologist's Annual. 1857. p. 70): *Adelops Wollastonii* n. A. aus England, auf der beifolgenden Tafel Fig. 8 abgebildet.

Waga (Bullet. d. l. soc. entomol. p. CXXV) fing eine lebende Spitzmaus (*Sorex tetragonurus*) und fand, als er sie in ein Glas eingesperrt hatte, zugleich einen *Leptinus testaceus* in demselben vor; derselbe verbarg sich tief zwischen den Haaren des Felles der Spitzmaus in der Nähe des Afters und lief, da er von dort aufgestört wurde, mit grosser Schnelligkeit auf dem Thiere herum.

Rouget „Note sur l'habitat et les différences sexuelles du *Catopsimorphus arenarius* Hampe“ (Annales de la soc. entomol. p. 756 ff.) machte Mittheilungen über das Vorkommen dieser Art in der Umgegend von Dijon. Das erste Exemplar wurde im Juli des Abends im Fluge gefangen, eine grosse Anzahl im Frühjahr unter Steinen in Gesellschaft der *Atta structor*; im Herbste findet sich der Käfer ebenfalls auf diese Art, obwohl in geringerer Menge. Das Männchen ist viel seltener als das Weibchen und unterscheidet sich ausser der Erweiterung der Vordertarsen und der Krümmung der Mittelschienen durch einen scharfen Dorn an den Mitteltrochanteren und einen kleinen Zahn in der Mitte des Hinterrandes des dritten Abdominalsegmentes. — Nach den vom Verf. angestellten Beobachtungen lebt der *Catopsimorphus* durchaus im Frieden mit den Ameisen und Stückchen Fleisch, die in den Bau gelegt wurden, verzehrten beide unbekümmert um- und miteinander.

Scriba (Entomol. Zeitung p. 377) charakterisirte *Colon latus* im männlichen Geschlechte.

Die Gruppe der Anisotomiden bereicherte Wollaston (Catal. of Coleopt. Insects of Madeira p. 148) mit einer neuen Gattung *Stereus*, die mit *Triarthron* in der dreigliedrigen Fühlerkeule, dem ungekielten Mesosternum und den fünfgliedrigen Tarsen in beiden Geschlechtern übereinstimmt, sonst aber in mehrfacher Beziehung davon abweicht. Der Körper ist fast kuglig wie bei *Cercyon*, die Beine sehr kurz und kräftig, die Schienen erweitert, stachlig, die Mandibeln sehr stark entwickelt, frei hervortretend, die rechte an der Innenseite mit zwei, die linke mit einem Zahne bewaffnet. Art: *Stereus cercyonoides* (Taf. I. Fig 1 abgebildet) $\frac{3}{4}$ —1 lin. aus Madeira.

Pselaphidae. Fairmaire (Annales d. l. soc. entomol. V. p. 735 ff.) beschrieb *Bryaxis nigropygialis*, *Bythinus laevicollis* und *Euplectus nitidus* als neue Arten aus Frankreich.

Wollaston (Catal. of Coleopt. Insects of Madeira p. 168): *Euplectus intermedius* n. A. von Madeira.

Rouget (Annales d. l. soc. entomol. p. 757) fand *Centrotoma*

lucifuga Heyden und Chennium bituberculatum Latr. unter Steinen in Gesellschaft der Myrmica caespitum bei Dijon.

Paussidae. Westwood (Journal of proceed. of the Linnean soc., Zoology I. p. 74 ff.) beschrieb *Paussus Murrayi* als neue Art von Old-Calabar, zur Abtheilung mit getheiltem Thorax und ausgehöhlter Fühlerkeule gehörend.

Thomson (Archives entomol. I. p. 403. pl. 21) machte *Pausus Aristoteli* (sic!) und *Plinii* als neue Arten von Port Natal durch Abbildungen bekannt.

Staphylini. Jacquelin du Val (Genera des Coléopt. II. p. 25 ff.) errichtete eine neue Gattung *Ciled* auf den *Tachyporus silphoides* auct., eine fernere *Atrecus* auf *Othius pilicornis* Er., zweigte von *Leptacinus* vorläufig als Untergattungen den *Lept. brevicornis* Er. unter dem Namen *Zeletomus* und den *Lept. nothus* Er. unter dem Namen *Stenistoderus* ab, vereinigte dagegen die Gattung *Ocypus* als unhaltbar mit *Staphylinus* Er. — Für *Acrognathus palpalis* Er. wird die Gattung *Plancustomus* errichtet, deren Hauptcharakter in den dreigliedrigen Tarsen besteht, die Gattung *Micropeplus* mit zwei neuen Arten: *Microp. Margaritae* aus Frankreich und *Marietti* aus Italien bereichert.

Derselbe (Historia fisica de la isla de Cuba p. 15 ff.) beschrieb *Tachinus infimus*, *Xantholinus puncticeps*, *Ocypus Cubae*, *Lathrobium margipallens* (!), *Platystethus exiguus*, *Trogophloeus aridus* und *aequalis* als neue Arten aus Cuba.

v. Motschulsky setzte seine im Jahre 1851 begonnene „Énumération des nouvelles espèces de Coléoptères rapportés de ses voyages“ im Bulletin de la soc. imp. des natur. de Moscou 1857, IV, pag. 490—517 mit einem zweiten Theil fort, welcher die Beschreibung einer beträchtlichen Anzahl neuer, oder wenigstens vom Verf. für neu gehaltener Staphylinen enthält. Aus der Gruppe der Omalini: *Anthobium alpestre* aus den Krainer Alpen, *Rhododendri* ebendaher, *Omalium corticinum* aus Tyrol, *Phloeonomus praenustus* aus Columbien, *flavescens* vom Cap, *ulmi* aus Fontainebleau, *Acidota pulchra* aus Steyermark, *Arpedium? pallens* von Bombay, *Lesteva oblonga* aus Bayern und *Anthophagus transversus* von den Krainer Alpen. — Aus der Gruppe der Proteinini: *Glyptoma cicatricosa* aus Columbien, zweimal so gross als *Gl. corticinum*. — Aus der Gruppe der Piestini: *Lispinus fultus* und *impressicollis*, *Holotrochus? fossulatus* und *foreolatus*, sämmtlich aus Ostindien, *Holosus* n. g., mit den beiden vorigen Gattungen verwandt, aber von der hinten verschmälerten Form der Tachyporinen; Maxillartaster wie bei *Holotrochus*, aber ihr letztes Glied länger und konischer; Fühler von Kopf- und Thoraxlänge zusammen, die fünf Endglieder eine Art Keule bildend, das erste Glied gross, fast so breit wie lang, das zweite klein, gerundet, das dritte breiter und zweimal

länger, das vierte bis sechste fast kuglig; Halsschild mit hervorspringenden Hinterecken, Flügeldecken fast gerade abgestutzt, mit eingedrückter Linie zu jeder Seite der Naht, Hinterleib ungerandet, hinten zugespitzt. Von den 5 neuen Arten der Gattung, sämmtlich aus Ostindien stammend, haben zwei: *Holusus tachyporiformis* und *tachiniformis* die Vorderhüften wenig hervortretend, zwei: *H. conuriformis* und *mycetoporiformis* dieselben quer oval, die fünfte: *H. olisthaeriformis* dieselben kuglig und deutlich hervortretend. — *Leptochirus quadridens*, *sanguinosus*, *tridens*, *excavatus* aus Ostindien. — Die Gattung *Zonoptilus* Motsch. wird in ihren Unterschieden von *Coprophilus* auseinandergesetzt. — Aus der Gruppe der Oxytelini: *Oxytelus lividus*, *incisus* und *thoracicus* aus Ostindien, *excavatus* aus Algier, *Trogophloeus lunatus*, *pallipes* und *simplex* aus Ostindien, *fossulatus* von Paris, *Platystethus crassicornis* und *testaceus* aus Ostindien, *aegyptiacus* aus Egypten, *Bledius Dama* aus Algier, *grandicollis* aus Steyermark, *dilutipennis* aus Ostindien. — Aus der Gruppe der Osoriides: *Osorius rufipes*, *punctulatus* und *rufipennis* aus Ostindien, *Megalops robustus* aus Columbien. — Aus der Gruppe der Stenini: *Stenus lateralis* aus Columbien, *flavitaris* aus Egypten, *elevatus* von Paris, *bituberculatus* von Marseille, *gilvipes* von Laybach und aus der Schweiz, *carinifrons* bei Paris, *picipes* aus der Schweiz und Krain, *cariniger*, *bivulneratus*, *piliferus*, *bispinus*, *cribellatus*, *fulvescens* und *pictus* aus Ostindien. — Aus der Gruppe der Pinophiliden: *Pinophilus pilicollis*, *melanocephalus* und *morio* aus Ostindien. — Die Beschreibungen des Verf. sind hier zum Theil eingehender und ausführlicher abgefasst, als dies gewöhnlich bei ihm der Fall ist, zum Theil jedoch auch sehr aphoristisch und es werden mindestens die einheimischen Arten noch einer genauen Kritik zu unterwerfen sein.

Derselbe (Etudes entomol. VI, p. 59 ff.) veröffentlichte die im Nachlasse Mannerheim's befindlichen Bestimmungen und Notizen Erichson's zu den von Mannerheim in seinem „Précis d'un nouvel arrangement des Brachelytres“ beschriebenen Staphylinen, welche erst nach der Herausgabe der Erichson'schen Genera et Species Staphylinorum gemacht und nur theilweise veröffentlicht worden sind. Nach den gegebenen Bestimmungen sind die von Mannerheim beschriebenen Arten zum grossen Theil von Erichson unter anderen Namen aufgeführt worden.

Wollaston (Catal. of Coleopt. Insects of Madeira p. 172 ff.) machte eine Reihe neuer Arten von Madeira bekannt: *Homalota truncorum*, *haligena*, *montivagans*, *alutaria*, *Oxygoda lurida*, *rugifrons* (*litigiosa* Woll. antea), *Othius vestitus*, *brevicornis*, *Philonthus proximus*, *simulans*, *punctipennis*, *Lithocharis indigena*, *debilicornis*, *Stenus hydropathicus*, *fulvescens* (Heerii var. β . Woll. antea), *Trogophloeus transversalis*, *nigrita*, *simplicicollis* und *Omalium clavicorne*.

Coleoptera quaedam e Staphylinorum familia nova vel minus cognita cum observationibus, auct. Flam. Baudi. (Berl. Entomol. Zeitschr. I. p. 97 ff.) Als neue Arten werden darin beschrieben: *Falagria elegans* von Cypern, *Ocalea picipennis*, *Aleochara maculipennis*, *Ocypus olympicus* und *Lathrobium apicale* ebendaher, *Scopaeus scitulus* aus Piemont, *Sunius thoracicus* und *biguttatus* von Cypern, *Paederus lusitanicus* (Aubé ?), *Stenus viridans* aus Piemont, *Bledius haedus* von Cypern, *Platystethus brevipennis* aus Sardinien, *Anthobium procerum* und *nitidicollis* aus Piemont. Ausserdem mehrfache Bemerkungen über schon beschriebene Arten.

C. G. Thomson, „Öfversigt af de arter inom Insektengrupper Stenini, som blifvit funna i Sverige“ (Öfversigt af Kongl. Vetensk. Akad. Förhandl. XIV. p. 219—235) gab eine Uebersicht der in Schweden einheimischen Arten der Gruppe Stenini. Alle Arten sind mit Diagnosen und Bemerkungen über Vorkommen und Fundorten, einige mit kritischen Anmerkungen und berichtigenden Zusätzen versehen, die neuen beschrieben. Als Schwedische Arten sind 1 *Dianous*, 53 *Stenus* und 2 *Euaestethus* aufgezählt, davon *Stenus bipustulatus*, *longitarsis*, *grandiceps*, *argentellus* (bupthalmus Gyll., carbonarius Er.) *nigripalpis*, *crassiventris* (nigritulus Er.), *littoralis* (nigritulus var. Er.), *brevicollis* (bifoveolatus Er. nec Gyll.) und *Euaestethus pullus* als neue Arten beschrieben. Von Erichson'schen Benennungen hat der Verf. einige ändern müssen, da die darunter beschriebenen Arten von den Gyllenhal'schen gleichen Namens verschieden waren.

Einzeln beschriebene neue Arten sind ausserdem folgende:

Lithocharis brevicornis Allard (Annales d. l. soc. entomol. p. 747) aus Frankreich, in Schaafställen aufgefunden, pl. 14 abgebildet, *Lithocharis pocofera* Peyron (ebenda p. 718) aus Marseille, *Aleochara major*, *Myrmedonia Erichsonis* und *Quedius Monspeliensis* Fairmaire (ebenda p. 737 und 635 ff.) aus Frankreich. — Der Verf. beschreibt zugleich das bisher unbekannte Männchen von *Omalium atrum* Heer auf p. 737. — *Ocypus Saulcyi* Reiche (Bullet. d. l. soc. entomol. V. p. VIII) aus dem Norden Schottlands, *Stenus testaceicornis* Perris (Annales d. l. soc. Linnéenne de Lyon IV. p. 121) aus den Grandes-Landes, *Staphylinus pygmaeus* und *Stenus roscidus* Snellen van Vollenhoven (Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland II. p. 70) aus den Niederlanden, *Anthobium signatum* Märkel (Allgem. Naturhist. Deutsche Zeitung 1857. p. 172) aus der Sächsischen Schweiz, *Homalota* und *Oxyptoda islandica*, *Omalium fucicola* Kraatz (Entomol. Zeitung p. 284 ff.) aus Island, *Oligota abdominalis* Scriba (ebenda p. 378) aus Hessen, *Isomalus Hesperidum* Wollaston (Annals of natur. history XX. p. 504) von den Cap Verdischen Inseln.

Eine erneute Charakteristik der Gattung *Boreaphilus* Sahlb., mit welcher *Chevriera* Heer vereinigt wird, hat Kraatz (Berl. Entomol. Zeitschr. I. p. 35 ff.) geliefert und auch die beiden Arten B.

Henningianus und *velox* nochmals beschrieben. Die Gattung *Coryphium* Steph., womit *Macropalpus* Cuss. identisch ist, wird von *Boreaphilus* als generisch verschieden betrachtet. Die beifolgende Tafel bringt Abbildungen des *Coryphium*, des *Boreaphilus* und des *Eudectus* Giraudi Redt.

Derselbe erging sich (ehenda p. 45) in Betrachtungen über den Umfang der Gruppe *Proteinini* Er., welche er nur auf *Proteinus*, *Megarthus*, *Phloeobium* und *Metopsia* Woll. auszudehnen gedenkt, dagegen *Glyptoma* zu den *Piestini*, *Pseudopsis* zu den *Phloeocharini*, *Euphantias* zu den *Oxytelini* und *Micropeplus* zu einer besonderen Gruppe *Micropeplini* bringen will.

„Zur Terminologie der Paraglossen“ (d. h. nur der Paraglossen der Staphylinen) machte derselbe ebenda p. 54 Bemerkungen, besonders um nachzuweisen, dass *Erichson* sowohl bei den verschiedenen Gattungen der Staphylinen als auch bei dieser Familie und den Carabicingen ganz verschiedene Theile als Paraglossen angesprochen habe und sich daher über das Wesen derselben nicht klar geworden sei. Es ist darüber zunächst zu bemerken, dass wenn *Erichson* auch vielleicht bei den Staphylinen nicht durchweg mit der Deutung der Paraglossen consequent verfahren ist, er doch wenigstens, wie es sich bei einem so gründlichen und wissenschaftlichen Kenner aller Insekten-Ordnungen von selbst versteht, und wie es auch sowohl aus seiner Beschreibung des Organs, welches er (*Gen. et Spec. Staphyl.* p. 10) als Seitentheile des vordersten Segments der Unterlippe angiebt, als auch aus seinen Figuren (z. B. Taf. III. Fig. 1—4) hervorgeht, sehr wohl wusste, was Paraglossen überhaupt bei den Insekten sind: dass dagegen der Verf. der vorliegenden Abhandlung, wenn er als Paraglossen „zwei schmale von der Basis des Zungenkörpers ausgehende Leisten“ ansieht, über den Begriff dieser Organe sehr falsch unterrichtet ist. Es ist dies in sofern auch nicht zu verwundern, als man aus den Staphylinen allein das Wesen der Paraglossen nicht wohl erkennen kann, sondern sich hierzu eine genaue Kenntniss der Mundtheile der übrigen Gliederthiere verschaffen muss. Da die Unterlippe, wie man aus den Crustaceen, aus der Entwicklung der Insektenlarve im Ei und aus den Orthopteren deutlich sieht, ein in der Mittellinie verwachsenes zweites Unterkieferpaar ist, so ist das Kinn (*Mentum*) das Analogon des *Cardo*, das *Fulcrum* (mit den *Lippentastern*) das Analogon des *Stipes* und der *Squama* und die *Ligula* (mit den Paraglossen, wo sie vorhanden sind) das Analogon der beiden Laden der Maxillen. Bei den Orthopteren lässt die vierlappige *Ligula* die Laden der beiden ursprünglichen Maxillen noch ganz deutlich erkennen, bei den Hymenopteren und Coleopteren sind die beiden inneren Laden zur *Ligula* verwachsen, während die beiden äusseren als Paraglossen frei bleiben (oder ebenfalls mit zur *Ligula* ge-

zogen werden, wenn Paraglossen fehlen). Hieraus, nämlich dass Paraglossen nur Theile der eigentlichen Ligula, d. h. modificirte äussere Laden der ursprünglichen Maxillen sind, geht deutlich hervor, dass Jemand, der Seitentheile des tastertragenden Abschnittes der Unterlippe (Fulcrum Kirby, Analogon des Stipes und der Squama der Maxillen) für Paraglossen ansieht, keine Idee von der Bedeutung der einzelnen Theile der Unterlippe der Insekten hat und sich daher mit Abhandlungen, wie es die vorliegende gegen Erichson gerichtete ist, lieber nicht befassen sollte. Wenn der Verf. des vorliegenden Aufsatzes behauptet, dass das, was er selbst bei den Staphylinen Paraglossen nennt, nicht analog mit den Paraglossen der Carabiden ist, so hat er darin vollkommen Recht, weil seine Staphylinen-Paraglossen eben keine sind; was dagegen Erichson Paraglossen nennt (Gen. et Spec. Staphyl. p. 10. Taf. III. Fig. 1—4) ist vollständig übereinstimmend z. B. mit den Paraglossen von Carabus und ganz besonders auch mit den Paraglossen der Bienen, bei denen dies Organ von Kirby und Illiger zuerst so benannt worden ist. — Wir könnten hiernach füglich die ebenfalls auf Unkenntniss beruhende Terminologie des Verf. für die einzelnen Theile der Unterlippe übergehen, in der z. B. „die Zungensubstanz“ (? unverständlich) mit der Form des Brustkastens (!) verglichen wird, wenn wir nicht bemerken müssten, dass die „sehr bezeichnende“ Benennung Fulcrum nicht für die hornige Ligula der Carabiden angewandt werden kann, da dieser Terminus schon vor mehr als fünfzig Jahren von Kirby für den tastertragenden Basaltheil der Zunge eingeführt worden ist. Schliesslich diene dem Verf. zur Notiz, dass er nicht von Paraglossen „der übrigen Insektenordnungen“ reden kann, da diese Organe bisher nur noch bei einer Insektenordnung, den Hymenopteren, aufgefunden und also benannt worden sind.

Eine nochmalige Diagnose und eine Abbildung des schönen *Tinopinus pictus* Le C. (= *Trichocanthus variegatus* Motsch.) gab Le Conte im Entomological Report p. 35. tab. I. fig. 12.

Dietrich (Entomol. Zeitung p. 136) sieht jetzt den von ihm aufgestellten *Paederus geniculatus* als identisch mit *P. brevipennis* Er. und *Paed. palustris* Dietr. als mit *P. caligatus* Er. übereinstimmend an. — Nach Jacquelin du Val (Bullet. d. l. soc. entomol. p. LIII) ist *Stenus carinifrons* Fairm. Laboulb. identisch mit *St. impressipennis* Jacq. d. Val.

Die ersten Stände und deren Entwicklungsgeschichte von *Falagria sulcatula* Payk. beschrieb Heeger (Sitzungsberichte der mathem.-naturwiss. Classe der Akad. d. Wissensch. zu Wien XXIV. p. 315 ff.); die Larve macht binnen acht bis zehn Tagen ihre drei Häutungen durch, nährt sich von todtten oder kranken Larven anderer Insekten und verpuppt sich acht Tage nach der dritten Häutung

ohne Umhüllung. Es finden zwei Generationen statt. (Abbildungen auf Taf. I.)

Trichopterygii. Neue Arten dieser Familie sind: *Ptilium denticolle* und *angulicolle* Fairmaire (Annales d. l. soc. entomol. V. p. 732 f.) aus Frankreich und *Acratrichis obscoena* Wollaston (Catal. of Coleopt. Insects of Madeira p. 35) von Madeira.

Hoffmann (Entomol. Zeitung p. 409) machte abermals Bemerkungen über die Mundwerkzeuge des *Sphaerius acaroides* und gab eine Abbildung derselben bei 400facher Vergrößerung.

Phalacrides. Heeger (Sitzungsberichte der mathem.-naturw. Classe der Akad. d. Wissensch. zu Wien XXIV. p. 330 ff.) machte die Naturgeschichte der ersten Stände von *Olibrus tricolor* Fab. bekannt. Die Eier werden vom Weibchen im ersten Frühjahr einzeln oder zu zweien in die jungen Blütenknospen von *Leontodon Taraxacum*, *Tussilago* und anderen Syngenesisten gelegt und die nach acht bis vierzehn Tagen auskriechenden Larven nähren sich anfangs von den unteren Theilen der Blütenblätter, später von den mittlerweile entstandenen unreifen Samen. Die Larven häuten sich dreimal nach je sechs bis acht Tagen, gehen durch den Fruchtboden in den hohlen Stengel, beißen sich von hier durch in die Erde und verpuppen sich daselbst in einem tonnenartigen Erdgespinnst. (Abbildung auf Taf. 6.)

Histerini. de Marseul hat in den Annales de la soc. entomol. V. p. 109—167 und 397—516 seine monographische Bearbeitung dieser Familie durch Hinzufügung eines allgemeinen Theiles so wie durch die nachträgliche Beschreibung einer Anzahl neuer Arten vervollständigt und hiermit abgeschlossen. Nach einer Zusammenstellung der Familien-Charaktere werden die Verwandtschaften der Histeren mit den Staphylinen, Pselaphiden, Nitidularien u. a. erörtert und sodann die Modifikationen, welchen sämtliche Theile des Körpers je nach den Gattungen unterworfen sind, aufgezählt. Die Charaktere der ersten Stände, bisher nur von fünf Arten bekannt, werden nach Perri s angegeben. Eine Notiz über die geographische Verbreitung der Familie ergibt im Ganzen 746 Arten (620 vom Verf. beschrieben, 120 ihm unbekannt); von diesen kommen 92 auf Europa, 107 auf Afrika, 64 auf Asien, 294 auf Amerika und nur 16 auf Australien. Europa und Afrika haben 13, Europa und Asien 10, Afrika und Asien 4 Arten gemein; 12 Arten sind über den ganzen alten Continent verbreitet und 8 finden sich zugleich in der alten und neuen Welt. Von den 43 Gattungen der Familie sind *Hololepta*, *Platysoma* und *Saprinus* in allen Welttheilen vertreten, *Paromalus*, *Teretrius*, *Onthophilus* und *Abraeus* über alle Theile des alten Continents verbreitet; 10 Gattungen sind ausschliesslich amerikanisch, 1 (*Glymma*) europäisch, 9 afrikanisch, 3 asiatisch, 1 (*Aulacosternus*)

Afrika und Australien gemein, 1 (*Margarinotus*) den beiden Küsten des Mittelmeers eigenthümlich. — Von p. 130—147 giebt der Verf. eine Uebersicht über die frühere Literatur und ein Verzeichniss der von ihm benutzten Autoren, wobei jedoch noch die eine oder andere Lücke auszufüllen wäre; z. B. ist der *Conspectus Insect. Coleopt. Peruan.* von Erichson, in welchem 1 *Omalodes*, 2 *Hister*, 1 *Saprinus* und 1 *Teretrius* diagnosticirt sind, unberücksichtigt geblieben und die bezeichneten Arten daher auch von Marseul übergangen worden: der von ihm beschriebene *Saprinus lepidus* wird daher auch seinen Namen wegen der so benannten Erichson'schen Art ändern müssen. — Es folgt nun eine synoptische Tabelle der Tribus und Gattungen und eine Aufnahme mehrerer Arten nach den Beschreibungen anderer Autoren, welche in der Monographie ausgelassen und dem Verf. selbst unbekannt geblieben sind. Diesen schliesst sich ein Supplement zu dem speziellen Theile der Arbeit an, welches die Beschreibung einer neuen Gattung und einer Anzahl neuer Arten (p. 397 ff.) enthält, welche, wie früher, auf pl. 10 und 11 sämmtlich abgebildet sind. Es sind folgende: *Hololepta Perraudieri* von Teneriffa und *Baulnyi* aus Ostindien, *Trypaneus breviculus* und *Carthagenus* aus Columbien, *Platysoma Murrayi* von Old-Calabar, *Confucius* aus China, *Hister Assamensis*, *Iamaecola* und *Thibetanus* aus Ostindien, *montanus* aus Abyssinien, *Calabaricus* von Old-Calabar, *coelestis* aus China, *Jekelii* von Shanghai, *Kurdistanus* aus Kurdistan, *Peyronii* aus Syrien, *Sennevillei* aus Californien. *Coelocraera* n. g. eine kurz eiförmige, gewölbte Form von nicht besonders auffallendem Habitus, die an einer tiefen Grube des Scheitels und stark gerieften Flügeldecken nach Art der *Onthophilus*-Arten kenntlich ist. Die Gattung wird vom Verf. in die Nähe von *Monoplius*, *Pelorus* u. s. w. gestellt; eine Art: *C. costifera* von Old-Calabar. — *Hetaerius brunnipennis* von Nord-Amerika, *Tribalus mixtus* vom Cap, *Saprinus Turcicus* aus der Turkey, *Tyrius* und *Mersinae* aus Syrien, *desertorum* aus Nord-Amerika, *fugax* und *Boudista* aus Ostindien, *barbipes* aus Californien und *Plegaderus Barani* von Toulon. — Ein alphabetisches Verzeichniss der Arten so wie eine systematische Uebersicht der Tribus, Genera und Species mit Angabe der Autoren und des Vaterlands beschliesst die sehr werthvolle Arbeit.

Le Conte (Entomol. Report p. 35 f.) beschrieb *Hister sellatus*, *Saprinus estriatus* und *Teretrius obliquulus* als neue Arten aus Californien und dem Oregon-Gebiet.

Jacquelin du Val (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 46 ff.): *Epierus Antillarum*, *Paromalus productus*, *Saprinus Cavallieri*, *cubaecola* und *viator* (de Marseul) als n. A. aus Cuba.

Derselbe theilte eine Notiz über die Bildung der Unterlippe bei den Histeren mit im Bullet. d. l. soc. entomol. p. LV.

Roger (Verzeichniss der Käfer Oberschlesien p. 53) stellte *Hister silesiacus* von Rauden als neue Art auf, Wollaston (Catal. of Coleopt. Insects of Madeira p. 77) *Acritus homoeopathicus* n. A. von Madeira.

Nitidulariae. Eine eigenthümliche neue Gattung *Calonecrus* stellte Thomson (Archives entomol. I. p. 117. pl. 10. fig. 3) auf, ohne jedoch ihre wesentlichen Merkmale näher hervorzuheben. Die Fühler sind nach einem Exemplar des hiesigen Museums nicht zehn-, sondern elfgliedrig, nur dass die beiden letzten Glieder zu einem kugligen Knopfe verwachsen sind; das vorhergehende neunte Glied ist stark in die Quere gezogen, fast dreimal so breit als das achte. Ein sehr auffallendes Merkmal, welches der Verf. ebenfalls übersehen hat, bieten die Flügeldecken dar, indem sie an der Spitze nahe dem Aussenrande einen tiefen Schlitz zeigen, durch den sich ein äusserer kleiner Lappen absondert. Die Gattung tritt durch die sehr flachgedrückte Körperform an *Lordites* Er. heran, von der sie sonst habituell sehr abweicht. Art: *C. Wallacei* von Borneo (im hiesigen Museum von Java).

Neue Arten sind ausserdem: *Trogosita elongatula, soror, sulcifrons* und *transversicollis* Jacquelin du Val (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 104 ff.) von Cuba, *Epuraea nubila, Omosita inversa, Meligethes rufimanus, moerens* und *seminulum* Le Conte (Entomol. Report p. 36 f.) aus Californien und dem Oregon-Gebiete, *Ips japonica* Motschulsky (Etudes entomol. VI. p. 28) aus Japan, *Cercus spiraeae* Märkel (Allgem. Deutsche Naturhist. Zeitung 1857. p. 177) aus der Sächsischen Schweiz.

Jacquelin du Val hat die Identität seiner den Clambiden beigezählten neuen Gattung *Phantazomerus* (vergl. Jahresbericht 1854. p. 89) mit *Cybocephalus* Er. und seiner Art *Ph. aeneiceps* mit *Cyboc. pulchellus* Er. anerkannt. (Annales d. l. soc. entomol. V. p. 97).

Colydii. Neue Arten sind: *Tarphius formosus, sculptipennis, excisus* und *explicatus* Wollaston (Catal. of Coleopt. Ins. of Madeira p. 44 ff.) von Madeira, *Eulachus costatus* (Erichs. i. lit.) Thomson (Archives entomol. I. p. 422) von Cayenne, *Nematidium costipenne* Jacquelin du Val (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 103) von Cuba und *Cerylon simplex* Le Conte (Entomological Report p. 39) aus Californien.

Scriba berichtete (Entomolog. Zeitung p. 380) über das Vorkommen des *Oxylaemus caesus* Er. Er fand ihn in grosser Anzahl in Löchern, welche er dicht an einer alten Eiche, in der *Bostrichus villosus* und *monographus* hausten, in die Erde gegraben und mit Moos ausgefüllt hatte. S. glaubt, dass die Larve des *Oxylaemus* von den *Bostrichen*-Larven lebe und sich zur Verwandlung unter die Erde begeben. (Letzteres ist unwahrscheinlich, da sich wenigstens

Oxyl. cylindricus unter ganz fest anliegender Eichenrinde findet, wo er schon seine Verwandlung durchgemacht haben muss. Ref.).

Cucujides. *Silvanus gemellatus* von Cuba wurde von Jacquelin du Val (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 104) als neue Art aufgestellt.

Lathridii. Wollaston (Catal. of Coleopt. Ins. of Madeira p. 67 f.) beschrieb *Monotoma spinifera* und *congener* als n. A. von Madeira.

Thorictidae. Die Arten der Gattung Thorictus Germ. sind von Peyron („Note monographique sur le genre Thorictus de Germar,“ Annales d. la soc. entomol. V. p. 697—714) sorgsam untersucht und beschrieben worden. Der Verf. liefert zuvörderst eine nochmalige ausführliche Charakteristik der Gattung und giebt über die Lebensweise der Arten, welche er selbst an mehreren hat beobachten können, an, dass sie sich unter Steinen, am Fusse von Bäumen und alten Mauern, meist in Gesellschaft von Tegenien, Opatrum, Rhytirrhinus und Acalles aufhalten. (Von Staudinger sind sie in Andalusien in Gesellschaft von Ameisen unter Steinen gefunden worden. Ref.) Die zehn dem Verf. bekannt gewordenen Arten stammen sämtlich aus den Ländern des Mittelmeerbeckens, nämlich aus Süd-Europa, Algier, Aegypten und Syrien; sie werden in einer analytischen Tabelle auseinandergesetzt und in zwei Hauptabtheilungen gebracht, je nachdem die Flügeldecken bei den Schultern mit einer Falte versehen sind oder dieser ermangeln; das Vorhandensein oder der Mangel von Gruben auf dem Prothorax giebt ein ferneres Merkmal zur Unterscheidung der Arten ab. Diese sind: Thorictus castaneus Germ. aus Syrien, Nubien und Aegypten, *pilosus* aus Caramanien, mauritanicus Luc. aus Sicilien, Spanien und Algier, puncticollis Luc. aus Algier, *orientalis* aus Caramanien, *dimidiatus* ebendaher, grandicollis Germ. aus Algier, Sicilien, Süd-Frankreich und der Turkey, *loricatus* (Dej.) = Sphaerophorus castaneus Walzl aus Spanien, laticollis Motsch. aus der Turkey, dem Caucasus und Caramanien, *gallicus* aus Süd-Frankreich.

Cryptophagides. Wollaston hat die in England einheimischen Arten der Gattung Atomaria einem genauen Studium unterworfen und besonders auch die in der Stephens'schen Sammlung befindlichen Typen zu dessen Beschreibungen mit den Arten der continentalen Autoren in Vergleich gebracht. („Revision of the British Atomariae, with observations on the genus.“ Transact. entom. soc. IV. p. 64—82.) In Bezug auf die Gattung bemerkt Wollaston, dass ihre Uebereinstimmung mit Ephistemus so gross sei, dass nur zwei Merkmale von einiger Haltbarkeit zwischen beiden aufgestellt werden könnten. Bei Atomaria findet sich unmittelbar vor der Spitze der Mandibeln ein kleiner Zahn und die Fühlerglieder sind (wenn auch

nicht stets sehr hervortretend) abwechselnd lang und kurz; der Habitus, die kurze, kuglige Körperform und die kürzeren Beine von Ephistemus seien wenig massgebend, indem einige Atomarien, z. B. eine von Madeira stammende, die Wollaston selbst auch als Ephistemus beschrieben habe, dieser Form ganz nahe träten. — Die in England vorkommenden Arten, welche von W. aufgezählt und beschrieben werden, belaufen sich auf 23; es sind *At. ferruginea* Sahlb. (*pallida* Woll.), *fimetarii* Hbst., *linearis* Steph., *elongatula* Erichs., *umbrina* Gyll. (*nigrirostris* Steph.), *nigriventris* Steph. (*nana* Er.), *peltata* Kraatz, *fuscipes* Gyll. (*carbonaria* Steph.), *pusilla* Payk., *atrica-pilla* Steph. (*nigriceps* Er.), *Berolinensis* Kraatz, *fuscata* Schönh. (*castanea et rufipes* Steph.), *gutta* Steph., *atra* Hbst., *mesomelas* Hbst. (*dimidiata* Steph.), *basalis* Er., *munda* Er., *nigripennis* Payk., *Hislopi* nov. spec., *apicalis* Er., *analis* Er. (*testacea et atra* Steph.), *ruficornis* Steph., *versicolor* Er. — In der Stephens'schen Sammlung fanden sich öfters unter einer Benennung mehrere Arten vereinigt, so dass die typischen Exemplare nicht herauszufinden waren; nur in einigen Fällen liessen sich Erichson'sche Arten auf die früheren von Stephens zurückführen.

Derselbe (Catal. of Coleopt. Insects of Madeira p. 59) beschrieb *Paramecosoma simplex* und *Atomaria insecta* als neue Arten von Madeira.

Le Conte (Entomol. Report p. 39) *Atomaria laetula* aus Californien.

Mycetophagidae. *Litargus pilosus* Wollaston (Catal. of Coleopt. Insects of Madeira p. 71) ist eine neue Art von Madeira.

Dermestini. Peyron (Annales de la soc. entomol. V. p. 719 ff.) beschrieb *Attagenus Redtenbacheri* n. A. aus Caramanien, zur Gruppe des *Attag. maritimus* Gené, *dispar* Redt. und *obtusus* Schönh. gehörend, für welche Arten der Verf. die Gattung *Telopes* Redt. aufrecht erhalten wissen will. Ausserdem *Anthrenus albidus* (Dej. Cat.) n. A. aus Marseille.

Azambre (Bullet. d. l. soc. entomol. p. XVII) fand Dermestes-artige Larven in Nestern geselliger Hymenopteren (Apiarien), aus deren einer sich *Megatoma undata* entwickelte; leider hat der Verf. die Charaktere dieser noch unbekannten Larve nicht angegeben.

Byrrhii. Nach Märkel (Allgem. Deutsche Naturhist. Zeitung 1857. p. 178) sind die Byrrhus-Arten pflanzenfressende Thiere und zwar nährt sich *Byrrhus ornatus* von Moos an feuchten Felsen; *Byrrhus arietinus* Steff. sieht M. als eine von *B. pillula* verschiedene Art an.

Lamellicornia. Description de quelques espèces nouvelles de Coléoptères Lamellicornes par Snellen van Vollenhoven (Mémoires d'entomologie, publ. p. l. soc. entom. des Pays-Bas I,

p. 20—27. pl. II); enthält Beschreibungen und Abbildungen einiger ausgezeichneten Arten der Dynastiden- und Cetoniarien-Gruppe aus dem Leydener Museum.

Dynastidae. — *Oryctes cristatus* und *Polyphemus* n. A. von Snellen van Vollenhoven (a. a. O. p. 21. pl. II) aus Guinea.

Trionychus castaneipennis, *Pentodon contractus*, *Syrichthus cribratus*, *Heteronychus paradoxus* und *tristis* n. A. aus dem Caffernlande von Boheman (Insect. Caffrar. II. p. 2 ff.).

Xylotrupes Mac Leayi, *Scarabæus dubius*, *Woodlarkianus*, *excavatus*, *triangularis*, *Cyclocephala bimaculata* und *Montargisii* n. A. von der Insel Woodlark, von Montrouzier (Annales de la soc. d'agricult. de Lyon VII. 1. p. 19 ff.).

Ancognatha Jamesonii und *crassimanus* n. A. aus Quito von Murray (Edinburgh new philosoph. journal, new ser. V. p. 230. pl. III. fig. 3. 4).

Cetoniariae. — Thomson (Archives entomol. I. p. 162) charakterisirte die Gattung *Incala* White, deren Unterschiede von der Süd-Amerikanischen Gattung *Inca* er in den unbewaffneten Vordersehenkeln, der Form des Kopfschildes, welches beim Weibchen stärker verlängert, beim Männchen schmaler und vorn breiter und abgerundet ist, und in der abweichenden Form des Prothorax findet. Eine als neu beschriebene Art von Gabon ist *Incala Quimalanca*; vielleicht gehört auch *Inca lineola* Westw. dieser Gattung an. — Neue Arten sind: *Trichius Bowringii* von Shangai (p. 118), *Cotinis Amazonica* und *Gymnetis Batesii* (= *G. schistazea* Burm.) vom Amazonenstrom (p. 135), *Bombodes Westwoodii* (pl. 14. fig. 2) aus Nord-Indien, *Macronota venerea* von Celebes, *Euryomia (Gametis) dulcinea*, *lasciva* und *Natalensis* von Pt. Natal (p. 283 ff.). — *Lomaptera Wallacei*, *validipes*, *adelpha*, *Arouensis* und *Schizorrhina Emiliae* (White?) von den Arou-Inseln, auf pl. 16 abgebildet.

Snellen van Vollenhoven (Mémoires d'entomologie, publ. p. 1. soc. entom. des Pays-Bas I. p. 23 ff. pl. II) gab Beschreibungen und Abbildungen von *Chalcothea affinis* von Borneo, *Macronota Forsteri* von Celebes, *suturalis* von Sumatra, *luctuosa* von Amboina und *aurantiaca* von Sumatra, sämmtlich ausgezeichnete neue Arten.

Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VII. 1. p. 24 ff.) beschrieb *Cetonia Marceani*, *humeralis*, *Kirbyi* und *Lomaptera punctata* als n. A. von S. Cristoval und Woodlark.

Boheman (Insecta Caffrariae II. p. 10 ff.) beschrieb zahlreiche neue Arten vom Caffernlande: *Goliath albosignatus*, *Genyodonta egregia*, *Discopeltis bellula*, *Trichostetha placida*, *Tephraea collaris*, *Oxythyrea dysenterica*, *vitticollis*, *Anoplochilus figuratus*, *Protaetia amakosa*, *Pachnoda albopicta*, *Elaphinis latecostata*, *nigritula*, *pumila*, *Diplognatha variegata*, *Macroma emarginicollis*, *Ptychophorus*

margaritiferus, *hilaris*, *Hoplostomus platycephalus*, *Coenochilus glabratus*, *Genuchus nigriclavus*, *Scaptobius Natalensis*, *Trogodes rotundicollis*, *Lissogenius luteovarius* und *Valgus plumatus*.

Sallé „Description d'une Gymnétide provenant des environs de Santa-Fé de Bogotà (Annales de la soc. entomol. V. p. 617 f.) machte unter dem Namen *Allorhina Lansbergei* eine sehr ausgezeichnete neue Gymnetiden-Form bekannt, welche mit der Gattung *Allorhina* in keiner näheren Beziehung steht, sondern, falls sie nicht zu einer eigenen Gattung erhoben werden soll, eine viel grössere Annäherung an *Gymnetis* darbietet. In der allgemeinen Körperform und der Bekleidung der Oberfläche mit letzterer Gattung übereinkommend, unterscheidet sie sich davon durch eigenthümlichen Goliathiden-ähnlichen Kopfschmuck; der Scheitel ist nämlich tief ausgehöhlt, die Seiten des Kopfes zu einer hohen, scharfen, winkligen Kante erhoben, der Vorderrand des Thorax vorgezogen und in einen den Kopf überragenden, hakenartigen Fortsatz endigend. Die Art (pl. 13 abgebildet) ist oberhalb matt lehmgelb, schwarz gesprenkelt, unten atlasglänzend blau.

Cremastochilus angularis ist eine neue Art von Le Conte (Entomolog. Report p. 37) aus Californien.

v. Motschulsky (Etudes entomol. VI. p. 112) bringt die früher von ihm als *Cremastochilus scabrosus* beschriebene Art zur Gattung *Clinterocera*; er giebt zugleich an, dass diese Art heteromerisch sei.

Rutelidae. — Neue Arten aus dem Caffernlande von Boheman (Insecta Caffrariae II. p. 59 ff.) sind: *Popilia limbata*, *Anomala resplendens*, *castanea*, *fusciceps*, *dorsata*, *vittipennis*, *Bohemani*, *Aloretus punctipennis*, *maculatus*, *laticeps*, *testaceus*, *impurus*, *nasutus*, *picinus*, *pecticollis*, *nigriceps*, *flaveolus* und *fuscus*.

Von Murray (Edinburgh new philosoph. journal, new. ser. V. p. 226 ff.): *Chlorota lineata*, *euchloroides* und *Leucothyreus gigas* n. A. von Quito, letztere auf pl. III. fig. 5 abgebildet.

Von v. Motschulsky (Etudes entomol. VI. p. 32): *Mimela Gaschkewitschii* aus Japan.

Melolonthidae. — Von Boheman (Insecta Caffrariae II. p. 77 ff.) wurden folgende neue Arten und Gattungen beschrieben: *Clitopa fervida*, *Leontochaeta fusciventris*, *Onocheta Natalensis*, *rufiventris*. *Haplobrachium* n. g. Kopf vorn quer eingedrückt, an der Spitze fast abgestutzt, mit stark aufgebogenem Rande; Lippentaster viergliedrig, das letzte Glied dicker als die beiden vorhergehenden, ihnen zusammen fast an Länge gleich; Augen gross, rund, mit erhabener Linie, die von der Vorderseite bis zur Mitte geht; Fühler zehngliedrig, das 4. bis 6. Glied etwas länger als die übrigen, die Keule sehr lang, dreiblättrig. Brustbein vorn scharf gedorn; Beine lang,

alle Schienen aussen wenig erweitert, unbewehrt, Tarsen lang, kräftig mit langgestrecktem Endgliede, Klauen an der Basis gezähnt. Schildchen gross, dreieckig, Flügeldecken mit fast gleichbreiten Seiten, gewölbt, vielrieffig. Zwei Arten: *Haplobrachium costipenne* und *sulcipenne*. — *Coniopholis ferruginea*, *decora*, *pilosicollis*, *costicollis*, *Hypopholis vittata*, *sulcicollis*, *Apogonia ovata*, *Ancylonycha adspersa*, *Schizonycha valida*, *rufina*, *puncticollis*, *carbonaria*, *russula*, *neglecta*, *oblonga*, *affinis*. — *Diplotropis* n. g. Kopf mit zwei Stirnleisten, vorn jäh verengt, an der Spitze tief dreieckig ausgeschnitten; Lippentaster eingliedrig, das 2. Glied länglich, das 3. kurz, das 4. dicker, den beiden vorhergehenden an Länge fast gleich; Augen klein, Fühler zehngliedrig, Keule länglich, siebenblättrig. Beine ziemlich lang, zart, Schenkel mässig verdickt, Vorderschienen aussen mit zwei scharfen Zähnen, der an der Spitze kräftiger, Hinterschienen stachlig; Tarsen lang, zart, die vier ersten Glieder untereinander gleich, das fünfte doppelt so lang; Klauen klein, stumpf gezähnt. Gestalt fast wie von *Schizonycha*. Drei Arten: *Dipl. nigrina*, *rufina* und *castanea*, alle drei $7\frac{1}{2}$ mill. lang. — Ferner: *Ablabera castanea*, *innocua*, *verticalis*, *rufipennis*, *rufina*, *unicolor*, *testacea*, *pallidula*, *pilosa*, *apicalis*, *variabilis*, *morio*, *flavipennis*, *pulicaria*, *pilosula*, *Camenta rufiventris*, *Pleophylla maculipennis*, *pilosa*, *Trochalus picipes*, *ferrugineus*, *obtus*, *byrrhinus*, *splendidulus*, *fulgidus*, *aeneus*, *chloris*, *crassus*, *breviusculus*, *pallidipennis*, *Serica puberula*, *curtula*, *Triodonta caffra*, *sericans*, *tenella*, *Anisonyx pilosus*, *lanatus*, *Peritrichia sulcicollis*, *Eriesthis variegata*, *hoplioides*, *Goniaspidius lepidus*, *lividipennis*, *Dichelus sulphureus*, *armipes*, *caffer*, *contractus*, *pruinus*, *Gymnoloma elegantula*, *Microplus luctuosus*, *pumilus*.

Thomson gab (Archives entomol. I. p. 148. pl. 10. fig. 4) die Beschreibung und Abbildung einer Mexikanischen Melolonthiden-Form, die er irriger Weise der Gattung *Chrysina* beizählt und *Chrys. Truquii* nennt. Die Gattung, der diese Art angehört, ist neu und würde in die Nähe von *Plectris* Burm. zu stellen sein, obwohl ihre habituelle Aehnlichkeit mit den Ruteliden leicht dazu verleiten könnte, sie diesen beizuzählen. Nach dem hiesigen Museum kommen in Mexiko mehrere Arten dieser Gattung vor.

v. Motschulsky (Etudes entomol. VI. p. 32) charakterisirte eine neue Gattung *Heptophylla*, im Habitus mit *Schizonycha* verwandt; Parapleuren des Metathorax schmal, Epimeren sehr klein, Oberlippe tief ausgerandet, Lippentaster auf der Aussenseite des Kinns eingefügt; Fühler 11gliedrig mit kurzem 4. Gliede und 7gliedriger Keule; Stirnleisten wenig ausgeprägt und unterbrochen; Klauen zweitheilig oder selbst bis auf den Grund gespalten. Art: *Hept. picea* aus Japan. — *Serica orientalis*, *Hoplia obducta* und *sabulicola* n. A. ebendaher.

Fernere neue Arten sind: *Tryssus comatus*, *Diplotaxis brevi-*

collis, *Dichelonycha valida*, *fulgida*, *Serica anthracina*, *Camptorhina serotina* und *Hoplia irrorata* Le Conte (Entomol. Report p. 38 ff.) aus Californien und dem Oregon-Gebiete, *Ancylonycha puberula*, *confusa*, *subsericans* und *bifoveolata* Jacquelin du Val (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 55) von Cuba, *Rhizotrogus punctatissimus* Montrouzier (Annales de la soc. d'agricult. de Lyon VII. 1. p. 24) von Woodlark und *Rhizotrogus Guyonii* Lucas (Bullet. d. l. soc. entomol. p. LXXXVI) aus Algier, mit Rhiz. Guerardi Buq. zunächst verwandt.

Hybosoridae. — Jacquelin du Val charakterisirte (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 57) *Trichops testaceus* (Dej. i. lit.) von Cuba; die Gattung ist übrigens unter dem Namen Hapalonychus beschrieben und muss daher so benannt werden. — Boheman (Insect. Caffrar. II. p. 369): *Hybosorus ruficornis* n. A. aus dem Caffernlande.

Geotrupini. — *Geotrupes laevistriatus* und *auratus* aus Japan wurden von v. Motschulsky (Etudes entomol. VI. p. 31) beschrieben, *Bolboceras caffer*, *consocius*, *rufotestaceus*, *maculicollis* und *dorsualis* aus dem Caffernlande von Boheman (Insect. Caffrar. II. p. 371 ff.).

Aphodiidae. — Boheman (Insecta Caffrariae II. p. 329 ff.) stellte eine Gattung *Syba* auf, bei welcher der Kopf mehr denn doppelt so breit als lang, der Thorax um die Hälfte breiter als lang, an der Spitze abgestutzt, in der Mitte der Basis etwas dreieckig nach hinten hervortretend, das Schildchen verlängert, abgerundet, die Flügeldecken mässig gewölbt, dreikeilig, an der Spitze ausgezogen, die Unterseite des Körpers flach, die Vorderschienen aussen sehr stark erweitert, dreizählig, innen mit einem Längskiele versehen, die hinteren fast drehrund, aussen zweikantig, innen kurz und dicht behaart sind. Die Gattung scheint mit Rhyparus zunächst verwandt zu sein; zwei Arten: *S. sulcicollis* und *impressicollis*. Ausserdem werden folgende neue Arten aus dem Caffernlande beschrieben: *Aphodius productus*, *ferrugineus*, *amabilis*, *rubricosus*, *nigritulus*, *lucidulus*, *consimilis*, *granulatus*, *gracilis*, *timidus*, *discoidalis*, *posticus*, *haematicius*, *Wahlbergii*, *peregrinus*, *calcaratus* (*humilis* Roth.?), *amoenus*, *misellus*, *badius*, *pygmaeus*, *evanescens*, *vestitus*, *puberulus*, *costipennis*, *sulcipennis* und *Amoecius lugubris*.

Le Conte (Entomol. Report p. 41 f.) beschrieb *Aphodius pectoralis*, *rubidus*, *pardalis*, *subaeneus*, *Aegialia crassa* und *caelata* aus Californien. Jacquelin du Val (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 51) *Psammodius gracilis* von Cuba.

Orphnidae. — *Orphnus rufulus* Boheman (Insect. Caffrar. II. p. 368) ist eine neue Art aus dem Caffernlande.

Coprides. — Eine neue Gattung und zahlreiche neue Arten aus Süd-Afrika wurden von Boheman (Insecta Caffrariae II. p. 162 ff.)

bekannt gemacht: *Ateuchus (Heliocantharus) profanus, cupreus, metallicus, nigroaeneus, Clericus, (Actinophorus) caffer, paradoxus, interstitialis, ambiguus, microcephalus, (Sebasteos) rusticus, funebris, cicatricosus, (Pachylomera?) horridus, Pachysoma validum, Gymnopleurus caffer, unicolor, Wahlbergii, subcupratus, coracinus, Lichtensteinii* (humeralis Klug?), *smaragdinus, cupreus, Sisypheus appendiculatus, fasciculatus, rubripes, sordidus, caffer, Chalconotus convexus, pumilus, Epirhinus sulcipennis, obtusus, armatus, Epilissus subtilis.* — *Odontoloma* n. g. Kopf breit und kurz, scharf vierzählig, die beiden Mittelzähne weiter auseinander stehend, der Vorderrand kaum ausgebuchtet; Thorax quer, doppelt so breit als lang, fast gleich breit, in der Quere gewölbt, Schildchen fehlend; Flügeldecken eiförmig, vorn ausgeschnitten; Schenkel unbewehrt, Vorderschienen dreizählig, Mittelschienen dicht und lang geborstet, Tarsen kurz, dünn. Art: *Odontoloma pauxillum*, $2\frac{1}{2}$ mill. lang. — Ferner: *Paedaria costata, tuberculata, picea, cylindrica, Coptorhina nitidipennis, obtusicornis, Delopleurus pullus, Heliocopris Neptunus, Faunus, Catharsius obtusicornis, Ulysses, laticeps, areolatus, vitulus, troglodytes, Copris laticornis, urus, Victorini, contracta, obesa, mutica, confusa, modesta, puncticollis, Onitis paradoxus, robustus, perplexus, fodiens, caffer, viridulus, picticollis, porculus, Onthophagus metallicus, aulicus, collaris* (loricatus Klug?), *naso, praeustus, columella, aciculatus, stercorarius, sapphirinus, parumnotatus, trinodosus, gracilicornis, interstitialis, moestus, glaber, pugionatus, lugubris, obtusicornis, lugens, monodon, setosus, opacus, impictus, pilosus, costipennis, scabrosus, pedestris, apicalis, obesus, intermedius, talpa, piceus, histerinus, pallidipennis, signatus, hybridus, quadrinodosus, verticalis, ferrugineus, chalcostomus, pusio, pusillus, obtusus, inconspicuus, brevicornis, viridicollis, Oniticellus planatus, militaris, variegatus, Depranocerus ambiguus, impressicollis, dispar und laticollis.*

Fernere neue Arten sind: *Phanaeus velutinus* Murray (Edinburgh new philosoph. journal, new ser. V p. 225) von Quito, *Phanaeus Chabrillacii* Thomson (Archives entomol. I. p. 115) aus Brasilien, *Onthophagus apustulatus* (Fab.?) und *sexstriatus* Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 22) von Woodlark, *Canthon simplex* Le Conte (Entomol. Report p. 41) aus dem Oregon-Gebiete.

Trogidae. — Boheman (Insecta Caffrariae II. p. 377 ff.) beschrieb *Trox incultus, melancholicus, variolosus, rusticus, talpa, angulatus* und *penicillatus* als neue Arten aus dem Caffernlande.

Lucanini. — Murray (Edinburgh new philosoph. journal, new ser. V. p. 221 ff.) machte eine neue Art der Gattung *Sphenognathus* unter dem Namen *Sphen. Lindenii* (pl. III. fig. 1. 2.) von Quito bekannt, die sich von *Sph. prionoides* Buq. durch stärkeren Erz-

glanz, längere Mandibeln beim Männchen u. s. w. unterscheidet; beide Geschlechter beschrieben und abgebildet.

Fernere neue Arten sind: *Hexarthrus Mniszechii* Thomson (Archives entomol. I. p. 396. pl. 14) aus Sylhet, in beiden Geschlechtern abgebildet, *Figulus Woodlarkianus*, *Cladognathus cinctus* und *chelifer* (M. Leay?) Montrouzier (Annales d. l. soc. d'agricult. de Lyon VII. 1. p. 26 ff.) von Woodlark, *Lucanus* (Hexarthrius?) *inclinatus* und *Psallidostomus* (?) *rectus* v. Motschulsky (Etudes entomol. VI. p. 29) aus Japan, *Dorcus adspersus* Boheman (Insect. Caffrar. II. p. 384) aus dem Caffernlande.

Le Conte beschrieb (Entomol. Report p. 42) *Sinodendron rugosum* Mannerh. nach beiden Geschlechtern und gab eine Abbildung derselben auf Taf. I. Fig. 15.

Passalidae. — Enumération des espèces mexicaines du genre *Passalus*, avec un tableau synoptique de toutes les espèces et la description de celles qui sont nouvelles, par M. E. Truqui (Revue et Magas. de Zoologie IX. p. 258—269 und p. 308—317). Der Verf. hat aus verschiedenen grösseren Sammlungen im Ganzen 26 Mexikanische *Passalus*-Arten zusammengebracht, deren Charaktere er in einer analytischen Tabelle darstellt; eine Anzahl neuer Arten wird beschrieben und zu mehreren bereits bekannten sind erläuternde Notizen beigebracht. Die neuen Arten sind: *Pass. heros*, *brevis*, *hirtus*, *rimator*, *incisus*, *erosus*, *inops*, *cognatus*, *corticicola*, *eclipticus*, *zodiacus*, *cuspidatus*, *Astecus*, *Mexicanus*, *laticornis* und *bicornis*.

Zwei neue Arten aus Guatemala machte Thomson (Archives entomol. I. p. 420 ff. pl. 21) bekannt: *Passalus opacipennis*, eine durch breite Körperform und matt schwarze Flügeldecken sehr ausgezeichnete Art, und *Pass. Goryi* Melly i. lit.

Von der Insel Woodlark sind *Passalus foreicollis* und *furcicornis* durch Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 28 f.) zur Kenntniss gekommen.

Buprestides. Die anatomischen Verhältnisse der Buprestiden sind von Laboulbène und Dufour in Thomson's Archives entomol. I. p. 206, 373 und 465 ff. in drei Abhandlungen sorgfältig erläutert worden. Die erste derselben von Laboulbène „Recherches sur les appareils de la digestion et de la reproduction du Buprestis (*Anthaxia*) manca“ (a. a. O. p. 206—233. pl. XI—XII) behandelt den Tractus intestinalis und die Geschlechtsorgane von *Anthaxia manca*. In den dünnen Oesophagus mündet jederseits eine voluminöse birnförmige Tasche mit sehr kurzem Ausführungsgange, die zuweilen mit einer hellbraunen Pulpa angefüllt war; der Magen verlängert sich bei seinem Beginne und zu jeder Seite von der Einmündung der Speiseröhre in zwei lange blinde Fortsätze, die sich nach vorn in den Thorax hineinerstrecken, gekerbte Ränder besitzen und offenbar sehr

drüsenreich sind. Eine gleiche drüsig-gelappte Oberfläche zeigt übrigens der darmförmige Magen bis zum letzten Drittheil seiner Länge; an seinem hinteren Ende münden sechs sehr kurze Vasa Malpighi ein und der darauf folgende sehr kurze Darm erscheint in der Mitte seiner Länge durch vier kurze, sackartige Ausstülpungen, welche im Kreise neben einander liegen, in einen Dünn- und Mastdarm geschieden. An den männlichen Genitalien sind die Hoden fast kugelförmig, von einer gelben Hülle umgeben, ihre Ausführungsgänge bis zu ihrer Vereinigung halb so lang als der aus ihnen entstehende Ductus excretorius; in letzteren mündet eine weisse, nierenförmige Drüse mit einem kurzen Canale, in erstere vor ihrer Vereinigung lange, fadenförmige Glandulae accessoriae. An den weiblichen Geschlechtsorganen bestehen die Ovarien aus sechs Eiröhren, die Bursa copulatrix und das Receptaculum seminis münden fast an gleicher Stelle in den gemeinsamen Eileiter, wo dieser durch Vereinigung der beiden Tuben seinen Ursprung nimmt. Der Verf. erörtert ausser den plastischen Eigenthümlichkeiten dieser beiden Organsysteme auch ihre feinere histologische Beschaffenheit und fügt am Schlusse noch einige Bemerkungen über die Struktur der Antennen und des Athmungsapparats hinzu. — Der zweite Artikel von L. Dufour „Fragments d'anatomie entomologique sur les Buprestides“ (ebenda p. 373—380. pl. XV) weist an *Capnodis tenebrionis* mehrere wesentliche Abweichungen in der Struktur des Tractus intestinalis von der bei *Anthaxia* beobachteten nach; der Oesophagus ist ausserordentlich kurz, nimmt aber ebenfalls zwei seitliche Taschen, die hier jedoch sehr langgestreckt, dornartig, fast von $\frac{2}{3}$ der Magenlänge und $\frac{1}{3}$ des Querdurchmessers des Magens sind, auf; der Verf. bezeichnet sie als „panse“ und vermuthet, dass sie vielleicht zur Aufnahme nicht gehörig verdauter Substanzen dienen, auch wohl gar ein Wiederkäuen zu Wege bringen. Der Darm von *Capnodis* ist von beträchtlicher Länge, sogar länger als der Magen, eine Gränze zwischen Dünn- und Mastdarm nicht bemerkbar, letzterer aber durch beträchtliche Weite ausgezeichnet. Besonders bemerkenswerth ist das Vorhandensein von zwei sehr langen Speicheldrüsen, die mit einem kurzen Ausführungsgange neben der Speiseröhre in den Kopf eintreten. Bei *Dicerca aenea* weist der Verf. zwei ähnliche hörnerartige Fortsätze des Magens nach, wie sie sich bei *Anthaxia* vorfanden, während dieselben bei *Capnodis* mangeln. Die männlichen Geschlechtsorgane von *Caraebus bifasciatus*, welche der Verf. ebenfalls zum Gegenstande seiner Darstellung macht, stimmen mit denen von *Anthaxia* im Wesentlichen überein. — Die dritte Arbeit, wieder von Laboulbène, enthält Untersuchungen über die Anatomie der *Buprestis gigantea* Lin. (ebenda p. 465—484. pl. XV) und zwar 1) über die Stigmen, 2) über die weiblichen Genitalien und 3) über den Tractus intestinalis. Die weitläufige Abhand-

lung über die Stigmen, in welcher der Nachweis geliefert wird, dass am Hinterrande der drei Thoraxringe je ein Stigmenpaar liege, von denen das Dritte eigentlich als erstes Abdominalstigma anzusprechen sei, enthält nichts Neues, da diese Anordnung der Stigmata allen Insekten zukommt und längst genügend bekannt ist. Interessant ist die Bildung der zum Schutze der Stigmenöffnung auf dem Peritrema sitzenden Haare, welche hier auf der einen Seite gabelförmig gespalten, auf der anderen dick, dornenartig und mit Seitendornen bewaffnet sind (Fig. 11—15). Von den weiblichen Genitalien ist zu erwähnen, dass die Ovarien aus zwölf Eiröhren bestehen, dass das Receptaculum seminis (ob Fettdrüse?) lang und dünn, darmförmig ist, und dass die Bursa copulatrix als tassenförmige Ausstülpung des Oviductus bei der Vereinigung der beiden Tuben erscheint. Den Verbindungsapparat betreffend, so sind die beiden taschenförmigen Anhänge des Oesophagus bei *Bupr. gigantea* klein, eiförmig, die Vasa Malpighi nur zu vieren vorhanden.

Eine Reihe neuer Arten und Gattungen wurde von Thomson (Archives entomol. I) charakterisirt; p. 109 ff.: *Chalcophora* (*Erides*) *Wallacei*, *flammea* und *sexspinosa* von Borneo, *Stigmodera rugosipennis*, *secularis*, *Daphnis*, *latithorax*, *coelesta*, *acutithorax*, *auricollis*, *liliputana* und *mustela maior* aus Neu-Holland, *pantherina* von Borneo. — p. 116: *Tetragonoschema* n. g. nach der Abbildung (pl. 10. fig. 2) von *Cryptocephalus*-ähnlicher Körperform, indem die Flügeldecken zusammen fast ein Quadrat bilden und den Hinterleib nicht ganz bedecken; Thorax quer viereckig, seitlich gerundet, nach vorn verschmälert; Clypeus vorn wenig ausgerandet, mit gerundeten Lappen; Fühlergruben mässig gross, das zweite und vierte Fühlerglied am grössten, die folgenden stark gesägt. Art: *T. chrysomelina*, $4\frac{1}{2}$ mill. lang, schön dunkelblau, von Haiti (ist = *Anthaxia quadrata* Buq.). — p. 168: *Tyndaris* n. g. für die Chilenische *Ptosima planata* Gory, welche Lacordaire als generisch verschieden bezeichnet, errichtet. — p. 430 ff. *Chrysodema callepyga*, *renerea*, *Chalcophora Stevensii*, *Arouensis* von den Arou-Inseln, auf pl. 16 abgebildet.

Neue Arten von Montrouzier (Annales de la soc. d'agricult. de Lyon VII, 1. p. 9 ff.) sind: *Buprestis Lottinii*, *Erides Cristallensis*, *Woodlarkiana*, *Buprestis Boisduralii*, *Wallisii*, *Chrysobothrys serpuntata* und *Agrilus hibisci* von den Inseln Woodlark und San Cristovall.

Von Jacquelin du Val (Historia fisica de la isla de Cuba VII, 1. p. 26 ff.): *Acmaeodera pulcherrima*, *cubaecola*, *Buprestis* (*Ancylochira*) *chalcoptera*, *Polycesta angulosa* aus Cuba.

Von Le Conte (Entomol. Report p. 42 ff.): *Ancylochira Gibbii*, *laeviventris*, *Buprestis angulicollis*, *Melanophila consputa*, *Anthaxia*

xia expansa, *Dicerca pectorosa* und *crassicollis*, *Polycesta californica* aus dem Oregon-Gebiete und Californien.

Derselbe stellte (Proceed. of the acad. of nat. scienc. of Philadelphia 1857. p. 6 ff.) einen „Index to the Buprestidae of the United States, described in the work of Laporte and Gory, with notes“ zusammen, bei denjenigen Arten, welche ihm aus eigener Anschauung bekannt sind, die Namen vermerkend, unter denen sie anderweitig, besonders von Nord-Amerikanischen Autoren beschrieben worden sind.

Agrilus Darwinii wurde endlich noch von Wollaston (Catal. of Coleopt. Insects of Madeira p. 82) als neue Art von Madeira aufgestellt.

Bemerkungen über Lacordaire's Buprestiden-System lieferte v. Kiesenwetter (Berliner Entomol. Zeitschr. I. p. 169 ff.); Ref. kann darüber nur bemerken, dass für die Systematik einer Familie, welche, wie die der Buprestiden, in ihren Hauptformen exotisch ist, die Europäische Fauna gar keinen Anhalt gewähren kann.

Duméril las in der Akad. d. Wissensch. zu Paris (Comptes rendus 16. Févr., Revue et Magas. de Zoologie IX. p. 85 ff.) einen Bericht über eine Arbeit von Leprieur, welcher die Larven der *Trachys pygmaea* im Parenchym der Blätter von *Malva sylvestris*, *rotundifolia* und *Alcaea rosea* aufgefunden hat. Auf den Blättern der Malven finden sich gelbe, blasenartige Flecke, in welchen die Larve lebt und sich binnen zwei bis drei Wochen zur Nymphe umbildet; beide sollen von sehr eigenthümlicher Form sein. Schon Réaumur habe die Nymphe und den Käfer, aber nicht die Larve gekannt. (In neuerer Zeit ist das Factum des Blattminirens der *Trachys*-Larven übrigens schon durch Heeger im J. 1851 an *Trachys nana* festgestellt worden. Ref.)

Throscidae. Drei neue Arten von Cuba wurden von Jacquelin du Val (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 29 f.) unter den Namen *Drapetes nigripennis*, *cyanipennis* und *azureus* bekannt gemacht. Der *Dr. cyanipennis* des Verf. ist jedoch mit *Lisso-mus bicolor* Lap. identisch.

Eucnemides. Neue Arten sind: *Galba dichroa* und *tomentosa* Montrouzier (Annales de la soc. d'agricult. de Lyon VII, 1. p. 12) von Woodlark, *Perothops Witticki* Le Conte (Entomol. Report p. 45) aus Californien und *Microrhagus Emyi* Rouzet (Annales de la soc. entomol. V. p. 749) von Dijon in Frankreich.

Cussac gab (Annales de la soc. entomol. pl. 12, Bulletin p. LXXIV) eine Abbildung und Beschreibung der Nymphe von *Eucnemis capucina*, die er im Holze von *Populus alba* aufgefunden hat.

Elaterides. Eine monographische Bearbeitung dieser schwierigen und artenreichen Familie hat M. E. Candèze unternommen und den ersten Theil derselben unter dem Titel: Monographie des

Elatérides par M. E. Candèze, Tome I. Liège 1857 (Mémoires de la soc. royale des sciences de Liège, Tome XII) veröffentlicht. Der Verf. hat alle Mittel angewandt, um seinem Werke einerseits die grösstmögliche Vollständigkeit in Betreff des in dasselbe eintretenden Materials, andererseits eine sichere Bestimmung der von früheren Autoren aufgestellten Gattungen und Arten zuzuwenden: er hat dies nicht nur durch die Benutzung fast aller ihm zu Gebote gestellten grösseren Europäischen und Nord - Amerikanischen Sammlungen, sondern auch durch den Vergleich aller ihm zugänglichen Typen seiner Vorgänger zu bewerkstelligen gewusst. Unter letzteren waren ausser den von französischen Autoren beschriebenen Arten ganz besonders die von Eschscholtz, Germar, Erichson, Klug, Boheman und Le Conte von besonderer Wichtigkeit. — Der Verf. beginnt sein Werk mit einer kurzen Erörterung des äusseren Körperbaues und der Hauptmodifikationen, denen die verschiedenen Theile unterworfen sind, schliesst hieran eine Uebersicht der von Eschscholtz und Le Conte aufgestellten systematischen Eintheilungen der Familie und geht dann sogleich zu der Feststellung der acht Gruppen, in welche er, sich genau an Lacordaire anschliessend, die Familie zerlegt, über. Diese Gruppen sind: die Agrypniden, Melanactiden, Hemirrhypiden, Chalcoplediiden, Oxynopteriden, Tetralobiden, die eigentlichen Elateriden und die Campyliden, letztere von allen vorhergehenden durch das nach vorn zugespitzte Mesosternum und das nicht über das Kinn hervorgezogene Prosternum scharf unterschieden. In Betreff ihres Umfangs sind diese Gruppen äusserst ungleich; während die der eigentlichen Elateriden den bei weitem grössten Theil aller bekannten Arten umfasst, zeigen sich die übrigen verhältnissmässig arm an Gattungen sowohl wie an Arten, übertreffen aber jene durch Eigenthümlichkeiten in der Form und durch Schönheit, so wie meist auch an Grösse der Arten. Im vorliegenden ersten Bande sind die sechs ersten Gruppen abgehandelt, womit der interessantere und freilich auch der leichtere Theil der Monographie beendet ist; möge dem Verf. die nöthige Ausdauer zur Seite stehen, um den noch übrig bleibenden, durch die ungeheure Masse und die ermüdende Gleichförmigkeit der Arten bei weitem schwierigeren Theil, in ebenso glücklicher Weise zu überwältigen! — Die Gruppe der Agrypniden zerfällt der Verf. in 14 Gattungen, die er, je nachdem die Tarsenglieder ohne lamellenartige Anhänge an der Unterseite oder mit solchen versehen sind, in zwei Abtheilungen bringt. Von diesen Gattungen sind neu aufgestellte: *Scaphoderus* mit 1 Art aus Chile, *Oceneus* mit 1 Art aus Brasilien, *Optaleus* (auf *Agrypnus punctipennis* Dej., *Lacon cribratus* Blanch. gegründet) mit 4 Arten aus Brasilien, *Meristus* (Typus: *Ela-ter lepidotus* Palis.) mit 4 winzigen Arten der alten und neuen Welt, *Agraeus* mit 1 Art aus Java, *Pericus* mit 1 Art aus Ostindien, *Myr-*

modes mit 1 Art aus Neu-Holland, *Eidolus* mit 1 Art aus Brasilien, *Hemicleus* mit 1 Art aus dem Caffernlande. Die Gruppe umfasst im Ganzen 186 Arten aller Welttheile. — Die Gruppe der Melanactiden enthält 7 Gattungen, von denen *Aphileus* mit 2 Arten aus Australien, *Anaissus* mit 1 Art aus Neu-Granada, *Ischius* mit 1 Art aus Guyana, *Aliteus* (Typus: *Elat. adpersus* Herbst) mit 2 Arten vom Cap neu aufgestellt sind; nur 12 Arten treten in diese Gruppe ein. — Die Gruppe der Hemirrhipiden umfasst 8 Gattungen, von denen nur *Chalcolepis* mit 1 Art aus Cayenne und *Tetrigus* mit 2 Arten aus Ostindien neu sind; ausserdem hat der Verf. den Gattungsnamen *Iphis* Lap. für die prachtvollen Madagascarensischen Arten in *Lycoreus* umgeändert. Die Gruppe enthält 58 Arten, mit die schönsten und seltensten der ganzen Familie. — Die Gruppe der Chalcolepidier theilt sich in 4 Gattungen: *Chalcolepidius* mit 31, *Semiotus* mit 47, *Oistus* n. g. mit 2 Mexikanischen Arten und *Campsosternus* mit 17 A. — Die Oxypteriden-Gruppe enthält 4 Gattungen mit 7 Arten und zwar bringt der Verf. die Gattung *Beliophorus* Esch., die nach des Ref. Ansicht in nächster Verwandtschaft mit *Ludius* steht, hier unter. — Die Gruppe der Tetralobiden endlich beschränkt sich auf die einzige Gattung *Tetralobus*, von der gegenwärtig 18 Arten bekannt sind. — Das Werk ist mit 7 vom Verf. selbst gezeichneten und in Steindruck sauber ausgeführten Tafeln ausgestattet, welche Repräsentanten sämmtlicher Gattungen (bei artenreichen die verschiedensten und interessantesten Formen) in sehr naturgetreuer Weise darstellen; ausserdem sind auch einzelne, systematisch wichtige Körpertheile wiedergegeben. — Was den wissenschaftlichen Werth der vorliegenden Arbeit betrifft, so trägt Ref., der sie in allen einzelnen Theilen einer genauen Prüfung mit Hinzuziehung der hiesigen Königl. Sammlung, die jetzt darnach bestimmt und geordnet ist, unterworfen hat, kein Bedenken, sie für eine der vorzüglichsten unter der neueren systematisch-entomologischen Literatur zu bezeichnen. Der Verf. hat sich einer Methode für die Charakteristik der Gattungen und Arten befleißigt, die nur Beifall verdienen kann; die Beschreibungen geben ein leicht fassliches Bild, heben stets die wesentlichen Charaktere scharf hervor und enthalten nichts Ueberflüssiges, zeichnen sich also in allen diesen Beziehungen vor der Mehrzahl der täglich erscheinenden Beschreibungen sehr vortheilhaft aus. In Betreff der Gattungen hat der Verf. ebenfalls den sehr zu empfehlenden Grundsatz festgehalten, für die Abgränzung und Aufstellung derselben nur wesentliche, unveränderliche Charaktere zu Hülfe zu nehmen, nicht aber nach der Zersplitterungsmethode der Neuzeit spezifische Charaktere zu generellen zu erheben und so eine natürliche Gattung künstlich zu zerstückeln. Die Literatur ist mit einer Umsicht und Kritik behandelt, wie es von einem Schüler Lacordaire's zu erwarten war und nur sehr vereinzelte

Irrthümer und Auslassungen liessen sich in dieser Beziehung nachweisen; zu diesen gehören: *Alaus senegalensis* Lap. (p. 220) ist offenbar der *Elater excavatus* Fabr.; unter der Gattung *Alaus* fehlt der *Elater appendiculatus* Herbst; *Calais patricia* Cand. (p. 242) ist der *Elater luscus* Oliv. pl. 6. fig. 64 b.; *Lacon cylindricus* Cand. (p. 121) ist nach Vergleich mit den Typen der hiesigen Sammlung der *Elater truncatus* Herbst Taf. 166. Fig. 12; unter *Lacon* fehlt *L. cervinus* Erichs. von Manilla; *Tilotarsus Boieldieui* Cand. (p. 176) ist der wirkliche *L. cuspidatus* Klug, dagegen *Til. cuspidatus* Cand. als *Til. einctipes* Germ. aufzuführen.

Thomson (Archives entomol. I. p. 164) beschrieb unter dem Namen *Julodischema Lacordairei* eine neue Gattung und Art aus Borneo, welche das Ansehn einer *Julodis* haben und zur Gruppe der Oxynopteriden gehören soll. Augen sehr gross, erstes Fühlerglied dick, die folgenden mit Ausnahme des abgerundeten letzten gekämmt; Maxillartaster sehr viel länger als die Lippentaster, das vorletzte Glied das längste, das letzte abgestutzt, an den Lippentastern beilförmig; Prosternalstachel gross, verlängert, Schildchen kreisrund, Flügeldecken sehr gewölbt, im hinteren Drittheil etwas breiter als im vorderen, an der Spitze abgerundet.

Als neue Arten wurden ausserdem beschrieben:

Von Le Conte (Entomol. Report p. 45 ff.): *Athous scissus*, *Limonius ornatulus*, *Corymbites Suckleyi* und *festivus*, *Agriotes macer*, *Elater rhodopus*, *caprella* und *Adelocera aurorata* aus Californien und dem Oregon-Gebiete.

Von Jacquelin du Val (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 31 ff.): *Dicrepidius Sagraianus*, *venustus* und *Alaus patricius* (ist der *Elater luscus* Oliv.) von Cuba.

Von Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 14 f.): *Agrypnus tomentosus*, *Elater tuberculatus*, *Makirensis*, *melanopterus* (*Cryptochile melanoptera* Latr.?) und *variabilis* von Woodlark.

Von Newman (Transact. of the entomol. soc. IV. p. 51 ff.): *Elater (Alaus) Gibboni* und (*Dorcostoma*) *Jansonii* von der Moreton-Bay in Neu-Holland.

Von Wollaston (Annals and magaz. of nat. hist. XX. p. 505): *Monocrepidius* (?) *Grayii* von den Cap Verdischen Inseln.

Brauer (Sitzungsberichte des zoolog.-botan. Vereins in Wien VII. p. 132) erzog aus der früher von ihm beschriebenen Larve, welche er (Zoolog.-botan. Verein II. p. 33) als muthmassliche Neuropteren-Larve ansprach, den *Elater equiseti* Herbst. Erwähnenswerth ist, dass die im Sande lebende Raupe eine Fliege, die ihr in den Behälter gesetzt wurde, verzehrte; sie zog dieselbe mit dem Maule unter den Sand, frass sie aus und liess nur die harten Theile derselben übrig.

Ein lebender Pyrophorus wurde durch ein Schiff aus Bahia mit nach Hamburg gebracht; derselbe nahm Nahrung zu sich und gab im Dunkeln ein helles, grünliches Licht aus den beiden Thoraxflecken von sich. (Archiv d. Vereins d. Freunde der Naturgesch. in Meklenburg XI. p. 151.)

Rhipicerides. *Callirhipis impressus* Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 13) ist eine neue Art von der Insel Woodlark.

Dascillidae. *Cyphon Hausmanni* wurde von Gredler (Käfer von Passeier) als n. A. aus Tyrol aufgestellt.

Malacodermata. Melyrides. — Neue Arten sind: *Malachius miniatus*, *humeralis*, *Anthocomus citrinoguttatus*, *Charopus formicarius* und *Zygia rostrata* Reiche (Annales d. l. soc. entomol. V. p. 178 ff. pl. 5) aus Syrien und Palästina, *Ebaeus congressarius* Fairmaire (ebenda p. 637) aus der Gegend von Montpellier, *Troglops Dufourii* Perris (Annales de la soc. Linnéenne de Lyon IV. p. 128) aus den Grandes-Landes, *Malachius gracilis* Miller (Wiener Entomol. Monatsschr. I. p. 138) aus Oesterreich, *Melyrosoma abdominale* Wolleston (Catal. of Coleopt. Insects of Madeira p. 87) von Madeira.

Jacquelin du Val (Annales de la soc. entomol. V. p. 93) glaubt, dass *Charopus grandicollis* Kiesenw. mit *Char. pallipes* Oliv. identisch sei und will dagegen den *Char. pallipes* Er. mit *Char. flavipes* Payk. vereinigt wissen. Erstere Art sei in ganz Frankreich und auch um Paris sehr häufig, letztere dagegen fehle ganz und scheine auf Schweden und Deutschland beschränkt zu sein.

Heeger (Sitzungsberichte der mathem.-naturw. Classe der Akad. d. Wissensch. zu Wien XXIV. p. 320 ff.) gab Nachricht über die ersten Stände des *Malachius bipustulatus* Fabr. und ihre Lebensweise. Die Larven überwintern unter Baumrinde oder an anderen geschützten Orten und leben hier von todtten Larven und Puppen verschiedener Insekten; sie verpuppen sich im Mai oder Juni in einem Gehäuse von Holzspänchen. (Abbildung auf Taf. 3.)

Telephorides. — Dietrich gab eine Aufzählung und Charakteristik der bei Zürich von ihm aufgefundenen Telephorus-Arten, von denen er einige für neu hält und beschreibt. (Entomol. Zeitung p. 118—132.) Von den zwanzig vom Verf. aufgeführten Arten werden *T. tigurinus*, *cyaneus*, *nigritulus*, *rotundicollis* und *desertus* als neu aufgestellt, *T. lividus* Lin. und *dispar* Fab. als Varietäten derselben Art nachgewiesen, *T. lituratus* Gyll. (pro parte) als var. zu *T. rufus* Lin. gezogen; von bekannten Arten kommen ausserdem bei Zürich vor und werden vom Verf. meist ausführlich charakterisirt: *T. violaceus* Payk., *fuscus* Lin., *rusticus* Fall., *obscurus* Lin., *nigricans* Fab., *pellucidus* Fab., *bicolor* Gyll., *rufescens* Letzn., *lituratus* Gyll., *clypeatus* Illig., *sudeticus* Letzn., *assimilis* Payk. und *albomarginatus*

Märk. — Den in Bremi's Catalog der Schweizerischen Coleopteren von ihm aufgestellten *Malthodes obscuriusculus* hält Dietrich gegenwärtig für identisch mit *M. mysticus* Kies. (ebenda p. 132).

v. Motschulsky (Etudes entomol. VI. p. 27) stellte eine neue Gattung *Themus* auf, die mit *Podabrus* in der Form übereinstimmt, sich aber durch einfache Klauen unterscheidet; Endglied der Taster beilförmig und zusammengedrückt, Kopf hervortretend, Augen wenig hervorspringend, mehr vorn als seitlich stehend. Art: *Th. cyanipennis* aus Japan.

Neue Arten sind ferner: *Telephorus marginiventris*, *dimidiatipes*, *tripunctatus* und *Malthodes Berytensis* Reiche (Annales de la soc. entomol. V. p. 169 ff.) aus Beirut, *Telephorus haemorrhoidalis* und *apicalis* Reiche (ebenda) aus Athen, *Telephorus puncticollis* Levrat (Annales d. la soc. Linnéenne de Lyon IV. p. 418) aus Sicilien, *Telephorus (Cantharis) Meisteri* Gredler (Käfer von Passeier) aus Tyrol, *Telephorus larvalis* Le Conte (Entomol. Report p. 48) aus dem Oregon-Gebiete, *Silis marginella* Jacquelin du Val (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 39) von Cuba.

Lycides. — A. Costa (Memorie della Reale Accademia delle scienze di Napoli II. p. 220) machte eine neue Gattung *Phaeopterus* mit einer Art: *Ph. unicolor* aus Neapel bekannt, welche mit *Homalitus* nahe verwandt, von dieser durch abweichenden Habitus, die Längsverhältnisse der Fühlerglieder, von denen das dritte kürzer als das zweite ist, durch kürzere Maxillartaster, kleine Mandibeln u. s. w. sich unterscheidet. Als Charaktere der Gattung sind aufgestellt: „Caput detectum, infra minime protractum, fronte in medio impressa, ac utrinque in gibberem antenniferum elevata. Antennae articulae (?), articulis primis tribus magnitudine decrescentibus. Pronotum utrinque linea longitudinali elevata, antice subtruncatum, angulis posticis acute productis. Tarsi articulo quarto profunde bilobo.“ Die Art ist auf der beifolgenden Tafel Fig. 1 dargestellt, ist $1\frac{1}{2}$ lin. lang und zeichnet sich durch sehr dicht und lang behaarte Fühlhörner aus.

Als neue Arten von Cuba wurden von Jacquelin du Val (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 34 ff.) *Calopteron aulicum*, *elegantulum*, *distinguendum*, *suave* und *amabile* beschrieben, von Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 16) *Lycus Woodlarkianus* als n. A. von der Insel Woodlark.

Lampyrides. — Von Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 78) wurde eine neue Gattung *Lycoides* mit einer Art *L. chrysomelas* von der Insel Woodlark beschrieben, welche mit dem Habitus eines *Lycus* die Charaktere der Lampyriden verbindet; Halsschild convex, fast kuglig, das 2. und 3. Fühlerglied viel kürzer als die folgenden, die übrigen gesägt.

Neue Arten sind ferner: *Lychnuris janthinipennis*, *dimidiati-*

pennis, *Photinus gamma*, *limbipennis*, *blandus*, *Photuris brunnipennis* Jacquelin du Val (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 37 ff.), *Ellychnia facula* Le Conte (Entomol. Report p. 48) vom Oregon, *Luciola lucifer* Reiche (Annales de la soc. entomol. V. p. 169 ff.) von Beirut und *Luciola dispar* Fairmaire (ebenda p. 739) vom Bosphorus.

In Newport's schriftlichem Nachlasse fanden sich werthvolle Beobachtungen über die Naturgeschichte der *Lampyrus noctiluca* vor, welche von Prof. Ellis zusammengestellt und im Journal of the proceedings of the Linnean society, Zoology I. p. 40—71 veröffentlicht worden sind. („On the natural history of the Glowworm, *Lampyrus noctiluca*, by the late George Newport, prepared from the author's Mscpt. by George Viner Ellis. Communicated by the Secretary.“) — Die sehr ausführliche Newport'sche Darstellung der Naturgeschichte des Leuchtkäfers erstreckt sich auf alle Stadien der Entwicklung vom Erscheinen des Eies bis zur Ausbildung der Imago und enthält zahlreiche ebenso interessante als werthvolle Beobachtungen, welche vollständig mitzutheilen der hier zustehende Raum nicht gestattet. Indem wir daher auf die Abhandlung als eine für Insektenbiologie besonders wichtige und interessante hinweisen, beschränken wir uns darauf, die wesentlichsten Punkte in Kurzem hervorzuheben. In dem Abschnitte, welcher die Lebensweise der Imago behandelt, geht der Verf. besonders auf die Art und die Intensität des Leuchtens ein; letztere zeigt ihre beträchtlichste Steigerung bei Weibchen am zweiten oder dritten Tage nach dem Ausschlüpfen aus der Puppe und zwar bei solchen, die noch nicht begattet worden sind; nach dem Coitus dagegen nimmt die Leuchtkraft sehr ab. Das Männchen stirbt bald nach der Paarung, das Weibchen, nachdem es zuvor seine Eier abgelegt hat; Weibchen, die nicht befruchtet werden, — was bei der Seltenheit und der kurzen Erscheinungsperiode der Männchen sehr häufig vorkommt — leben dagegen ziemlich lange und nehmen von Abend zu Abend an Leuchtkraft zu. Die Paarung der beiden Geschlechter, welche von Newport an Individuen, die aus Puppen erzogen worden waren, beobachtet wurde, dauert anderthalb Stunden und das Männchen beginnt damit 24 Stunden nach seiner Ausbildung; übrigens wird sie oft noch später, während das Weibchen schon Eier ablegt, wiederholt, so dass es scheint, als genüge eine einmalige Befruchtung nicht, um alle Eier zur Entwicklung zu bringen. Auch die unbefruchteten Weibchen legen mehrere Tage nach ihrer Entwicklung aus der Puppe Eier ab, jedoch immer nur eins oder zwei; ihr Leib erreicht ebenfalls durch die herangereiften Eier eine beträchtliche Ausdehnung. Die Eier werden seltner an Grasstengel, meistens an die Wurzelfasern abgesetzt, jedoch stets über der Erde; durch eine klebrige Masse, mit der sie im Momente des Austrittes überzogen sind, werden sie an die Graswurzeln oder

Halme befestigt. Das Leuchten der Eier, welches von einigen Beobachtern bestritten wird, findet nach Newport allerdings statt, ist indessen, sobald sie das Ovarium verlassen haben, sehr schwach und scheint von dem Klebestoffe, mit dem sie überzogen sind, herzurühren; während sie noch vom Ovarium umschlossen sind, ist das Leuchten deutlicher sichtbar und wird beim Eintauchen in Wasser verstärkt. Die Entwicklung der Larve im Ei ist nicht beobachtet worden; die Larve schlüpft aus demselben nach 35 bis 45 Tagen, je nach der obwaltenden Temperatur, aus; sie ist im ersten Augenblicke weisslich, wird aber binnen einigen Stunden zuerst grau und dann dunkelschwarz und bewegt sich bald sehr lebhaft. Die Nahrung der Larven besteht bekanntlich in lebendigen Schnecken (*Helix*), welche sie mit grosser Gier verzehren; sie beißen zuerst in die Fühlhörner und es scheint, als wenn die in Folge dessen eintretende Schwächung der Schnecken nicht allein durch die mechanische Wirkung des Bisses hervorgerufen würde, sondern dass dabei eine Art von Vergiftung im Spiele ist; wenigstens tritt während des Bisses eine Flüssigkeit aus dem Munde der Larve hervor. Nach angestellten Versuchen, die auf p. 53—59 ausführlich beschrieben werden, stirbt eine kleine *Helix* durch den einmaligen Biss der *Lampyris*-Larve binnen zwei Stunden, eine grössere wenigstens in Folge von zwei bis drei Bissen, die dann zuerst am Fusse und erst nachher an den Fühlhörnern der Schnecke ausgeübt werden. Die erste Häutung der Larven erfolgt nach achtzehn, die zweite nach ebenso viel Tagen; ihre Gefrässigkeit ist ausserordentlich, indem sie nach Tödtung einer Schnecke dieselbe nicht eher verlassen, als bis sie völlig verzehrt ist; sodann reinigen sie sich mittelst des von Maille beschriebenen Apparates am Ende des letzten Körperringes von dem ihrem Körper anhaftenden Schleime. Die Leuchtfähigkeit besitzen die Larven nicht nur, wie allgemein bekannt, im späteren Alter, sondern von ihrem Austritte aus dem Eie an; ja dieses selbst lässt in seiner letzten Periode einen deutlichen Schimmer, der offenbar von dem leuchtenden Embryo herührt, erkennen. Auch der Larve ist die Fähigkeit eigen, das Leuchten zu verstärken und zu vermindern; besonders durch Mangel an Frass oder in der ersten Minute nach einer plötzlichen Beunruhigung der Larve wird das Licht auffällig schwächer; es verschwindet fast ganz bei stark vermindelter Temperatur während des Winters, in welcher Jahreszeit die Larven zugleich zu fressen aufhören und sich in einem Zustande von Erstarrung befinden. Bei allmählig zunehmender Wärme im Frühjahr beginnen die Larven wieder heranzukriechen und zu fressen, bis sie zu Anfang Juni sich zur Nymphe verwandeln, welche besonders hell leuchtet; aus dieser entwickelten sich die Weibchen nach sieben, die Männchen nach elf Tagen zur Imago. Durch gewisse äussere Umstände veranlasst, kann übrigens

die Entwicklung der Larven so verzögert werden, dass sie erst im zweiten Jahre ihr vollständiges Wachsthum erreichen.

Clerii. Montrouzier (Annales d. scienc. phys. de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 17) errichtete eine neue Gattung *Bostrichoides*, vom Ansehn eines *Bostrichus*, und von *Cylidrus*, dem sie durch das verlängerte Halsschild und den gleich breiten Hinterleib gleicht, durch nicht ausgerandete Augen und die nicht verlängerten ersten Glieder der Fühler unterschieden. Die Fühler verdicken sich unmerklich und endigen in eine Keule von 4 oder 5 Gliedern; sie sind vor den Augen von einander entfernt eingelenkt; Augen oval, Kopf, Halsschild und Hinterleib gleich breit, Halsschild verlängert, Flügeldecken am Ende abgestutzt; Körperform linear. Art: *B. angustatus* von Woodlark. Neue Arten: *Cylidrus villosus* und *Tillus? variegatus* ebendaher.

Le Conte (Entomol. Report p. 48) beschrieb *Enoplum dichroum* als n. A. aus Californien, Thomson (Archives entomol. I. p. 115) *Pallenis sanguineus* vom Gabon.

Jacquelin du Val (Annales soc. entomol. V. p. 93) machte Bemerkungen über die von Réaumur bezeichnete Trichodes-Larve, welche er gegen Perris für die des Trich. alvearius hält.

Ptiniores. Neue Arten sind: *Ptinus interruptus*, *Sinoxylon declive* und *Exops ovicollis* Le Conte (Entomol. Report p. 48 f.) aus Californien, *Apate destructor* Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 55) von der Insel Woodlark, *Ptinus nigrescens* Wollaston (Catal. of Coleopt. Insects of Madeira p. 91) von Madeira, *Gibbium Boieldieu* Levrat (Annales de la soc. Linnéenne de Lyon IV. p. 419) aus der Türkei und *Xyletinus striatipennis* Fairmaire (Annales de la soc. entomol. V. p. 638) von Montpellier.

Andrée (Bullet. de la soc. entomol. p. CXI) erzog *Ptinus Aubéi* Boield. in grösserer Anzahl aus abgefallenen Eichengallen, die schon in Fäulniss übergegangen waren; er fand im Innern derselben auch die Larven und Nymphen des Käfers.

Cissidae. Jacquelin du Val (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 100) beschrieb *Cis hirtellus*, *bipartitus*, *Ennearthron delicatulum* und *taurul* als neue Arten von Cuba.

Melasoma. Zahlreiche neue Arten aus dem Orient wurden von Reiche und de Sauley (Annales de la soc. entomol. V. p. 186—271) durch ausführliche Beschreibungen und zum Theil durch Abbildungen bekannt gemacht: *Arthrodeis globosus* (Latr.) von Beirut, *Anodesis giganteus* aus Natolien und Syrien, *Melancrus* (Dej.) n. g., auf den *Mel. compactus* Dej. beschränkt, während die übrigen darunter gestellten Arten zu *Oxycara* und *Gnophota* gehören; von *Oxycara* unterscheidet sich *Melancrus* durch die kürzere, mehr aufgetriebene Form des Körpers, das sichtbare Scutellum und den weniger

scharfen Prosternalfortsatz, welcher nicht in den Vorsprung des Mesosternum eindringt; von Gnophota durch die Bildung des Pro- und Mesosternum, welche in letzterer Gattung keinen Vorsprung zeigen. Drei Arten: *Melanocrus laevigatus* von Beirut, *hegetericus* vom todtten Meere und aus Egypten und *pygmaeus* (Waltl) ebendaher. — *Daiognatha crenata* von Nablus, *Calyptopsis Jeremias* von Jericho, *Solieri* von Jerusalem, *Dichomma Chevrolatii* aus Syrien, *Tentyria subsulcata* von Nablus, *Herculeana* von Jericho, *Solieri* und *discicollis* vom Rothen Meere, *collatina* von Jerusalem, *acuminata* aus dem Peloponnes, *Mesostena parvula* von Beirut, *Micipsa philistina* von Nablus, *Trachyderma philistina* und *Gomorrhana* aus Palaestina, *Thriptera asphaltidis* vom todtten Meere. *Gedeon* n. g. zur Pimelien-Gruppe gehörend und den Uebergang von *Pachyscelis* und den vorhergehenden Gattungen zu *Pimelia* vermittelnd, von allen Gattungen dieser Gruppe durch seine einfachen, nicht gespaltenen Mandibeln, das kurze Endglied der Maxillartaster und die hervorragende Oberlippe abweichend; von *Trachyderma* durch die Vorderschienen, welche die Form eines langgezogenen Dreiecks zeigen, sich entfernend. Art: *Gedeon hierichonticus* von Jericho. — *Adesmia arca* und *Olivieri* aus Palästina, *Microtelus careniceps* von Beirut, *Tagenia comata* und *fulvipes* aus Palästina, *Blaps longula* von Nablus, *indagator* von Jerusalem, *rotundicollis* aus dem Peloponnes, *tibialis* aus Griechenland, *convexa* von Beirut, *crassa* und *angulata* vom rothen Meere, *sodalis* aus Syrien, *Bioplanes impressus* von Jerusalem, *riduus* und *Syriacus* aus Syrien, *Opatrum soricinum* vom todtten Meere, *Scleron abbreviatum* und *Crypticus inflatus* aus dem Peloponnes, *longulus* aus Syrien, *Helops tuberculiger* von Athen, *fulvipes* und *acutipennis* aus Palästina, *Stenochia saracena* von Beirut. (Abbildung der neuen Gattungen und mehrerer neuen Arten auf pl. 5.) Den Beschreibungen sind zahlreiche synonymische Bemerkungen über verwandte Arten beigefügt und diese von einigen Gattungen (*Dichomma* p. 202, *Trachyderma* p. 217, *Adesmia* p. 227) aufgezählt; die in letzterer Gattung von Solier beschriebenen Arten führt Reiche auf die der früheren Autoren, wie Klug u. a. zurück.

Von Montrouzier (Annales d. scienc. phys. de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 29 ff.) wurden folgende Arten von der Insel Woodlark bekannt gemacht: *Opatrum australe* (Boisd.), *Cristovallense*, *Toxicum Richesianum*, *Chevrolati*, *Upis Lottinii* (Dup.), *Tenebrio rugulosus*, *emarginatus*, *Diaperis viridipennis*, *Uloma ferruginea*, *Helops aeneus*, *azureus*, *striatopunctatus*. Eine neue Gattung ist *Macrophthalmus*, zwischen den Helopiern und den Cistelinen in der Mitte stehend; Insertion der Fühler kaum bedeckt, diese länger als der Kopf und das Halsschild, fadenförmig, mit langgestreckten Gliedern; Kopf schmaler als das Halsschild, Augen sehr gross, sich

fast berührend, Halsschild fast viereckig, quer, Flügeldecken convex, verlängert; Schienen gerade, ohne Dorn, Vorderschenkel weder angeschwollen, noch gezähnt. Art: *M. coeruleus* 5 lin.

Von v. Motschulsky (Etudes entomol. VI. p. 34) wurde eine neue Gattung *Plesiophthalmus* aufgestellt, die mit *Amarygmus* und *Misolampus* zunächst verwandt sein soll; Augen gross, sehr genähert, die Stirn concav, Fühler länger als der halbe Körper, 3. Glied dreimal so lang als die beiden folgenden zusammengenommen, 4. kürzer als das 5. und dem 11. an Länge gleich; Vorderschenkel über der Mitte erweitert, Vorderschienen etwas gebogen, die hinteren gerade, 1. Tarsenglied der Hinterfüsse so lang als die drei folgenden zusammengenommen, Vordertarsen nicht erweitert; Lippentaster kurz, mit erweitertem und fast viereckigen letzten Gliede, Maxillartaster sehr hervorspringend, mit beilförmigem letzten Gliede; Körper oval, sehr gemitte erweitert, vorn und hinten zugespitzt. Art: *Ples. nigrocyaneus* wölbt; in der aus Japan; ebendaher *Gonocephalum coriaceum* n. A.

Wollaston (Catalogue of the Coleopterous Insects of Madeira p. 154) charakterisirte die Gattung *Autocera* Melly mscpt., von *Opatrum* durch nicht ausgerandeten Kopf, die Verhältnisse der Fühlerglieder, welche vom zweiten bis achten gleich gross sind, während die drei letzten eine wohl abgegränzte Keule bilden, durch das ovale Endglied der Maxillartaster, durch die grosse, breite, vorn ganzrandige Unterlippe, die stark erweiterten und zusammengedrückten, an der Spitze mit zwei grossen Sporen bewaffneten Vorderschienen und die sehr kurzen Tarsen unterschieden. Art: *Aut. laticeps* (pl. 1. fig. 2) von Madeira, auch der Mittelmeerfauna angehörend, 1¼ lin. lang. — Neue Arten sind ferner: *Ellipsodes oblongior* (glabratus var. Wollast. antea), *Hypophloeus ambiguus*, *Helops subdepressus*.

Derselbe (Annals and magaz. of nat. hist. XX. p. 505) beschrieb *Phaleria Clarkii* als n. A. von den Cap Verdischen Inseln.

Le Conte (Entomol. Report p. 46 ff.): *Nyctoporis galeata*, *Eleodes connexa*, *sulcipennis*, *granulata*, *humeralis*, *rotundipennis*, *stricta*, *subligata* (letztere drei mit *El. cordata* Esch. nahe verwandt, und nach Le C. selbst vielleicht nur Formen dieser Art), *Helops laetus*, *Platydemia Oregonense*, *Phaleria globosa* aus Californien und dem Oregon-Gebiete.

Jacquelin du Val (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 60 ff.): *Nosoderma echinatum* Dej. Cat., *Opatrinus punctulatus* Dej. Cat., *Helops azureus*, *granulipennis*, *Stenochia amethystina*, *Talamus crilrarius*, *Allecula flavipes* Dej. Cat. aus Cuba.

E. Truqui, „Generis Iphthimi characteres“ (Entomol. Zeitung p. 92—94) lieferte eine ausführliche Charakteristik der neben *Upis* und *Nyctobates* stehenden Gattung *Iphthimus* Dej. Cat. und beschrieb darunter folgende Arten: *Iphthimus italicus* aus Etrurien, *Croaticus*

aus Ungarn, Croatien und Griechenland, *Bellardii* aus Cypern und *serratus* (Nyctobates) Mannerh. aus Californien.

Lucas „Note sur les métamorphoses de l'*Alphitobius mauritanicus* Lin., précédée de quelques remarques synonymiques sur les espèces de ce genre, qui ont été rencontrées dans les possessions françaises du nord de l'Afrique“ (Annales de la soc. entomol. V. p. 71—84) gab eine ausführliche Beschreibung und auf pl. 4 eine Abbildung der ersten Stände des *Alphitobius mauritanicus* Lin. Die Larve, welche sich früher in grosser Anzahl in den Reptilien-Behältern des Jardin des plantes fand, wo sie zusammen mit den *Tenebrio*-Larven zur Fütterung der Amphibien benutzt wurde, hat mit dem gewöhnlichen Mehlwurm grosse Aehnlichkeit, weicht aber durch einfach zugespitztes, dreieckiges Endsegment ab. Die Synonymie der beiden in Algier vorkommenden Arten: *Alph. diaperinus* und *mauritanicus* wird von Lucas ausführlich erörtert.

Ueber die ersten Stände mehrerer Melasomen-Gattungen und Arten hat Perris (Insectes du pin maritime, Annales de la soc. entomol. V. p. 343—377. pl. 8 u. 9) ausführliche Mittheilungen gemacht und dieselben auf zwei beifolgenden Tafeln abgebildet; die in allen drei Entwicklungsstufen beschriebenen Arten leben sämmtlich in *Pinus maritima*. Es sind folgende: 1) *Platydemia europaea* Lap. Die Larve lebt unter der Rinde von den sich hier bildenden Schwämmen und spinnt sich zur Verwandlung in den Einkerbungen der Rinde ein rothgelbes elliptisches Gewebe; sie ist lederartig, glatt, fast linear, oben matt braun und convex, mit röthlichen Einschnitten, unten blasser, flachgedrückt; das letzte Segment endigt wie bei *Scaphidemia bicolor* und *Platydemia violacea* in zwei kurze Dornen. 2) *Uloma Perroudi* Muls. Die Larve ist rostroth, hornig, linear und vollkommen cylindrisch mit Ausnahme einer leichten Abplattung am Sternum; sie lebt im August in alten Fichtenstöcken, die von den Larven des *Ergates* durchfressen sind und liefert im Juni des nächsten Jahres den Käfer. Perris hält die Mulsant'sche Art von *Uloma culinaris* für vollkommen specifisch verschieden. 3) *Phthora crenata* Muls. Die Larve ist ganz weiss, mehr von lederartiger als horniger Consistenz, vollkommen glatt, glänzend, fadenförmig und cylindrisch; sie lebt vom Holze verfaulender Fichtenstöcke, in welche sie tiefe und schmale Gänge nach allen Richtungen hineingräbt und braucht zu ihrer Entwicklung nicht ein volles Jahr. Die Nymphe ist am Thorax mit Borsten, an den Seiten der Hinterleibssegmente mit zweizackigen Warzen besetzt, deren obere Zacke fast horizontal, die untere stark nach hinten gekrümmt ist. 4) *Hypophloens ferrugineus* Creutz. Die Larve gleicht der des *H. bicolor*, welche von Westwood abgebildet ist, ist glatt, linear, fast von horniger Consistenz, ziemlich convex auf der Oberseite und etwas schwächer gewölbt auf der Unterseite.

Sie ist nicht holzfressend, sondern ein Feind des *Tomicus stenographus*, dessen Larven sie verzehrt; der Käfer legt nämlich seine Eier in die Gallerieen des letzteren, wo die Larven beider fast gleichzeitig ausschlüpfen; da die *Hypophloeus*-Larven langsamer wachsen als die des *Bostrichus*, so entkommt von letzteren eine Anzahl den Angriffen der ersteren und entwickelt sich zum Käfer. 5) *Hypophloeus linearis*. Die Larve unterscheidet sich von der vorhergehenden durch mehr cylindrischen, nur am Sternum etwas abgeflachten Körper; sie führt einen entsprechenden Vernichtungskrieg gegen die Larve des *Tomicus bidens*. 6) *Tenebrio curvipes* Fabr. Die Larve ist fast von horniger Consistenz, glänzend, parallel, sehr gewölbt auf der Ober-, schwächer auf der Unterseite, in der Brustgegend abgeflacht. Sie zeigt mehrere wesentliche Unterschiede von den Larven des *Tenebrio molitor* und *obscurus*, welche denen des Käfers entsprechen, so dass Perris die Abtrennung der Art zu einer eigenen Gattung (*Menephilus* Muls.) gut heisst; unter anderen fehlen den Larven der beiden genannten Arten die Ocellen und das dritte Glied der Fühler ist (umgekehrt wie bei *T. curvipes*) länger als das zweite. 7) *Helops striatus* Geoffr. Die Larve gleicht ausserordentlich der des *Tenebrio curvipes*, hat jedoch nur zwei Ocellen und der Raum zwischen den beiden Haken des letzten Körpersegmentes ist einfach ausgeschnitten, ohne Zähne und Apophysen. Sie lebt wie die der vorigen Art ein oder zwei Jahre lang in den verwesenen Fichtenstöcken, welche schon von *Leptura*, *Criocephalus* oder *Ergates* angegriffen sind, und nährt sich theils von den Excrementen der letzteren, theils vom Holze. 8) *Prionychus ater* Fabr. Die Larve ist schon von Kyber, Waterhouse und Perris beschrieben worden; sie lebt sowohl in vielen Laub-Bäumen als in *Pinus maritima*. — Die Tenebrioniden-Larven im Allgemeinen zeigen im Aeusseren eine grosse Aehnlichkeit mit denen der Elateriden, unterscheiden sich aber von diesen durch das nicht mit der Stirn verwachsene Kopfschild und Oberlippe, durch die gegen das Kinn beweglichen Maxillen, einfache Maxillarlade, dreigliedrige Kiefertaster, längere Fühler, nicht gefurchte und gewöhnlich weniger dornige Füsse. Eigenthümlich ist die Ortsbewegung der Melasomen-Larven, welche ohne die wellenförmige Bewegung der weichleibigen Larven vor sich geht; nur die Beine vermitteln dieselbe und die Haken am hinteren Körperende verhindern das Zurückgleiten. Besonders auffallend ist der Unterschied zwischen der Form der Larven (sehr langgestreckt und schmal) und derjenigen der Nymphe und des Käfers (oft sehr breit und kurz). Ihre Nahrung ist sehr verschieden: einige leben im Humus und faulem Holze, andere von Excrementen, wieder andere von Pilzen und endlich fehlen auch (*Hypophloeus*) nicht carnivore.

Melandryadae. Perris (*Insectes du pin maritime*, An-

nales de la soc. entomol. V. p. 378—387) hat die Larven und Verwandlungsgeschichte von *Hallomenus flexuosus* Payk. und *humeralis* Fabr. beschrieben und durch Abbildungen auf pl. 9 erläutert. Die Larve des ersteren ist weiss, weich, cylindrisch-elliptisch, oben mit Warzen, seitlich mit Borsten versehen, auf den ersten Blick einer jungen Larve eines *Longicornen* ähnlich; sie lebt in *Boletus*, in den sie unregelmässige Gänge frisst, welche sie jedoch vor der Verwandlung stets nach der Aussenseite hin richtet, so dass der Käfer beim Ausschlüpfen nur eine dünne Wand zu durchbrechen hat. Der Nymphenzustand dauert nur acht bis zehn Tage; die Begattung dauert eine Stunde und gleich nach dieser legt das Weibchen seine weissen, sphärischen Eier in den Pilz, indem es seine Legeröhre in die oberste Lage desselben einführt. — Die Larve des Hall. *humeralis* ist etwas niedergedrückt, ziemlich lederartig, glänzend, wenig behaart und linear; sie frisst Gänge in *Polyporus maximus* und erreicht in 1½ Monaten ihre vollständige Grösse. In dieser Periode lässt sie sich aus dem Pilz heraus auf die Erde fallen, in welche sie sich einbohrt und erst im nächsten Sommer ihre Verwandlung eingeht; in einem Falle verwandelten sich jedoch die Larven im Pilze selbst. Die Larve zeigt sehr auffallende generische Verschiedenheiten von der vorhergehenden, weshalb Perris auch eine Trennung der beiden Arten in Vorschlag bringt (was jetzt durch Mulsant auch schon geschehen ist. Ref.).

Mulsant und Guillebeau (*Annales de la soc. Linnéenne de Lyon* IV. p. 414) beschrieben *Orchesia luteipalpis* n. A. von Lyon, mit *O. sepicola* verwandt.

Anthicidae. Wollaston (*Catal. of Coleopt. Insects of Madeira* p. 166) beschrieb *Anthicus Lubbockii* (tristis Woll. antea) n. A. von Madeira.

Boie, Notizen über das Vorkommen des *Anthicus ater*, *antherinus* und *rufipes* in Holstein (*Entomol. Zeitung* p. 193).

Mordellonae. *Mordella 9-guttata*, *textilis*, *Cristovalensis*, *8-guttata*, *setacea*, *Pelecotoma holosericeum* Montrouzier (*Annales de la soc. d'agriculture de Lyon* VII, 1. p. 33 ff.) n. A. von Woodlark, *Mordellistena flexipes* Mulsant und Rey (*Annales de la soc. Linnéenne de Lyon* IV. p. 411) n. A. von Hyères, *Anaspis assimilis* und *testacea* Snellen van Vollenhoven (*Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland* II. p. 70) aus den Niederlanden.

Vesicantia. Auf die interessante Abhandlung von Fabre „Mémoire sur l'hypermétamorphose et les mœurs des Méloïdes“ (*Annales des sciences naturelles*, 4. sér. VII. p. 299—365. pl. 17) ist schon im allgemeinen Theile dieses Berichtes ausführlich eingegangen und dort die in physiologischer Beziehung bemerkenswerthen Thatsachen hervorgehoben worden; es bleibt hier noch übrig, die

werthvollen Beobachtungen des Verf. über die Naturgeschichte von *Sitaris humeralis* und *Meloë cicatricosus* in Kurzem mitzuthellen. Sobald sich von *Sitaris* Männchen und Weibchen aus den Zellen von *Anthophora pilipes* entwickeln, gehen sie sofort an die Begattung, welche im Innern der Erdhöhle, in der sich das Bienenneest befindet, vorgenommen wird; überhaupt scheinen die Käfer ihren unterirdischen Aufenthaltsort gar nicht zu verlassen, indem man sie nirgends im Freien, etwa auf Blumen oder dgl. antrifft. Die Männchen sind so hitzig, dass sie oft dem Weibchen beim Ausschlüpfen aus ihrer Puppenhülle behülflich sind, ja oft dasselbe befruchten, während es noch halb darinnen steckt; einige Tage nach der Begattung sterben beide Theile, das Weibchen, nachdem es unmittelbar nach derselben seine Eier abgelegt hat. Die Eier werden etwa 2000 an Zahl binnen 36 Stunden in einem unförmlichen Häufchen innerhalb des Bienenbaues und zwar nicht weit von der Oeffnung, welche ins Freie führt, abgesetzt. Nach Verlauf eines Monats, nämlich Ende Septembers oder Anfang Oktobers schlüpfen die jungen Larven aus, welche schwarz gefärbt sind und in der Körperform den jungen *Meloë*-Larven gleichen (Abbildung pl. 17. fig. 2); sie bleiben während des ganzen Winters bis Ende Aprils des folgenden Jahres zusammen auf einem Fleck, und zwar zwischen den verlassenen Eihäuten sitzen, ohne irgend welche Nahrung zu sich zu nehmen und ohne sich zu verändern oder zu wachsen. Sobald im Frühjahr des folgenden Jahres die männlichen *Anthophoren* auszufliegen beginnen, findet man sie meist zu mehreren auf dem Thorax derselben, an dessen Haaren sie sich festklammern, sitzen; dass sie von diesen auf die Weibchen (wahrscheinlich während der Begattung) übergehen, hat Fabre durch Versuche festgestellt, indem er Männchen, die mit *Sitaris*-Larven besetzt waren, mit Weibchen in Berührung brachte und hierbei die Larven auf letztere sich begeben sah. Bevor F. die Lebensweise der jungen Larven und die Art, wie sie in die Bienenzellen gelangen, kannte, versuchte er ihnen sowohl Zellen mit Bienenlarven als auch solche, in denen nur Honig angesammelt war, vorzulegen; sie verschmähten beides und kamen, wenn sie auf den Honig gesetzt wurden, in diesem stets um. Ihre Einführung in die Bienenzellen konnte nur auf die Art vor sich gehen, dass sie in dem Momente, wo die Biene ein Ei in die Zelle und zwar auf die Oberfläche des Honigs legt, von dem Hinterleibe derselben auf das Ei übergingen, um sich auf dessen Oberfläche vor dem Ertrinken im Honig zu bewahren. Dass sich dies also verhält, ist von F. ebenfalls durch direkte Beobachtung bestätigt worden; er fand sowohl Bienenzellen unmittelbar nach dem Verschluss derselben mit einem Ei und der darauf sitzenden jungen *Sitaris*-Larve besetzt, als auch glückte es ihm, Zeuge davon zu sein, wie letztere mit ihren Mandibeln sich in das Ei einbiss und die in

demselben enthaltene Flüssigkeit verzehrte. Binnen acht Tagen ist der ganze Inhalt des Bienen-Eies verzehrt und nur noch die Hülle übrig, welche dazu dient, die junge Larve über dem Niveau des Honigs zu halten, dessen Berührung ihr zu dieser Zeit schädlich sein würde; zu dieser Zeit ist sie um das Doppelte ihres ursprünglichen Umfangs gewachsen und nachdem ihre Haut auf dem Rücken geborsten ist, erscheint sie unter der Form einer weissen, weichen Made, in welcher sie befähigt ist mit dem Honig in Berührung zu treten, der jetzt ihre Nahrung bildet. Nachdem sie ihre vollkommene Grösse erreicht, treten die eigenthümlichen Verwandlungen ein, welche oben erörtert worden sind; zuweilen ist die Periode der „pseudo-chrysalide“ nur von kurzer Dauer und das ausgebildete Insekt erscheint dann zu Anfang Septembers; in den meisten Fällen dagegen währt jener Zustand der Ruhe den Winter über und erst im Juni des folgenden Jahres beginnen die Umwandlungen zu der dritten Larvenform, der Nymphe und dem Käfer, der sich in 24 Stunden ausfärbt, jedoch noch 14 Tage länger in der bis dahin unversehrten Puppenhülle verbleibt, welche er gegen Mitte August durchbricht.

Die Entwicklungsgeschichte von *Meloë* hat *Fabre* zwar nicht in gleich erschöpfender Weise behandelt, jedoch wenigstens die bedeutendsten Lücken, welche sich in der *Newport'schen* Darstellung dieses Gegenstandes vorfinden, beseitigen können. Ueber das Eierlegen, das Ausschlüpfen der jungen Larven und ihren Uebergang auf den Körper der Biene stehen dem Verf. keine eigenen Beobachtungen zu Gebote (vergl. darüber *Newport Transact. Linnean. soc. XX*); als die Bienen-Arten, welche er bei Avignon mit *Meloë*-Larven besetzt fand, führt F. an: vier *Halictus*-Arten (sowohl Männchen als Weibchen), *Nomada fulvicornis* Männchen und *Andrena thoracica* Männchen, ferner von grabenden Hymenopteren die Männchen von *Scolia haemorrhoidalis* und *4-punctata*. Wie die auf letzteren befindlichen Larven zu einer ferneren Metamorphose gelangen können, ist nicht gut einzusehen, ebensowenig was mit denjenigen, die sich auf *Eristalis*-Arten begeben, geschieht; von den Volucellen, auf denen man ebenfalls die Larven findet, können sie begreiflicher Weise leicht in Hummelnester und -Zellen gelangen. — Die Bienen-Nester, in denen *Fabre* die *Meloë*-Larven selbst beobachtete, gehörten ebenfalls der *Anthophora pilipes* an; die kleine sechsbeinige Larvenform fand er einmal ganz ebenso wie die der *Sitaris* auf dem Bienen-Eie sitzend in einer eben geschlossenen Zelle vor, die zweite plumpe und weiche Form in verschiedenen Grössen und in entsprechender Weise in den Honig der Zelle, von dem sie sich nährte, eingebettet. Diese zweite Larvenform von *Meloë*, welche *Newport* gar nicht gekannt hat, weicht in ihrer Gestalt sehr wesentlich von der entsprechenden *Sitaris*-Larve ab; sie ist langgestreckt, wurstförmig, nach

hinten allmählig verdünnt, halbkreisförmig gebogen, mit grossem Kopfe, kräftigen Mandibeln und drei wohl ausgebildeten Fusspaaren. F. hat diese zweite Form in drei verschiedenen Entwicklungsstufen beobachtet, einmal in einer Länge von 4 mill., also gleich nach ihrer Entstehung aus der ersten Form, das zweite Mal in der Hälfte ihres Wachstums und eine dritte, welche fast den ganzen Honig-Vorrath verzehrt hatte und sich darauf zur „pseudo-chrysalide“ verwandelte. Der Zeitraum, in welchem sich diese zweite Form bis zu ihrer vollständigen Grösse entwickelt, dauert etwa 4—5 Wochen (Ende Mai bis Ende Juni), um welche Zeit sich nach Berstung ihrer Oberhaut die „pseudo-chrysalide“ entwickelt. (Beide Entwicklungsstufen sind auf pl. 17. fig. 7 und 8 abgebildet.) Zu Ende des August fand F. eine „pseudo-chrysalide“ von Meloë bis zum Stadium der Nymphe vorgeschritten, welche letztere sich aus der geborstenen Hülle der ersteren theilweise herausdrängte; da F. die dritte Larvenform in der pseudo-chrysalide nicht beobachtet hatte, glaubte er zuerst, sie fehle bei Meloë überhaupt; dies ist jedoch nicht der Fall, sondern sie fand sich zusammengeschrumpft am Ende der Nymphe hängend und zeigte bei näherer Untersuchung eine grosse Uebereinstimmung mit der zweiten Form. Uebrigens glaubt F. annehmen zu dürfen, dass die Entwicklung der Meloë in der Regel erst im Frühjahr des folgenden Jahres stattfindet, wofür auch ihr Erscheinen im Freien um diese Zeit spricht.

Von einer dritten Meloiden-Form (F. vermuthet darunter Zonitis) fand der Verf. nur eine todte pseudo-chrysalide in einem Neste der *Chalicodoma muraria* (auf pl. 17. fig. 9 dargesellt), welche eine grosse Form-Aehnlichkeit mit der gleichen Entwicklungsstufe von *Sitaris* hatte; sie war nicht von einem Hantsacke umgeben, wie jene, doch konnte derselbe leicht zerstört worden sein, da die Zelle, in welcher sie sich befand, sehr beschädigt war.

Eine Beobachtung von Lareynie über das Eierlegen der *Mylabris armeniaca* Fabr. wurde von Jacquelin du Val (*Annales de la soc. entomol.* V. p. 96) mitgetheilt. Gegen Ende des Juli und zu Anfang des August wählt sich das Weibchen einen sandigen Ort, in welchen es mit den Mandibeln eine Höhlung von der Form eines Fingerhutes eingräbt; sodann legt es die Spitze des Hinterleibs auf den Rand der Oeffnung und lässt nach und nach etwa dreissig dicke, gelblichweisse Eier hineingleiten. Nach Ablegung der Eier wird der ausgegrabene Sand wieder in das Loch hineingeschüttet und die Oeffnung dem Boden gleich gemacht. Lareynie glaubt nicht daran, dass die Larven in Bienen- und Wespennestern erzogen werden, da er die *Mylabris* nur an den Orten fand, wo das Jahr vorher die Weibchen Eier abgelegt hatten und viele derselben an ihren Flügeldecken noch deutliche Spuren eines Aufenthaltes unter der Erde tru-

gen. (Beides würde nicht gegen die Entwicklung der Käfer in Hymenopteren-Nestern, die ebenfalls oft in die Erde hineingebaut sind, sprechen. Ref.)

Mulsant theilte in seiner Bearbeitung der in Frankreich einheimischen Vesicantien (*Histoire naturelle des Coléoptères de France, Vesicants und Annales de la soc. Linnéenne de Lyon IV. Année 1857. p. 209—409*) diese Familie in drei Gruppen (die er Familien nennt), nämlich in Meloidiens, Mylabriens und Cantharidiens. Als Charaktere der Meloiden stellt er die sich an der Naht krenzenden, weiter hinten klaffenden, sich nach unten um den Körper herumschlagenden und meist abgekürzten Flügeldecken, das Fehlen der Flügel u. s. w. auf; die Mylabriden unterscheidet er von den Canthariden durch die an der Spitze gekeulten Fühlhörner, deren Endglied länger und merklich dicker als die übrigen ist, während bei letzteren die Fühler fast fadenförmig, sei es dass sie allmählig und kaum merklich an Dicke zunehmen, sei es dass sie gegen die Spitze hin dünner werden, erscheinen. Die Gruppe der Meloiden beschränkt sich auf die Gattung *Meloë*, welche in Frankreich durch 15 Arten vertreten ist; ausser diesen werden anhangsweise noch 4 andere Europäische Arten, sämmtlich bereits bekannt, charakterisirt. — Die Gruppe der Mylabriden zerfällt in die *Cerocomaires*, bei denen die Fühler vor der Stirnnaht eingefügt und die Oberlippe länger als breit ist (Gattung *Cerocoma* mit 3 französischen und 2 sonst in Europa vorkommenden, sämmtlich bekannten Arten) und in die *Mylabraires*, bei denen die Fühler hinter der Stirnnaht entspringen und die Oberlippe breiter als lang ist; hierher gehören *Hycleus* mit 1 und *Mylabris* mit 7 französischen Arten (von zwei äusserfranzösischen Arten ist *Mylabris Forti* Muls. eine neue Art). — Die Gruppe der Canthariden theilt der Verf. in *Cantharidaires* und *Zonitaires*, erstere wieder in *Alosimates* und *Cantharidiates*; die neue Gattung *Alosimus* ist auf *Lytta syriaca* begründet, die Gattungen *Cantharis* und *Epicauta* je auf 1 Art beschränkt. Die *Zonitaires* zerfallen in *Zonitates* (Gattungen *Zonitis* 3 Arten, *Nemognatha* 2, *Apalus* 1 A.) und *Sitarates* mit den Gattungen *Stenoria* (auf *Sitaris apicalis* basirt) und *Sitaris* mit 2 Arten. — Die beifolgende Tafel giebt Darstellungen verschiedener Gattungsrepräsentanten, ihrer Larven und systematisch wichtiger Körpertheile. In dem vorangeschickten allgemeinen Theile der Arbeit geht der Verf. besonders ausführlich auf die früheren Eintheilungen der Familie in Gattungen, von Linné bis auf die neuesten Autoren, ein und stellt die früheren Beobachtungen über die Entwicklungsgeschichte der ersten Stände (welche in neuester Zeit freilich sehr erweitert worden sind) sorgsam zusammen.

Rojas, „Description d'une nouvelle espèce de Coléoptères de la république de Venezuela“ (*Revue et Magas. de Zoologie IX. p. 441 ff.*)

beschrieb *Epicauta caustica* als neue Art aus Venezuela, welche sich durch starke vesikatorische Eigenschaften auszeichnet. Der Käfer setzt sich, in der Nacht durch Licht angezogen, oft auf den menschlichen Körper und lässt hier einen Saft fallen, der heftiges Brennen, Röthe und Blasen verursacht. Eine Cauterisation der Haut mit dem lebenden Insekt lässt bis auf acht Tage Spuren zurück; in Alkohol aufbewahrt, behält dasselbe seine vesikatorischen Eigenschaften noch nach drei bis vier Monaten, nach einem Jahre ging die Wirkung jedoch verloren. Die Art lebt auf *Lycopersicum esculentum* Kunth.

Einzeln beschriebene neue Arten sind ferner: *Meloë caelatus*, *sericellus*, *Mylabris intersecta* Reiche (Annales de la soc. entomol. V. p. 271 ff.) aus Palästina, Klein-Asien und Athen, *Meloë coarctatus* v. Motschulsky (Etudes entomol. VI. p. 35), *Lytta Childii* Le Conte (Entomol. Report p. 52) aus Californien, *Nemognatha Cubaecola* Jacquelin du Val (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 68. pl. 8. fig. 18) von Cuba.

Peyron (Annales de la soc. entomol. V. p. 723) stellte die Synonymie der *Zonitis mutica* Fabr. folgendermassen fest: *Zonitis immaculata* ist der älteste Name, indem das Insekt vor Fabricius durch Olivier als *Apalus immaculatus* beschrieben worden ist; Synonyme sind: *Zonitis mutica* Fabr., *Mylabris fulva* Rossi.

Oedemeritae. Perris beschrieb (Insectes du pin maritime, Annales de la soc. entomol. V. p. 387—395. pl. 9) die Larven und deren Lebensweise von *Xanthochroa carniolica* und *Nacerdes melanura*. Beide sind kaum von einander zu unterscheiden, nach vorn stark keulenförmig erweitert, besonders der Kopf und das erste Segment des Thorax sehr gross, quer viereckig, die Abdominalringe etwas länger, aber merklich schmäler als die beiden letzten des Thorax. Die Larven leben in den Pinus-Stämmen jedes Alters, welche von der Rinde entblösst und fast ganz in einen schwammigen Zustand übergegangen sind; zur Verwandlung machen sie eine längliche Zelle nahe der Oberfläche.

Le Conte (Entomol. Report p. 52) beschrieb *Ditylus vestitus* als neue Art vom Oregon, Jacquelin du Val (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 67) *Asclera testaceicollis* von Cuba.

Rhinosimi. *Salpingus impressus* Wollaston (Catal. of Coleopt. Insects of Madeira p. 161) ist eine neue Art von Madeira, *Rhinosimus australis* Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 56) n. A. von der Insel Woodlark.

Bruchetae. Zur Anthribiden-Gruppe wurden von Montrouzier (Annales des scienc. phys. de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 40 ff.) folgende neue Arten und Gattungen von der Insel Woodlark bekannt gemacht: *Stenocerus quadrituberculatus*, *pla-*

tipennis, *macrophthalmus*, *punctatus*; *Cerambyrhynchus* n. g. soll mit *Mecocerus* in naher Verwandtschaft stehen, sich aber dadurch unterscheiden, dass der Rüssel nicht plötzlich am Ende erweitert ist, dass die Leiste, welche das Halsschild theilt, nicht in zwei Dornen endigt, und dass die Tarsen kürzer als die Schienen sind. Art: *C. Schönherri* 7 lin. — *Xenocerus speracerus*, *anthriboides*, *Eucorynus marmoratus*, *Anthribus griseus* (Fabr.); *Oedecerus* n. g. neben *Anthribus* zu stellen; Fühler kurz und dick, vor den Augen entspringend, das dritte Glied beim Männchen angeschwollen und so dick wie die Keule; diese durch vier wenig deutliche Glieder gebildet, in eine Spitze endigend; Rüssel sehr kurz und breit, vorn ausgerandet. Art: *Oed. bipunctatus*.

Thomson (Archives entomol. I. p. 434 ff.) errichtete eine neue Gattung *Eugigas* auf *Dolichocera Childreni* Gray und beschrieb *Eug. Schönherri* von der Insel Arou und *Goliathus* von Java, beide auf Taf. 17 abgebildet. Fernere neue Arten sind: *Mecocerus? pantherinus*, *parvulus* und *Xenocerus lacrymans* von der Insel Arou.

Neue Arten der Gattung *Bruchus* sind: *Bruchus plagiatus* Reiche (Annales de la soc. entomol. V. p. 649) aus dem Peloponnes, *pauperculus* Le Conte (Entomol. Report p. 52) aus Californien. — *Spermophagus simulatus* von Cuba wurde von Jacquelin du Val (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 70. pl. 8. fig. 19) beschrieben und abgebildet.

Curculionides. Fairmaire (Annal. de la soc. entom. V. p. 740 ff.) beschrieb eine neue Gattung *Choerorhinus*, die einen Uebergang zwischen den Dryophthoriten und Cossoniten machen soll, indem sie mit ersteren im äusseren Habitus und der viergliedrigen Fühlergeissel, mit letzteren in der Tarsenbildung übereinstimmt. Körper länglich, ziemlich gewölbt, Augen rund, hervortretend, Rüssel kurz, fast so breit wie der Kopf, Fühlergrube kurz, tief, geschwungen, die Glieder der Fühlergeissel sehr verbreitet, so dass die Keule nicht deutlich abgesetzt erscheint; Schildchen nicht sichtbar, Beine kurz und kräftig, Schienen aussen an der Spitze mit einem starken, gebogenen Zahne bewaffnet. Art: *Ch. squalidus* aus Sicilien, pl. 14. fig. 3 abgebildet. — Neue Art: *Lignyodes rudesquamosus* von Beziers in Frankreich. — *Bagous severopolinus* Duf. ist = *Eirrhinus pilumnus* Shh. und *Cotaster littoralis* Motsch. = *Trachodes exsculptus* Germ.

Wollaston (Catalogue of the Coleopterous Insects of Madeira p. 100) machte eine merkwürdige neue Gattung *Leipommata* aus der Cossonen-Gruppe bekannt, welche sich durch den Mangel der Augen und durch eigenthümliche Schienen- und Tarsenbildung auszeichnet; die Schienen sind fast gerade, an der Spitze nach aussen in einen grossen, gekrümmten Haken, innen in einen grossen Enddorn verlängert, die Vorderschienen nach der Spitze zu lang behaart; an den

Tarsen ist das 1. Glied länglich, das 2. und 3. kleiner, untereinander fast gleich, das letzte fast von der Länge des ersten; die Flügeldecken fast verwachsen, die Fühlergeissel siebengliedrig. Die Art: *Leip. calcaratum*, $1\frac{1}{2}$ lin. lang, lebt bis $1\frac{1}{2}$ Fuss tief unter der Erde, offenbar an Pflanzenwurzeln. — Andere neue Arten von Madeira sind: *Acalles histrionicus*, *coarctatus*, *festivus*, *Omius angustulus*, *Apion delicatulum*.

Von Roger (Verzeichniss der Käfer Oberschlesiens p. 103, Stettiner Entomol. Zeitung p. 60 ff.) wurde unter dem Namen *Euryomatus Mariae* eine in Schlesien aufgefundenene neue Gattung und Art charakterisirt, die der Verf. als mit *Coryssomerus* zunächst verwandt bezeichnet. Die Augen sind nach oben so weit ausgedehnt, dass sie in der Mittellinie nur durch eine feine Stirnnaht getrennt werden, die Fühler mit siebengliedriger Geissel, deren beide ersten Glieder beträchtlich länger als die folgenden sind, der Rüssel so lang als Kopf und Halsschild, nicht in die Brust einschlagbar, da die Vorderhüften aneinanderstossen; die Vorderschenkel stark keulenförmig verdickt, mit einem starken Zahne hinter der Mitte, die mittleren und hinteren schwächer verdickt und nur sehr fein gezähnt, das erste Tarsenglied stark verlängert. (Die Gattung zeigt weder mit *Copturus* noch mit *Coryssomerus* eine nähere Verwandtschaft, sondern würde sich der Gattung *Phytophilus* Schh. sehr eng anschliessen; man könnte sogar aus der Aehnlichkeit der Art mit dieser in Afrika und Ostindien einheimischen Gattung vermuthen, dass sie ebenfalls exotisch und nur nach Europa eingeführt worden sei. Ref.)

Thomson (Archives entomol. I. p. 287) stellte eine neue Gattung *Celebia* für eine schöne Art *C. azureipes* von Celebes (pl. 14. fig. 3 abgebildet) auf, die nach der Abbildung entschieden der Gattung *Geonemus* Schh. angehört. (Diese Gattung, welche bei Schönherr heterogene Elemente in sich schliesst, muss auf die Arten der Asiatischen Inseln und von Neu-Guinea beschränkt werden, dagegen sind sowohl die Europäischen Arten als die Süd-Amerikanischen davon auszuschliessen; von letzteren sind u. a. *Geon. 4-nodosus* und *4-tuberculatus* zur Gattung *Cyphus* zu verweisen. Ref.) — Andere neue Arten des Verf. (ebenda p. 442 ff.) sind: *Eupholus Linnei* und *Geonemus Fabricii* von der Insel Arou.

Jekel hat (Fabricia entomologica, 2. livr. Paris 1857) seine Revision der Gattung *Hypsonotus* fortgesetzt und eine Reihe neuer Arten, die er mehreren auf Kosten jener gegründeten Gattungen unterordnet, beschrieben: *Alocorhinus virescens* aus Brasilien, *Acanthobrachis Germari* aus Brasilien, *Eudinetus cinereus*, *posticatus*, *nigromaculatus* aus Columbien, *Merodontus derosus* von Cayenne, *fornicatus* und *setosulus* vom Amazonenstrom, *aurulans* von Rio-Negro, *vetustus*, *cordifer* und *alophoides* von Cayenne, *Orthocnemus*

Lebasii aus Bogotà, *heilipoides* von Quito, *Hyponotus Stevensii*, *rotundipennis*, *albofasciatus*, *selectus* aus Brasilien, *apicatus* aus Columbien, *morio* aus Venezuela, *subscutellaris* und *callosicollis* von der Insel St. Catharina, *albopictus* und *includens* aus Brasilien.

Eine Reihe neuer Arten aus Californien und dem Oregon-Gebiete machte L e C o n t e (Entomol. Report p. 52 ff.) bekannt: *Rhynchites gelastinus*, *Apion crassinusum*, *proclive*, *cribricollis*, *cavifrons*, *protensum*, *Sitones vittatus* und *sordidus*, *Alophus constrictus*, *Listroderes teretirostris* und *Oregonensis*, *Hylobius?* *taeniatus* und *torpidus*, *Ptochus saccatus* und *globiventris*, *Otiorkynchus segnis* und (?) *naso*, *Tyloderes gemmatus*, *Lixus auctus*, *Magdalinus imbellis* und *gracilis*, *Balaninus uniformis*, *Baridius macer* und *seriatus*, *Analcis morbillosus*, *Rhynchophorus asperulus* und *Sphenophorus gentilis*.

Eine beträchtliche Anzahl neuer Arten aus dem Orient wurde von Reiche und de Saulcy (Annales d. l. soc. entomol. V. p. 651—695) bekannt gemacht: *Apion Truquii*, zur Gruppe des *A. difforme* gehörend und durch sehr verbreiterte Fühlerglieder beim Männchen besonders ausgezeichnet, von Damascus, *Brachycerus argillaceus* von Beirut, *orbipennis*, *ornatus*, *nodulosus* aus Syrien, *Psolidium pactolum* von Nablus, *forcipatum* von Beirut, *Lerratii* von Rhodus, *Thylacites seriepunctatus* von Beirut, *Strophosomus albarius* aus dem Peloponnes, *Sitones bisphaericus* von Beirut, *Cleonus Samaritanus* aus Palästina, *ornatus* von Beirut, *Hylobius alpheus* aus dem Peloponnes, *Procas Saulcyi* von Cypern, *Phytonomus cypris* ebendaher, *Limobius globicollis* und *Phyllobius lateralis* aus dem Peloponnes, *Rhytirrhinus horridus* und *atticus* von Athen, *Otiorkynchus cypricola* von Cypern, *nitidus*, *bisphaericus* und *graniger* aus Griechenland.

Neue von Montrouzier (Annales des scienc. phys. de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 46 ff.) beschriebene Arten und Gattungen von der Insel Woodlark sind: *Pachyrrhynchus chrysomelas*, *Geonemus Cristorallensis*, *Rhinoscapa* n. g., vom Ansehn der Gattung *Aegorhinus* Er., aber darin unterschieden, dass das Basalglied der Fühler mehr als den dritten Theil der ganzen Fühlerlänge misst, dass das dritte Glied länger als das zweite, der lange und dicke Rüssel oberhalb gefurcht, die Fühlerfurche desselben schief ist, dass die Leiste über dem Auge und das Zähnnchen an den Schenkeln fehlt. Art: *Rh. bicincta*, 12 lin. — Ferner: *Alcides?* *rufipennis*, *Otiorkynchus oxygaster*, *bicristatus*, *incisus* (die Arten der letzteren Gattung gehören vermuthlich zu *Elytrurus* oder *Isomerinthus* Schh. Ref.), *Orthorhinus rugosus*, *Tylodes griseus*, *megapoda*, *ater*, *cinctus*, *pulverulentus*, *oedothorax*, *Imhoffii*, *Cryptorhynchus Gyllenhalii*, *ficus*, *Guerinii*, *Woodlarkianus*, *Cleogonus pumilus*, *Calandra bilineata* und *cincta*.

Jacquelin du Val (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 77 ff.) beschrieb *Lachnopus Guerinii*, *seriepunctatus*, *niveo-irroratus*, *multipunctatus*, *sublineatus*, *Geonemus aureosquamosus*, *Anthonomus varipes*, *Peridinetus Poeyi*, *Diorymerus pello*, *Cryptorhynchus bufonius*, *Tylodes quadriplicatus* und *Rhina oblita* als neue Arten von Cuba.

Perris (Annales de la soc. Linnéenne de Lyon IV. p. 135 ff.): *Apion laticolle*, *stenocephalum*, *cribricolle*, *Anisorhynchus curtus*, *Trachyploeus Larraldi*, *Anthonomus ruber*, *Baridius vestitus*, *Bagous setiger*, *dorsalis*, *Ceutorhynchus contusus*, *carneus*, *Rhyncolus crassirostris* Dej. Cat. als neue Arten aus den Grandes-Landes. — Auf p. 139 beschreibt der Verf. auch die Larve des *Coniatus chrysochlora* Luc., welche ganz den *Phytonomus*-Larven gleicht und in verschiedenen Gegenden auf verschiedenen *Tamarix*-Arten (*T. africana*, *gallica*, *anglica*) lebt.

Einzelne als neu beschriebene Arten sind ferner: *Ceutorhynchus chlorophanus* Ronget (Annales de la soc. entomol. V. p. 752) von Dijon, zur Gruppe des *C. Erysimi* gehörend und auf *Erysimum lanceolatum* lebend, *Ceutorhynchus acalloides* und *albohispidus* Fairmaire (ebenda p. 639 ff.) von Montpellier, *Amomphus Cottgi* Lucas (Bullet. de la soc. entomol. p. CXXIV) aus Algier, *Peritelus Marquetii* Gautier des Cottés (ebenda p. CXXXVI) von Beziers in Frankreich, *Mettallites Pirazzolii* Stierlin aus Italien und *Dichotrachelus Imhoffii* Stierlin aus der Schweiz (Entomol. Zeitung p. 62 ff.), *Apion bicolor* und *Dichotrachelus Stierlini* mit einer var. ? *vulpinus* Gredler (Käfer von Passeier) aus Tyrol.

„Die Apionen der Wiener Gegend“ verzeichnete L. Miller (Wiener Entomol. Monatsschrift I. p. 10—25 und p. 56—59). Der Verf. hat im Ganzen 81 Arten der Gattung *Apion* bei Wien aufgefunden, die er nach ihren natürlichen Verwandtschaften aneinanderreicht und mit kurzen Beschreibungen, welche die hervortretendsten Unterscheidungsmerkmale enthalten, versieht; auch wird stets die Futterpflanze, so weit sie bekannt, und das Vorkommen erörtert. Als neue Arten werden beschrieben: *Apion pulchellum*, zwischen *A. penétrans* und *aciculare* Germ. gestellt, *amethystinum* und *Schmidtii* (Märk. i. lit.), beide dem *A. punctigerum* ähnlich; letztere Art ist jedoch schon von Bach unter diesem Namen beschrieben worden. Die bereits vielfach erörterte Synonymie der Arten ist nach ihrer früheren Feststellung beibehalten worden; mit Recht bezieht der Verf. das *Ap. opeticum* Bach auf *A. Marshami* Schönh., da in der Schönherr'schen Beschreibung die Unterschiede dieser Art nach dem Weibchen deutlich und unverkennbar auseinandergesetzt werden und derselben auch der Stephens'sche Name verbleiben kann, indem das *Ap. Marshami* Steph. mit *A. subulatum* identisch ist.

Ueber die Apionen der Schweiz machte Dietrich (Entomol. Zeitung p. 133 ff.) mehrfache Mittheilungen, die sich besonders auf die Nahrungspflanzen solcher Arten beziehen, deren Lebensweise bisher nicht bekannt war. Als neue Arten beschrieb derselbe *Apion Dietrichi* Bremi i. lit., auf *Orob. vernus* lebend, nach den Original-Exemplaren des Verf. jedoch identisch mit *Ap. Marshami* Schönh. (= *A. opeticum* Bach) und *Apion gracilipes*, aus den Blüthenköpfen von *Trifolium medium* erzogen, von *A. flavipes* u. a. durch die Färbung der Fühler unterschieden.

Jacquelin du Val (Annales de la soc. entomol. V. p. 85 ff.) hat sich nachträglich jetzt auch davon überzeugt, dass von *Rhinomacer attelaboides* beide Geschlechter vorhanden seien, und dass *Diodyrhynchus austriacus* nicht als Weibchen zu dieser Art gehöre; die äusseren Unterschiede der beiden Geschlechter des *Rhinomacer* (vergl. Jahresbericht 1855. p. 75) scheinen ihm aber unbekannt geblieben zu sein. — Derselbe (ebenda p. 89) bestreitet die von Jekel behauptete Identität seiner Gattung *Mitomermus* mit *Cathormiocerus* Schönh., die des *Cath. variegatus* mit *Mit. hystrix* und des *Barypeithus rufipes* mit *Omfias sulcifrons* Schönh., ohne jedoch gültige Beweise dafür vorzubringen. — Nach demselben (Bullet. de la soc. entomol. p. LIII) ist *Strophosomus subnudus* Fairm. ein Metallites, welcher Ansicht von Fairmaire (ebenda p. LIX) widersprochen wird.

Nach Heeger (Sitzungsberichte der mathem.-naturwiss. Classe der Akad. d. Wissensch. zu Wien XXIV. p. 317 ff.) lebt die Larve des *Apion basicorne* Illig. in den holzigen Wurzeln der einheimischen Kletten-Arten, an denen sie zwar keine Galle, aber eine knotenartige Verkrüppelung und ein Zerplatzen derselben erzeugt. Abbildung der ersten Stände auf Taf. 2.

Märkel (Allgem. Deutsche Naturhist. Zeitung 1857. p. 180) fand die Larve des *Plinthus Fischeri* in den Wurzelstöcken von *Aspidium spinulosum*; sie ist weiss mit gelblichem Kopfe und verwandelt sich im September zum Käfer, welcher überwintert.

Stollwerk (Verhandl. d. Naturhist. Vereins d. Preuss. Rheinl. u. Westphal. XIV. p. 125) erzog Braconiden aus den Blattdüten des *Rhynchites betulae*, *betuleti* und *populi* (die meisten aus ersterer Art), *Poropoea Stollwerkii* häufig aus denen des *Attelabus curculionoides*.

Scriba (Entomol. Zeitung p. 377) fand den ursprünglich Amerikanischen *Sitophilus oryzae* in Hessen unter der Rinde abgehauener Rüstern in Mehrzahl; nach seiner Angabe weichen diese Exemplare von den importirten durch beträchtlich schmalere Körperbau ab.

In den Sitzungsberichten des zoolog.-botan. Vereins in Wien VII. p. 135 ist eine Schrift von T. Prada, „*Curculioniti del agro Pavese*,“ Pavia 1857 angezeigt, welche dem Ref. nicht zur Ansicht vorgelegen hat.

Brenthides. Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 36 ff.) stellte eine neue Gattung *Megacerus* auf, die sich von allen Schönherr'schen Gattungen durch das letzte Fühlerglied, welches beträchtlich länger als das vorhergehende ist, unterscheiden soll; von *Belophorus*, der einzigen Gattung, mit der sie verwechselt werden könnte, weicht sie darin ab, dass bei dieser das zweite Fühlerglied kürzer als das dritte ist und die Fühler selbst kaum zweimal so lang als das Halsschild sind. Art: *Megacerus decemmaculatus* von Woodlark, 8 lin. lang. — Fernere neue Arten, ebendaher: *Belophorus pogonocerus*, *Cephalobarus pumilus*, *Leptorhynchus curvidens*, *Guérinii*, *Arrhenodes unicolor* und *punctatus*.

Calodromus cyrtotrachelus von Borneo ist eine neue Art von Thomson (Archives entomol. I. p. 119).

Bostrichini. Als neue Arten wurden beschrieben: *Dendroctonus valens*, *similis*, *Bostrichus pubipennis*, *Corthylus scutellaris* Le Conte (Entomol. Report p. 59) aus Californien und dem Oregon-Gebiete, *Platypus subcostatus* Jacquélin du Val (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 99) von Cuba, *Platypus Wallacei* Thomson (Archives entomol. I. p. 343) von Borneo, *Tomicus erosus* und *perforans* Wollaston (Catal. of Coleopt. Insects of Madeira p. 95) von Madeira.

Nach Kollar (Verhandl. d. zoolog.-botan. Vereins in Wien VII. p. 187) griff *Bostrichus curvidens* Ratz., bisher nur an Weisstannen als schädlich beobachtet, im botanischen Garten zu Wien auch eine Ceder, eine *Pinus Pichta* und eine *Larix* an, welche er sämmtlich von Grund aus zerstörte. An der Ceder fand sich in seiner Gesellschaft *Hypophloeus pini* Panz.

Longicornia. A. Chevrolat setzte (Revue et Magas. de Zool. IX. p. 74, 107 und 166) seine Beschreibungen der Cerambycinen Old-Calabar's fort und machte ausserdem („Description de trois Longicornes nouveaux,“ ebenda p. 103 ff.) und in Thomson's Archives entomol. I. p. 414 ff. einige neue Arten, besonders von den Indischen und Südsee-Inseln bekannt.

F. Pascoe, On new genera and species of Longicorn Coleoptera, Part. II. (Transact. of the entomol. soc. IV. p. 89—112. pl. 22. 23). — Der Verf. fährt damit fort, neue Cerambycinen-Formen aus den verschiedenen Gruppen durch aphoristische Beschreibungen bekannt zu machen und zum Theil abzubilden; wiewohl die meisten, wie früher, dem südlichen Asien angehören, sind doch solche aus anderen Welttheilen nicht ganz ausgeschlossen.

Die ausgedehnteste Bereicherung hat diese Familie jedoch durch den ersten Theil von Thomson's Archives entomologiques erfahren, in welchem neben Buquet, Chabrillac u. a. der Herausgeber selbst vorzugsweise sich damit abgegeben hat, ausgezeichnete und seltene

Gattungen und Arten bekannt zu machen und zwar besonders durch vorzüglich ausgeführte Abbildungen; ausserdem ist es auch sein Bestreben gewesen, eine grössere Anzahl der von Dejean aufgestellten und bisher nicht charakterisirten Gattungen zu beschreiben, zuweilen freilich ohne Hinzufügung von Arten, die dazu gehören, und meist auch ohne Berücksichtigung ihrer Verwandtschaften und ob sie überhaupt begründet seien. In einem „Abrégé de l'histoire des Cerambycides et revue des divisions primaires et secondaires établies dans cette famille (a. a. O. p. 81—89) hebt der Verf. die Systeme einiger Autoren, die sich mit der Eintheilung der Familie befasst haben, hervor, lässt aber die wichtigsten, wie z. B. die Le Conte'sche fort. Um neue Benennungen einzuführen, stellt er für die Cerambycinen mit ausgerandeten Augen den Namen „Ectemnopsites“, für die mit ganzen Augen (Lepturiden) den Namen „Strongulopsites“ auf, freilich ohne zu bedenken, dass auch in der Gruppe der Cerambyces genuini Gattungen mit nicht ausgerandeten Augen vorkommen.

Prionii. — Von Pascoe wurden (Transact. entom. soc. IV. p. 90—92) folgende neue Gattungen und Arten bekannt gemacht: *Dynamostes* n. g., eine sehr eigenthümliche Form, deren Kopf vorn breiter als der Thorax und hinter den Augen halsförmig verlängert ist; Fühler von $\frac{2}{3}$ der Körperlänge, einander genähert, haarig, das erste Glied fast doppelt so lang als das dritte und verdickt, die folgenden vom vierten an fast von der Länge des ersten, unter einander fast gleich; die Endglieder beider Taster verkehrt kegelförmig; Flügeldecken niedergedrückt, breiter als der Thorax, die Beine mit sehr kräftigen, verdickten Schenkeln. Art: *D. audax* aus Ostindien, auf pl. 22. fig. 1 abgebildet. — *Neostenus* n. g., mit *Aphanasium* und *Philus* verwandt; Kopf schmal, Augen nierenförmig, Palpen schlank, ungleich; Fühler ziemlich von Körperlänge, ihr erstes Glied kürzer als das dritte, mit welchem die folgenden fast von gleicher Länge sind; Thorax seitlich gerundet, einfach, Flügeldecken sehr lang und schmal, aber kürzer als der Hinterleib; Beine kurz, mit einfachen Schienen. Art: *N. Saundersii* (pl. 22. fig. 2) aus Neu-Cambria. — *Prionus fossatus* und *hydropicus* neue Arten aus Nord-China.

Unter den zahlreichen von Thomson in den Archives entomologiques I. beschriebenen und zum Theil abgebildeten neuen Cerambycinen-Formen gehören folgende der Prionier-Gruppe an: Unter dem Titel „Monographie de la tribu des Anacolites“ (p. 7—20. pl. 1—3) giebt der Verf. eine Beschreibung und Abbildung der Gattungen *Myzomorphus*, *Anacolus* und einer neuen Namens *Oedeterus*, die er mit Hervorhebung einiger ihnen gemeinsamen Charaktere als eigene Gruppe „Anacolites“ hinstellt und die wiederum in Vereinigung mit mehreren anderen Gattungen nach ihm eine eigene Abtheilung der Prionier als „Prioniens plaxoleptés“ (!) bilden sollen; die Aufstel-

lung solcher Gruppen in der Art, wie es der Verf. thut, ist allerdings sehr leicht, doch müssten zu ihrer Begründung wohl eingehendere Untersuchungen angestellt werden als es hier geschehen ist. — Von den drei Gattungen ist *Myzomorphus*, die nach dem Vorgange von Dejean angenommen und charakterisirt wird, durch zwei Arten: *M. scutellatus* Sallé und *quadrinotatus* Ménétr. (*4-maculatus* Gory, *4-punctatus* Gray, *pygmaeus* Buq.) vertreten. Die Vereinigung des *Anac. 4-maculatus* Gory nebst der Var. *4-punctatus* Gray mit dem *A. 4-notatus* Ménétr. ist jedoch durchaus unbegründet, da bei der letzteren Art die beiden vorderen Flecke der Flügeldecken dicht an der Basis stehen und die Vorder- und Mittelschienen an der Spitze gelb sind, während bei *A. 4-maculatus* Gory die beiden vorderen Flecken, abgesehen von ihren Grössenverschiedenheiten, stets vor der Mitte stehen und alle Schienen schwarz gefärbt sind; ausserdem sind auch die Fühler beider Arten in der Länge und Dicke der Glieder merklich verschieden. (Das hiesige Museum besitzt ausser diesen drei Arten eine sehr ausgezeichnete vierte, die neu ist.) — Die neue Gattung *Oedeterus* ist auf ein hübsches Insekt gegründet, welches sich im Habitus mehr den männlichen *Anacolus* nähert, sich durch sehr schlanke, dünne Fühler, deren drittes Glied (nicht das vierte, wie angegeben wird) fast den beiden folgenden zusammen an Länge gleich kommt und deren folgende Glieder in einen dünnen, abstehenden Ast auslaufen, auszeichnet und bei dem der Prosternalfortsatz langgestreckt ist, so dass er bis zwischen die Mittelhüften reicht. Art: *O. Buquetii* aus Columbien. — Die Gattung *Anacolus* umfasst nur eine Art, die *A. lugubris* Lepell. genannt wird, und zu der die sämtlichen übrigen von Ménétré's, Buquet, Lepelletier, Perty und White aufgestellten Arten als Weibchen und Färbungsvarietäten gezogen werden, eine Ansicht, die nach den Exemplaren des hiesigen Museums dem Ref. begründet scheint.

Der Monographie der *Anacoliten* schliesst sich (ebenda p. 20—23. pl. 9) die Beschreibung und Abbildung zweier ausgezeichneten neuen Gattungen an, welche der Verf. mit jener Gruppe für nahe verwandt ansieht. 1) *Georgia* n. g. An den Fühlern ist das erste Glied (nicht das zweite, wie angegeben wird) das längste und dickste, die folgenden vom dritten an innen dreieckig erweitert beim Männchen, nur die vier vorletzten erweitert beim Weibchen; Thorax in der Mitte der Seiten zu einem starken Dorn erweitert, Flügeldecken breit und gedrungen, beim Männchen hinten allmählig zugerundet, beim Weibchen viel stumpfer endigend, schön goldgelb gefärbt, mit dunklem Mittelfleck und breiter Spitze. Art: *G. citrina* von Cayenne und vom Amazonenstrom. 2) *Hamadryades* n. g. in Form und Färbung der vorigen Gattung sehr nahe stehend, beim Männchen (?) ebenfalls die (fünf) vorletzten Glieder, aber nach aussen dreieckig erweitert, der

Prothorax ohne Mitteldorn, nach hinten trapezoidal erweitert. Art: *H. alurnoides* von Cayenne. (Der Gattungsname wird später p. 136 als schon vergeben in *Nicias* umgeändert.)

Ebenda p. 120 wird auf *Prionus mordax* White eine eigene Gattung *Priotyranus* errichtet, deren Charaktere auseinandergesetzt und die auf pl. 10. fig. 1 abgebildet wird.

Ebenda p. 341 wird eine neue Gattung *Baralipion* charakterisirt, die mit *Aegosoma* in nächster Verwandtschaft steht und mit dieser Gattung auch in den Längsverhältnissen der Fühler übereinstimmt; das erste Glied ist jedoch am Ende mit einem starken Dorne bewaffnet, das dritte das längste von allen und beim Weibchen den sechs folgenden zusammengekommen gleich. Das Halsschild ist sehr kurz und quer und weicht von *Aegosoma* durch die Bewaffnung des Seitenrandes ab; sowohl der Vorder- als Hinterrand endigen jederseits in einen Dorn und ein drittes Paar zeigt sich am hinteren Drittheile des Seitenrandes. Die sehr prächtige und grosse Art: *B. maculosum*, durch seidenartige Behaarung der Flügeldecken und schöne Zeichnung bemerkenswerth (pl. 14. fig. 1 abgebildet), wird mit der Vaterlandsangabe „Asie orientale“ belegt; ein Exemplar des hiesigen Museums stammt von Calcutta.

Ebenda p. 404 eine neue Gattung *Diploschema*, welche der Verf. mit *Tornentes* und *Coptocephalus* in Verbindung bringt und zu den Prioniern rechnet, die aber offenbar den *Cerambyces genuini* beizuzählen ist und in nächster Verwandtschaft mit *Criodion* steht; (hierher ist übrigens auch die Gattung *Coptocephalus* Griffith, für welche der Name *Metopocoelus* einzuführen ist, zu stellen. Ref.). Die Gattung unterscheidet sich von letzterer durch ungetheilte Augen, schlanke und in beiden Geschlechtern fast gleiche Fühler von zwei Drittheilen der Körperlänge, schmalen, cylindrischen, gleichbreiten Körper und schmalen; spitz dreieckigen Prosternalfortsatz; der Thorax ist beim Männchen länger, als beim Weibchen und seitlich nicht gerundet. Art: *Dipl. flavipennis*, im hiesigen Museum aus Brasilien.

Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 56) beschrieb *Mallodon costatus* als neue Art von der Insel Woodlark.

Le Conte (Entomol. Report p. 59) vereinigt jetzt die von ihm aufgestellte Gattung *Trichocnemis*, deren Art *Tr. spiculatus* nur auf ein Weibchen gegründet war, nach Kenntniss des männlichen Geschlechtes mit der Gattung *Ergates* Serv.

v. Motschulsky (Etudes entomol. VI. p. 36) beschrieb *Prionus insularis* als neue Art aus Japan.

Nach Fairmaire (Archives entomol. I. p. 38) wurden *Malloides microcephalus* und *Amallopodes scabrosus* in Chile mit ein-

ander in Begattung angetroffen; dass sie die beiden Geschlechter einer und derselben Art seien, ergibt sich aus ihren mehrfachen Uebereinstimmungen und aus dem Umstande, dass von jeder nur ein Geschlecht bekannt ist.

Cerambyces genuini. — Neue Gattungen, von Pascoe (Transact. entomol. soc. IV. p. 92 ff.) aufgestellt, sind: 1) *Xoanoder* n. g. nebst den beiden folgenden mit *Cerambyx* (*Hammaticherus*) nahe verwandt; Kopf schmal, mit grossen, weit ausgerandeten Augen, Palpen verlängert, die der Kiefertaster länger, mit abgestutztem Endgliede; Fühler länger als der Körper, das vierte Glied beträchtlich kürzer als das dritte und fünfte; Thorax länglich, mit starken Längsriefen, Flügeldecken an der Spitze schief abgestutzt, der Aussenwinkel über die Naht heraustretend. — Zwei Arten: *X. trigona* (pl. 23. fig. 1.) von Malacca, *magister* von Borneo. — 2) *Calpazia* n. g., der vorigen Gattung sehr ähnlich, die Fühler aber viel länger als der Körper, das siebente Glied am längsten, die Palpen ziemlich gleich, das letzte Glied der Maxillarpalpen fast dreieckig; Thorax fast ellipfisch, unbewaffnet, querrieffig, Flügeldecken an der Spitze fast zugrundet. Art: *C. vermicularis* (pl. 23. fig. 2) von Borneo. — 3) *Zatrephus* n. g., von viel kräftigerem Baue als die beiden vorigen, die Fühler auseinanderstehend, kürzer als der Körper, die Glieder bis zum fünften an der Spitze gerundet, die folgenden eckig erweitert; die Palpen fast gleich, kurz, das Endglied fast so lang als die übrigen zusammen; Thorax nach vorn verschmälert, stark gerunzelt, Flügeldecken ziemlich breit, an der Spitze leicht abgestutzt. Zwei Arten: *Z. pannosus* (pl. 23. fig. 3) und *inscitus* von Borneo. — 4) *Noserius* n. g., mit *Stromatium* zunächst verwandt; Kopf bei den Augen breit, nach hinten verlängert, Palpen gleich, die der Maxillen dicker, Fühler länger als der Körper, ihr drittes Glied am längsten, Thorax breiter als lang, leicht niedergedrückt, seitlich gehöckert, Flügeldecken lang, an der Spitze abgerundet. Art: *N. tibialis* (pl. 23. fig. 4) von Borneo. — 5) *Pyrestes* n. g., mit *Erythrus* verwandt, aber durch den sehr verlängerten, fast cylindrischen Prothorax abweichend; Kopf vorgezogen, Fühler kurz, die Glieder nach der Spitze hin stark erweitert, die Maxillarpalpen länger als die Lippentaster, die Flügeldecken hinter den Schultern etwas ausgerandet, hinten erweitert und breit abgerundet. Drei Arten: *P. eximius* (pl. 22. fig. 3) von Borneo, *miniatus* aus Nord-Indien und *haematicus* aus Nord-China. — 6) *Deuteromma* n. g. mit borstenförmigen Fühlern von doppelter Körperlänge, deren Glieder mit Ausnahme der beiden kurzen ersten fast gleich lang sind; Augen vier (d. h. in zwei Theile getrennt), Palpen kurz, Thorax niedergedrückt, seitlich gerundet, leicht gezähnt, hinten eingeschnürt, Flügeldecken parallel, flach, Beine lang, zusammengedrückt. Art: *D. callidioides* (pl. 23. fig. 6) von Borneo. (Eine

zweite Art wird p. 111 als *Deuteromma testacea* von Borneo diagnosticirt.) Die (ebenda) beschriebenen neuen Arten sind: *Cerambyx* (?) *morosus* von Borneo, *Sternacanthus picticornis* von Pará, *Stromatium alienum* aus Brasilien, *Pachyloceus plumiferus* (pl. 23. fig. 5) aus Ostindien, *Clytellus Westwoodii* von Borneo, *Didymocantha thoracica* von der Moreton-Bay, *Blemmya humeralis* von Malacca, *Tmesisternus graciosus* (pl. 22. fig. 4) von der Fichten-Insel.

Eine grössere Anzahl neuer Formen dieser Gruppe wurde auch von Thomson (Archives entomol. I) bekannt gemacht; p. 121 ff.: *Sclerocerus priapicus*, *Chabrillacii* und *cylindricus* aus Brasilien, *Cerambyx Pascoei* aus Ostindien, *Xestia Chabrillacii* aus Brasilien, *Odontocera* (?) *Singaporensis* von Singapore, *Odontocera* (?) *Sarawackensis* von Borneo. — p. 288: *Chlorida curta* von Cayenne. — p. 291 wird für die Gattung *Leptocera* Serv. (der Name soll von Schönherr bei den Curculionen vergeben sein) die neue Benennung *Iresioides* vorgeschlagen. — p. 316: *Distenia peregrina* aus Brasilien (wird später p. 394 als zur Gattung *Phelocalocera* Blanch. gehörend und wahrscheinlich als aus Madagascar herstammend angegeben). — p. 404. Gattung *Diploschema*, zu den Prioniern gerechnet, aber der gegenwärtigen Gruppe angehörend, siehe Prionii! — p. 406. *Sibylla* n. g. für *Phaedinus Coemeterii* Thoms. (Magasin de Zoologie 1856) errichtet. — *Gonyacantha* n. g. von Rhachidion durch gedornete Schenkelspitze, die Fühler, an denen das dritte Glied das längste, das 6.—11. erweitert sind, die Bildung des Pro- und Mesosternal-Fortsatzes, welche mit einem Tuberkel besetzt sind und die Beine unterschieden; das hinterste Paar ist sehr lang und die Schenkel an diesem weniger stark hinter der Mitte aufgeschwollen als an den beiden vorderen. Art: *Gon. rubronigra*, 18 mill. aus Brasilien. — p. 423. *Iresioides ferox* als neue Art von Madagascar beschrieben.

Stål, „Några nya arter of Longicornia“ (Öfversigt af Kongl. Vetensk. Akad. Förhandl. XIV. p. 63) charakterisirte eine neue Gattung *Cluvia*, neben *Elaphidium* zu stellen; Körper langgestreckt, Kopf hervorgezogen, Fühler länger als der Körper, ungedornt, drittes Glied den beiden ersten an Länge gleich, Thorax um $\frac{1}{3}$ länger als breit, seitlich leicht gerundet, vorn quer eingedrückt, auf der Scheibe mit Längsfurchen; Schildchen gefurcht, Flügeldecken gleich breit, hinten abgerundet, unbewehrt, Schenkel gegen die Spitze hin etwas dicker, ohne Stacheln. Art: *Cl. Chevrolatii* aus Tunis, 11 mill. lang. — Neue Art: *Eburia triocellata* aus Neu-Granada.

Buquet, Notice supplémentaire sur le genre *Euryprosopus*, suivie de la description de deux espèces nouvelles (Revue et Magas. de Zool. IX. p. 409 ff.). Der Verf. hat sich nach Vergleich eines grösseren Materials an Arten der Gattung *Euryprosopus* davon überzeugt, dass die von ihm in seiner Monographie der Gattung (vergl.

Jahresbericht 1853. p. 50) angegebenen Gruppen-Merkmale, nämlich die Ausrandung des ersten Fühlergliedes und die halbcylindrische Form der Flügeldecken Charaktere des Männchens, dagegen der Mangel jener Ausrandung des ersten Fühlergliedes und abgeflachte Flügeldecken Charaktere des Weibchens seien. Uebrigens sind sämtliche damals von ihm aufgestellte Arten selbstständige; von *Euryprosdardanus* wird nachträglich das Weibchen und ausserdem zwei neue Arten: *Eur. Chabrillacei* und *angustissimus* aus Brasilien beschrieben.

Derselbe (Archives entomol. I. p. 137 und 332) beschrieb *Ancylocera curvicolis* neue Art aus Brasilien und *Sallei* n. Art aus Mexiko.

Chevrolat (ebenda p. 414 ff.): *Tmesisternus viridicollis*, *Nanomorpha? albocincta*, *sanguinicollis* aus Neu-Caledonien, *Macrocyrtamacilentia* von Singapore. — Ferner (Revue et Magas. de Zool. IX. p. 103 ff.): *Crioprosopus Nieti* aus Mexiko, *Distenia Pilati* von Cordova, auf pl. 6. fig. 1. 2 abgebildet.

Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 57 ff.) machte folgende Arten von der Insel Woodlark bekannt: *Stenocorus biguttatus* (Boisd.), *inermis*, *Callidium punctatum*, *affine*, *Tmesisternus? dubius*, *Ichthyosoma mirabile* (Boisd.), *Dejeani*, *armatum*, *Purpuricenens variabilis* und *Cerambyx Mulsanti*.

Chabrillac (Archives entom. I. p. 194 ff.) beschrieb folgende Arten aus Brasilien: *Xestia Thomsonii*, *Javeti*, *de Rourai*, *fulgurata*, *Ibidion quadrifoveolatum*, *Thomsonii*, *Armandinae*, *Rhachidion granulicollis* (ist nach den Exemplaren des hiesigen Museums offenbar das Männchen von *Rhach. obesum* Newm.), *Lophonocerus tuberculicollis* und *Chrysoprasis armatus*.

Le Conte (Entom. Report p. 60 ff.) aus Californien: *Callidium vulneratum*, *decussatum*, *Mannerheimii* (dimidiatum Mannerh., nec Kirby) und *Clytus conjunctus*.

v. Motschulsky (Etudes entomol. VI. p. 36) aus Japan: *Purpuricenens spectabilis* und *Japanus* (letztere Art ist schon von Guérin als *Sternoplistes Temminckii* beschrieben worden).

Wollaston (Catal. of Coleopt. Insects of Madeira p. 126): *Blabinotus Bewickii* von Madeira.

Lucas „Note sur un nouveau genre de la famille des Longicornes (*Icosium tomentosum*), qui habite les possessions françaises du nord de l'Afrique“ (Annales de la soc. entomol. V. p. 609—615) beschrieb die schon im Jahresberichte 1854. p. 82 erwähnte und vom Verf. im Bullet. de la soc. entomol. 1854. p. 82 vorläufig diagnostizierte Gattung und Art *Icosium tomentosum* aus Algier jetzt ausführlich und gab auf Pl. 13 eine Abbildung derselben nach beiden Geschlechtern.

Derselbe (Bullet. de la soc. entomol. p. XLVIII) machte Mittheilungen über das Männchen des *Clytus Hartwegii* White aus Mexiko in Betreff der Unterschiede, die es von dem bis jetzt allein bekannten Weibchen darbietet.

Kollar (Verhandl. d. zoolog.-botan. Vereins in Wien VII. p. 185) handelte über die geographische Verbreitung und den Haushalt des *Callidium ruscicum* Fabr. Dasselbe findet sich in Russland, Oesterreich, Klein-Asien und Nord-Amerika; in Wien entwickelte es sich mehrere Jahre hindurch aus einem Stamme von *Juniperus drupacea*, welcher aus Syrien mitgebracht wurde.

Heeger (Sitzungsberichte der mathem.-naturwiss. Classe der Akad. der Wissensch. in Wien XXIV. p. 323 ff.) beschrieb die ersten Stände des *Hylotrupes bajulus* Lin. und ihre Lebensweise. Die Larven sind in Dachstühlen von Gebäuden sehr schädlich; die männlichen sind nur von $\frac{2}{3}$ der Grösse der weiblichen; trotz mehrjähriger Beobachtungen hat der Verf. niemals eine Häutung an ihnen bemerkt. Abbildungen auf Taf. 4.

Lamiariae. — Von Pascoë wurden (Transact. entomol. soc. IV. p. 100 ff.) folgende neue Gattungen und Arten bekannt gemacht: 1) *Stegenus* n. g. mit *Actophora* Newm. nahe verwandt, jedoch durch die Fühler unterschieden; diese sind genähert, wenig länger als der Körper, die ersten vier Glieder dicht mit kurzen Bürstenhaaren besetzt; Thorax unbewehrt, länger als breit, vorn und hinten eingezogen, Flügeldecken beträchtlich breiter als der Thorax. Art: *St. dactylon* (p. 22. fig. 6) von Borneo. — 2) *Aconodes* n. g. eine Dorcadion-ähnliche Form, mit *Hoplopterus* nahe verwandt; Fühler schlank, kürzer als der Körper, das dritte Glied am längsten, das Endglied der Maxillartaster eiförmig, zugespitzt, Augen klein, weit ausgerandet; Thorax breiter als der Kopf, länglich, seitlich schwach erweitert, Flügeldecken gewölbt, nach hinten erweitert, jede in eine auswärts gewandte Spitze endigend. Art: *A. montanus* (pl. 23. fig. 7) vom Himalaya. — 3) *Ectatosia* n. g., eine eigenthümliche schmale Saperdenform, mit *Tetraglenes* Newm. verwandt; Kopf klein, Augen vollständig getheilt, die obere Hälfte auf dem Scheitel liegend, klein; Fühler kurz, von halber Körperlänge, ihr drittes und viertes Glied sehr lang, die folgenden zusammen an Länge übertreffend; Thorax lang, fast cylindrisch, Flügeldecken lang und schmal, hinten in divergirende Spitzen endigend. Art: *E. Moorei* (pl. 23. fig. 9) von Java. — 4) *Eris* n. g. von *Anthrribus*-ähnlicher Gestalt, neben *Olenocamptus* zu stellen; Kopf breiter als der Thorax, Palpen kurz, fadenförmig, Fühler länger als der Körper, von einander entfernt eingefügt, ihr erstes und viertes Glied gleich lang, das dritte viel länger; Thorax länger als breit, unbewehrt, Flügeldecken beträchtlich breiter, niedergedrückt. Art: *E. anthriboides* (pl. 22. fig. 7) von Borneo. — 5) *Scopadus* n. g.,

mit *Leptoplia* Dej. nahe verwandt, von dieser Gattung jedoch durch die Bildung des Thorax und der Schenkel abweichend. Der Kopf ist gross, die Fühler länger als der Körper, gewimpert, der Thorax schmäler als der Kopf, länger als breit, gewölbt, die Flügeldecken mit einem hohen Buckel hinter den Schultern, an der Spitze stark convex und abgerundet, die Schenkel keulenförmig, die Tarsen sehr kurz. Art: *Sc. ciliatus* (pl. 22. fig. 5) vom Amazonenstrom. — Neue Arten sind ferner: *Agelasta irrorata* von Java, *Cacia concinna* von Borneo, *setulosa* von Java, *confusa* von Malacca, *inculta* von Borneo, *Newmani* von Malacca, *Penthea Saundersii* vom Schwanen-Flusse, *Monohammus hilaris* aus Nord-China, *permutans* ebendaher, *carissimus* von Burmah, *Cereopsius marmoreus* von Malacca, *exoletus* von Borneo, *Phymasterna concreta* von Port Natal, *Praonetha posticalis* von Ceylon, *melanura* von Malacca, *Hathlia Buckleyi* aus Nord-Indien, *Apomecyna frenata* von Malacca, *Entelopes ionoptera* (pl. 23. fig. 8) von Borneo, *Asthatas straminea* von Burmah, *purpurea* und *terminata* von Malacca, *Nemotragus cincticornis* von Port Natal.

Von Thomson (Archives entomologiques I) wurden folgende neue Gattungen und Arten beschrieben und zum Theil abgebildet: *Batocera Victoriana*, eine schöne Art von Borneo (p. 24, Abbildung auf dem Titeltupfer). — Einige mit *Tragocephala* in naher Verwandtschaft stehende Gattungen wurden unter dem Titel: „Monographie du groupe des Tragocephalites“ durch Beschreibung und Abbildung der ihnen zugehörigen Arten abgehandelt (p. 25—38. pl. 4—6). Die Gruppe der *Tragocephalites* soll 5 Gattungen umfassen: *Phosphorus* n. g., auf Ceramb. *angolator* Oliv. begründet, *Tragocephala*, *Tragiscus* n. g. mit 2 neuen Arten, *Poimenesperus* n. g. mit 1 neuen Art und *Callimation* Dej. — Die Gattung *Tragocephala* umfasst hier 11 Arten (einige bereits beschriebene sind übergangen worden), von denen als neu aufgestellt sind: *Tr. heteroclitia* von Pt. Natal, *Boerensis* (ist = *Tr. ducalis* White) ebendaher, *venusta* Klug (ist von Bertoloni als *Tr. variegata* beschrieben worden und muss daher so genannt werden) von Mossambique, *Castnia* vom Senegal, *Buquettii* von Gabon, *Bowringii* (ist = *Tr. Chevrolatii* White) von Pt. Natal, *Mniszechii* ebendaher, *Gorilla* von Guinea. — Die Gattung *Tragiscus*, deren Name später p. 67, als schon von Klug vergeben, in *Tragiscoschema* umgewandelt wird, scheint nach der Abbildung der beiden Arten *T. Bertolonii* aus Mossambique und *lascivus* von Port Natal mit der Gattung *Rhaphidopsis* des Ref. zusammenzufallen. — Die Gattung *Poimenesperus* ist von kürzerer Form als die vorhergehenden, die Fühler dicker, das dritte Glied (nicht das vierte, welches irrthümlich bei allen diesen Gattungen als das längste bezeichnet wird) am längsten, die übrigen vom sechsten an undeutlich gegliedert; der Vorsprung der Prosternum verlängert, an der Spitze zweilappig, der des

Mesosternum fast oval, stark hervortretend. Art: *P. voluptuosus* von Port Natal. — Callimation mit drei Arten: *C. callipygum* (venustum Dej.) von Madagascar, *pontificum* von Guinea und *pyrgopolynicum* vom Senegal. — Sämmtliche Arten der Gruppe sind durch sehr schöne Abbildungen erläutert.

Unter einem entsprechenden Titel: „Monographie du groupe des Tapeinites“ beschrieb derselbe (ebenda p. 39—44. pl. 7) die vier ihm bekannten Arten der Gattung Tapeina, für welche er die Gruppe Tapeinites errichtet. Was der Verf. als *T. erectifrons* beschreibt, ist offenbar die *T. coronata* Serv. (*picea* Serv. Perty), schon weil es die in Brasilien gemeinere Art ist; dagegen ist *T. coronata* des Verf., im hiesigen Museum aus Columbien, von der Serville'schen Art gleiches Namens verschieden. Eine neue Art aus Mexiko ist ausserdem noch *T. transversifrons*.

Ebenda p. 45—67 giebt der Verf. einen „Essai monographique sur le groupe des Tetraophthalmites,“ zu welchem keine Abbildungen gegeben werden und der daher wegen der Oberflächlichkeit der Beschreibungen für die Bestimmung fast vollständig unbrauchbar ist. Die abgehandelten Gattungen sind: 1) Tetraophthalmus Blanch. (wofür der ältere Name Astathes Newm. einzuführen ist) mit 10 beschriebenen Arten, von denen *T. Daldorfii* des Verf. nicht mit der Illiger'schen Art gleiches Namens identisch sein kann, da diese auf der Unterseite stets hell rostroth gefärbt ist. Neue Arten sind: *T. Mniszechii* von den Philippinen, *Japonicus* aus Japan, *ignorantinus* (Kuhlii Dalm.?) von Java, *violaceipennis* Dej. aus Nord-Indien, *episcopalis* (Chevrol.?) aus Shangai und *testaceus* aus Java. (Die drei von Newman beschriebenen Arten sind dem Verf. unbekannt und werden daher dessen Diagnosen abgedruckt, ebenso dessen Gattung Tetraglenes.) 2) *Plaxomicrus* n. g. von der vorigen Gattung dadurch abweichend, dass das dritte Fühlerglied nicht so lang als die beiden folgenden zusammen ist, ferner durch den schmaleren Prothorax, die mehr genäherten Vorderhüften und den fehlenden Fortsatz des Mesosternum. Zwei Arten: *Pl. Fortunei* und *ellipticus* von Shangai. 3) *Hecphora* n. g., für *L. testator* Fab. Oliv. vom Senegal errichtet. 4) *Tetraopes* Dalm. Es werden nur *T. varicornis* Klug und *11 punctatus* Dej. aus Mexiko beschrieben, die übrigen aus Nord-Amerika beschriebenen Arten von Say und Le Conte nach diesen angeführt. 5) *Lamprocleptes* n. g. von Tetrops durch den Prothorax unterschieden, der einen dicken, kreisrunden Vorsprung in der Mitte zeigt; der Prosternalfortsatz ist gegabelt, der Mesosternal-Vorsprung verlängert, die männlichen Fühler überragen ein wenig die Körperlänge. Art: *L. entomologorum* aus Brasilien (?). 6) *Tetrops*, ohne neue Arten. — Die Gattung *Lamprocleptes* wird später (p. 152) als mit *Phaea* Newm. identisch angegeben.

Ebenda (p. 68—77. pl. 9) „Essai synoptique sur les Comptosomites“, mit einer ausgezeichnet schönen Tafel, welche Abbildungen der beschriebenen Arten liefert, ausgestattet. Der Verf. nimmt drei Gattungen an: *Pythais* n. g. für *Lam. scutigera* Vigors errichtet, *Comptosoma* Serv. mit 9 Arten, wovon *C. Mnischehii* vom Amazonenstrom, *Chabrilacii* von Rio, *franciscum* aus Brasilien neu sind, und *Tessarecphora* n. g. mit einer Art *T. arachnoides* aus Brasilien, eine Gattung, die nur auf einen spezifischen Charakter, die etwas abweichende Fühlerbildung, gegründet ist; die auch im hiesigen Museum befindliche Art zeigt in Form und Zeichnung eine so auffallende Aehnlichkeit mit *Comps. variegatum* Serv., dass sie schon hiernach sehr wohl mit *Comptosoma* vereinigt bleiben kann.

Ebenda (p. 79) „Description d'un genre nouveau des Cérambycides.“ Der Verf. errichtet für *Monohammus blattoides* Pascoe eine neue Gattung *Hotarionomus*, deren Charaktere er auseinandersetzt; sie ist mit *Monohammus* und *Triammatus* verwandt und scheint durch den verlängerten Thorax sich *Tacniotes* zu nähern.

Ebenda (p. 124 ff.) neue Arten: *Monohammus Nicoletii* von Singapore, *Ceroplesis callipyga* von Pt. Natal, *Javetii* aus Ostindien (im hiesigen Museum von Madras) und *Sternodonta philosophica* vom Senegal (= *St. ducalis* Klug var.).

Ebenda (p. 127) eine neue Gattung *Clythraschema*, nach dem Verf. mit *Tetraopes* und *Cryptocranium* verwandt, die freilich weit auseinander stehen; nach der Abbildung eine Lamien-Form von ziemlich gedrungenem Baue, mit fast getheilten Augen, deren beide Theile nur durch eine schmale Brücke zusammenhängen; Fühler fast von Körperlänge, ihr erstes Glied gross, angeschwollen; Endglied beider Taster konisch, Oberlippe gerundet, Mandibeln wenig verlängert; Thorax seitlich leicht gerundet, Flügeldecken zusammen fast doppelt so breit, parallel, an der Basis gerade abgeschnitten, hinten stumpf zugerundet. Art: *Cl. Chabrilacii* von Rio-Janeiro, schwarz, mit goldgelben Flügeldecken, die auf der Scheibe je einen grossen braunen Fleck zeigen; Basalglied der Fühler roth.

Ebenda (p. 139—147) gab derselbe eine Uebersicht der *Stibara*-Arten seiner Sammlung, deren Zahl sich auf 30 beläuft, wobei jedoch zu bemerken ist, dass der Verf. die Gattungen *Glenea* Newm. und *Sphenura* Chev. mit *Stibara* Hope vereinigt. Als neu werden folgende beschrieben: *Stibara Indiana* aus Ostindien, *St. Mariae* aus Sylhet, *funerula* aus Indien, *capriciosa* ebendaher, *anticepunctata* von Java, *obsoletepunctata* aus Indien, *Oudetera* von Borneo, *arithmetica* von Ceylon (auch von Nietner dort aufgefunden), *algebraica* von Java und Borneo, *mathematica* und *illuminata* von Singapore, *ana* von Java, *obesa* von Sylhet, *Argus* aus Indien, *sanguinaria* von Java

(scheint = ochracea Guér. zu sein) *carinata* von Java (ist = costata Wied.), *cosmopolita*, *annulata* und *bicolor* aus Indien. Bei der Oberflächlichkeit der Beschreibung dieser Arten, welche nicht abgebildet werden, ist eine Bestimmung in den meisten Fällen unmöglich.

Ebenda (p. 151) *Dorcadion Fairmairei* n. sp. aus Griechenland, auf pl. 10. fig. 6 abgebildet, eine sehr robust gebaute, glänzend schwarze Art, die neuerdings viel aus Griechenland zu uns gelangt ist.

Ebenda (p. 169—194) Diagnosen einer grösseren Reihe neuer Gattungen und Arten: *Lubentia* n. g. von Ancyronotus Cast. durch den Mangel der Dornen auf der Oberfläche, dicke Fühler, deren drittes Glied nicht geschwungen ist, unbewaffneten Thorax, starken Vorsprung des Mesosternum, gedornte Flügeldeckenspitze u. s. w. unterschieden, mit einer Art: *L. voluptuosa* von Manilla. — *Batocera Chinensis* n. A. aus China (im hiesigen Museum auch aus Japan, von wo sie de Haan unter dem Namen *L. catenator* verbreitet hat), *Chlorinda* aus Ostindien, *Taeniotes insularis* von Cuba, *Amazonum* aus Brasilien, *suturalis* (Dej.) aus Mexiko (diese beiden Arten scheinen einerlei zu sein, da die Exemplare des hiesigen Museums aus Mexiko, Costa-Rica und Columbien übereinstimmen und zugleich auf beide passen), *inquinatus* (Dej.) aus Columbien, *inermis* (Chevr.?) aus Mexiko. — *Rhodopis* n. g., vom Ansehn der Gattungen Hotionomus und Triammatus, doch nur das dritte Fühlerglied an der Spitze stark angeschwollen, der Thorax undeutlich an den Seiten gedorn, die Vorderbeine so kurz wie die übrigen. Art: *Rh. pubera* aus Sylhet, pl. 10. fig. 7. — *Monohammus cylindricus* n. A. von Java. — *Rhamses* n. g., auf Monoh. bipunctatus Schönh. begründet. — Die Gattung *Leptoderia* Dej. Cat. wird charakterisirt und folgende Arten derselben beschrieben: *Lepr. elongata* von Java, fimbriata Chevr., *plagiata* von Java (scheint nach der Beschreibung = *L. trimaculata* Chevr. zu sein), *spinosa* von Java, *pleuricosta* von Java (ist = *L. maculatrix* Perty = *Carcelii* Guér.; der Name pleuricosta ist offenbar aus pleurocausta verunstaltet, unter welchem die Art von Hagenbach verbreitet wurde). — *Phryneta hecphora* aus Guinea, *Senegambiae*, *pallida* von Pt. Natal. — *Hecyra* n. g., mit einer Gattung Psycholupes in Vergleich gestellt, die vorläufig noch nicht charakterisirt ist (!). Art: *H. improba* von Pt. Natal. — *Hechinoscema* n. g. (der Igel heisst nicht Hechinus, sondern Echinus, Ref.), Fühler um die Hälfte länger als der Körper, das dritte und vierte Glied gleich lang, das letzte das längste von allen; Thorax mit einem Seitendorn, Flügeldecken hinten abgerundet, mit einem Schulterdorn und mit stacheliger Scheibe. Art: *H. spinosa* aus Sylhet. — *Morimus lethalis* n. A. aus Shangai. — *Morimopsis* n. g., von Morimus durch das zweite nicht geschwungene Fühlerglied (?), den Thorax, der länger als breit

und hinten schmaler ist, breitere und convexere Flügeldecken, verlängerte Hinterbeine unterschieden. Art: *M. lacrymans* aus Ostindien. — Gattung *Diastocera* Dej. charakterisirt. — *Ceroplesis zonaria* n. A. von Port Natal. — *Eutaenia* n. g., auf *Ceroplesis Javetii* (p. 125) gegründet, *Pycnoptera* n. g. ebenso für *Cerosterna brachyptera* Boh. von Pt. Natal. — *Tragocephala Bassamensis*, *Prosopocera Belzebuth* (Chevr.?) aus Senegambien, *Apocoptoma Chabrillacii* aus Brasilien, *Taurorcus* n. g. mit *Dorcadion* verwandt und mit einer Brasilianischen Art: *T. Chabrillacii*, *Platiomopsis* (Blanch.) n. g. für *Lamia obliqua* Donov. errichtet, *Mallonia*, neue Benennung für *Mastigocera* Dej., welche Gattung ebenso wie *Zygocera* und *Imantocera* Dej. charakterisirt wird; *Moncilema carinata* und *albotessellata* n. A. aus Mexiko, *Zygocera pallidicornis* aus Neu-Holland, *mortalis* aus Java; *Anauxesis* n. g. für *Hippopsis cincticornis* Pascoe, *Authades* n. g. *Indianus* aus Ostindien und *Psathyrus* n. g. *Aeolis* vom Cap, beides schlanke Lamienformen vom Habitus der Gattung *Nemotragus* Klug und *Canidia* neue Gattung, deren Verwandtschaft nicht weiter bezeichnet wird, mit einer Art: *C. cincticornis* von Costa-Rica. (Die Gattung *Psathyrus* wird nachher als identisch mit *Listrocerum* Chevr. bezeichnet.)

Ebenda (p. 289) *Astynomus Celebensis* n. A. von Celebes. — p. 292 ff.: *Embryon* n. g. wird als mit *Brachychilus* Gay verwandt angegeben, von kleinem, robusten Körper, die Fühler sich gegen die Spitze hin verdickend, indem die Glieder vom achten an erweitert sind; Thorax abgerundet, im hinteren Dritttheil etwas breiter, dann plötzlich scharf abgeschnitten und am Hinterrande zugeschärft; Schildchen abgerundet, Flügeldecken kurz oval, abgerundet; Tarsenglieder breit, quer. Art: *E. griseovillosum* aus Brasilien, 4—5 mill. — *Monohammus subfuscus* und *adamitus* von Singapore, *subgemmaus* aus Sylhet, *desperatus* aus Neu-Holland, *Dejeanii* aus Java, *griseipennis* aus Indien, *Gnoma sticticollis* von Celebes und Java (scheint auf kleine Exemplare von *Gnoma longicollis* Fabr. gegründet zu sein), *Cerosterna laevigator* aus Nord-China (eine hübsche, von *C. punctata* wohl unterschiedene Art), *Rhamses Alcanor* Newm. von Celebes. — Die Gattung *Aerenea* Dej. Cat. wird charakterisirt und *Aer. posticalis* als n. A. aus Brasilien beschrieben, ebenso *Alphitopola* Dej. mit *A. lactea* vom Senegal, *Mycerinus* neuer Name für *Hathlia* Dej., mit *Myc. dorcadoides* vom Senegal, *Atmodes* neuer Name für *Mylothris* Dej., *Agennopsis* ebenso für *Talaepora* Dej., mit *Ag. mutica* n. A. aus Brasilien, *Hebestola* Dej. Cat. mit *Heb. comata* aus Brasilien, *Phaula* Dej. Cat. mit *Ph. antiqua* und *melancholica* aus Brasilien, *Onocephala* Dej. Cat. mit *Onoceph. rugicollis* aus Brasilien (wohl = *O. diophthalma* Perty), *Clinia* n. g. eine schmale, fast gleich breite Saperden-Form mit dünnen Fühlern von Körperlänge, unbewehrtem, hinten beiderseits gerundetem, vorn stark halsförmig

verengtem Thorax und an der Spitze ausgerandeten, zweidornigen Flügeldecken. Art: *Cl. senegalensis* pl. 10. fig. 9, vom Senegal. (Die Gattung ist identisch mit *Proctocera* Chevr.) — *Rondibilis* n. g. mit *Psathyrus* (*Listrocerum*) verwandt, mit einer Art *A. bispinosa* aus Indien. — *Cirrhicera* n. g. auf einige *Amphionycha*-Arten begründet, bei denen nur das 5. und 6. Fühlerglied mit einem Haarschopfe versehen ist, wie *Cirrh. leucronota* (sic!) aus Mexiko, eine Art, die schon von Castelnau als *Hemilophus leuconotus* beschrieben worden ist, *nigrina* aus Venezuela, *Sallei* aus Mexiko; den Gattungsnamen *Amphionycha* Dej. will der Verf. auf solche Arten beschränken, welche gar keine Haarbüschel haben. (Es scheint jedoch als wenn diese Behaarung der Fühler von gar keiner generischen Bedeutung ist, besonders auch deshalb, weil alle Uebergänge zwischen dicht behaarten, dünn behaarten und gebüschelten Fühlern bei *Hemilophus*, *Amphionycha*, *Spathoptera* und *Cirrhicera* vorkommen, wonach diese Gattungen, zugleich wegen der übereinstimmenden Bildung der Fussklauen am besten vereinigt werden. Ref.) — Die Gattungen *Aerenica* Dej. Cat. und *Amillarus* (geänderter Name für *Aphies* Dej.) werden charakterisirt, jedoch keine dazu gehörige Art beschrieben, so dass die Charaktere unverständlich sind; *Frixus* n. g. mit *Oberea* verwandt, eine Art: *Fr. variegatus* aus Indien, *Nyctimene* n. g. aus derselben Verwandtschaft, Art: *N. agriloides* von Java, *Aglaophis* n. g. aus der Verwandtschaft von *Hastatis*, mit einer Art: *A. fasciata* aus Indien.

Ebenda (p. 343) *Apomecyna tigrina* als neue Art von Java beschrieben. — p. 384 ff. Uebersicht der Arten der Gattung *Trachysomus*; es werden fünf beschriebene aufgeführt (von denen *Trach. elephas* Buq. auf die *Lam. verrucosa* Oliv. zu reduciren wäre, Ref.) und zwei neue: *Trachysomus Buquetii* und *peregrinus* aus Brasilien beschrieben.

Ebenda (p. 409) *Thryallis* n. g. im Habitus mit *Anisocerus* verwandt, auf *Onychocerus undatus* Chevr. aus Mexiko begründet, mit einer neuen Art: *Thryallis maculosus*, ebenfalls aus Mexiko.

Ebenda (p. 444 ff.) *Monohammus longicornis*, *rarus*, *Rhamses Arouensis*, *Batocera Wallacei* und *Laena* von der Insel Arou, *Celebiana* von Celebes, *Sarawakensis* von Borneo, *Ajax* und *Hector* Dej. Cat. von Java, *ferruginea* (Blanch.?) von Ceylon, *Glenea Arouensis* und *cyanipennis* von der Insel Arou.

Chevrolat (Revue et Magas. de Zool. IX. p. 105) beschrieb eine neue Gattung *Triammatus*, welche in der Körperform, Schienenbildung u. s. w. mit *Monohammus* zunächst verwandt ist, aber durch den verlängerten, vorn dreieckig verengten Kopf und besonders durch die Fühler, an denen das 3. und 4. Glied an der Spitze stark knotenartig angeschwollen, das 5. in der Mitte spindelförmig verdickt, an der Basis und Spitze aber eingeschnürt ist, abweicht. Art: *Triam*

Saundersii von Borneo, Taf. 6. Fig. 3 abgebildet. — Das von Chevrolat nicht beschriebene Weibchen, welches sich vom Männchen durch die Fühler- und Prosternalbildung unterscheidet, wurde von Thomson „Remarques sur le genre *Triammatus* de la famille des *Cerambycides*“ (Annales de la soc. entomol. p. 107, Archives entomol. I. p. 149) bekannt gemacht.

Derselbe machte (Revue et Magas. de Zoologie IX. p. 74, 107 und 166 ff.) folgende neue Arten von Old-Calabar bekannt: *Monohammus basalis*, *Phryneta coeca*, *Prosopocera ocellata*, (?) *pictiventris*, *Temnoscelis taeniolatus*, *Sthenias verticalis*, *Xylorrhiza biapicata*, *Acmocera subundata*, *Saperda apicalis*, *Sphenura lineigera*, *sexpunctata*, *impunctata*, *occipitalis* und *Oberca* (?) *dimidiaticornis*.

Derselbe (Archives entomol. I. p. 417 f.) beschrieb *Scopodus? bicuspis* unbekannten Vaterlands und *Stegenus denticornis* n. A. aus Java.

Buquet (ebenda p. 327 ff.) gab eine Charakteristik der Gattung *Hemicladus* Dej. Cat. und beschrieb drei derselben angehörende Arten: *Hem. Dejeanii* von Cayenne, *Thomsonii* und *callipus* aus Brasilien, letztere beiden auf pl. 14. fig. 4. 5 abgebildet. Die Gattung ist unter den Lamien-Formen Brasiliens durch die Bildung der Fühler, an denen das 4. bis 7. Glied in Form einer flachgedrückten Lamelle verbreitert ist, sehr ausgezeichnet. — Ferner charakterisirte derselbe (p. 333 ff.) die Gattung *Atelodesmis* Dej. Cat. mit fünf Arten: *Atel. hirticornis* und *vestita* aus Brasilien, *unicolor* aus Mexiko, *octomaculata* und *viridescens* aus Brasilien. Die dichte Behaarung der vier ersten Fühlerglieder ist kein charakteristisches Merkmal der Gattung, sondern kommt nur den beiden ersten Arten zu. — Ebenda p. 333 ff. wird die Gattung *Hastatis* Dej. Cat. mit drei Arten: *Hast. denticollis* und *auricollis* aus Brasilien, *signaticornis* aus Cayenne beschrieben. — *Tragocephala Blutelii* ist eine neue Art desselben Verf. vom Gabon (ebenda p. 202).

Chabrillac (ebenda p. 199 f.) neue Arten aus Brasilien: *Onychocerus hammatu*s, *Hemilophus dirus* und *Mniszechii*.

Javet (ebenda p. 412): *Batocera Thomsonii* n. A. aus Borneo.

Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 61 ff.) neue Arten von der Insel Woodlark: *Lamia* (*Batocera*) *Woodlarkiana*, *Monohammus Lessonii*, *fasciatus*, *Apomecyna porphyrea*, *Penthea undata*, *Woodlarkiana*, *assimilis*, *adspersa*, *Saperda punctata* (vergebener Name!) und *melancholica*.

Jacquelin du Val (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 112 ff.) neue Arten von Cuba: *Acanthoderes circumflexus* (Klug i. lit.), *Probatius umbraticus* (Klug i. lit.), *Amniscus sagittatus* (Klug i. lit.), *transversatus* Klug i. lit. (diese Art ist im Doubletten-Verzeichnisse von Klug unter dem Namen *A. incrassatus* Dej. diagno-

sticirt worden. Ref.), *argentatus* Dej. Cat. und *dealbatus* Dej. Cat. — Die Gattung *Eutheia* Dej. tauft der Verf. in *Euthuorus* um, da ersterer Name schon vergeben ist, rechnet dieselbe aber irriger Weise zu den Leptureten, während sie zu den Saperden gehört; die Art *E. filum* ist übrigens schon von Guérin in der Iconographie beschrieben worden.

Zwei als neu beschriebene inländische Arten sind: *Pogonocherus multipunctatus* Georg (Entomol. Zeitung p. 64) aus Hannover und *Oberea melanura* Gredler (Käfer von Passeier) aus Tyrol.

Lepturetae. — Pascoe (Transact. entomol. soc. IV. p. 111. pl. 22. fig. 8) gab die Beschreibung und Abbildung einer neuen Gattung *Noëmia*, die er mit *Stenoderus* nahe verwandt hält, von der es aber wohl zweifelhaft ist, ob sie nicht der Gruppe der *Cerambyces* genuini beizuzählen ist. Der Kopf ist zwischen den Augen bucklig, die Fühler sehr lang, von mehr als doppelter Körperlänge, unterhalb der Augen entspringend, mit langen Haarbüscheln an der Innenseite der einzelnen Glieder; die Augen gerundet, ganzrandig, die Lippen-taster klein, die Kiefertaster mit längerem und eiförmigem Endgliede. Thorax schmal, seitlich mit einem Dorne; Flügeldecken linear, an der Spitze abgerundet; Beine schlank, von mässiger Länge, mit kurzen Tarsen. Art: *N. flavicornis* von Malacca.

Thomson (Archives entomol. I. p. 317 ff.) charakterisirte folgende neue Gattungen der Leptureten-Gruppe: *Pachyticon* n. g., vom Ansehn der Gattung *Pachyta*; Augen sehr gross, ausgerandet, auf dem Scheitel stark genähert, Fühler ähnlich wie bei *Distenia*, fadenförmig, dreimal so lang als der Körper, das dritte Glied kaum länger als das vierte, die folgenden fast gleich gross, das letzte so lang als die drei vorhergehenden zusammen; Palpen sehr gross, kräftig, mit ovalem Endgliede; Thorax wie bei *Vesperus*, unbewehrt, Flügeldecken an der Basis breiter als der Thorax, nach der fast scharfen Spitze hin allmählig verengt. Art: *P. brunneum* vom Cap. — Ferner werden die Gattungen *Mostododera* Blanch. (Typus *Toxotus basalis* d'Urv.), *Ophistomis* Dej. Cat. und *Oedecnema* Dej. Cat. mit Charakteren versehen, jedoch keine ihnen angehörige Art beschrieben.

Le Conte (Entomol. Report p. 62 ff.) beschrieb als neue Arten aus Californien und dem Oregon-Gebiete: *Acmaeops fusca*, *lugens*, *subcyanea*, *tumida*, *Toxotus spurcus*, *Leptura impura*, *laeta*, *amabilis*, *valida*, *crassipes* und *fuscollicis*.

Newman (Transact. of the entomol. soc. IV. p. 53): *Stenoderus quietus* n. A. von Moreton-Bay.

Chrysomelinae. Sagrides. — Thomson (Archives entomol. I. p. 396 und 411) beschrieb *Sagra Natalensis* von Pt. Na-

tal und *Lacordairei* von der Westafrikanischen Küste, Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 66): *Orsodacna splendida* von der Insel Woodlark.

Donacides. — Als neue Arten aus dem Oregon-Gebiete wurden von Le Conte (Entomol. Report p. 66) *Donacia pyritosa*, *Syneta albida* und *simplex* beschrieben.

Criocerides. — Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 68) beschrieb *Lema bipustulata* n. A. von Woodlark.

Clythrines. — *Saxinis saucia* Le Conte (Entomol. Report p. 66) n. A. aus Californien und dem Oregon-Gebiete.

Cryptocephalides. — Stål „Till kändedom af Phytophaga“ (Öfversigt af Kongl. Vetensk. Akad. Förhandl. XIV. p. 60 ff.) machte eine Reihe Süd-Amerikanischer Arten dieser Gruppe und darunter auch zwei neue Gattungen durch Diagnosen bekannt. *Mylassa* n. g. mit *Cryptocephalus* zunächst verwandt: „Corpus oblongo-quadratum, antennae filiformes, oculi integri, haud sinuati, thorax postice ante scutellum triangulariter retrorsum productus et huius partem dimidiam basalem tegens, elytris aequilatus; elytra thorace fere duplo longiora.“ Zwei Arten: *M. fasciatipennis* und *socia* aus Chile. — *Monachus cyanopterus*, *luteicollis*, *ochropus*, *pustulipennis*, *geniculatus*, *pallipes*, *rubropustulatus* von Rio-Janeiro, *rubrosignatus* aus Chile. — *Mecostethus* n. g. mit *Monachus* zunächst verwandt: „Corpus cylindricum, subelongatum, latitudine plus 1½ longius; antennae filiformes, articulo basali subelongato, oculi valde sinuati, basi contigui; thorax posterius transversim depressus, ante scutellum levisime sinuatus, basi elytris aequilatus et ea fere amplexans; scutellum parvum; elytra thorace plus duplo longiora, convexa; prosternum anterius pone caput deflexo-productum, postice medio impressum aut incisum.“ Art: *M. Sahlbergii* von Rio-Janeiro. — *Pachybrachys humeralis* aus Neu-Granada, *signifer* aus Minas Geraes, *pustuliger*, *flavopustulatus*, *nigro-ornatus*, *limbiventris*, *pallididorsis* von Rio-Janeiro, *pallidilabris* und *moerens* aus Brasilien.

Perris (Insectes du pin maritime, Annales de la soc. entom. V. p. 341 ff.) machte Mittheilungen über die Naturgeschichte des *Disopus pini*, dessen ersten Stände noch völlig unbekannt geblieben sind; er erscheint in Südfrankreich von Anfang Oktober an und ist bis zu Ende dieses Monats und selbst bis zum November und December sehr gemein. Er hält sich stets auf Fichten von sechs bis fünfzehn Jahren auf und zwar mehr auf sparsam stehenden oder am Rande von Gehölzen; er ernährt sich von den Nadeln, in die er eine lineare Furche, oft über die ganze Länge hin einfrisst. P. glaubte zuerst, dass diese Furche zum Hineinlegen der Eier gemacht würde, doch haben ihn

wiederholte Beobachtungen belehrt, dass dem nicht so sei. Er traf die Insekten häufig in Begattung und die Weibchen legten auch in der Gefangenschaft längliche, hellgelbe Eier; wohin dieselben im Freien gelegt werden, ist dem Verf. unbekannt geblieben.

Enmolpidae. Neue Arten sind: *Eumolpus smaragdulus* Le Conte (Entomol. Report p. 67) aus Californien, *Heteraspis Japana* Motschulsky (Etudes entomol. VI. p. 37) aus Japan und *Eumolpus in-testinarum* Thomson (Archives entomol. I. p. 126) aus Brasilien.

Chrysomelae genuinae. — Sehr werthvolle Beiträge zur Kenntniss der ersten Stände und der Entwicklungsgeschichte mehrerer einheimischer Chrysomelinen lieferte Cornelius (Entomol. Zeit. p. 162—171 und p. 392—405) in einer Abhandlung: „Ernährung und Entwicklung einiger Blattkäfer.“ Die Tüchtigkeit der Beobachtungen des Verf., welche schon aus seinen früheren Untersuchungen über die Larven der Cassiden u. s. w. bekannt ist, bestätigt sich in der vorliegenden Arbeit von Neuem und letztere liefert zugleich den sprechendsten Beweis, wie wichtig für die Unterscheidung mancher Arten die Kenntniss der Larven und die Beobachtung ihrer Lebensweise ist. Bekanntlich sind die verschiedenen Autoren über die Artrechte der *Phratora vitellinae* und *vulgatissima* abweichender Ansicht gewesen, bis Suffrian dieselben nicht nur als Arten anerkannte, sondern auch ausserdem zwei andere, ebenfalls sehr ähnliche als *Phr. tibialis* und *laticollis* abtrennte. Cornelius hat sich nun bemüht, die Larven dieser Arten zu beobachten und die Käfer daraus zu erziehen, wobei sich nicht nur die vier von Suffrian angenommenen Arten als sicher herausstellten, sondern sogar noch eine fünfte zum Vorschein kam, welche der Verf. als *Phratora atrovirens* charakterisirt. Die Larven unterscheiden sich zum Theil schon durch die Futterpflanzen, indem *Phr. laticollis* und *atrovirens* z. B. nur von Espen, *Phr. vulgatissima* nur auf Wollweiden, *Ph. tibialis* auf *Salix purpurea* lebt, während *Phr. vitellinae* verschiedene Weiden- und Pappelarten frisst. Auffallendere Unterschiede bieten die Larven selbst dar, wie z. B. bei denen der *Phr. vitellinae*, *tibialis* und *atrovirens* die Unterseite gefleckt, bei den beiden andern dagegen ungefleckt ist. Nebst einer genauen differentiellen Beschreibung der Larven aller fünf Arten giebt der Verf. auch eine solche von den Käfern und zwar hebt er besonders die Unterschiede der neuen *Phr. atrovirens* von *Phr. vulgatissima* und *laticollis* hervor. — Fernere Arten, deren erste Stände vom Verf. ausführlich beschrieben werden, sind *Hellodes phellandrii* (Larve auf *Cicuta virosa*), *hannoverana* (auf *Caltha palustris*), *marginella* und *aucta* (auf *Ranunculus*-Arten); während die Larven der drei letzteren Arten äusserst ähnlich und selbst bei genauer Betrachtung kaum von einander zu unterscheiden sind, zeigen die Puppen auffallende Unterschiede, die vom Verf. in

einer Tabelle auseinandergesetzt werden. — Von den drei übrigen von Cornelius beschriebenen Larven lebt die der *Lina cuprea* auf *Salix triandra*; die der *Gonioctena viminalis* und *Plagiodera armoraciae* sind durch Letzner schon kurz zuvor zur Kenntniss gekommen, die C.'schen Beschreibungen enthalten jedoch vervollständigende und berichtigende Angaben über dieselben.

Die Larven des *Phaedon carniolicus* und der *Lina lapponica* sind durch Märkel (Allgem. Deutsche Naturhist. Zeitung 1857. p. 171 und 174 ff.) bekannt gemacht worden; die der ersteren Art nährt sich von *Stellaria nemorum*, hängt sich zur Verwandlung nicht an, sondern verpuppt sich liegend; die der zweiten lebt auf Weiden, deren Blätter sie skelettirt, indem sie alle Blattrippen, selbst die feinsten, verschont und hängt sich zur Verpuppung gestürzt auf. Der Verf. hebt mit Recht hervor, dass die Larven der Chrysomelen für die Systematik und besonders für die Abgränzung der Gattungen von Wichtigkeit seien; so z. B. zeichnen sich die Larven der Gattung *Lina* dadurch aus, dass sie auf dem zweiten und dritten Körperringe zwei Warzen führen, aus denen beim Drucke ein Tropfen Flüssigkeit hervordringt; auch die Art des Frasses und der Verpuppung würden hier in Betracht kommen.

Stål „Till kännedomen af Phytophaga“ (Öfversigt af Kongl. Vetensk. Akad. Förhandl. XIV. p. 53 ff.) machte als Vorläufer zu einer monographischen Bearbeitung der Gattung *Doryphora* 49 neue Arten derselben durch Diagnosen bekannt, welche hier namentlich aufzuführen überflüssig sein würde. Ferner zwei neue Ostindische Chrysomelinen-Gattungen: *Lycaria* n. g. „Corpus ovale, valde convexum; palpi apice oblongo-clavati, articulo apicali praecedenti aequilongo, sed graciliore, cylindrico; oculi oblongi, anterieus sinuati; antennae apicem versus sensim crassiores; thorax elytrorum tertiae parti aequilongus, transversus, antrorsum angustatus, anguste marginatus; scutellum utrinque et apice late rotundatum; unguiculi tarsorum fissi.“ Mit *Chalcomela* Baly verwandt. Art: *L. Westermanni* aus Assam. — *Phyllophila* n. g. „Corpus oblongo-subovatum, modice convexum; palpi cylindrici, articulo penultimo apice ultimo nonnihil latiore; antennae thorace cum capite dimidio longiores, apicem versus vix crassiores, articulo apicali fusiformi; tibiae simplices, unguiculi tarsorum a basi ultra medium paralleli, aequicrassi, dein subito angustiores.“ Mit *Gonioctena* zunächst verwandt. Art: *Ph. scdecimpustulata* von Pulo Penang. — Neue Arten sind ausserdem: *Chrysomela stictica* von Java, *Mellyi* aus Thybet, *pyrrhopyga* aus Ostindien, *Lina elata* ebendaher, *discolor* und *Entomoscelis ochroptera* vom Cap.

Baly, „Description of two insects belonging to *Pseudomela*, a new genus of Chrysomelidae“ (Transact. of the entomol. soc. IV. p. 87 f.) errichtete eine neue Gattung *Pseudomela*, an welcher er die

habituelle Aehnlichkeit mit *Eumolpus* hervorhebt, die aber nach der Bildung des dritten Tarsengliedes und der Fussklauen zu den eigentlichen Chrysomelen gehöre. Diese Gattung fällt mit der vom Ref. aufgestellten *Ceralces* (Jahresbericht f. 1855. p. 84) zusammen; die beiden von Baly beschriebenen Arten sind *Pseudom. Murrayi* von Old-Calabar und *Natalensis* aus Süd-Afrika.

Neue Arten sind ausserdem: *Chrysomela Duperreyi* Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 68) von der Insel Woodlark, *Chrysomela insulana* und *Lina cruentipennis* Jacquelin du Val (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 125 f.) von Cuba, *Chrysomela cobaltinus* Le Conte (Entomol. Report p. 67) und *Cyrtinus punctipennis* Fairmaire (Annales de la soc. entom. V. p. 744) aus den östlichen Pyrenäen.

Dietrich (Entomol. Zeitung p. 135) beschrieb eine von ihm früher als eigene Art angesehene Varietät der *Chrysomela fucata* (Chr. subseriepunctata Bremi Catal.).

Gallerucariae. — Eine Reihe neuer Arten aus Californien und dem Oregon-Gebiete machte Le Conte (Entom. Report p. 67 ff.) bekannt: *Haltica puncticollis*, *limbicollis*, *prasina*, *obolina*, *lazulina*, *cerina*, *aereola*, *subcrinita*, *ligata*, *subaenea*, *albionica*, *lepidula*, *Psylliodes parvicollis*, *convexior*, *Chaetocnema irregularis*, *Luperus varipes*, *longulus*, *Galleruca rudis*, *conspua*, *guttulata* und *morosa*.

Jacquelin du Val (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 126 ff.) folgende von Cuba: *Coelomera opacipennis*, *Phyllobrotica pulchella* Dej. Cat., *Monomacra costipennis*, *religata* Klug i. lit., *Strabala intermedia* Dej. Cat., *Systema basalis* und *Crepidodera uscata* Dej. Cat.

Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 69 ff.) folgende von Woodlark: *Galleruca ficus*, *Cristovallensis*, *macropoda*, *bicincta*, *flavescens*, *affinis*, *4-maculata* (Fabr.), *Boisduvalia* (nov. subgen. „Halsschild fast so breit als die Basis der Flügeldecken“), *sexlineata*, *circumdata* und *Haltica azurea* (Latr.).

Eine neue Gattung *Arthrotus* stellte v. Motschulsky (Etudes entomol. VI. p. 38) auf; Fühler lang, 2. und 3. Glied kurz, das 4. fast so lang als die drei ersten zusammengekommen; Maxillartaster mit dreieckigem, zugespitzten Endgliede, Lippentaster mit ovalem Endgliede, welches länger als das quer mondförmige vorhergehende Glied ist; Kopf stark quer mit hervortretenden Augen, Thorax quer, seitlich bei den zahnförmigen Vorder- und Hinterecken ausgebuchtet; Flügeldecken fast gleich breit, stark punktiert, mit deutlichen Schulterecken; erstes Tarsenglied breiter als das 2. und so lang als die beiden folgenden zusammengekommen. Art: *Arthr. niger* aus Japan. — *Rhaphidopalpa femoralis*, *Aulacophora nigripennis* neue Arten ebendaher.

Wollaston (Catal. of Coleopt. Insects of Madeira p. 132 ff.) beschrieb *Longitarsus consanguineus*, *fractus* und *excurrus* als neue Arten von Madeira, Fairmaire (Annales de la soc. entom. V. p. 641) *Psylliodes crassicollis* n. A. von Montpellier, Gredler (Käfer von Passaier) *Luperus gularis* aus Tyrol.

Thomson (Archives entomol. I. pl. 10. fig. 5) lieferte eine nochmalige Abbildung des *Loxoprosopus ceramboides* Guér. mas.

Hispaniae. — *Alurnus Dryas* Thomson (Archives entomol. I. p. 127) n. A. aus Columbien, *Odontota axillaris* (Dej. Cat.) Jacquelin du Val (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 130) n. A. von Cuba.

Cassidariae. — *Cassida testudinaria*, *aurata* und *strigula* Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 67) n. A. von Woodlark, *Cassida Rossii* Wollaston (Catal. of Coleopt. Insects of Madeira p. 130) n. A. von Madeira.

Erotylenae. Thomson (Archives entomol. I. p. 410) beschrieb *Omoiotelus spinifer* als neue Art vom Amazonenstrom.

Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 73 f.): *Triplax 4-vittata*, *4-maculata*, *4-pustulata*, *parallela*, *rhomboides* und *angustata* als neue Arten von Woodlark.

Endomychidae. Ref. hat (dies. Archiv für Naturgesch. XXIII, 1. p. 211—243) als Vorarbeit zu einer (jetzt erschienenen) Monographie dieser Familie die alten Gattungen *Eumorphus* und *Endomychus* einer näheren Untersuchung unterworfen, die unter ihnen enthaltenen Gattungen (im neueren Sinne) auseinandergesetzt und die gegenwärtig bekannten Arten durch Diagnosen festgestellt. („Versuch einer systematischen Auseinandersetzung der Gattungen *Eumorphus* Web. und *Endomychus* Payk.“). Nach Feststellung der Charaktere der Familie, besonders im Gegensatz zu den nahe verwandten *Coccinellinen*, wird eine Eintheilung in zwei Hauptgruppen: *Endomychidae genuini* und *adsciti* vorgenommen; bei ersteren ist das dritte Tarsenglied wie bei den *Coccinellinen* klein und im Grunde des vierten verborgen, bei letzteren dagegen frei entwickelt und aus dem vorhergehenden hervortretend. Die beiden Gruppen *Eumorphini* und *Endomychini*, den eben genannten älteren Gattungen entsprechend, gehören der ersteren Abtheilung der *Endomychidae genuini* an. Die *Eumorphini* zeichnen sich durch verlängertes drittes Fühlerglied und blattartig flachgedrückte Fühlerkeule, ausserdem durch die besonders prägnante Geschlechtsdifferenz aus. Sie umfassen 10 Gattungen: 1) *Amphisternus* Germ., von allen folgenden durch das gabelförmig gespaltene Prosternum unterschieden; 10 Arten, sämmtlich von den Sunda-Inseln, davon 7 neu. 2) *Spathomeles* n. g., mit fast verwachsenen Gliedern der Fühlerkeule, innen gezähnten und lang zu-

gespitzten Mandibeln, quерem Endgliede der Lippentaster und stark gekeulten Schenkeln; die Männchen mit hakenartigem Fortsatz auf der Scheibe der Flügeldecken; 4 sämmtlich neue Arten von den Sunda-Inseln. 3) *Engonius* n. g. von der vorigen Gattung durch die durchblättrte Fühlerkeule, die kurze Spitze der Mandibeln und den Mangel des Hakens auf den männlichen Flügeldecken unterschieden; 6 neue Arten von den Sunda-Inseln und Ceylon. 4) *Trycherus* n. g. (*Olenus* Dej.) mit am Innenrande gezähnten, an der Spitze gespaltenen Mandibeln, quерem Endgliede der Lippentaster und nicht gekeulten Schenkeln; 5 neue Arten, aus dem tropischen Afrika. 5) *Eumorphus* Web., auf die Ostindischen Arten mit lanzettlichem Prosternum, am Innenrande ungezähnten und an der Spitze abgestutzten Mandibeln, quерem Endgliede der Lippentaster und zusammengedrückten Schenkeln beschränkt; 22 Ostindische Arten, wovon 17 neu. 6) *Pedanus* n. g. kleinere Arten mit ganz stumpf abgerundeten Mandibeln umfassend; 3 neue Ostindische Arten. 7) *Dioedes* n. g. (*Aploscelis* Dej.) auf *Eumorphus atratus* Klug begründet, ausser dieser noch eine zweite Art von Madagascar umfassend. 8) *Encymon* n. g., durch ganz lineares, zwischen den Vorderhüften eingesenktes Prosternum von den vorhergehenden unterschieden; Mandibeln kurz, innen gezähnt, mit sehr scharfer Spitze, Lippentaster mit sehr breitem Endgliede; 1 neue Art von Sumatra. 9) *Cymbachus* n. g. Prosternum die Vorderhüften nicht überragend, eingeschnitten, Mandibeln schmal, innen gezähnt, mit verlängerter, ungetheilter Spitze, Lippentaster mit ovalem Endgliede; 1 neue Art von Java. 10) *Corynomalus* (Dej.) die Süd-Amerikanischen Eumorphiden umfassend, z. B. *Aegithus marginatus* und *discoideus* Fab. u. a., mit 16 Arten, von denen jedoch 2 als Varietäten einzuziehen sind. — Die Gruppe der Endomychini, welche sich durch nicht verlängertes drittes Fühlerglied, ungezähnte Mandibeln, hornige äussere Maxillarlade, gerundete Unterlippe und mangelnde Geschlechtsdifferenz an den Beinen auszeichnet, zerfällt in 4 Gattungen: 1) *Eucteanus* n. g. eine grosse, im Habitus den Eumorphen verwandte Form, mit sehr breitem Prosternum, langen, schlanken Beinen und sehr breiter, blattartiger Fühlerkeule; 1 neue Art vom Himalaya. 2) *Meilichius* n. g. von *Endomychus* durch verbreitertes Prosternum und schmale, schief abgestutzte Mandibeln unterschieden; 1 Ostindische Art. 3) *Endomychus* Payk. mit 4 Arten. 4) *Panomoea* n. g. ganz von der Form einer Coccinella, von der sie sich durch nicht beilförmiges Endglied der Kiefertaster und den Mangel der Schenkelfurchen des Hinterleibes unterscheidet; 1 Art von den Philippinen.

Thomson, Description d'un genre nouveau de la famille des Eumorphides et de plusieurs espèces, qui rentrent dans cette division (Archives entomol. I. p. 153—157). Die als neu angesehene

Gattung *Cacodaemon*, welche die Eumorphen mit gabelförmig getheiltem Prosternalfortsatz umfassen soll, fällt mit *Amphisternus* Germ. zusammen. Von den darunter beschriebenen 5 Arten gehören *Cac. Hopei* und *hamatus* nicht zu dieser Gattung, sondern zu *Spathomeles* des Ref., und zwar ist *Cac. Hopei* = *Spathomeles anaglyptus*, *Cac. hamatus* nicht der *Eum. hamatus* Dej. Guér., sondern *Spath. decoratus* des Ref. — Zu *Amphisternus* Germ. gehören: *Cac. lucifer* (= *Amph. aculeatus* G.) von Borneo, *Cerberus* (= *Amph. spinicollis* G.) von Java und der schon im vorigen Jahre beschriebene *Eum. satanas*. — Ausserdem glaubt der Verf. durch Hinzusetzung seines Namens zu den Gattungen *Olenus* Dej., *Quirinus* Dej., *Orestia* und *Leiestes* und durch Hinzufügung einiger allgemein gültiger Charaktere sich die Autorschaft für diese Gattungen zu erwerben, ohne jedoch darauf Rücksicht zu nehmen, dass die beiden letzteren schon von Germar und Redtenbacher charakterisirt worden sind; von den beiden ersten ist *Olenus* = *Trycherus* des Ref., *Quirinus* mit *Stenotarsus* Perty identisch.

Ebenda (p. 237—280. pl. 13) hat auch Guérin unter dem Titel: „Matériaux pour une monographie des Coléoptères du groupe des Eumorphides et plus spécialement du genre *Eumorphus*“ eine von ihm im J. 1834 verfasste Arbeit über diese Familie abdrucken lassen, welche eine Beschreibung der ihm bekannten *Eumorphus*-Arten und ausserdem aphoristische Notizen über die von Dejean in seinem Cataloge aufgestellten übrigen Gattungen nebst einzelnen Arten derselben enthält. Unter *Eumorphus* sind 19 Arten vereinigt, deren Beschreibungen gründlich abgefasst sind, so dass sie mit Sicherheit erkannt werden können, die der Verf. auf ihre generischen Abweichungen aber nicht näher untersucht hat; so gehört z. B. sein *Eum. Kirbyanus* weder dieser Gattung, noch überhaupt der Gruppe der *Eumorphini* an (Gattung *Indalmus* des Ref.), *Eum. Westermanni* muss ebenfalls eine eigene Gattung bilden, für *Eum. hamatus* hat schon Germar eine eigene Gattung *Amphisternus* errichtet, die dem Verf. nebst den zwei darunter beschriebenen Arten ganz unbekannt geblieben ist; *Eum. Hopei* und *quadrisignatus* bilden die Gattung *Spathomeles* des Ref. und fallen mit den darunter beschriebenen Arten zusammen, wogegen *Eum. Herklotsii* Guér. eine Art zu sein scheint, die dem Ref. nicht bekannt geworden ist. Die übrig bleibenden 12 Arten gehören der Gattung *Eumorphus* Web. an und sind sämmtlich vom Ref. ebenfalls, zum Theil unter anderen Namen beschrieben worden. Für die Gattung *Olenus* Dej. führt Guérin den Namen *Balius* ein (= *Trycherus* Gerst.) und beschreibt ausser *B. Senegalensis* noch eine Ostindische Art: *B. minutus*. — Was die übrigen kurzen und unzusammenhängenden Notizen des Verf. über die folgenden Dejean'schen Gattungen und Arten betrifft, so sind sie durchaus werthlos, da sie einerseits ohne Berücksichtigung der vorhandenen Literatur zu-

sammengeschrieben, andererseits nicht derartig abgefasst sind, dass sich für die Bestimmung der Gattungen und Arten etwas daraus ersehen liesse. Die von Redtenbacher, Germar, Say, Le Conte u. A. aufgestellten Gattungen und Arten werden als neu angesehen und ohne deren Citate beschrieben (z. B. *Epipocus*, *Leiestes*, *Rhanis*), andere Gattungen, wie *Orestia* Germ., die der Familie ganz fremd sind, ebenfalls mit abgehandelt; in gleicher Weise werden auch die älteren Fabricius'schen Arten, welche Dejean nicht erkannt hatte, unter des letzteren Namen aufgeführt und mit kurzen Diagnosen versehen. Von Interesse dürfte die Notiz sein, dass die Gattung *Pelinus* Dej. nicht dieser Familie, sondern den Heteromeren angehört. — Eine die Abhandlung erläuternde Tafel enthält die Darstellung von 20 Arten und zahlreiche Detail-Zeichnungen.

Derselbe hat zugleich unter obigem Titel im Decemberhefte der *Revue et Magasin de Zoologie* IX. p. 565—581 (erst im Februar 1858 ausgegeben) eine Streitschrift gegen Thomson veröffentlicht, in welcher er diesem den Vorwurf macht, einige der von ihm beschriebenen Eumorphiden unter anderen Namen vorweg publicirt zu haben und zwar ohne bei dieser Publikation die Arbeiten früherer Autoren (z. B. in Betreff der Gattung *Amphisternus* diejenige von Germar) berücksichtigt zu haben. Letzteren Vorwurf hätte Guérin jedoch kluger Weise lieber bei Seite lassen sollen, da er seine eigene Arbeit in viel ausgedehnterem Maasse trifft. Als Zugabe zu dieser Broschüre und als Nachtrag zu seiner oben erwähnten Bearbeitung der Eumorphen nimmt der Verf. eine Vertheilung der von ihm beschriebenen Arten unter eine Anzahl Gattungen (oder Untergattungen, *genres secondaires*) vor, deren Charaktere er in einer analytischen Tabelle entwickelt, die aber zum Theil verfehlt sind. Seine Gattungen *Eumorphus*, *Eumorphoides*, *Enaisimus*, *Haplomorphus* und *Heterandrus* sind nämlich nur auf spezifische Eigenthümlichkeiten verschiedener Arten derselben Gattung, welche *Eumorphus* Weber heissen muss, begründet und können um so weniger Geltung erlangen, als sie nicht einmal auf den natürlichen Gruppen dieser Gattung basiren, ausserdem auch ganz fremde Elemente, wie den *Eum. Kirbyanus*, der in die Verwandtschaft von *Ancylopus* gehört, einschliessen. Von den übrigen Guérin'schen Gattungen fällt *Rhachidophorus* mit *Spathomeles* des Ref., *Amphisternus* mit der gleichnamigen Germar'schen Gattung zusammen und *Homalosternus* scheint mit *Eucteanus* des Ref. identisch zu sein, in welchem Falle sie gar nicht der Eumorphen-Gruppe angehört, sondern zu *Endomychus* zu verweisen ist.

Montrouzier (*Annales des scienc. phys. de la soc. d'agriculture de Lyon* VII, 1. p. 74) beschrieb *Eumorphus immaculatus* von der Insel Woodlark, mit rothem Halsschild und violetten Flügeldecken,

ohne Flecken. Die Art gehört offenbar nicht zur Gattung *Eumorphus*, doch ist über ihre Stellung aus der kurzen Beschreibung nichts Näheres zu ersehen.

Guérin (Rev. et Magas. de Zool. IX. p. 191) beschrieb *Trochoideus? Goudotii* als neue Art aus Columbien, welche jedoch nur das längst bekannte Weibchen des *Troch. Americanus* Buq. ist; die Angabe von fünf Fühlergliedern beruht auf einem Irrthume.

Coccinellinae. Neue Arten sind: *Coccinella* 28-punctata, cyanoptera, Richesiana, Musae (ist *Coelophora patrualis* Muls.), trineincta, cassidioides (ist *Sunia melanaria* Muls.), Cristovallensis und Laportei Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 75 ff.) von der Insel Woodlark, *Epilachna* 28-maculata Motschulsky (Etudes entomol. VI. p. 40) aus Japan, *Psyllora taedata* und *Chilocorus fraternus* Le Conte (Entomol. Report p. 70 f.) aus Californien, *Scymnus decemplagiatus* und *Rhizobius oculatissimus* Wollaston (Catal. of Coleopt. Insects of Madeira p. 137 ff.) aus Madeira und *Coccinella ambigua* Gredler (Käfer von Passeier) aus Tyrol.

Heeger (Sitzungsberichte der mathem.-naturwiss. Classe der Akad. d. Wissensch. in Wien XXIV. p. 326 ff.) machte die ersten Stände des *Scymnus arcuatus* Rossi und ihre Entwicklungsgeschichte bekannt. Die weissbestäubte kleine Larve lebt auf Ephen, wo sie sich von den Larven und Eiern des *Aleurodes immaculatus* ernährt. Abbildung des Käfers sowohl wie der Larve und Puppe auf Taf. 5.

Clypeastres. Jacquelin du Val („Note sur les caractères et la composition de la famille des Clypeastrides,“ Annales de la soc. entomol. de France V. p. 98 ff.) will mit Redtenbacher diese Familie gegen Erichson aufrecht erhalten, modificirt aber ihren Umfang und glaubt nach der Verwandtschaft ihrer Larven mit denen der Lathridier, nach der Form der Hüften u. s. w. letztere als ihre nächsten Verwandten betrachten zu müssen. Er stellt die Familien-Charaktere vorläufig folgendermassen fest: Maxillen nur mit einer schmalen, hornigen Lade, Palpen verschieden, Fühler mit 9 bis 11 Gliedern, die letzten eine sehr deutliche Keule bildend; Flügeldecken vollständig oder an der Spitze etwas abgestutzt, Flügel ringsherum gewimpert oder fehlend, Hinterleib meist sechsringlig, Vorderhüften hervortretend, die hinteren quer, sehr weit auseinanderstehend; Tarsen schmal, drei- oder viergliedrig, oder etwas erweitert und subtetramer. Die Familie soll sich in zwei Gruppen theilen: 1) Clypeastrites mit den Gattungen *Clypeaster*, *Sericoderus* und *Corylophus*. 2) Orthopérites mit den Gattungen *Orthoperus*, *Moronillus* und *Alexia*, ausserdem auch *Sphaerius*.

Nach Peyron (Bulletin de la soc. entomol. p. CXIV) sind die Hinterflügel der Gattung *Orthoperus* Steph. lang und stark gewimpert

(bei *Orth. atomus* und *brunnipes* untersucht), weshalb er dieselbe zu der Familie der *Trichopterygii* bringen zu müssen glaubt.

Wollaston (Catal. of Coleopt. Insects of Madeira p. 140) beschrieb *Arthrolips aequale* als neue Art von Madeira.

Orthoptera.

Yersin theilte im Bulletin de la soc. Vaudoise des scienc. natur. No. 41 mikroskopische Beobachtungen über das Rückengefäß der Orthopteren mit, welche von ihm an frisch gehäuteten und dadurch hinreichend durchsichtigen Individuen von *Blatta orientalis* angestellt wurden. Es ist darin nichts wesentlich Neues enthalten; das Rückengefäß mit seinen Klappen-Einrichtungen, der dasselbe umgebende Sinus, die Bewegung der Blutflüssigkeit in letzterem, endlich die Blutkörperchen, wie sie sich bei verschiedenen Vergrößerungen darstellen, werden beschrieben.

Fischer, Ueber die Deutung der Orthopteren in Scopoli's Entomologia carniolica (Entomol. Zeitung p. 100). Verf. zählt die 18 von Scopoli beschriebenen Orthopteren auf und fügt die Namen der modernen Gattungen, denen sie angehören, bei; die Art-Nomenklatur stimmt mit zwei Ausnahmen (*Blatta sylvestris* Scop. = *lapponica* auct. und *Gryllus lunulatus* Scop. = *Stenobothrus variabilis* auct.) mit der allgemein angenommenen überein.

Assmuss (Sitzungsberichte des zoolog.-botan. Vereins in Wien VII. p. 146 f.) publicirte ein Verzeichniß der Orthopteren des Gouvernement Kaluga (Russland). Die Bestimmung der Arten ist nach Fischer's Orthoptera Europaea gemacht und im Ganzen werden 34 aufgezählt: 4 Forficulina, 5 Blattina, 3 Gryllodea, 5 Locustina und 17 Acridiidea.

Einige bei Larche in den Basses-Alpes gesammelte Orthopteren verzeichnete Brisout de Barneville (Annales de la soc. entomol. V. p. 599). Es sind 2 Forficula, 5 *Stenobothrus*, 1 *Pezotettix* und 1 *Pachytylus*.

Acridiidea. J. Nieto, Note sur une nouvelle espèce d'Orthoptère du Mexique (Revue et Magas. de Zoologie IX. p. 359 ff.) gab eine Beschreibung und Abbildung einer von ihm für neu gehaltenen Art: *Acridium Velasquezii* aus Vera-Cruz, mit lebhaft grünen

Flügeldecken und rosenrothen Hinterflügeln, dem *Gryll. flavicornis* Fabr. nahe verwandt. Diese Art ist jedoch schon von Erichson (Schomburg, Reisen in British Guyana) als *Acridium praetor* beschrieben worden.

Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 90) beschrieb *Truxalis Oceanicus* und *sylvaticus*, ausserdem ein unbenanntes *Acridium* als neue Arten von der Insel Woodlark.

Nach Lucas (Bulletin de la soc. entomol. p. CVI) ist *Eremobia Jaminii* Luc. (1854) mit *Eremobia* (*Oedipoda*) *insignis* Luc. identisch.

Locustina. Neue Arten von der Insel Woodlark sind: *Locusta bilineata*, *macrocephala*, *pogonopoda*, *Conocephalus Cristovalensis*, *Thunbergi* Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 87 ff.). Ebenda wird *Hyperomala virescens* Boisd. nochmals beschrieben.

Yersin (Bullet. de la soc. entomol. p. CLXI) gab die Diagnose einer neuen Art *Ptero'epis alpina* nach beiden Geschlechtern, 16—22 mill. lang, von der Spitze der Alpen.

Gryllodea. A. Yersin, Observations sur le *Gryllus Heydenii* (Annales de la soc. entomol. V. p. 761—779) hat ausführliche Mittheilungen über die Lebensweise dieser Art gemacht. Zuerst beschreibt der Verf. das noch unbekannte Männchen derselben, welches zugleich auf pl. 15 in vergrössertem Maassstabe abgebildet ist. Sodann unterwirft er den Gesang des *Gryllus Heydenii* einer ausführlichen Erörterung, macht Mittheilungen über seine Nahrung (mehr vegetabilisch als animalisch), beschreibt die Gänge, welche er in die Erde gräbt, ferner die Begattung, welche nur des Abends vor sich geht, die Spermatophoren, welche aus einer kugligen Blase und einem dünnen, gebogenen Stiele bestehen, und die in denselben befindlichen Spermatozoën. Zum Eierlegen erwählt das Weibchen einen feuchten Ort, bringt seine Legeröhre in die Erde hinein und legt nur immer ein oder zwei Eier auf einmal. Die jungen Larven (ebenfalls auf pl. 15. fig. 9 abgebildet) sind 1 mill. lang, grau, durchsichtig und zeichnen sich durch sehr grossen und breiten Kopf aus; die Hinterleibszangen sind so lang wie Thorax und Abdomen zusammengenommen.

Phasmodea. Laboulbène (Bullet. de la soc. entomol. p. CXXXVII) machte einige Mittheilungen über die anatomischen Verhältnisse von *Bacillus gallicus*, welchen er zusammen mit L. Dufour untersucht hat. Der *Tractus intestinalis* ist gerade, der Oesophagus verlängert, die Speicheldrüsen sehr kurz, traubenförmig, der Kropfmagen fehlt, der Chylusmagen ist ähnlich dem von *Tridactylus*, nämlich an einer Seite vierlappig. Die Eiröhren sind auf eine Seite

beschränkt und münden, fast wie bei Mantis, in einen gemeinsamen Stamm; es existirt eine, vielleicht auch zwei Anhangsdrüsen. Die Eier sind gross und in jeder Eiröhre ist nur eins vollständig entwickelt, darüber noch eins oder zwei sehr kleine; im Abdomen sind sie gelb, nach dem Ablegen schwarz oder schwarzbraun, hart, runzlig, ähnlich denen von Blatta.

Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 80 ff.) beschrieb *Bacteria Servillei*, *Tropidoderus viridis*, *Pachymorpha Grayi*, *longipennis*, *Karabidion micracanthum*, *scorpionoides* und *australe* als neue Arten von der Insel Woodlark. Für die Gattung *Euryacantha* Boisd., deren Art *Eur. horrida* Boisd. nach beiden Geschlechtern wiederholt beschrieben wird, stellt der Verf. einen neuen Namen *Karabidion* auf, und zwar erstens, weil er den Boisdual'schen nicht für die übrigen Arten der Gattung als bezeichnend hält, zweitens weil die Einwohner von Woodlark diese Insekten „Karabok“ nennen; er glaubt zugleich, dass dieser Name desselben Ursprungs wie *Carabus* sei.

Schann (Monatsberichte der Berl. Akad. d. Wissensch. p. 423) beschrieb *Bacteria bituberculata* als neue Art von Mossambique.

Lucas (Bullet. de la soc. entomol. p. CXLVII) stellte *Phyllium Magdelainei* als neue Art von Sumatra auf und hob ihre Unterschiede von *Phyl. siccifolium* und *Scytha* kurz hervor.

Mantodea. Lucas, Note sur les caractères que l'on peut tirer du développement des organes du vol pour distinguer l'état parfait ou non parfait des espèces composant le genre *Eremiaphila*. (Annales de la soc. entomol. V. p. 321—327.) Verf. hat die von Yersin hervorgehobene Lage und Faltung der Flügeldecken und Hinterflügel der Orthopteren bei Larven und Imagines auch an der Gattung *Eremiaphila* bestätigt gefunden und weist nach, dass die aus den Genitalien für die vollständige Entwicklung eines Individuums entlehnten Kennzeichen stets mit der Ausbildung der Flügel Hand in Hand gehen.

Mantis monochroa Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 79) ist eine neue Art von der Insel Woodlark.

Blattina. Waga, Observations sur quelques particularités des mœurs de la petite Blatte des cuisines (*Blatta germanica* auct.) et sur les effets de la poudre persane comme moyen de destruction de cet insecte incommode. (Revue et Magas. de Zoologie IX. p. 444, 505 ff.) Verf. berichtet über die Wirkungen des Persischen Insektenpulvers (aus den Blüthen von *Pyrethrum roseum* bestehend) auf *Blatta germanica*, welche er in einer Polnischen Meierei, wo sich Schaaren dieses Insektes in einem Wohnzimmer fanden, erprobte. Eine Schabe, die in ein Glas gesetzt und mit Pulver bestreut wurde, starb in drei Minuten; am Abend wurde um den Ofen des Zimmers, in dessen Nähe

sich die meisten dieser Thiere der Wärme wegen aufhielten, Insektenpulver gestreut und die augenblickliche Folge war, dass alle augenblicklich die Flucht ergriffen, am nächsten Morgen aber schaarenweise todt oder dem Tode nahe rücklings auf dem Boden lagen. Gegen *Sphodrus planus*, der in Gemeinschaft mit *Pristonychus subcyanus* den Blatten nachstellte, ferner gegen Porcellionen, Wanzen, Flöhe u. s. w. hat sich das Pulver gleichfalls wirksam erwiesen. — Von den übrigen Mittheilungen des Verf. über *Blatta germanica* ist hervorzuheben, dass die Kälte sie schnell tödtet; in einem Glase dem Froste ausgesetzt, starben sie und zwar ausgebildete Exemplare und Männchen viel schneller als junge Larven und Weibchen; die jungen Larven lebten, nachdem sie für todt gehalten worden waren, am nächsten Tage wieder auf. Wo Blatten häufig sind, treten auch Krankheiten unter ihnen auf und zwar werden die kranken Individuen von den gesunden aufgefressen, während ein Gleiches unter gesunden niemals stattfindet.

Neue Arten sind: *Blatta pellucida* und *quadripustulata* Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 79) von Woodlark, *Blatta (Holocompsa) collaris*, *Blabera Sulzeri* (Surinamensis Sulzer), *fumigata*, *Monachoda Thunbergii*, *Phyllodromia Burmeisteri* und *delicatula* Guérin (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 138 ff.) von Cuba.

Termitina. Cornelius hielt in der Generalversammlung des Naturhist. Vereins d. Preuss. Rheinl. und Westphalens einen Vortrag über Termiten, welcher in den Verhandlungen des Vereins XIV. p. 20—44 abgedruckt ist.

Libellulinae. Hagen (The Entomologist's Annual 1857. p. 39—60) gab eine Uebersicht der in England vorkommenden Libellen (A synopsis of the British Dragon-Flies), deren Zahl sich im Ganzen auf 46 stellt. Sowohl die Gruppen und Gattungen als die Arten sind mit kurzen Diagnosen versehen, so dass diese Uebersicht zugleich dem angehenden Sammler Britischer Libellen als Anleitung bei der Bestimmung seiner Arten dienen kann; auch sind einige Arten mit aufgenommen, deren Vorkommen zwar in England noch nicht festgestellt ist, die aber, nach ihrer sonstigen Verbreitung zu schliessen, wohl daselbst noch aufgefunden werden dürften. Die Englischen Libellen-Arten vertheilen sich auf die einzelnen Gattungen folgendermassen: *Libellula* 13, *Cordulia* 4, *Gomphus* 3, *Cordulegaster* 1, *Aeschna* 7, *Anax* 1, *Calopteryx* 2, *Platynemis* 1, *Lestes* 5, *Agriion* 9.

Herklots, „Eerste Opgave van inlandsche Waternimfen“ (Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland I. p. 119—122) stellte eine Namenliste der in den Niederlanden beobachteten Libellulinen mit Citaten ihrer Beschreibung in Sélys und Rambur und Angaben ihrer Fundorte zusammen. Von *Libellula* werden 10, von *Cor-*

dulia 1, von Aeschna 5, von Calopteryx 2, von Lestes 6 und von Agrion 7 Arten aufgeführt, ausserdem noch 3 Arten erwähnt, die von Séllys als in Holland einheimisch angegeben werden.

Mehrere neue Nord - Amerikanische Libellulinen beschrieb Uhler, Contributions to the Neuropterology of the United States, No. 1 (Proceedings of the acad. of nat. scienc. of Philadelphia 1857. p. 87 f.): *Namophya bella* (fem.), *Libellula bistigma* (mas), *plumbea* und *confusa* von Baltimore, *saturata* von San Diego, *Julia* aus dem Oregon-Gebiete, *assimilata* von Nebraska. Die *Libellula confusa* des Verf. ist identisch mit *L. pulchella* Drury (*L. versicolor* Fabr.)

Séllys - Longchamps (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 187 ff.): *Libellula Attala* (annulata Ramb. pro parte), *mithra* (ebenso), *Justina*, *Justiniana* (minuscule Ramb. pro parte), *Metella*, *didyma* (Phryne Ramb., nec Perty), *Celena*, *Aphilla*, *Caraiba*, *Gynacantha septima*, *Trichocnemis minuta*, *Agrion* (*Nehalania*) *macrogaster*, (*Pyr-rhosoma*) *discolor* Burm. ?, *dominicanum*, (*Ischnura*) *tuberculatum* als neue Arten von Cuba.

Perlariae. Brauer (Verhandl. d. zoolog.-botan. Vereins in Wien VII. p. 205) machte „Bemerkungen über die kurzflügligen Formen einiger Perliden - Arten.“ Verf. fand von *Perla cephalotes*, deren Männchen von Curtis und Pictet als kurzflüglig angegeben wird, zahlreiche langflüglige Männchen mit den Weibchen in copula, dagegen zusammen mit diesen nur ein einziges kurzflügliges; ebenso besitzt er lang- und kurzflüglige Männchen von *Dictyopteryx microcephala* Pict. und von *Taeniopteryx trifasciata* Pict. Es scheint demnach eine Schwankung in der Ausbildung der Flügel bei den Perliden-Männchen mehr oder weniger allgemein zu sein, gerade wie es bei vielen Formen der Locustinen etc. der Fall ist; die Häufigkeit der einen oder der anderen Form scheint nach den Lokalitäten zu variiren.

Forficulina. Guérin (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 136 ff.) beschrieb *Forficula* (*Forficesila*) *distincta* und *affinis* als neue Arten von Cuba.

Podurellae. Herklots (Mémoires d'entomol., publ. p. 1. soc. entom. des Pays-Bas I. p. 94 f.) gab eine genaue Beschreibung der *Podura arborea grisea* de Geer (= *Podura campestris cinerea* de Geer), welche gewöhnlich, aber unrichtiger Weise, mit *Podura nivalis* Lin. als synonym vereinigt wird. Die Unterschiede der de Geer'schen Art, welche der Verf. mit einem neuen Namen *Degeeria* (vergebener Gattungs-Name bei den Tachinen!) *pi*, nach einer π -förmigen Zeichnung der Körpersegmente belegt, werden gegen *Podura nivalis* auseinandergesetzt.

Wright (Natural history review IV., Proceed. of societ. p. 231) untersuchte die Mitchelstown-Höhlen in Irland und fand darin eine Poduren-Art, welche der von Schiödde aus den Krainer Höhlen als *Anurophorus stillicidii* beschriebenen sehr ähnlich ist, sich aber durch mehrere Merkmale, die von Haliday p. 235 ff. erörtert werden, davon unterscheidet.

J. Papon (Jahresbericht d. naturforsch. Gesellsch. Graubünden's I. p. 67—70. Taf. 2) machte Mittheilungen über eine im Februar 1855 bei Chur beobachtete *Desoria*, welche in grossen Schwärmen den Schnee streckenweise ganz bedeckte. Er hält die Art für neu und beschreibt sie als *Desoria nivalis*; sie ist aber nach Heer identisch mit *Podura arborea nigra* de Geer, nach Voigt dagegen mit *Desoria viatica* Nicolet.

Neuroptera.

Neuroptera austriaca. Die im Erzherzogthum Oesterreich bis jetzt aufgefundenen Neuropteren nach der analytischen Methode zusammengestellt, nebst einer kurzen Charakteristik aller Europäischen Neuropteren-Gattungen, von Friedrich Brauer, unter Mitarbeit von Franz Löw. Mit fünf lithographirten Tafeln. Wien, C. Gerold 1857. (lex. 8. 74 pag.). — Eine nach dem Vorbilde von Redtenbacher's Oesterreichischer Käferfauna vorgenommene übersichtliche Bearbeitung der Neuropteren Oesterreichs hätte wohl von Niemanden in glücklicherer Weise bewerkstelligt werden können als von dem durch seine vielfachen interessanten Entdeckungen auf diesem Felde vortheilhaft bekannten Verf. So gering der Umfang des hier zu behandelnden Materials im Vergleiche zu anderen Ordnungen war, so waren doch der Schwierigkeiten in weniger durchgearbeiteten Familien, wie z. B. bei einem Theil der Phryganiden, nicht geringe zu überwäligen und selbst eine dem vorliegenden Zwecke angepasste Zusammenstellung und Behandlung des über die anderen Familien Bekannten bedurfte einer ebenso grossen Umsicht, als dieselbe für die Erweckung eines grösseren und mehrseitigeren Interesses an diesem Zweige der Entomologie nur vortheilhaft wirken konnte. Der Verf. hat in dem vorliegenden Werkchen die Neuropteren im Sinne der älteren Systematiker bearbeitet, d. h. ausser den eigentlichen Neuropteren mit vollkommener Verwandlung auch diejenigen,

welche wir gegenwärtig den Orthopteren beizählen, mit aufgenommen, also ganz in dem Umfange, wie er von Rambur in seiner Hist. nat. d. Néuroptères angenommen worden ist; dass trotzdem die Pseudoneuropteren als eine den Orthopteren angehörende Abtheilung, die sich von den eigentlichen Neuropteren scharf abgränzt, vom Verf. angesehen werden, braucht kaum erwähnt zu werden. Den analytischen Tabellen zur Bestimmung der Familien, Gattungen und Arten sind einige einleitende Abschnitte vorausgeschickt, in welchen über die äusseren Körpertheile der Neuropteren, über die im speziellen Theile angewandte Terminologie und ganz besonders eingehend über die Larven der verschiedenen Familien und Gattungen gehandelt wird. Bei der Anfertigung der analytischen Tabellen hat sich der Verf. durchaus zweckmässig an solche Charaktere gehalten, welche leicht fasslich sind, gleichviel ob dieselben wesentlich und durchgreifend sind, oder nicht; so z. B. benutzt er das Vorhandensein oder Fehlen der Flügel als ein auffallendes Merkmal, und führt dann die Familien und Gattungen, wo beide Modifikationen vorkommen, natürlich zweimal in der Tabelle auf. Die eigentliche Charakteristik der Familien und Gattungen erfolgt erst in der dritten Tabelle, welche zur Bestimmung der Art dient und hier sind zugleich diejenigen Europäischen Gattungen, welche in Oesterreich fehlen, aufgenommen. Wollte man an der Arbeit des Verf. etwas anders wünschen, als es eben gegeben ist, so könnte es in Bezug auf diese Charakteristik der Familien und Gattungen sein, welche im Ganzen etwas zu aphoristisch und oft mit Uebergang von besonders interessanten Merkmalen, z. B. der Bildung der Mundtheile, abgefasst sind; für den Anfänger wäre auch vielleicht eine bildliche Darstellung derselben in ihren Haupttypen von Nutzen gewesen. Die Abbildungen, welche der Verf. auf den beifolgenden fünf Tafeln gegeben hat, dienen zur Erläuterung des Flügelgeäders und ganz besonders der Analsegmente der Phryganiden, welche für die sichere Bestimmung der Arten von grossem Werthe sind; die ebenso zahlreichen als sorgfältigen Zeichnungen, welche der Verf. von denselben gegeben hat, zeugen dafür, dass er sich das Studium dieser Familie für das vorliegende Werk besonders

hat angelegen sein lassen. Dieselbe ist zugleich die einzige, welche mit einer Anzahl neuer Arten bereichert worden ist, während bei den übrigen nur die Artnamen früherer Autoren figuriren.

Was die Abgränzung und Aneinanderreihung der Familien und Gruppen der eigentlichen Neuropteren betrifft, so gesteht Ref. jetzt dem Verf. gern die Verbindung von Raphidia mit den Sialiden als in der Natur begründet zu und widerruft demgemäss seine hierüber im Jahresberichte 1855. p. 97 kundgegebene Ansicht als eine irrige. Dagegen erscheint ihm die Trennung der Panorpatae von den Megalopteren und Sialiden durch die dazwischen eingeschobenen Trichopteren etwas zu künstlich, da erstere, wenn sie auch nicht mit Burmeister zu den Planipennien selbst gezogen werden können, mit diesen doch jedenfalls in engerer Beziehung als mit den Trichopteren stehen, an welche sie sich doch nur durch die Verwachsung der beiden Unterkieferpaare anschliessen könnten. — Ob die Gattung Nemoptera passender unter den Hemerobiden oder unter den Myrmeleonen steht, mag vorläufig dahingestellt bleiben, da die Larve, welche ihr muthmasslich angehört, doch nicht mit absoluter Sicherheit als solche festgestellt ist; die Stellung von Dilar Ramb. zwischen Sisyr und Drepanopteryx ist aber in jedem Falle aufzugeben, da sie als sehr abweichende Form zwei ganz eng verbundene Gattungen trennt. Wenn Rambur diese Gattung auf Grund der gekämmten Fühler des Männchens zu den Sialiden bringt, könnte ihre habituelle Aehnlichkeit mit den Hemerobiden allerdings zum Einspruche gegen diese Stellung berechtigen, obwohl die grossen im Dreieck gestellten Ocellen dieselbe andererseits wieder zu rechtfertigen scheinen; jedenfalls müsste aber Dilar, unter die Hemerobiden versetzt, ausser der Reihe aller übrigen bekannten Gattungen Platz nehmen.

Hemerobini. L. Dufour machte in seinen „Fragments d'anatomie entomologique“ (Annales des scienc. natur. 4. sér. VIII. p. 6—10. pl. I) die Resultate seiner Untersuchungen über den Verdauungsapparat und die Ovarien der Nemoptera lusitanica bekannt. („Sur l'appareil digestif et les ovaires du Nemoptera lusitanica“). Speicheldrüsen, wie sie bei Myrmeleon, Hemerobius und Osmylus vorkommen, liessen sich bei Nemoptera nicht auffinden. Der Tractus intestinalis geht in gerader Richtung zum hinteren Ende des Körpers und ist der Länge desselben gleich; die vorn sehr feine Speiseröhre erweitert sich nach hinten kropfförmig, nimmt an ihrem hinteren Ende einen darmartigen Schlundanhang („panse“) auf und setzt sich alsdann in den langgezogenen, cylindrischen Chylus-Magen fort, von dessen hinterer Mündung jederseits vier lange, vielfach gewundene und verhältnissmässig starke Vasa Malpighi ausgehen. Der Dünndarm zeigt bis zum After keine Theilung oder Abschnürung, ist etwa zwei

Dritttheilen der Magenlänge gleich und von beträchtlich geringerem Lumen. -- Jedes der beiden Ovarien besteht „aus einem länglichen Centralsack mit feinen, durchsichtigen, fast membranösen Wänden, an dessen Peripherie sich in sehr lockerer Weise etwa zehn kurze Eierstocksröhren anheften.“ Jede Eiröhre enthält an ihrem unteren Ende nur ein entwickeltes Ei, welches dann frei in den Centralsack herabfällt, aus dem es auf dem Verf. unbekannte Weise abgelegt wird. Die Beschaffenheit des Ausführungsganges dieser Ovarien ist der Untersuchung entgangen. — Die Tracheen, über welche ebenfalls kurze Angaben gemacht werden, sind sparsam und überall cylindrisch und mit dem Spiralfaden versehen; im Thorax allein kommen einige Erweiterungen an ihnen vor, ohne indessen die Form von Luftsäcken anzunehmen. — Das früher von Duf. vergebens gesuchte Nervensystem ist ihm trotz wiederholter Untersuchungen auch jetzt noch unsichtbar geblieben.

Die schon von Westwood (Introduct. mod. classific. of Insects II. p. 55) ausgesprochene Vermuthung, dass der von Roux abgebildete *Necrophilus arenarius* die Larve von *Nemoptera* sei, wurde durch die nähere Beschreibung dieses interessanten Thieres von Schaum (Berl. Entomol. Zeitschrift I. p. 1—9) nahebei zur Gewissheit erhoben. Die zu Sangzangen organisirten Mandibeln und Maxillen finden sich bei dieser Larve in ganz analoger Weise wie bei den Megalopteren-Larven vor und die seitwärts hinter den Kiefern hervortretenden Lippentaster bekunden ihre nahe Verwandtschaft mit den Myrmeleonen-Larven. Abweichend ist der Mangel der Zähne am Innenrande der Mandibeln, die sehr langen und dünnen Beine und ganz besonders der aus zwei Stücken bestehende Prothorax, von denen das vordere dünn, stielförmig und so lang als der ganze übrige Körper ist. Von inneren Organen ist der Tractus intestinalis untersucht, welcher sich ebenfalls in seiner Bildung derjenigen der Myrmeleonen-Larven genau anschliesst; der sehr deutliche Nervenstrang mit seinen grossen Ganglien ist wenigstens zum Theil präparirt worden. — Obwohl die Verwandlung der in Aegypten vom Verf. aufgefundenen Larven nicht beobachtet wurde, scheint ihre Zugehörigkeit zu *Nemoptera* kaum zweifelhaft, da dies die einzige Gattung der Familie ist, deren Larve man nicht kennt und deren Eigenthümlichkeiten auf eine ebenfalls sehr heterogene Larve schliessen lassen; auch kommen in Aegypten zwei *Nemoptera*-Arten vor. — Eine getreue Abbildung dieses Thieres durch Wagenschieber, so wie eine Darstellung des Darmkanals und Nervenstranges findet sich auf der beifolgenden Tafel.

Brauer (Verhandl. d. zoolog.-botan. Vereins zu Wien VII. p. 201) verglich die von ihm im vorigen Jahre beschriebene *Chrysopa tricolor* mit *Chr. gracilis* und *stenoptila* Schneid. und glaubt,

dass alle drei zu einer und derselben Art gehören; die letzte Schneider'sche Art scheint auf ein unausgefärbtes, die erste auf ein altes, verfärbtes Exemplar begründet zu sein.

Einige Mittheilungen über die Lebensweise der Larve von *Acanthaculis occitanica* in Süd-Frankreich machte Perris in seinen „Nouvelles excursions dans les Grandes-Landes“ (Annales de la soc. Linnéenne de Lyon IV. 1857. p. 88 f.); seine Beobachtungen stimmen mit denen am Ostseestrande gemachten darin überein, dass die Larve keine Trichter im Sande gräbt.

Panorpatae. Von Brauer wurde (Verhandl. d. zoolog.-botan. Vereins zu Wien VII. p. 69 f.) die muthmassliche Larve des *Boreus hiemalis* nach ausgewachsenen Exemplaren, welche sich im Januar in mit Schneewasser getränktem Moose an Steinen vorfanden und ganz denjenigen glichen, die der Verf. schon im Jahre 1855 aus den Eiern, welche von einem in der Gefangenschaft begatteten *Boreus*-Weibchen gelegt worden waren, erhalten zu haben glaubte, beschrieben. Obwohl die Zucht der Imago aus den Larven nicht gelang, scheint die Zugehörigkeit der letzteren zu *Boreus* dadurch gesichert, dass sich im Herbste Nymphen und Imago an denselben Orten vorfanden, erstere in ausgetrockneter Erde unter Moos. Die Larve bewegt sich raupenartig, beisst beständig um sich und höhlt mit ihren grossen Kiefern in feuchter Erde Gänge aus; die Nymphen gleichen in der Gestalt fast der Imago, die Mundtheile sind jedoch kürzer und dicker, die Farbe blass grüngelb mit schwarzem Scheitel und Pronotum. — Eine Abbildung der Nymphen so wie des Kopfes und der Mundtheile der Larve ist auf Taf. 4 gegeben.

In einer nachträglichen Mittheilung (Sitzungsberichte des zoolog.-botan. Vereins VII. p. 133) bestätigt der Verf. die Richtigkeit seiner Vermuthung, dass die beschriebene Larve dem *Boreus hiemalis* angehöre; aus Larven, die im August in vermodernden Baumstämmen (auf dem Schneeberge in Steyermark) gefunden wurden, entwickelte sich Anfangs Oktober ein Exemplar des *Boreus*.

Trichoptera. Von A. Costa (Memorie della Reale Accademia delle scienze di Napoli II. p. 222) wurde eine Gattung *Lasiocephala* mit einer Art: *Las. taurus* aus Neapel beschrieben und abgebildet, die mit *Pogonostoma* und *Lasiostoma* Ramb. im Habitus zunächst übereinstimmen soll. Die auffallendsten Charaktere geben sich in der Bildung der männlichen Fühler und Maxillartaster kund; letztere sind zweigliedrig, das erste Glied sehr kurz, das zweite sehr verlängert, drehrund, fast halbkreisförmig gebogen, nach unten gedreht und lang behaart, die Lippentaster kürzer, dreigliedrig; das erste Glied sehr kurz, das 2. und 3. gleich gross. Die männlichen Fühler sind borstenförmig, das erste Glied lang, kräftig, aufgerichtet, fast lederartig, vor der Mitte zusammengeschnürt, langhaarig, die

übrigen vom sechsten an unterhalb lang gebartet. Beim Weibchen sind die Maxillartaster fünfgliedrig, das 1. Glied sehr kurz, das 2. bis 4. gleich gross, das 5. länger, dünner und zugespitzt; an den Fühlern die Glieder vom sechsten an nackt. Die Flügel haben bei beiden Geschlechtern keine Queradern, die vier hinteren Schienen mit vier Sporen bewaffnet. Die Gattung ist auf der beifolgenden Tafel, Fig. 2 und 3 abgebildet.

Neue Oesterreichische Arten, von Brauer (Neuroptera austriaca, p. 37 ff.) beschrieben, sind: *Rhyacophila aurata*, *Philopotamus tigrinus*, *Hydropsyche Danubii*, *maxima*, *versicolor*, *Aspatherium piceum*, *Dasystoma nigrum*, *Enoicyla limnophiloides*, *Frauenfeldii*, *Chaetopteryx fusca*, *Halesus uncatus*, *Anabolia gigantea*, *rotundipennis* und *Limnophilus tuberculatus*.

Strepsiptera.

F. Smith, Observations on the difficulties attending the discrimination of the species of the genus *Stylops* (Transact. entom. soc. IV. p. 115—118. pl. 24). Der Verf. liefert eine nach dem Leben angefertigte Zeichnung eines männlichen *Stylops*, der sich aus einer *Andrena Trimmerana* entwickelt hat und kommt bei dem Versuche, denselben nach den bisher existirenden Englischen Abbildungen zu bestimmen, zu dem Resultate, dass wahrscheinlich überhaupt nur eine *Stylops*-Art in England existire. Die Unterschiede, welche die Abbildungen des *Stylops melittae* Kirby, *Chilidreni* Gray, *Kirbyi* Sowerby, *aterrima* Newport und *Dalii* Curtis zeigen, beruhen auf Ungenauigkeiten und den Veränderungen, welche nach dem Tode des Thieres schnell und in hohem Grade eintreten. Auf der beifolgenden Tafel hat Smith Zeichnungen von einigen Typen der genannten Arten, die im British Museum existiren, geliefert.

„Ich erinnere nur an die Strepsipteren, welche Coleopteren sind“ (!?) sagt Burmeister (Zeitschrift f. wissensch. Zoologie VIII. p. 153), um für den Nachweis, dass die Rotatorien zu den Crustaceen gebracht werden müssen, eine Stütze zu haben.

Hymenoptera.

Die Verzeichnisse der Hymenopteren des British Museum sind mit einem fünften Bändchen, welches die Vespaerien enthält und von F. Smith zusammengestellt ist, fort-

gesetzt worden: *Catalogue of Hymenopterous Insects in the collection of the British Museum by Fred. Smith. Part V. Vespidae.* London, printed by order of the Trustees. 1857. (12., 147 pag. c. tab. VI.) — Es sind in diesem Verzeichnisse, wie gewöhnlich, sämtliche bis jetzt bekannt gewordene Gattungen und Arten der Familie aufgezählt, mit vollständiger Synonymie versehen, die im British Museum vorhandenen eigens bezeichnet und die als neu erkannten Arten beschrieben. Da für die Bestimmung dieser Familie eine neuere, sehr reichhaltige Monographie vorlag, so ist die Anzahl der als neu beschriebenen Arten begreiflicher Weise eine weit geringere als in den Catalogen über die Apiarien, Heterogynen und Crabroniten; neue Gattungen sind gar nicht darin aufgestellt. In synonymischer Hinsicht ist das Verzeichniss nicht ohne Interesse, da der gründliche Verf. dieselbe öfters von Neuem untersucht und hin und wieder mit Berücksichtigung älterer Autoren geändert hat, zuweilen auch Saussure'sche Arten als Abänderungen anderer hinstellt. Die neuen Arten sind an ihrem Orte einzeln namhaft gemacht worden; die sechs das Bändchen begleitenden Kupfertafeln liefern Abbildungen von 23 theils bekannten, theils neuen Arten im Umrisse, die letzte einige Nester socialer Wespen.

H. de Saussure hat seine *Etudes sur la famille des Vespides*, welche im J. 1855 mit dem dritten Theil vorläufig abgeschlossen worden waren, von Neuem aufgenommen. Wie in dem zuletzt erschienenen Bande neben der Monographie des *Masariens* reichhaltige Nachträge und Verbesserungen zu der Monographie des *Guêpes solitaires* (Tome I. 1852) geliefert wurden, so ist der jetzt begonnene vierte, von dem die drei ersten Lieferungen (Cah. 8—10. Paris 1856—57) vorliegen, in entsprechender Weise dazu bestimmt, die Monographie des *Guêpes sociales* (Tome II. 1853) durch neues Material zu bereichern und zu ergänzen. (Näheres siehe unter *Vespariae*!)

A. Förster's „*Hymenopterologische Studien*,“ von denen im Jahre 1850 das erste Heft (*Formicariae*) erschienen war, sind jetzt mit einem zweiten Hefte (*Chalcidiae et Proctotrupii*, Aachen 1856. 4. 152 pag.) fortgesetzt worden.

Der Verf. beschäftigt sich in dieser ebenso umfangreichen als gehaltvollen Arbeit zunächst mit einer Feststellung der Gruppen und Gattungen der durch ihre überraschenden Formen so interessanten Familien der Chalcidier und Proctotrúpier, indem er die Beschreibung der Arten für das nächste Heft, welches ebenfalls bald erscheinen soll, verspricht. Als Einleitung (p. 1—8) dient eine historische Uebersicht der über beide Familien erschienenen systematischen Arbeiten von Linné bis auf die Autoren des Entomological Magazine und Nees v. Esenbeck; sodann folgt ein Eingehen auf die systematische Stellung und den Charakter beider Familien, eine Darstellung ihrer natürlichen Merkmale und ihrer Verwandtschaft mit anderen Familien und Gruppen. Bei der Feststellung der zahlreichen Gruppen (vom Verf. nicht passend als Familien bezeichnet), in welche die Chalcidier und Proctotrupier (diese sind Familien!) zerfallen, folgt F. im Ganzen den von Haliday und Walker aufgestellten Systemen, ohne sich jedoch im Einzelnen an dieselben zu binden, wie dies die Errichtung einer Anzahl neuer Gruppen (Myinoidae, Perilampoidae, Ormyroidae, Elasmoidae, Elachistoidae, Eatedonoidae, Tetrastichoidae und Trichogrammatoidae unter den Chalcidiern, Platygasteroidae, Betyloidae, Heloroidae unter den Proctotrupiern) zeigt. In weit höherem Grade entfernt sich der Verf. von seinen Vorgängern in der Feststellung der Gattungen, die in der vorliegenden Arbeit eine sehr beträchtliche Bereicherung erfahren haben, so dass das Werk für die Systematik der genannten Familien eines der bedeutendsten ist und in der Literatur derselben mit den ersten Rang einnimmt. Auf die systematischen Einzelheiten der Arbeit ist bei den betreffenden Familien, so weit es der Raum gestattet, eingegangen worden.

Vom Ref. sind die in Mossambique durch Peters gesammelten Hymenopteren bearbeitet worden und ein Verzeichniss derselben nebst den Diagnosen der neuen Gattungen und Arten vorläufig in den Monatsberichten der Akademie der Wissenschaften zu Berlin vom J. 1857. p. 460—464 und p. 509—513 veröffentlicht. Es finden sich hier zunächst die Familien der Apiariae, Vespariae, Crabronites, Sphegidae, Pompilidae und Heterogyna abgehandelt.

Die Familie der Apiariae ist durch 11 Gattungen mit 25 Arten vertreten, von denen nur fünf bereits bekannt, die übrigen neu sind; auf zwei derselben wurden besondere Gattungen gegründet. — Die 17 Arten der Vesparien gehören 6 bereits bekannten Gattungen an und enthalten 11 neue. — Von 9 Crabroniten war nur eine Art (*Liris haemorrhoidalis* Fabr.) bekannt, die übrigen neu, wogegen von 6 Sphegiden nur 3, und von 7 Pompiliden ebenfalls nur 3 sich als unbeschrieben herausstellten; von 15 Heterogynen-Arten endlich waren 5 bereits bekannt, die 10 übrigen wurden als neu diagnosticirt und auf eine der letzteren auch eine neue Gattung errichtet.

Eversmann hat seine „Fauna hymenopterologica Volgo-Uralensis“ im Bulletin de la soc. impér. des naturalistes de Moscou 1857. IV. p. 544—567 mit einer Aufzählung der zwischen der Wolga und dem Ural einheimischen Chrysiden fortgesetzt. (Siehe diese Familie!)

Giraud, Description de quelques Hyménoptères nouveaux ou rares (Verhandl. d. zoolog.-botan. Vereins in Wien VII. p. 163—184). Der Verf. giebt darin Beschreibungen einiger neuen Ichneumoniden, Braconiden, Tenthredineten und Apiarien aus Oesterreich und den angrenzenden Ländern.

F. Smith's „Notes and observations of the aculeate Hymenoptera“ (Entomologist's Annual 1857. p. 27—38) enthalten Notizen über die Lebensweise und das Vorkommen einiger seltneren und zum Theil in England neu aufgefundenen Arten aus den Familien der Apiarien, Vesparien, Crabroniten, Pompiliden etc. und ausserdem interessante Bemerkungen über das Variiren gewisser Arten, die über einen grösseren Theil von Europa und zum Theil auch bis nach Nord-Amerika verbreitet sind. Als Arten, die beiden Welttheilen gemein sind, werden z. B. angeführt: *Halictus flavipes*, *Andrena Clarkella*, *Megachile centuncularis*, *Nomada ruficornis*, *Bombus hortorum*; von anderen wird ein gemeinsames Vorkommen in Europa und verschiedenen Theilen Afrikas (Canarische Inseln, Cap der guten Hoffnung) nachgewiesen.

Ein Verzeichniss der in den Niederlanden vorkommenden Hymenopteren stellte Snellen van Vollenhoven in Herklots' *Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland*, II. Deel, p. 221—283 unter dem Titel: „Naamlijst van Ne-

derlandsche vliesvleugelige Insekten (Hymenoptera)“ zusammen und reihte daran die Beschreibung einer Anzahl von ihm für neu gehaltener Arten. Das Verzeichniss, welches mit den Blattwespen beginnt und mit den Apiarien endigt, erstreckt sich auf sämtliche Familien der Hymenopteren, deren Gattungen und Arten in systematischer Reihenfolge aufgezählt werden; die letzteren sind mit Citaten aus den wichtigsten allgemeinen Werken über die ganze Ordnung und aus den bedeutendsten Monographien einzelner Familien und Gruppen, so wie mit Angaben über Fundorte, Flugzeit u. s. w. versehen. Die zwölf als neu beschriebenen Arten gehören den Familien der Blattwespen, Schlupfwespen und Bienen an.

Das Artverzeichniss, in welches nach dem Vorworte des Verf. die Braconiden, Pteromalinen u. a. nur unvollständig aufgenommen sind (aus Mangel an sicheren Bestimmungen), erreicht die Zahl 633; davon kommen auf die Tenthredinetae 147 A., auf die Urocerata 6, Cynipidea 18, Evaniales 1, Ichneumonidea 172, Braconidea 53, Chalcididae 2, Pteromalina 38, Chrysididae 12, Formicariae 10, Mutillidae 5, Scoliidae 5, Sphegidae 6, Pompilidae 17, Larridae 3, Nyssonidae 4, Bembecidae 2, Philanthidae 4, Mellinidae 2, Pempredonidae 7, Crabronidae 23, Eumenidae 10, Vespariae 4, Andrenidae 25 und Apiariae 57.

Schenk hat seine seit einer Reihe von Jahren veröffentlichte Bearbeitung der Hymenopteren des Herzogthums Nassau im J. 1857 mit einer umfangreicheren Abhandlung „Die Grabwespen des Herzogthums Nassau“ (Jahrbücher des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau XII. p. 1—341), ausserdem auch im Separatabdrucke (Wiesbaden 1857. 8. 343 pag. 2 tab. lith.) erschienen, fortgesetzt. Wie in seinen früheren Arbeiten verbindet der Verf. auch in der vorliegenden mit der Feststellung der Nassauischen Hymenopteren-Fauna zugleich den Zweck, durch kurze Beschreibungen der Familien, Gattungen und Arten, so wie durch analytische Tabellen denjenigen Sammlern, welchen die Literatur nicht vollständig zu Hand ist, ein Hülfsmittel zur Bestimmung ihrer Arten zu geben. Die Benennung „Grabwespen“ gebraucht der Verf. im weitesten Sinne des Wortes, indem er darunter die Hymenoptera aculeata mit Ausnahme der Apiarien und

Vesparien, d. h. ausser den eigentlichen Crabroniten die Familien der Heterogyna (Mutillaria, Scolietae, Sapygidae), Pompilidae und Sphegidae begreift, sich also dem Umfange, welchen Dahlbom (Hymenopt. Europ. I) dieser Gruppe gegeben hat, anschliesst und sie nur noch durch Aufnahme der Heterogynen erweitert; überhaupt hat der Verf. die Dahlbom'sche Arbeit für die Anlage der seinigen zum Muster genommen und überall benutzt. Ueber die Lebensweise und Entwicklungsgeschichte der einzelnen Gruppen und Gattungen ist das bereits Bekannte zweckmässig verwerthet und zusammengestellt worden, so dass der Leser sich neben der Kenntniss der Arten auch über ihre Naturgeschichte belehren kann. Eine Anzahl Arten verschiedener Gattungen, die dem Verf. neu scheinen, sind als solche aufgeführt und beschrieben worden.

Die Gesamtzahl der im Nassauischen nach Schenk aufgefundenen Arten der Hymenoptera fossoria beträgt 166. Die Gattungen der einzelnen Familien und Gruppen sind folgendermassen vertreten: 1) Crabronites: Crabro 2 A., Solenius 4, Ectemnius 7, Thyreopus 2, Ceratocolus 2, Crossocerus 15, Blepharipus 1, Lindenius 3, Entomognathus 1, Nitela 1, Oxybelus 8, Rhopalum 1. — 2) Pemphredonidae: Trypoxylon 2, Pemphredon 1, Cemonus 3, Diodontus 2, Passaloeus 5, Stigmus 1, Celia 1. — 3) Philanthidae: Philanthus 1, Cerceris 5. — 4) Nyssonidae: Nysson 7, Gorytes 2, Hoplisus 4, Harpactes 3, Stizus 1, Alyson 2. — 5) Bembecidae: Bembex 2. — 6) Mellinidae: Mellinus 2. — 7) Larridae: Astata 1, Tachytes 5, Miscophus 2, Dinetus 1. — 8) Sphegidae: Spheg 1, Ammophila 1, Miscus 1, Psammophila 1, Mimesa 4, Dahlbomia 1, Psen 7. — 9) Pompilidae: Aporus 2, Salius 1, Pompilus 16, Priocnemis 11, Agenia 2, Pogonius 2, Ceropales 2. — 10) Sapygidae: Sapyga 2, Polochrum (?) 1. — 11) Scoliidae: Scolia 1, Tiphia 3, Meria (Myzine) 1. — 12) Mutillidae: Mutilla 4, Myrmosa 1, Methoca 1.

Ruthe und Stein stellten (Entomol. Zeitung p. 311—316) die Sphegiden und Chrysiden der Umgegend Berlins zusammen; in die erste der beiden Familien sind die Pompiliden und Crabroniten mit inbegriffen.

Die einzelnen Gattungen sind in folgender Weise durch Arten vertreten: 1) Sphegidae: Mimesa 3, Dahlbomia 1, Psen 3, Miscus 1, Ammophila 1, Psammophila 2, Spheg 1, Enodia 1 (*E. chrysoptera* kurz charakterisirt). — 2) Pompilidae: Ceropales 1, Salius 3 (*S. taeniatus* Ziegl. i. l. und *germanicus* Mus. Ber. kurz charakterisirt),

Aporus 2, Pompilus 12, Pogonius 4, (eine Art als *P. notatus* charakterisirt), Agenia 1, Priocnemis 10. — 3) Crabronites: Tachytes 5, Astata 3, Alyson 1, Harpactes 4, Stizus 2 (St. Perrisii Duf. beschrieben), Hoplisus 2, Gorytes 2, Nysson 5, Bembex 1, Philanthus 1, Cericeris 5, Mellinus 2, Dinetus 1, Miscophus 4, Celia 1, Stigmus 1, Passaloecus 6, Diodontus 4, Cemonus 2, Ceratophorus 1, Pemphredon 3, Oxybelus 9, Trypoxylon 2, Rhopalum 2, Entomognathus 1, Nitela 1, Lindenius 5, Crossocerus 7, Blepharipus 2, Thyreopus 3, Ceratocolus 4, Ectemnius 3, Solenius 1, Crabro 1. — 4) Chrysidides: Cleptes 2, Omalus 4, Elampus 4, Holopyga 1, Hedychrum 10, Chrysis 16, Euchroeus 2 und Parnopes 1.

Kirchner stellte (Lotos 6. Jahrg. p. 28 ff.) „die durch die Zucht blattlausartiger Insekten gewonnenen Schmarotzer-Hymenopteren der Kaplitzer Gegend“ zusammen. Es sind 8 Braconiden, 22 Chalcidier und 8 Proctotrupier; die Arten sind namentlich aufgeführt und bei jeder die Blattlaus-Art, aus der sie erzogen wurden, angegeben.

Derselbe verzeichnete (ebenda p. 33, 63, 107 u. s. w.) die von ihm erzogenen Ichneumoniden der Umgegend von Kaplitz; die Arbeit ist auch im Separatabdrucke unter dem Titel: „die Ichneumoniden der Umgegend von Kaplitz, eine systematische Zusammenstellung der dort gezogenen Arten, mit kurzen Charakteristiken der Gattungen, von L. Kirchner“ (Prag 1856. 8. 63 pag. 1 tab. lith.) erschienen. — Der Verf. hat ausser angestochenen Raupen und Puppen auch den Blatt-Taschen, Harzgallen, Pflanzenauswüchsen und Nadelholzapfen seine Aufmerksamkeit zugewandt und sie behufs der Zucht von Schmarotzern eingesammelt. Er geht in der Einleitung auf die Kennzeichen der angestochenen Wirthe ein, macht eine Mittheilung über das Anstechen der Puppe der Vanessa Polychloros durch Pteromalus puparum, bringt Bemerkungen über die Gastvertheilung bei und zählt dann die von ihm erzogenen Schmarotzer in systematischer Reihenfolge nach Familien und Gattungen auf, bei jeder einzelnen genaue Angaben über ihre Lebensweise, ihre ersten Stände, ihre Wirthe u. s. w. beifügend. Von Cynipiden werden 11, von Evanialen 4, von Ichneumoniden 147, von Braconiden 60, von Chalcidiern 114, von Proctotrupiern 46 aufgeführt.

Apiarine. Die vom Ref. (Monatsberichte der Akad. d. Wissenschaft. zu Berlin p. 460 ff.) durch Diagnosen bekannt gemachten

neuen Gattungen und Arten aus Mossambique sind folgende: *Xylocopa lugubris*, *Anthophora flavicollis*, *Lipotriches* n. g., mit *Epeolus* und *Phileremus* verwandt, folgendermassen festgestellt: „Ocelli in tuberculo verticis positi; alae anticae cellulis submarginalibus tribus, tertia elongata; femora postica dentata; palpi maxillares 6-, labiales 4-articulati, ligula et paraglossae lanceolatae, hirsutae.“ Art: *Lipotriches abdominalis*. — *Coelioxys pusilla*, *Allodape facialis*, *Heriades argentata*, *phthisica*, *Anthidium niveocinctum*, *Euaspsis* n. g. auf *Thynnus abdominalis* Fab. und die folgende neue Art begründet: *Clypeus convexus*, ♀ *rotundatus*, ♂ *truncatus*; palpi maxillares exigui, biarticulati; ligula nuda, labio terminali lenticulari; palpi labiales ligula longiores, articulo primo admodum elongato, basi incrassato, tertio quartoque brevissimis; scutellum ♂ *truncatum*, ♀ *bilobum*; corpus fere nudum, ♂ *breve*, ♀ *elongatum*; tegulae ♀ *dilatatae*, alae *elongatae*.“ Art: *Euaspsis rufiventris*. — *Megachile felina*, *bombiformis*, *larvata*, *chrysorrhoea*, *xanthopus*, *curtula*, *gratiosa*, *Nomia rulpina*, *anthidioides* und *hylaeoides*. — Von bereits beschriebenen Arten wurden in Mossambique gesammelt: *Apis mellifica*, var. *fasciata* Latr., *Xylocopa flavorufa* Deg., *lateritia* Smith, *castra* Lin. und *Allodape variegata* Smith.

Lucas (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 314 ff.) beschrieb *Andrena Poeyi* und *Xylocopa cubaecola* als neue Arten von der Insel Cuba.

Giraud (Verhandl. d. zoolog.-botan. Vereins zu Wien VII. p. 179 ff.) *Panurgus fasciatus* aus Ungarn, *Anthidium quadridentatum* bei Wien, *Osmia cylindrica* von Gastein, *spiniventris* aus Oesterreich, Italien und Ungarn.

Snellen van Vollenhoven (Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland II. p. 283): *Nomada Batava* als neue Art aus den Niederlanden.

Von Smith (Proceed. of the entomol. soc. IV. p. 31) wurde eine ausgezeichnete neue Art der Gattung *Lamprocolletes* aus Australien (von Sidney) unter dem Namen *Lampr. bipectinatus* bekannt gemacht, welche sich durch doppelt gekämmte Fühler auszeichnet; es ist dies der erste Fall einer derartigen Fühlerbildung unter den *Apiarien*, welche der Verf. für sexuell hält.

Derselbe (Transact. of the entomol. soc. IV. p. 116) glaubt sich überzeugt zu haben, dass *Andrena helvola* und *varians* nur Varietäten einer und derselben Art seien, zwischen denen sich die allmähligsten Uebergänge nachweisen lassen.

Beobachtungen von Wahlberg über die nordischen Hummeln aus dem J. 1851 theilte Creplin (Zeitschrift f. d. gesammten Naturwissensch. IX. p. 132 ff.) in deutscher Uebersetzung mit. Da dieselben schon in einem späteren Aufsätze desselben Verf. in der Öfvers.

af Kongl. Vetensk. Akad. Förhandl. 1854 (vergl. Jahresbericht 1854. p. 100) ihre weitere Ausführung gefunden haben, so wird ein Hinweis auf jene Abhandlung allein genügen.

Fabre (Annales des sciences naturelles, 4. sér. VII. p. 329) hat sehr interessante Mittheilungen über das Schmarotzen der *Melecta armata* in den Nestern der *Anthophora pilipes* gemacht. Er beobachtete, dass erstere Biene sich in grosser Anzahl aus den Zellen der *Anthophora* entwickelte und sah, wie sie in die Zellen derselben des Eierlegens halber eindrang, ohne von der *Anthophora* daran gehindert zu werden. Nach seinen Beobachtungen bestreitet F. die Richtigkeit der Annahme Lepelletier's, dass die parasitirende *Melecta* ihr Ei in die *Anthophora*-Zelle lege, bevor diese vollständig mit Honig gefüllt sei, und dass sobald dies geschehen, die *Anthophora* ihrerseits vor dem Schlusse der Zelle ebenfalls ein Ei hineinlege; er hat nämlich bei Untersuchung zahlreicher Zellen niemals zwei Eier in einer einzelnen gefunden, was hiernach der Fall sein müsste. F. ist vielmehr der Ansicht, dass *Melecta* erst in die *Anthophora*-Zelle eindringe, wenn sie mit einem Eie von Seiten der Besitzerin belegt sei, dieses mit den Mandibeln zerbeisse und nun ihr eigenes Ei hineinlege, welches dann von der *Anthophora* durch Anfertigung des Deckels eingeschlossen würde; für diese Vermuthung spricht die Beobachtung des Verf., dass *Melecta* öfters in die Zellen der *Anthophora* eindringen gesehen wurde, während letztere Biene schon mit der Anfertigung des Deckels beschäftigt war.

Ueber zahlreiches Vorkommen von Fadenwürmern (*Mermis albicans*) in *Apis mellifica* und zwar ausschliesslich in Drohnen, welche dadurch in grosser Anzahl starben, machte Assmuss (Allgem. deutsche Naturhist. Zeitung III. p. 353) eine Mittheilung.

Vespariae. H. de Saussure, Nouveaux Vespides du Mexique et de l'Amérique septentrionale. (Revue et Magasin de Zoologie IX. 1857. p. 269—280.) Der Verf. macht hier eine grössere Anzahl neuer Vesparien aus Mexiko und Nord-Amerika, die von ihm selbst gesammelt sind, vorläufig durch Diagnosen bekannt; die ausführliche Charakteristik derselben soll in einem Werk, welches die Resultate seiner Reise zusammenfasst, erfolgen. Die Namen der Arten sind folgende: *Zethus Aztecus*, *spinosus*, *Montezuma*, *Guatemotzin* (zur Abtheilung *Zethuscus* gehörig), *Poeyi* (von Cuba), *Chicontenatl* und *Matzicatzin* (zur Abtheilung *Didymogastra*); mit Ausnahme der einen Art alle aus Mexiko. — *Montezumia huasteca*, *Eumenes Iturbide* und *aztecus* (zur Divisio a.), *mexicanus* und *regulus* (zur Divisio o), *Pachymenes Santanna*, *Odynerus* (*Protodynerus*) *Philadelphiae* aus Pensylvanien, (*Ancistrocerus*) *capra* aus den Vereinigten Staaten und Canada, *Santa Anna*, *Bustamente*, *tigris* (Pensylvanien), *Parredes*, *proximus* (New-York), *Bravo*, *Farias*, *occidentalis*, *Arista*,

Sumichrasti, *Guzmani*, *Aztecus*, *Hidalgo*, *Iturbide*, *Alvarado*, *flavopictus* (Vereinigte Staaten), *Morelios*, *Guerrero*, *Toltecus*, *vagus* und *perennis* (Vereinigte Staaten), *Huastecus*, *Otomitus*, *sobrinus*, *Peyroti*, *Tontonacus*, *Tacubayae*, *Maya*, *Victoria*, *Mystecus*, *Tapaneus*, *Chichimecus*, *Acolhuus* und *Nectarinia Azteca*. Die Arten, welche nicht besonders bezeichnet sind, stammen aus Mexiko.

Derselbe sprach sich in einer „Note sur les Polistes Américains“ (Annales de la soc. entomol. V. p. 309—314) über die grosse Veränderlichkeit der Färbung bei den Polistes-Arten überhaupt aus und ging speciell auf die Amerikanischen Arten ein, welche von ihm in seiner Monographie des guêpes sociales zwar schon auf eine geringe Anzahl von Arten reducirt worden seien, aber trotzdem nach den von ihm an Ort und Stelle gemachten Beobachtungen noch weiter eingezogen werden müssen. Im Ganzen sind dem Verf. nur elf nordamerikanische Arten als selbstständige bekannt, nämlich: a) mit konischem, nach hinten zusammengedrückten Hinterleib: *Polistes canadensis* Lin., *annularis* Lin., *cavapyta* Sauss. und *americanus* Fabr. (wozu *P. lineatus* und *instabilis* Sauss. als Varietäten gehören. — b) mit niedergedrücktem, an der Spitze zusammengedrückten Hinterleib: *P. carnifex* Fab., *aurifer* Sauss. und *comanchus* n. sp. aus Neu-Mexiko, durch Diagnose festgestellt. — c) mit niedergedrücktem, mehr ovalen Hinterleib: *P. rubiginosus* Lepell., *fuscatus* Fab. (wozu *P. exilis*, *pacificus*, *instabilis* var. und *cinerascens* Sauss. als Varietäten gehören), *minor* Pallis. und *apachus* n. sp. aus Neu-Mexiko, hier diagnosticirt.

Derselbe („Description de quelques Vespides nouveaux,“ Annales de la soc. entomol. V. p. 315—319) beschrieb folgende neue Arten: *Ischnogaster Drewseni* von Pulo Penang, *Mischocyttarus Drewseni* aus Brasilien, *Rhynchium carbonarium* von Tranquebar und *Odynerus Drewseni* aus Neu-Holland.

Desselben „Bemerkungen über die Gattung *Vespa*, besonders über die Amerikanischen Arten“ (Entomol. Zeitung p. 114—117) handeln über die Veränderlichkeit der Färbung bei den überdem sehr ähnlich gezeichneten Arten Europa's und Amerika's, für welche hauptsächlich die Flecke des Clypeus, die Färbung der Fühler und besonders die Stellung der Augen als charakteristische Merkmale zur Art-Unterscheidung hervorgehoben werden. Was die Amerikanischen Arten betrifft, so ist zu bemerken, dass dieselben in Nord-Amerika zahlreich vertreten sind, gegen Mexiko hin abnehmen und weiter südlich ganz zu fehlen scheinen; überall sind die Individuen selten, wogegen die Polistes-Arten häufig, also gerade umgekehrt als in Europa. Saussure kennt elf Nord-Amerikanische *Vespa*-Arten, nämlich: a) mit nicht bis zu den Mandibeln reichenden Augen: *V. maculata* Lin., *diabolina* und *infernalis* Sauss.; b) mit ganz oder bei-

nahe an die Mandibeln reichenden Augen: *V. carolina* Fab., *sulphurea* Sauss., *cuneata* Fab., *arenaria* Fab., *marginata* Kirby, *vidua* Sauss., *communis* Sauss. und *pensylvanica* Sauss. — Der Verf. bringt diese Arten in eine analytische Tabelle, zieht *V. consobrina* Sauss. als identisch zu *V. arenaria* Fab. und *arenaria* Sauss. zu *marginata* Kirby, und diagnosticirt *V. communis* und *pensylvanica* als neue Arten.

Ref. machte (Monatsberichte der Akad. d. Wissensch. zu Berlin p. 462 ff.) folgende neue Arten aus Mossambique durch Diagnosen bekannt: *Eumenes longirostris*, *phthisica*, *sanguinolenta*, *Rhynchium histrionicum*, *pulchellum*, *luctuosum*, *Belonogaster lateritius*, *elegans*, *Icaria nobilis*, *distigma* und *tomentosa*. Von bekannten Arten wurden in Mossambique aufgefunden: *Eumenes tinctor*, *Synagris xanthura* Sauss., *Rhynchium rubens* Sauss., *Belonogaster juncus* Fab., *Polistes Smithii* und *fastidiosus* Sauss.

Eine Reihe neuer Arten aus verschiedenen Ländern, im British Museum befindlich, machte Smith (Catalogue of Hymenopt. Insects in the collection of the British Museum, Pt. V. Vespidae, London 1857) bekannt. Aus der Masariden-Gruppe: *Paragia pictifrons* aus Australien. — Aus der Eumeniden-Gruppe: *Rhaphiglossa Natalensis* und *Zethus pubescens* von Pt. Natal, *Zethus carbonarius*, *pallidus*, *sculpturalis*, *dubius*, *carinatus* aus Brasilien, *albopictus* von St. Domingo, *gracilis*, *laevinodus* aus Mexiko, *Eumenes sublaevis* von Borneo, *fulvipennis* von Celebes, *imperatrix* aus Nord-China, *insularis* von den Salomons-Inseln, *auropilosa* aus Brasilien, *picta* von St. Domingo, *Pachymenes obscura* aus Mexico, *Abispa australis* von Port Essington, *Odynerus basalis* aus der Ukraine, *intricatus* von Bombay, *flavolineatus* von Java, *confluentus* von Sumatra, *rufescens* von Ceram, *fragilis* von Borneo, *nigrifrons* aus Shanghai, *flavocinctus* aus Neu-Holland, *4-tuberculatus* und *eumenoides* von Pt. Natal, *combustus* und *instabilis* vom Gambia, *pruinus* von St. Domingo, *similis* von Mexiko, *Alastor argentifrons* und *carinatus* aus Neu-Holland, *albocinctus* aus Tasmanien. — Von socialen Wespen: *Ischnogaster cilipennis* von Malacca, *Icaria pendula* aus Ostindien, *opulenta* und *flavopicta* aus Borneo, *Polistes lateritius* von Ceram, *oculatus* aus Mexiko, *Vespa tyrannica* von Singapore, *Polybia pallidipectus* aus Mexiko, *cordata*, *albopicta*, *bicolor*, *diligens* aus Brasilien, *flavifrons* aus Venezuela, *Chartergus luctuosus* aus Brasilien.

v. Motschulsky (Etudes entomol. VI. p. 40) beschrieb *Vespa Japonica* (Radaschkowsky i. lit.) als neue Art aus Japan, 20 lin. lang.

H. de Saussure, Etudes sur la famille des Vespides. Monographie des Guêpes sociales ou de la tribu des Vespiciens, Cah. 8—10. Paris 1856—57. (8., CXLIV pag., pl. 35—37.) — Der Verf. beginnt seine Nachträge und Ergänzungen zu der Monographie der socialen Wespen mit einem allgemeinen Theile, in welchem er auf die sy-

stematische Eintheilung der Gruppe in Gattungen, auf die sexuellen Unterschiede, auf die geographische Verbreitung der Gattungen und Arten, endlich mit besonderer Ausführlichkeit auf die Wespenbauten eingeht; der letztere Abschnitt nimmt den bei weitem grössten Theil der vorliegenden drei Hefte, von p. 19—138 ein. Nach Betrachtung der Wespennester und ihrer Elemente, der Waben und Zellen im Allgemeinen geht der Verf. zu einer Classification der Bauten über, welche bereits in einer besonderen Abhandlung (siehe Jahresbericht 1855. p. 106 ff.) veröffentlicht worden ist; das dort aufgeführte System wird hier unverändert wiedergegeben, jedoch in seinen Einzelheiten weiter ausgeführt und erläutert. Auf die von Möbius (siehe Jahresbericht 1856. p. 116) gegen die Natürlichkeit dieses Systems gemachten Einwendungen geht der Verf. p. 65 ff. in einem Capitel: „Rapport entre la classification des nids et celle de ses artisans“ nur indirekt ein und noch dazu, ohne die vortreffliche Arbeit jenes Autors auch nur mit einem Worte zu erwähnen, obwohl er ihr augenscheinlich mannigfache Modifikationen seiner früheren Ansichten zu verdanken hat. Seine Meinung, dass Arten einer und derselben Gattung nicht zugleich zu den Phragmocytaren und Stelocytaren gehören können, hat S. in Hinsicht auf die Gattungen *Chartergus* und *Polybia* allerdings aufgegeben; er stellt jedoch das Vorkommen begrenzter und unbegrenzter Nester bei *Chartergus* nur als Ausnahme hin, während er sich bei *Polybia* damit hilft, dass diese Gattung ein Gemisch verschiedenartiger Elemente sei und daher der Theorie keinen Eintrag thue. Dass unter *Polistes* einige Arten zu den „*Rectinides*“, die meisten dagegen zu den „*Latérinides*“ gehören, erkennt er ebenfalls an, während er für die übrigen Gattungen bis auf Weiteres die Ansicht, dass die Arten derselben stets Nester von gleicher Kategorie bauen, festhält. In dem speziellen Theile dieses Abschnittes beschäftigt sich der Verf. mit einer eingehenden Charakteristik der Nester einer grösseren Anzahl verschiedener Arten.

In einer „*Note sur les organes buccaux des Masaris*“ (*Annales des scienc. natur.*, 4. sér. VII. p. 107—112. pl. I.) unterwarf H. de Saussure die sehr complicirte und abweichende Bildung der Unterlippe bei den Masariden einer genauen Darstellung. Am meisten stimmt dieselbe bei der Gattung *Paragia* mit der den Eumeniden eigenthümlichen Form überein, den abweichendsten Typus zeigt sie dagegen bei *Masaris* selbst; einen Uebergang zwischen beiden Formen vermittelt die Bildung der Lippe bei der Gattung *Ceramius*. Auf der beifolgenden Tafel hat der Verf. die Bildung der Lippe bei *Paragia*, *Masaris* und *Celonites* nochmals durch mehrere Figuren erläutert.

Crabronites. Ref. (Monatsberichte der Berlin. Akad. der Wissensch. 1857. p. 509 f.) machte folgende neue Arten von Mosambique durch Diagnosen bekannt: *Philanthus stygius*, *frontalis*,

Cerceris pictiventris, *trivialis*, *rufocincta*, *Lyrops quadricolor*, *fluctuata* und *sepulchralis*.

Schenck (Jahrbücher des Vereins f. Naturk. im Herzogthum Nassau XII. p. 62 ff.) beschrieb als angeblich neue Deutsche Arten: *Solenius argenteus*, *Ectemnius pictus*, *Crossocerus clypeatus*, *Nysson lineolatus* (ist offenbar auf eine Varietät des weiblichen *Nysson maculatus* Fab. gegründet), *Tachytes obscuripennis*, *Psen intermedius*, *laevigatus*, *ambiguus* und *fulvicornis*. Der Verf. ist bei mehreren dieser Arten selbst im Zweifel, ob sie nicht als Varietäten von bereits bekannten anzusehen seien.

Goureaux (Bulletin de la soc. entomol. p. CLVII) machte Mittheilungen über die Brutstätte von *Passaloecus gracilis* Dahlb. oder einer ihm nahe verwandten, neuen Art. Die Zellen waren zu fünf in einem Rosenstocke angelegt, in dessen Stengel ein Gang von 5 bis 6 centim. Länge eingegraben war. In jeder Zelle fand sich eine nackte Nymphe von gelber Farbe; es war keine Spur von Ueberbleibseln verzehrter Insekten darin zu finden, ein Zeichen, dass der Raub der Larven von weicher Consistenz sei, also wahrscheinlich wie bei den übrigen Pemphredoniden in Blattläusen bestehe.

Sphegidae. Neue Arten des Ref. aus Mossambique (Monatsberichte der Berlin. Akad. d. Wissensch. 1857. p. 510 f.) sind: *Ammophila lugubris*, *Chlorion fulvipes* und *subcyaneum*; von bekannten Arten wurden aufgezählt: *Sphex albifrons* Fab., *Ammophila ferrugineipes* Lepell. und *Pelopoeus spirifex* Latr.

Stål, Nya arter af Sphegidae (Öfversigt af Kongl. Vetensk. Akad. Förhandl. 1857. p. 63 ff.) gab Diagnosen von *Ampulex amoena* n. A. aus China und *venusta* aus dem Caffernlande.

Pompilidae. *Pompilus vespertilio*, *fatalis* und *irpex* sind neue Arten des Ref. aus Mossambique (Monatsberichte der Berlin. Akad. d. Wissensch. 1857. p. 511); von bekannten wurden daselbst aufgezählt: *Pompilus Tamisieri* Guér., *morosus* Smith, *Brentonii* Guér. und *pulcher* Fab.

Von Stål (Öfversigt af Kongl. Vetensk. Akad. Förhandl. 1857. p. 63 ff.) wurden diagnosticirt: *Pepsis colossica* aus Columbien, *Dahlbomii* aus dem Caffernland, *Mildei* und *Hemipepsis ochroptera* aus Californien, *iodoptera* aus dem Caffernland, *ochropus* aus Sierra-Leona und *Sphecius lanio* aus Neu-Holland.

Von Schenck (Jahrbücher d. Vereins f. Naturk. im Herzogth. Nassau XII. p. 235 ff.) folgende Deutsche Arten als neu beschrieben: *Pompilus intermedius*, *distinguendus*, *Priocnemis maculipennis*, *clari-pennis* und *Agenia canaliculata*.

Heterogyna. Ref. errichtete (Monatsberichte der Akad. d. Wissensch. zu Berlin p. 511 ff.) eine neue Gattung (oder Unter-

gattung) *Pseudomeria* auf eine aus Mossambique stammende neue Art: *Ps. semirufa*, welche sich von den übrigen bekannten Arten der Gattung *Meria* dadurch unterscheidet, dass in den Vorderflügeln die zweite Submarginalzelle verkümmert ist, wodurch sich die dritte verlängert und beide Nervi recurrentes aufnimmt; ausser dem auffallend flachgedrückten Körper und dem langgestreckten, gleichbreiten Abdomen sind auch an den Fühlern das 2. bis 4. Glied nicht an der Spitze angeschwollen und stark verkürzt. — Als neue Arten aus Mossambique wurden ferner (ebenda) diagnosticirt: *Mutilla aestuans*, *Tettensis*, *bilunata*, *Guineensis* Fabr. mas, *Tiphia pedestris*, *scabrosa*, *Myzine cingulata*, *Scolia pardalina*, *mansueta*. — Von bereits bekannten Arten werden als in Mossambique einheimisch aufgeführt: *Scolia ruficornis* Fabr., *melanaria* Burm., *cyanea* Lepell., *thoracica* Fabr. und *fasciata* Klug.

H. de Saussure, Notes sur les Scoliètes et diagnoses de diverses espèces nouvelles. (Revue et Magasin de Zoologie IX. 1857. p. 280—282.) Die neuen hier durch Diagnosen bekannt gemachten Arten sind: *Scolia Azteca* und *Montezumae*, *Elis Tolteca* und *Americana* aus Mexiko. Als Synonyma werden bezeichnet: *Scolia coronata* Smith = *frontalis* Sauss., *pulchra* Smith = *Picteti* Sauss., *instabilis* Smith = *Jurinei* Sauss., *personata* Smith = *fulvifrons* Sauss., *aulica* Burm. Smith = *dubia* Say, Sauss., *dubia* Smith = *haematodes* Burm., *Scol. bimaculata* Smith = *Elis consanguinea* Sauss., *Scol. irregularis* Smith = *Elis lativentris* Sauss.

Schenck (Jahrbücher d. Vereins f. Naturk. im Herzogthum Nassau XII. p. 278) beschrieb *Polochrum* (?) *cylindricum* als neue Deutsche Art. Nach den Angaben über die Form der Cubitalzellen gehört diese Art nicht zu *Polochrum*; nach denjenigen über die Bildung der Fühler und die Zeichnung des Hinterleibs würde man eher auf eine *Sapyga* schliessen, von welcher Gattung die vorliegende Art jedoch dem Verf. zufolge abweichen soll.

Formicarinae. Roger (Berl. Entom. Zeitschr. I. p. 10 ff.) charakterisirte unter dem Namen *Tetrogmus caldarius* eine neue Gattung und Art aus der Abtheilung der Myrmicinen, welche mit *Leptothorax* Mayr zunächst verwandt ist; die Kiefertaster sind drei-, die Lippentaster zweigliedrig, das Metanotum ist rinnenartig ausgehöhlt, mit scharf erhabenem Rändern, in der Mitte mit zwei kurzen aufgerichteten Dornen und zwei gleichen am unteren Ende zur Seite der Einlenkungsstelle des Pedunculus. — Die Art, welche in Arbeitern und Weibchen beschrieben ist, findet sich in grosser Anzahl in Ananashäusern bei Rauden in Schlesien und ist wahrscheinlich importirt. — Ein Zwitter dieser Art, links Männchen, rechts Weibchen, ist ebenda p. 15 ff. ausführlich beschrieben und auf der beifolgenden Tafel abgebildet.

Derselbe (ebenda p. 17 ff.) gab interessante Aufschlüsse über *Formica capsincola* Schilling. Letzterer wollte beobachtet haben, dass die genannte Ameise ihre Eier einzeln an die Rinde der Eichen ablegt und die ausschlüpfenden Larven zum Schutze mit einem kapselförmigen Gewebe umgiebt, welches nach der Entwicklung von der herauskommenden Ameise durchbrochen wird. R. hat dieselbe Art an derselben Lokalität nebst den erwähnten Kapseln aufgesucht und gefunden, dass letztere keine angefertigten Kapseln, sondern trüchtige Weibchen von *Lecanium Cambii* sind, aus denen die Ameisen auch nicht ausgeschlüpft sind, sondern welche nur des Saftes wegen von den Ameisen heimgesucht werden. Vielleicht ist *F. capsincola* Schill. nichts Anderes als *F. nigra* Lin.

L. Dufour (Annales de la soc. entomol. V. p. 60 ff.) errichtete auf *Formica pygmaea* Latr., von welcher er eine Beschreibung und auf pl. 4 eine Abbildung giebt, eine neue Gattung *Micromyrma*, deren wesentlicher Charakter besonders in der Form des Hinterleibsstieles liegt. „Abdominis petiolum simplicissimum, breve, cylindricum, thorax inermis seu muticus, postice truncato-retusus, mandibulae inaequidentatae.“ Da die *Form. pygmaea* Latr. zur Gattung *Tapinoma* Foerst. gehört, so würde die Gattung *Micromyrma* Duf. mit der Förster'schen zusammenfallen; übrigens giebt Duf. abweichend von Nylander bei den Arbeitern seiner Art zwölfgliedrige Fühler an und ist daher über die Identität derselben mit der von Nylander als *F. pygmaea* Latr. angesehenen im Zweifel.

„Ungarn's Ameisen von Dr. G. Mayr“ (22 pag. in 4., ohne Titel und Jahreszahl erschienen) ist eine Schrift, in welcher der Verf. die ihm aus Ungarn bekannt gewordenen Ameisen in analytischen Tabellen kurz nach den Arbeitern beschreibt und über ihre Lebensweise Notizen giebt; sie ist vorzüglich darauf berechnet, Anfänger in das Studium dieser Familie einzuführen, giebt übrigens zugleich ein Bild der dortigen Fauna. Die einzelnen Gattungen sind in folgender Weise vertreten: *Formica* 25, *Tapinoma* 3, *Hypoclinea* 1, *Polyergus* 1, *Ponera* 1, *Myrmica* 3, *Myrmecina* 1, *Tetramorium* 2, *Strongylognathus* 1, *Leptothorax* 2, *Diplorhoptrum* 1 und *Atta* 2 Arten.

Chrysidides. Die zwischen der Wolga und dem Ural vorkommenden Arten dieser Familie hat Eversmann (Bullet. de la soc. imp. des naturalistes de Moscou 1857. IV. p. 544—567) zusammengestellt, die einzelnen Gattungen und Arten mit lateinischen Diagnosen versehen und die darunter befindlichen neuen charakterisirt. Die Zahl derselben stellt sich folgendermassen heraus: *Cleptes* 2 A., *Omalus* 3, *Ellampus* 7, (*E. femoralis* n. A.), *Holopyga* 1, *Hedychrum* 5, (*H. flavipes* n. A.), *Chrysis* 18, (*Chr. cylindrica* n. A. mit ganzrandigem Endsegmente des Hinterleibs, *Chr. amoena* n. A. mit vierzähligem Endringe; alle übrigen Arten der Gattung sind eben-

falls ausführlich charakterisirt.) Stilbum 2 A., Euchroeus 3, Parnopes 2, (*P. Popovii* n. A.). In der Nomenklatur der Arten ist der Verf. überall Dahlbom gefolgt, daher er auch die Synonymie nicht weiter erörtert.

Ichneumonides. Wesmael hat unter dem Titel: „Ichneumonologica otia“ in den Bulletins de l'académie royale des sciences de Belgique XXIV. 2. p. 355—426 seinen Arbeiten über die einheimischen Ichneumoniden abermals einen neuen Nachtrag hinzugefügt, in welchem er eine grössere Anzahl neuer Arten beschreibt und die Kenntniss früher beschriebener durch ergänzende Bemerkungen vervollständigt. 1) *Ichneumones oxypygi*. Neue Arten sind: *Chasmodes paludicola* (Ch. motatorius var. Wesm. antea) von Paris, *Ichneumon tentator* ebendaher, *imperiosus* aus Ungarn, *nobilis* aus Piemont, *perspicuus* aus Frankreich, *eburnifrons* aus Belgien, *erythromerus* (insidiosus var. Wesm. antea), *albicollis*, *phaeostigmus*, *eumerus* (raptorius var. Wesm. antea), *exilicornis* (raptorius var. Wesm.), *firmipes* aus der Schweiz, *Dahlbomi* aus Schweden, *sexcinctus* aus Piemont, *humilis* aus Deutschland, *torpidus* aus Piemont, *citrinops* aus der Schweiz, *zephyrus*, *comis*, *leucocrepis* aus Italien, *pseudocryptus* aus Belgien. — *Hoplismenus lamprolabus*. — 2) *Ichneumones amblypygi*. Neue Art: *Amblyteles longimanus*. — 3) *Ichneumones platyuri*. Neue Art: *Platylabus varipedulis* aus Ungarn. — 4) *Ichneumones pneustici*. Neue Arten: *Hemichneumon subdulus* aus Ungarn, *suspectus* aus Belgien, *Gnathoxys nasutus* aus Ungarn und Deutschland, *Phaeogenes rubripictus* von Paris, *Aethecerus regius*, *Ischnus anomalus* aus Belgien. — Für die vervollständigten Beschreibungen bereits bekannter Arten so wie für die synonymischen Berichtigungen, welche der Verf. giebt, verweisen wir auf die Arbeit selbst.

Auch Boie (Beobachtungen und Bemerkungen, Entomol. Zeit. p. 192 ff.) theilte fernere Beobachtungen über die Zucht von Ichneumoniden aus verschiedenen Raupen u. s. w. mit und beschreibt diejenigen, welche er für neu hält: *Ichneumon nitidulus* aus *Noctua piniperda*, *Campoplex facialis* aus *Noctua ripae*, *Phytodietus maritimus* aus der Puppe einer *Scatophaga*, *Pimpla cryptocampi* aus Weiden-Gallen (von Blattwespen). Ausführliche Angaben über die Veränderlichkeit des *Ichn. incubitor* Grav. und die Abweichungen der beiden Geschlechter von einander auf p. 195 ff.

A. E. Holmgren, *Monographia Tryphonidum Sueciae*. Holmiae, 1856. 4. 300 pag. c. tab. 2. lith. (*Acta Regiae Academiae scientiarum Holmiae* I. 1855. p. 91—394). Der Verf. liefert in dieser sehr umfangreichen Abhandlung eine monographische Bearbeitung der in Schweden einheimischen Arten der Ichneumoniden-Gruppe Tryphonides, welche nicht nur für die Kenntniss der Arten, sondern auch in Rücksicht auf die systematische Gliederung der Gruppe von beson-

derer Bedeutung ist. Nachdem der Verf. für die fünf Hauptgruppen der Ichneumoniden, die Ichneumoniden, Crypti, Ophioniden, Tryphoniden und Pimplariae die wesentlichen Charaktere festgestellt hat, zerfällt er die Tryphoniden zunächst in vier Abtheilungen: Tryph. homalopi, prosopi, schizodonti und aspidopi. Während in den drei ersten Abtheilungen das Scutellum mehr oder weniger erhaben, nach hinten verengt und an der Spitze abgerundet ist, zeigt es sich bei der vierten abgestutzt und seine Ecken vorgezogen. Bei den Tryph. schizodonti ist der obere Zahn der Mandibeln zweispitzig und unter demselben erscheinen die Mandibeln dreizählig; bei den Tryph. prosopi und homalopi ist der obere Zahn der Mandibeln dagegen ungetheilt. Letztere beiden unterscheiden sich durch den Clypeus, der bei den Tryph. homalopi abgetrennt, bei der Tryph. prosopi mit der Stirn verschmolzen, durch das Gesicht, welches bei ersteren wenig hervortretend, bei letzteren stark vorgequollen ist, durch die Längsverhältnisse des ersten Gliedes der Fühlergeissel, welches bei den Tryph. homalopi länger als das zweite, bei den Tryph. prosopi meist ebenso lang als das zweite ist, durch die Spiracula des Metathorax, die bei den einen gerundet, bei den anderen länglich oder oval sind. — Die Tryphoniden homalopi umfassen 20 Gattungen, die je nachdem die Hinterschienen mit zwei Dornen bewaffnet oder unbewehrt sind, in zwei Sektionen zerfallen. Unbewehrte Schienen haben drei Gattungen: *Acrotomus* n. g., *Exenterus* Hart. und *Exyston* Schiödt. Zweidornige Hinterschienen kommen 17 Gattungen zu, welche der Verf. nach den Verschiedenheiten einzelner Körpertheile abermals in fünf Divisionen zerfällt: a) *Mesoleptus* Grav., *Catoglyptus* Först., *Euryproctus* n. g. und *Notopygus* n. g. b) *Ctenopelma* n. g., *Priopoda* Holmgr. c) *Perilissus* Först., *Eclytus* n. g. d) *Megastylus* Schiödt. e) *Mesoleius* Holm., *Trematopygus* n. g., *Tryphon* Fall., *Grypocentrus* Ruthe, *Adelognathus* n. g., *Euceros* Grav., *Polyblastus* Hart. und *Erromenus* n. g. — Die Tryphoniden prosopi zerfallen in 7 Gattungen: *Monoplectron* Holm., *Ischyrocnemis* n. g., *Colpotrochia* Holm., *Exochus* Grav., *Chorinaeus* n. g., *Hyperacmus* n. g. und *Orthocentrus* Grav. — Die Tryphoniden schizodonti beschränken sich auf die einzige Gattung *Bassus* Fall., die Tr. aspidopi auf *Metopius* Panz. — Die Zahl der in der vorliegenden Arbeit beschriebenen neuen Arten ist sehr beträchtlich und die überhaupt darin enthaltenen betragen mehr als fünfhundert; die artenreichsten Gattungen sind: *Mesoleius* 112, *Tryphon* 21, *Polyblastus* 46, *Exenterus* 47, *Exochus* 29, *Orthocentrus* 55 und *Bassus* 41. In artenreichen Gattungen giebt der Verf. ausser den Beschreibungen der einzelnen Arten eine analytische Tabelle zur leichteren Bestimmung derselben. Der Verf. hat eine ebenso grosse Sorgfalt auf die Beschreibung des ihm vorliegenden Materials als auf die Durcharbeitung der früheren Literatur verwandt,

so dass sowohl aus diesem Grunde als auch wegen der Reichhaltigkeit der Schwedischen Fauna an Tryphoniden die Arbeit als eine besonders wichtige in der ichneumonologischen Literatur zu bezeichnen ist. Zwei beifolgende Tafeln geben eine Darstellung von 25 Gattungs-Repräsentanten.

Derselbe, „Ophionidslägtet *Anomalon*“ (Öfversigt af Kongl. Vetensk. Akad. Förhandl. XIV. p. 157—186) lieferte eine Aufzählung und ausführliche Beschreibung der in Schweden einheimischen Arten der früheren Gattung *Anomalon* Grav., in welcher er mit *Wesmaël* vier Untergattungen annimmt. Von diesen ist *Schizoloma* Wesm., *Exochilum* Wesm. und *Heterochilum* Wesm. je durch 1, *Anomalon* sens. strict. durch 19 Arten vertreten. Unter letzteren sind als neu zu erwähnen: *Anomalon Wesmaëli* (ruficorne Grav.?, *bellicosum* var. Wesm.), *rufum*, *affine*, *septemtrionale* und *geniculatum*. Die Abhandlung ist von einer Tafel begleitet.

Giraud (Verhandl. des zoolog.-botan. Vereins in Wien VII. p. 136 ff.) beschrieb *Euceros crassicornis* Grav. und *albitarsis* Curt. nach beiden Geschlechtern, *Metopius nasutus* (ob = *M. micratorius* Grav.?), *Mesostenus nubeculator*, *Pezomachus tricolor* als neue Arten aus Oesterreich, *Anomalon fasciatum* aus Sicilien, Dalmatien und Syrien. Abbildungen auf Taf. 3.

Snellen van Vollenhoven (Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland II. p. 281 f.): *Lissonota cruenta*, *Exetastes Cimbicis* und *Anomalon bucephalum* als neue Arten aus den Niederlanden.

Nach Sichel (Bullet. de la soc. entomol. p. XCVI) ist der von Doumerc aus *Hemerobius perla* erzogene Ichneumopide kein *Acoenites*, wie früher von ihm angegeben (vergl. Jahresbericht 1855. p. 118), sondern ein *Hemiteles*; die Art ist entweder eine Varietät von *Hem. floricator* Grav. oder eine damit verwandte neue Art.

Agriotypus armatus Walk., von v. Siebold neuerdings als Schmarotzer von Phryganiden-Larven (*Aspatherium picicorne* Kol.) nachgewiesen, kommt nach Kollar (Verhandl. d. zoolog.-botan. Vereins in Wien VII. p. 189) auch in Bayern und Steyermark vor; die Art war bisher nur aus England bekannt.

Kawall (Entomol. Zeitung p. 12 ff.) wies auf eine von Thunberg im IX. Bande der Petersburger Akademie-Schriften (1824) erschienene Arbeit über Ichneumonen hin, welche von Gravenhorst und den späteren Autoren nicht berücksichtigt worden ist, aber die Beschreibung einer beträchtlichen Anzahl neuer Arten (206 Europäische und zwar meist Schwedische, 31 ausländische) enthält. Ohne Frage sind hier viele von Gravenhorst und nach ihm beschriebene Arten schon charakterisirt und müssen für diese die früheren Thunberg'schen Namen wiederhergestellt werden; Kawall hat sogar

einige Arten nach Thunberg bestimmen können, die von Gravenhorst und Wesmaël gar nicht beschrieben worden sind.

Evaniales. Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 113) beschrieb *Stephanus haematipoda* als neue Art von der Insel Woodlark, mit *Steph. coronator* Boisd. nahe verwandt.

Braconides. Giraud (Verhandl. d. zoolog.-botan. Vereins in Wien VII. p. 172 ff.) beschrieb *Paxytomma buccata* Encycl. (= *Hybrizon latebricola* Nees) nach dem männlichen Geschlechte, P. Cremieri de Romand, *Ischiogonus longicaudis* als neue Art aus Oesterreich, *Aleiodes formosus*, *carbonarius* und *grandis* aus der Wiener Gegend. Abbildungen dieser Arten auf Taf. III und IV.

Phylax aestivalis Snellen van Vollenhoven (Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland II. p. 282) ist eine als neu beschriebene Art aus den Niederlanden.

Boie (Entomol. Zeitung p. 194) bestätigt die Angabe von Bouché, dass *Spathius clavatus* Nees sich aus *Anobium striatum* entwickele.

Chalcididae. Förster (Hymenopterologische Studien II. Heft) errichtete in dieser Familie folgende neue Gruppen: *Myinoidae*, zwischen die Chalcididen und Eupelmiden Walker's gestellt, für die Gattungen *Agonioneurus* Westw. (*Myina* Nees), *Coccophagus* Westw. und *Mesidia* n. g. errichtet; letztere Gattung unterscheidet sich von *Myina* Nees dadurch, dass die drei dem Endgliede der Fühler vorausgehenden Geisselglieder von gleicher Grösse sind. — *Perilampoideae* zwischen Eucharoiden und Ormyroiden, für die Gattungen *Perilampus* Latr., *Lamprostylus* n. g. und *Elatus* Walk. errichtet; die neue Gattung *Lamprostylus* hat, wie *Elatus* Walk., einen deutlich gestielten Hinterleib, unterscheidet sich aber von derselben durch tief grubig punktirtes Mesonotum und Schildchen. — *Ormyroidae* für *Ormyrus* Westw. (*Periglyphus* Boh., *Siphonura* Nees, *Cystosoma* Perty.) — *Elasmoidae* für *Elasmus* (Aneure Nees). — *Elachistoidae* enthält die Gattungen *Euplectrus* Westw., *Elachistus* Spin. und drei neue: *Aulogymnus*, Furchen des Parapsiden auf das Schildchen stossend, Fühler mit zwei Ringeln; *Olynx*, Furchen der Parapsiden weit vom Schildchen ab auf die Achseln stossend, Fühler mit einem Ringel, achtgliedrig; *Telcognus* ebenso, aber die Fühler neungliedrig. — *Entedonoidae* mit 13 Gattungen: *Epiclerus* Hal., *Rhopalotus*, *Astichus*, *Holcoppelte*, *Euderus* Walk., *Secodes*, *Pleuropachys* Westw., *Pleurotropis*, *Entedon* Dalm., *Asecodes*, *Omphale* Hal., *Chrysocharis* und *Derostenus* Westw. Die Gattung *Rhopalotus* mit keulförmigen, weniger als zwölfgliedrigen Fühlern, *Astichus* mit nicht keulförmigen Fühlern, deren Geissel beim Männchen stark gesägt und wirtelhaarig ist,

Holcopelte: Fühlergeißel beim Männchen nicht gesägt, Schildchen mit Mittelfurche; *Secodes* von Euderus Walk. durch den Mangel der Haarreihen auf den Flügeln unterschieden, mit einer unvollkommenen Randzelle; *Pleurotropis* von *Pleuropachys* Westw. dadurch unterschieden, dass die Unterrandader nicht stark verdickt ist; das Metanotum mit Seitenkielen. *Asecodes* von Entedon Dalm. durch glattes Schildchen unterschieden, *Chrysocharis* von *Derostenus* Westw. durch achtgliedrige Fühler abweichend. — *Tetrastichoidae* mit acht Gattungen: *Triphasius*, *Anozus*, *Pterothrix* Westw., *Trichaporus*, *Ceraninus* Walk., *Baryscapus*, *Hyperteles* und *Tetrastichus* Halid. Die Gattung *Triphasius* hat keine Furchen auf dem Schildchen und scheinbar dreigliedrige Fühler, *Anozus* mehrgliedrige Fühler, Flügel ohne Ramus stigmaticus; *Trichaporus* von *Pterothrix* durch den Mangel langer Wimperhaare am Vorderrande des Flügels unterschieden, *Baryscapus* von *Ceraninus* Walk. dadurch abweichend, dass der Vorderrand der Vorderflügel nicht lang gewimpert ist, sondern dass sich lange Wimperborsten nur auf dem Ramus marginalis vorfinden; *Hyperteles* von *Tetrastichus* Halid. durch zehngliedrige Fühler in beiden Geschlechtern abweichend. — *Trichogrammatoidae*, ein Gruppe die für die trimerischen Chalcidier errichtet ist und acht Gattungen umschliesst: *Poropoea* Först., *Trichogramma* Westw., *Chaetosticha* Walk., *Lathromeris*, *Centrobia*, *Asynacta*, *Brachysticha* (*Brachista* Walk.) und *Oligosita* Halid. Bei *Lathromeris* und *Centrobia* sind die Vorderflügel reihenweise behaart, die Unterrandader bildet keinen Bogen, die Flügel sind hinter dem Ramus marginalis bis zur Spitze nur mit einem kurzen Haarsaume besetzt; bei ersterer Gattung sind die Fühler sieben-, bei letzterer sechsgliedrig. *Asynacta* hat nicht reihenweise behaarte Flügel und siebengliedrige Fühler.

Auch die bereits früher festgestellten Gruppen der Chalcidier hat Förster (a. a. O.) mit zahlreichen neuen Gattungen bereichert, nämlich die Eupelmoiden mit *Halidea* (vergebener Name), *Polymoria*, *Ratzeburgia* und *Charitopus*, die Encyrtoiden mit *Eucomys*, *Discodes*, *Anusia*, *Euryscapus*, *Aglyptus*, *Echthroplexis*, *Sterrhocoma*, *Dinocarsis*, *Rhopus*, *Leptomastix* (*Leptomastax* gen. Coleopt.!), *Habrolepis* und *Sceptrophorus*, die Tormymoiden mit *Cryptopristus*, *Glyphomerus*, *Syntomaspis* und *Lochites*, die Cleonymoiden mit *Tricoryphus*, *Heydenia*, *Plutothrix* und *Tetracampe*, die Miscogastriden mit *Pachycrepis*, *Hypsicamara*, *Sphaeripalpus*, *Arthrolysis*, *Dichalysis*, *Cryptoprymna* und *Isocratus*, die Hormoceroiden mit *Anogmus*, *Tripedias* und *Isoplata*, die Pteromalinen mit *Megapelte*, *Oxyglypta*, *Stictonotus*, *Caenacis*, *Xenocrepis*, *Peridesmia*, *Simopterus*, *Dibrachys*, *Coelopisthia*, *Diglochis*, *Metacolus*, *Pandelus*, *Dinotus*, *Rhopalicus* und *Acrocormus*, die Eulophoiden mit *Solenotus* und *Sympiesis*. Die Charaktere der einzelnen Gattungen sind stets gruppenweise in analytischen Tabellen

entwickelt und ausserdem noch näher erörtert; ein Gleiches hat mit den Gruppen statt.

A. Costa (Memorie della Reale Accademia delle scienze di Napoli II. p. 223) machte eine neue Gattung *Bactyrischion* aus der Gruppe der Pteromalinen bekannt und stellte für dieselbe folgende Charaktere auf: Fühler gebrochen, in der Mitte der Stirn eingefügt, 13-gliedrig, die Geissel in eine länglich spindelförmige, solide Keule endigend; Vorderflügel mit einem sehr kurzen vom Submarginal-Nerven ausgehenden Aestchen und einigen obliterirten Aederchen. Mittelbeine mit geraden Schenkeln, die an der Basis dünner, an der Spitze leicht gekeult sind; Hinterhüften gross, verlängert, frei, Hinterschinkel dick, unterhalb reihenweise gezähnt, Hinterschienen gebogen, an der Spitze schief abgestutzt und in einen kräftigen Dorn ausgezogen, ohne beweglichen Dorn. Hinterleib fast sitzend, zusammengedrückt, mit langer Legeröhre. Nur im weiblichen Geschlechte bekannt. Art: *Bact. bicoloratum*, fig. 4 abgebildet, aus Neapel, 1½ lin. lang.

Dahlbom hat in der Öfversigt af Kongl. Vetensk. Akad. Forhandl. XIV. p. 289—298 unter dem Titel: „Svenska Små-Ichneumonernas familjer och slågten“ eine Uebersicht der in Schweden vorkommenden Gattungen der Chalcidier und Proctotrupier gegeben und dieselben in Gruppen vertheilt, die in ihrem Umfange von denen der Englischen Autoren mehrfach abweichen. Sowohl diese Gruppen als die darunter aufgeführten Gattungen sind mit kurzen Charakteristiken in Schwedischer Sprache versehen, unter letzteren jedoch keine Arten citirt oder beschrieben, selbst da nicht, wo die Gattungen als neue aufgestellt werden. Eine Uebersicht des Inhalts der Arbeit ist folgende: 1) Psilidae Dahlb. (*Diapria*, *Psilus*). 2) Codrinidae Dhlb. (*Codrus*). 3) Heloridae Dahlb. (*Agenophorus* n. g., *Helorus*). 4) Sparasionidae Dhlb. (*Platygaster*, *Teleas*, *Sparasion*). 5) Ceraphron-tidae Dhlb. (*Microps*, *Telospilus* n. g., *Megaspilus*, *Ceraphron*). 6) Dryinidae Halid. (*Bethylus*, *Dryinus*, *Gonatopus*). 7) Entedontidae Dhlb. (*Entedon* mit 6 Untergattungen). 8) Encyrtidae Walk. (*Lonchocerus* n. g., *Eupelmus*, *Copidosoma*, *Chorcus*, *Coccophagus*, *Eusemion* n. g., *Stenocera* und *Encyrtus* mit 4 Untergattungen). 9) Torymidae Walk. (*Sciatheras*, *Spalangia*, *Periglyphus*, *Torymus*). 10) Eurytomidae Walk. (*Pteromalodes* n. g., *Megastigmus*, *Decatoma*, *Eurytoma*). 11) Pteromalini Dalm. mit 2 Gruppen: *Chrysolampidae* Dhlb. (*Cycloneuron* n. g., *Notopodion* n. g., *Chrysolampus*) und *Pteromalini* Dhlb. (*Cleonymus*, *Caratomus*, *Perilampus*). 12) Chalcididae Walk. (*Hookeria*, *Haltichella*, *Brachymeria*, *Eucharis*, *Chalcis*).

Reinhard (Berlin. Entom. Zeitschr. I. p. 70 ff.) erörterte die Synonymie von 12 Arten aus verschiedenen Pteromalinen-Gattungen, welche sich ihm beim Vergleiche der Englischen und Deutschen

Autoren, von letzteren besonders Förster und Ratzeburg, ergeben haben.

Boie (Entomol. Zeitung p. 194) lieferte eine nochmalige Beschreibung von *Telegriaphus maculipennis* Ratzeb., von ihm in einem Exemplare auch bei Kiel aufgefunden.

Stollwerk (Verhandl. d. naturhist. Vereins. d. Preuss. Rheinl. und Westphalens XIV. p. 113—125) machte umständliche Mittheilungen über die Lebensweise der *Poropoea Stollwerkii* Först. Der Parasit sticht die Eier von *Attelabus curculionoides* an und entwickelt sich aus den von diesem gebildeten Blattdüten; es wird nur je ein Ei des Parasiten in das Ei des *Attelabus* gelegt, dessen Inhalt der Larve des ersteren zur Nahrung dient.

Proctotrupii. Förster (Hymenopterologische Studien II. Heft) errichtete in dieser Familie drei neue Gruppen: 1) *Platygastreroideae* für die Gattungen *Iphitrachelus*, *Inostemma* Halid. und *Platygastrer* Latr., denen hier ausserdem noch achtzehn neue unter dem Namen *Allotropa*, *Metaclisis*, *Monocrila*, *Isostasius*, *Acerota*, *Catillus*, *Xestonotus*, *Amblyaspis*, *Leptacis*, *Isorhombus*, *Ectadius*, *Sactogaster*, *Synopeas*, *Anopedias*, *Isocybus*, *Trichacis*, *Hypocampsis* und *Polygnotus* hinzugefügt werden. 2) *Belytoideae* mit 19 Gattungen: *Ismarus* Halid., *Psilomma*, *Oxylabis*, *Belyta* Jur., *Synacra*, *Pantolyta*, *Zygota*, *Aclista*, *Acropiesta*, *Anectata*, *Pantoclis*, *Macrohynnis*, *Xenotoma*, *Leptorhaptus*, *Cinetus* Jur., *Anommatium*, *Diphora*, *Zelotypa* und *Miota*. 3) *Heloroidae* für *Helorus* Latr. — Zu den bisherigen Gruppen kommen ausserdem als neue Gattungen: *Myctrophorus* zu den Dryinen, *Trichosteresis* und *Lygocerus* zu den Ceraphroniden, *Acolus*, *Baeoneura*, *Anteris*, *Baryconus*, *Trimorus*, *Apegus*, *Hadronotus* und *Idris* zu den Scelioniden, *Camptoptera*, *Limacis*, *Doriclytus*, *Cosmocomma* und *Stichothrix* zu den Mymariden, *Entomacis*, *Idiotypa*, *Hemilexis*, *Loxotropa*, *Glyptonota*, *Monelata* und *Polypeza* zu den Diaprioiden.

Haliday (Natural history review IV., Proceed. of societies p. 166 ff., pl. X) machte eine neue Gattung *Labolips* aus der Gruppe der Diapridae bekannt, von welcher, nach seiner Meinung, nur Weibchen vorkommen, die sich durch eine eigenthümliche Bildung der Eierstöcke (siehe oben unter Insecta!) auszeichnen. Die Fühler sind auf der hervorragenden Stirn eingefügt und zwölfgliedrig, die Maxillen und Unterlippe zurückgezogen, die Kiefertaster obsolet, die Lippentaster klein, ungegliedert, die Flügel fast ohne Adern; Ocellen fehlen, die Mandibeln sind innerhalb mit einem Zahne bewaffnet, die Fühler mit verlängertem Schaft, die Geissel durchblättert, der Hinterleib an der Basis des zweiten Segmentes ausgehöhlt. Art: *Labolips innupta*, 2 lin. lang aus Irland, auf pl. X abgebildet. — Mit der Charakteristik dieser Gattung verbindet der Verf. eine Auseinan-

dersetzung der Gattungen der Diapriden, und theilt die bisher bestehenden in eine Anzahl von Untergattungen, die zum Theil neu sind. *Helorus* Latr. mit einer neuen Art *H. corruscus* bleibt in der früheren Abgränzung, *Ismarus* Hal. zerfällt in *Ismarus* sens. strict. und *Entomius* Herr.-Sch., *Belita* Jur. in 4 Untergattungen: *Acoretus* (für *Belyta* rufo-petiolata Nees) mit kreuzweisen, langen, sichelförmigen Mandibeln, *Cinetus* (*C. gracilipes* Curt.), *Belita* (*Bel. bicolor* Jur.) und *Opazon* mit abwärts gebogenen, rüsselförmigen Mandibeln. Die Gattung *Diapria* Latr. umschliesst die Untergattungen *Diapria* sens. strict., *Basalys*, *Spilomicrus*, *Paramesius* und *Aneurhynchus* Westw., *Galesus* Curt. und drei neue: 1) *Corynopria* „Antennae maris articulis 14, quarto integro, feminae articulis 13, ultimo longe maximo; alae vena unica capitata; abdominis segmentum secundum laeve, summa basi leviter tomentosum.“ Arten: *C. petiolaris* Nees und *cincta* n. sp. 2) *Glyphidopria*. „Antennae 13 articulae, maris articulo secundo minuto; vena subcostalis, qua marginem alae attingit, angulatum reflexa in ramulum radialem; abdominis segmentum secundum basi media breviter canaliculatum.“ Zwei neue Arten: *Gl. platyptera* und *perplexa*. 3) *Mionopria*. „Antennae maris 13 articulae, feminae 12 articulae; vena subcostalis cum costali concurrens in lineolam stigmaticalem medio appendiculatam; abdominis segmentum secundum basi impressum; mesonoti scutum bisulcum.“ Art: *Diapr. maritima* Halid. — Die Gattung *Platymischus* zerfällt in *Platymischus* Westw. und *Artibolus* (*Chlidonia* Herr.-Sch.), letztere für *Diapria brachialis* Nees.

Cynipidae. „On the quantity of Tannin in the galls of *Cynips quercus-petoli*,“ by Edw. Hart Vinen (Journ. of the proceed. of the Linnean soc., Zoology I. p. 72). Verf. hat einheimische Gallen (aus England) chemisch untersucht, um ihren Gehalt an Tannin im Vergleiche mit den im Handel befindlichen Aleppo-Gallen festzustellen. Das durch Maceration der Englischen Gallen in Aether und Wasser erhaltene Residuum enthielt nur $\frac{2}{3}$ Tannin- und Gallen-Säure, das von Aleppo-Gallen dagegen fast $\frac{1}{4}$; dies Resultat ist aber nicht massgebend, da die Englischen Gallen nach dem Ausschlüpfen der Cynips, die Aleppanischen dagegen vor demselben, zur Zeit ihrer grössten Entwicklung untersucht wurden. Uebrigens schwanken auch die von verschiedenen Chemikern angestellten Untersuchungen über den Tannin-Gehalt der Gallen zwischen 26 und 77 Procent.

Urocerata. Snellen van Vollenhoven (Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland II. p. 280) beschrieb *Cephus elongatus* als neue Art aus den Niederlanden, Giraud (Verhandl. d. zoolog. botan. Vereins in Wien VII. p. 181 f.) *Cephus luteomarginatus* aus Ungarn.

Tenthredinetae. Taschenberg, „Schlüssel zur Bestim-

mung unserer einheimischen Blatt- und Holzwespen-Gattungen und Verzeichniss der bisher in der Umgegend von Halle aufgefundenen Arten“ (Zeitschrift f. d. gesamt. Naturwiss. X. p. 113—118). Der Verf. entwickelt in dieser kleinen Abhandlung die Charaktere der bei Halle vorkommenden Tenthredineten- und Uroceraten-Gattungen in einer analytischen Tabelle und lässt dieser eine systematische Aufzählung der von ihm bei Halle aufgefundenen Arten mit Hinzufügung des Datums und Fundortes folgen. Dieselben vertheilen sich auf die einzelnen Gattungen folgendermassen: *Cimbex* 5, *Hylotoma* 9, *Schizocera* 1, *Lophyrus* 7, *Cladius* 4, *Nematus* 8, *Diphadnus* 1 (unbenannt, durch Diagnose festgestellt), *Dineura* 1, *Dolerus* 16, *Emphytus* 6, *Phyllotoma* 1, *Selandria* 20, *Athalia* 3, *Allantus* 17, *Tenthredo* 22, *Tarpa* 2, *Lyda* 6. — Urocerata: *Cephus* 3, *Xiphydria* 2, *Sirex* 5.

Snellen van Vollenhoven hat unter dem Titel: „De inlandsche Bladwespen in hare gedaanteverwisselingen en levenswijze beschreven door Sn. v. Voll.“ (Mémoires d'entomologie publiés par la soc. ent. des Pays-Bas I. p. 133—154 und p. 171—194. pl. 5—7 und pl. 9—12) eine Arbeit über die Verwandlung und Lebensweise der Holländischen Blattwespen begonnen, in welcher er die einzelnen Arten ohne systematische Reihenfolge, sondern je nachdem ihm die Naturgeschichte derselben bekannt geworden ist, abhandelt. Während das vollkommene Insekt, sobald es genugsam bekannt ist, nicht weiter beschrieben, sondern nur durch eine lateinische Diagnose und Anführung der darüber vorhandenen Literatur festgestellt wird, werden die ersten Stände einer ausführlichen Charakteristik unterworfen, ihre Lebensweise, Verwandlung, Futterpflanze und ihre Parasiten genau erörtert. Ausser der Beschreibung ist jede einzelne Art durch eine beifolgende Tafel, welche Abbildungen der Larve, Puppe und Imago, der Futterpflanze der ersteren so wie einzelner charakteristischer Theile der letzteren enthält, erläutert; die Ausführung dieser Tafeln sowohl in Zeichnung als Colorit ist ganz vortrefflich. — Die in dem gegenwärtig vorliegenden Theile der Arbeit abgehandelten Arten sind folgende: *Abia aenea* Klug, *Nematus coeruleocarpus* Hart., *hortensis* Hart., *Allantus tricinatus* Fab., *Cladius viminalis* Fall., *Lophyrus pini* Lin., *Nematus vallator* n. sp., Larve auf *Populus italica*. — Der Verf. beginnt seine Arbeit mit einer Darlegung der über Blattwespen-Larven bestehenden Literatur in chronologischer Reihenfolge.

Derselbe (Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland II. p. 276 ff.) beschrieb *Lophyrus catocalus*, *Dolerus Busaei*, *Selandria albomarginata*, *Sixii*, *Lyda maculifrons*, *nigricornis* als neue Arten aus den Niederlanden.

Giraud (Verhandl. d. zoolog.-botan. Vereins in Wien VII. p. 181 ff.) beschrieb *Tenthredo (Allantus) Frauenfeldi* und *Idriensis*

aus Krain, *Lyda aurantiaca* aus Tyrol und Krain als neue Arten und brachte Tenth. *intermedia* Klug als Männchen zu Tenth. *coryli* Fab.; beide wurden in Begattung gefangen.

Diptera.

Insecta Saundersiana, or characters of undescribed Insects in the collection of W. W. Saunders. Vol. I. Diptera, by F. Walker. London, J. van Voorst, 1856. (8. 474 pag. c. tab. VIII). — Unter vorstehendem Titel liegt jetzt der 1. Band des Werkes, dessen frühere Lieferungen in die Jahre 1851 — 53 fallen, mit dem fünften Hefte abgeschlossen vor; während sich der Verf. in jenen mit der Beschreibung der in der Saunders'schen Sammlung befindlichen neuen Gattungen und Arten aus den verschiedenen Familien der Diptera brachycera beschäftigt hatte, geht er in dem Schlusshefte auf die Nemoceren ein, welche durch lateinische Diagnosen, denen in der Regel eine fast wörtliche Uebersetzung ins Englische folgt, festgestellt werden. Von neuen Gattungen findet sich nur eine, mit *Ceratopogon* verwandte, aufgestellt. Es folgen ausserdem noch Nachträge, in denen einzelne neue Arten aus den Familien der Tabanii, Xylotomae und Asilici beschrieben werden. Der Band wird durch ein systematisch geordnetes Namensverzeichniss der Familien, Gattungen und Arten abgeschlossen; Abbildungen sind für die Abtheilung der Nemoceren nicht beigegeben worden.

Als eine fernere Ergänzung des eben bezeichneten Werkes sind die Beschreibungen einer grösseren Anzahl ausländischer Arten aus verschiedenen Familien der Diptera brachycera anzusehen, welche F. Walker unter dem Titel: „Characters of undescribed Diptera in the collection of W. W. Saunders“ (Transact. of the entomol. soc. IV. p. 119—158) veröffentlicht hat; die hier bekannt gemachten Arten stammen aus Nord-Amerika, vom Amazonenstrome, von Port Natal und aus Neu-Holland.

Ein Verzeichniss der von R. Wallace zu Sarawak auf Borneo gesammelten Dipteren lieferte derselbe im Journal of the proceed. of the Linnean soc., Zoology I. p. 105—136; „Catalogue of the Dipterous Insects collected at Sarawak, Borneo, by Mr. A. R. Wallace, with descriptions of new

species.“ Die hier verzeichneten Arten, deren Zahl sich auf 170 beläuft, vertheilen sich auf fast alle Familien der Dipteren; bei weitem die grösste Anzahl derselben wird als neu angesehen und durch kurze lateinische und englische Beschreibungen, beide dem Inhalte nach fast gleichlautend, bekannt gemacht. Diejenigen, auf welche der Verf. neue Gattungen gründet, sind von Westwood auf pl. VI durch schöne Abbildungen und durch Darstellung ihrer charakteristischen Merkmale zur näheren Kenntniss gebracht worden.

J. Bigot, Essai d'une classification générale et synoptique de l'ordre des Insectes Diptères. 5. Mémoire. (Annales de la soc. entomol. V. p. 517—564.) — Der Verf. beginnt diese Fortsetzung seiner systematischen Versuche damit, Nachträge zu den früher behandelten Familien zu liefern, d. h. die von ihm dort übersehenen und die seit jener Zeit aufgestellten Gattungen gehörigen Orts einzuschalten, resp. ihre Selbstständigkeit zu bestreiten. Auch werden zugleich einige der von ihm begangenen Irrthümer wieder gut gemacht, indem z. B. die Gattung *Chauna* Loew den Stratiomyiden, *Philopota* den Henopiern wieder zurückgegeben werden. Wenn der Verf. bei diesen hätte zu der Einsicht kommen müssen, dass, um Aenderungen vorzunehmen, eine genaue Prüfung des Vorhandenen nothwendig sei, fährt er nichtsdestoweniger über andere ihm unbekannte Formen in gleich leichtfertiger Weise zu urtheilen fort, ein Verfahren, welches die Sache selbst natürlich nicht fördern kann; es erscheint daher auch unnöthig, auf die zahlreichen, kurz hingeworfenen Bemerkungen des Verf. hier speziell einzugehen. — Der zweite Theil der Arbeit enthält eine synoptische Tabelle der Gattungen der Asiliden und Empiden, in welcher, wie bei den früheren Familien, die dem Verf. unbekannten Gattungen fehlen; sowohl diese als auch solche, welche ihm nicht gehörig begründet erscheinen, werden zuvor einzeln namhaft gemacht. Die auf einzelne bereits bekannte Arten begründeten neuen Gattungen so wie die Hauptmomente, auf welche der Verf. seine Eintheilung der genannten Familien basirt, sind bei diesen in Betracht gezogen worden.

Derselbe, „Diptères nouveaux provenant du Chili“ (Annales de la soc. entomol. V. p. 277—308) lieferte Beschreibungen und schöne colorirte Abbildungen von mehreren neuen Chilenischen Dipteren verschiedener Familien, auf welche zum Theil auch neue Gattungen errichtet wurden.

Camillo Rondani, Dipterologiae Italicae prodromus. Vol. I et II. Parma 1856—57. — Der durch seine zahlreichen Beiträge zur Kenntniss der Italienischen Dipteren-Fauna bekannte Verf. beabsichtigt mit dem vorliegenden Werke, wie sich aus dessen Anlage ergibt, weniger eine eingehende und umfassende Bearbeitung der Italienischen Zweiflügler im streng wissenschaftlichen Sinne, als vielmehr neben der Feststellung der dortigen Fauna hauptsächlich dem Sammler ein Hilfsmittel an die Hand zu geben, die daselbst vorkommenden Gattungen und Arten bestimmen zu können. Dies resultirt schon aus der von ihm in Anwendung gebrachten analytischen Methode zur Unterscheidung der Familien, Gruppen, Gattungen und Arten, bei welcher ein Eingehen auf die wesentlichen und natürlichen Charaktere oft weggelassen oder wenigstens in den Hintergrund treten muss, während ein Hervorheben der rein unterscheidenden Merkmale die Hauptsache bildet. Nach dem Beispiele anderer nach derselben Methode abgefasster Faunen, beginnt der Verf. sein Werk mit einer analytischen Tabelle zur Feststellung der Familien, deren er im Ganzen 32 annimmt (Vol. I. p. 10—18), schliesst hieran eine gleiche für die innerhalb der Familien von ihm angenommenen Gruppen (ebenda p. 19—41), welche übrigens wohl zweckmässiger mit der dritten Tabelle zur Bestimmung der Gattungen (p. 42 .ff), die den übrigen und bei weitem grössten Theil des ersten Bandes einnimmt, vereinigt worden wäre. Dieser erste Theil des Werkes führt auch den besonderen Titel: „Genera Italica ordinis Dipteriorum, ordinatim disposita et distincta, et in familias et stirpes aggregata“ (Parma, 1856. 8. 226 pag.), während der zweite, welcher den Anfang des speziellen Abschnittes enthält, die Bezeichnung: „Species Italicae ordinis Dipteriorum, in genera characteribus definita, ordinatim collectae, methodo analytica

distinctae et novis vel minus cognitis descriptis. Pars I. Oestridae, Syrphidae, Conopidae.“ (Parma, 1857. 8. 264 pag.) erhalten hat. In letzterem werden die drei bezeichneten Familien so wie die unter ihnen vereinigten Gattungen, die im ersten Theile nur durch die in die Tabelle aufgenommenen Unterscheidungsmerkmale definirt und je mit dem Citat einer einzelnen, entweder bereits bekannten, oder (wie es oft vorkommt) auch vom Verf. als neu bezeichneten Art begleitet worden sind, mit kurz gefassten Charakteristiken versehen und die ihnen angehörigen Arten nun ebenfalls auf analytischem Wege auseinandergesetzt; dieser letzten Tabelle zur Bestimmung der Art folgt dann unter jeder Gattung eine nochmalige Aufzählung der Species mit Hinzufügung der wichtigsten Synonyme, Bemerkungen über ihr Vorkommen, ihre Häufigkeit und die Zeit ihres Erscheinens, bei den als neu aufgestellten aber auch eine Aufzählung der Merkmale, durch welche sie sich von den ihnen zunächst stehenden unterscheiden. — Sowohl der Zuwachs an neuen Arten, welchen die Süd-Europäische Fauna durch das Werk des Verf. erhält, als auch die sehr beträchtliche Anzahl der darin neu aufgestellten Gattungen sichern demselben nothwendig die Beachtung der sich für die Ordnung der Dipteren interessirenden Entomologen. Da Ref. bisher nicht Zeit gefunden hat, sich mit der Arbeit bis in ihre Einzelheiten näher bekannt zu machen, muss er sich natürlich, eines Urtheils über den Gesamtwertb derselben enthalten; aus den Charakteren, welche der Verf. oft zur Aufstellung neuer Gattungen benutzt, so wie aus den darunter citirten Arten, lässt sich jedoch soviel mit Bestimmtheit ersehen, dass vielen seiner Schöpfungen eine kurze Lebensfrist bestimmt ist, was z. B. für die auf Kosten der Gattungen Laphria, Conops, einiger Syrphiden-Gattungen u. a. gebildeten gelten kann. Für andere, z. B. Mycetina wird wenigstens der Name als bereits vergeben nicht bestehen können, um ganz von denen abzusehen, deren Benennung sprachlich unrichtig gebildet ist; mit den meisten in Italien erscheinenden naturwissenschaftlichen Werken theilt das vorliegende ausserdem zahlreiche Druckfehler, incorrekte Schreibweise der Eigennamen,

sowohl von Autoren als Gattungen und nichts weniger als ansprechende Ausstattung.

Loew's „Neue Beiträge zur Kenntniss der Dipteren“ sind mit einem fünften Beitrage, enthalten im Programm der Königl. Realschule zu Meseritz vom J. 1857. (4. 56 pag.) fortgesetzt worden; derselbe enthält eine Abhandlung über die Familie der Dolichopoden. (Siehe diese Familie!)

Desselben „Dipterologische Notizen“ und „Dipterologische Mittheilungen“ (Wiener Entomol. Monatsschrift I. p. 1—10 und p. 33—56) enthalten Beschreibungen und Abbildungen einzelner neuer Gattungen und Arten verschiedener Familien, so wie kritische Bemerkungen über schon bekannte.

Derselbe (Verhandlungen des zoolog.-botan. Vereins in Wien VII. p. 79—86) zählte 37 in Syrien gesammelte Dipteren auf, die zum grösseren Theile den Familien der Bombylier, Asilen und Syrphiden angehören; sechs derselben werden als neue Arten beschrieben.

Derselbe lieferte (Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften X. p. 97—112) einen Beitrag zur Dipteren-Fauna des Harzes durch Aufzählung von 247 bei Wernigerode von ihm gesammelten Diptera brachycera. An einige der verzeichneten Arten knüpft der Verf. synonymische Bemerkungen; sieben derselben, zu den Dolichopoden, Anthomyziden und Acalypteren gehörend, werden als neu beschrieben.

Ebenda (IX. Bd. p. 553) wird eines reichhaltigen Verzeichnisses Graubündtner Dipteren erwähnt, welches Am Stein zusammengestellt und im Jahresberichte der Naturf. Gesellsch. Graubündtens 1855. I. p. 89—111 veröffentlicht hat; die aufgeführten Arten sollen nach Meigen angeordnet, mit Orts- und Zeitangaben versehen sein. Dem Ref. hat dieses Verzeichniss nicht zur Einsicht vorgelegen.

Snellen van Vollenhoven's „Notes dipéetrologiques“ (Mémoires d'entomologie, publiés par la soc. entomol. des Pays-Bas I. p. 88—93) enthalten Bemerkungen über einige Tipularien und Stratiomyiden von den Sunda-Inseln und die Beschreibung einiger der letzteren Familie angehörenden neuen Arten.

van der Wulp und Snellen van Vollenhoven haben ihre schon im Jahre 1852 begonnene „Naamlijst van inlandsche Diptera“ in Herklots „Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland, II. Deel, p. 89—117 mit einem dritten Theile fortgesetzt und beschlossen; da die Arbeit in ihren ersten Theilen für die entsprechenden Jahresberichte nicht benutzt worden ist, mag über dieselbe ein kurzer Gesamtbericht abgestattet werden. Die von den beiden Verf. gegebene Aufzählung der Niederländischen Dipteren erfolgt in systematischer Reihenfolge nach Meigen; dem Namen jeder Art sind Citate aus Meigen und Macquart, zuweilen aus den Werken der älteren Autoren, falls diese die Art zuerst beschrieben haben, ausserdem aus den neuesten Monographien, wo solche vorhanden waren, beigefügt; ebenso sind die Fundorte und die Zeit des Vorkommens bemerkt. Der erste Theil des Verzeichnisses (Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland I. p. 138—153) erstreckt sich auf die Familie der Tipularien mit 178 Arten; der zweite (ebenda I. p. 188—206) enthält die Familien der Tabanen, Stratiomyiden, Asiliden, Empiden, Bombyliiden, Thereviden, Leptiden, Dolichopoden und Syrphiden und schliesst mit der 372. Art; der dritte (ebenda II. p. 89—117) bringt die übrigen Familien der Pipunculinen, Platypezinen, Conopiden, Oestriden, Muscarien und Coriaceen zum Abschlusse und stellt als die Gesamtzahl der bis jetzt in den Niederlanden aufgefundenen und determinirten Dipteren 694 fest.

Schiner, „Dipterologische Fragmente V.“ (Verhandlungen des zoolog. - botan. Vereins in Wien VII. p. 3—20) machte Mittheilungen über die von ihm in Triest gesammelten und beobachteten Dipteren aus den Familien der Asilen und Stratiomyiden, so wie über einzelne bemerkenswerthe Arten anderer Abtheilungen; am Schlusse werden zwei Arten als neu beschrieben.

Derselbe setzte seine Aufzählung der im Kaiserthum Oesterreich bisher aufgefundenen Zweiflügler mit der Familie der Syrphiden ebenda p. 275—506 fort. (Siehe diese Familie!).

Haliday lieferte in der Natural history review IV. p. 180—196 eine Zusammenstellung derjenigen Britischen

Dipteren, von denen die Naturgeschichte der ersten Stände und diese selbst in mehr oder weniger erschöpfender Weise bis jetzt bekannt gemacht worden sind. „List of the genera and species of British Diptera, the earlier stages of which are more or less perfectly known, with references to the principal authorities.“ Die Aufzählung der Arten erfolgt in systematischer Reihenfolge, bei jeder einzelnen werden die Autoren und Werke, in welchen die Beschreibung der Larve und Puppe niedergelegt ist, citirt, die Charakteristik derselben jedoch nicht wiedergegeben; nur die Merkmale, welche den ersten Ständen der ganzen Familie eigen sind, werden bei dieser kurz erörtert. Ausser den in England einheimischen Arten sind auch einige dem übrigen Europa angehörige aufgenommen worden und zwar in dem Falle, wo sie eigene Gattungen repräsentirten. Der Verf. hat sich durch diese Zusammenstellung um die Förderung der Naturgeschichte der Dipteren ein grosses Verdienst erworben und seine Arbeit wird hoffentlich zu einer sehr wünschenswerthen ausführlicheren Darstellung sämmtlicher bekannter Larven der Ordnung, in der Art wie es durch Chapuis und Candèze für die Coleopteren geschehen ist, Anregung geben. Als Anhang fügt der Verf. die Beschreibung und bildliche Darstellung der noch unbekannten ersten Stände einiger einheimischen Arten bei.

Léon Dufour (Annales de la soc. entomol. V. p. 39—59) erläuterte in seinen „Mélanges entomologiques“ die ersten Stände und die Naturgeschichte einiger Dipteren, welche der Gruppe der Acalypteren angehören.

Barthélemy, Etudes anatomiques et physiologiques sur un Diptère Tachinaire, parasite de la chenille du Sphinx Euphorbiae, et sur ses métamorphoses. (Annales des scienc. natur. 4. sér. VIII. p. 111—124.) Nach den Angaben des Verf. wird die Raupe der Sphinx Euphorbiae von einer Tachine heimgesucht, die zur Gattung Senometopia gehört und der Sen. atropivora nahe verwandt ist; dieselbe ist vivipar und setzt, während sie auf dem Rücken der Raupe entlang läuft, zehn bis zwölf junge Larven auf derselben ab, die sich sogleich in die Haut einbohren und sich auf Kosten der Raupe

ernähren. Nach dreimaliger Abstreifung der Haut greifen die Larven mit grosser Gefrässigkeit die tiefer liegenden Organe der Raupe an, tödten diese dadurch und fressen sich durch die Haut hindurch, um sich zu verpuppen. Die Angaben, welche der Verf. über die anatomischen Verhältnisse der Larve, über die Verwandlung derselben und den Nymphenzustand macht, sind eingehend, ohne indessen Neues über diesen Gegenstand beizubringen.

Tipulariae. Walker (Insecta Saundersiana, Diptera Pt. V. p. 415 ff.) beschrieb folgende Arten verschiedener Länder aus der Saunders'schen Sammlung. Aus der Gruppe der Mycetophilidae: *Mycetophila aequalis* und *Leia fulva* Vandiemensland, *Boletina helvetica* und *Sciophila diversa* aus der Schweiz, *Sciophila par* von Vandiemensland, *Mycetobia divergens* aus Nord-Amerika, *Sciara primogenita* von Cayenne?, *antica* und *fasciata* aus Brasilien, *indica* aus Ostindien, *reciproca* von Vandiemensland, *confusa* vom Cap, *Platyura venusta* aus Ostindien. — Aus der Gruppe der Cecidomyien: *Cecid. umbra* aus Süd-Amerika; aus der der Bibioniden: *Plecia bimaculata* aus den Vereinigten Staaten und *costalis* aus Columbien; aus der der Chironomiden: *Chironomus redeuns* (!) aus den Vereinigten Staaten, *vicarius* aus Ostindien, *alternans* aus Neu-Süd-Wales, *applicatus*, *duplex*, *imitans*, *oppositus* und *conjunctus* aus Vandiemensland, *Pachyleptus* n. g. mit *Ceratopogon* nahe verwandt; Körper schlank, Kopf klein, rundlich, Palpen mässig lang, Thorax gewölbt, Hinterleib schlank, fast cylindrisch, an der Basis etwas eingeschnürt, doppelt so lang als der Thorax, hintere Beine etwas verlängert, dünn, mit leicht gekeulten Schenkeln, die vorderen zu Raubbeinen umgestaltet, mit dicken Schenkeln und gebogenen Schienen; Flügel schmal. Art: *Pach. fasciatus* aus Süd-Amerika. — Aus der Gruppe der Culiciden: *Culex conterrens*, *solicitans*, *perturbans* und *territans* aus den Vereinigten Staaten, *excrucians* aus Neu-Schottland, *terrens*, *discrucians* und *perterrans* aus Süd-Amerika, *exagitans* von Parà, *flavicosta* vom Amazonenstrom, *commorens* aus Neu-Holland, *crucians* und *Anopheles annulipes* von Vandiemensland. Aus der Gruppe der Tipuliden: *Trichocera ocellata* aus Ostindien, *Limnobia basalis* von Vandiemensland, *turpis* aus Canada, *aterrima* aus Ostindien, *prominens* aus den Vereinigten Staaten, *lanuginipes* vom Cap, *biterminata* und *ignobilis* aus Nord-Amerika, *chrysoptera*, *calopus* und *tenebrosa* aus Süd-Amerika, *Geranomyia pilipes* vom Amazonenstrom, *Tipula simulata* und *platymera* aus Canada, *disjuncta* und *dejecta* aus den Vereinigten Staaten, *seticornis* und *filigera* aus Columbien, *tincta* von Pt. Natal, *vicaria* und *delta* aus Ostindien, *viridis* aus Neu-Seeland, *Ptilogyna par* aus Neu-Süd-Wales, *simplex* aus Süd-Amerika, *Gynoplistia elegans* aus

Neu-Süd-Wales, *apicalis* und *fumipennis* von Vandiemensland, *Ctenophora succedens* aus Canada, *constans* Vaterland unbekannt, *fumiplena* (!) aus China. — Aus der Gruppe der Rhyphiden: *Rhyphus brevis* aus Vandiemensland.

Neue Arten aus Borneo, von Walker (Journal of the proceed. of the Linnean soc., Zoology I. p. 105 ff.) beschrieben, sind: *Sciara laticornis*, *solita*, *Cecidomyia deferenda*, *Plecia subvarians*, *Limnobia impressa*, *rubescens*, *pyrrhochroma*, *argentocincta*, *Pterocismus lunigerus*, *infixus*, *optabilis*, *combinatus*, *dilutus*, *Tipula vilis*.

Bigot (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 329) beschrieb *Culex Cubensis* als neue Art aus Cuba.

Snellen van Vollenhoven (Mémoires d'entomol., publ. p. l. soc. entomol. des Pays-Bas I. p. 89) bemerkte, dass während die *Ctenophora*-Arten sonst in solche mit gestielter und mit sitzender zweiter Hinterrandszelle zerfallen, eine Art von Celebes im Leidener Museum hierin nach den Geschlechtern auffallende Unterschiede zeige, indem beim Männchen diese Zelle lang gestielt, beim Weibchen dagegen sitzend sei. Die Art wird charakterisirt, aber nicht mit einem Namen belegt, da die vorliegenden Exemplare mangelhaft sind. — Von *Tipula praepotens* Wied. wird eine Varietät aus Japan in ihren Abweichungen von der Javanischen Stammart erörtert.

van der Wulp (ebenda p. 15 ff., pl. I.) gab eine Beschreibung und Abbildung der Puppe von *Ptychoptera contaminata* Fabr. („Iets betreffende de ontwikkeling van een tweetal soorten van Diptera.“)

Nach v. Osten-Sacken (Entomol. Zeitung p. 90) ist *Limnobia imperialis* Loew identisch mit *Tipula annulata* Lin., wie dies die Untersuchung des noch erhaltenen Linné'schen Original-Exemplars ergab.

Laboulbène, „Métamorphoses de la *Cecidomyia papaveris* et remarques sur plusieurs espèces du genre *Cecidomyia*.“ (Annales de la soc. entomol. V. p. 565—583). Die Larven der *Cecidomyia papaveris* leben im Innern der Köpfe von *Papaver Rhoeas*, sind fusslos, orangegelb, glatt, mit zweigliedrigen Fühlern, ausgerandetem letzten Körpersegmente und neun gleichen Stigmen. An der Nymphe ist der Kopf mit zwei langen und steifen Borsten, der Thorax mit zwei Dornen bewaffnet; in letztere hat der Verf. eine feine Röhre eintreten sehen, die er für eine Trachee ansieht (und die auch nach der Analogie mit anderen Larven gewiss eine solche ist). Das ausgebildete Insekt wird ebenfalls beschrieben und nebst den ersten Ständen auf pl. 12 abgebildet; der Verf. zieht bei Beschreibung der einzelnen Körpertheile andere bereits bekannte Arten mit in Vergleich.

J. Couch, „A few remarks on the midge fly, which infests the wheat,“ (Report of the Royal Cornwall Polytechnic society for 1856

Annals and magaz. of nat. hist. XX. p. 399 f.) handelte über die Lebensweise der *Cecidomyia tritici* und den Schaden, welchen die Larve derselben dem Weizen zufügt.

Mittheilungen über die Golumbacser-Fliege (*Simulia Columbacensis* Fab.) machte Kornhuber (Verhandl. d. Vereins für Naturkunde zu Presburg I. Jahrg., Sitzungsberichte p. 47 ff.); dieselben rühren von einem Augenzeugen, der die Art mehrere Jahre hindurch zwischen Moldova und Orsova, ihrer ausschliesslichen Heimath, zu beobachten Gelegenheit hatte, her, enthalten jedoch Nichts, was nicht schon anderweitig über dieselbe bekannt geworden ist.

Bemerkungen über *Clunio adriaticus* und seine Unterschiede von *Cl. marinus* Halid. machte Schiner (Verhandl. d. zoolog.-botan. Vereins VII. p. 14).

Eine Notiz über eine Erscheinung des Heerwurms gab Lorez (Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellsch. in Zürich II. p. 88 ff.). — Hohmann: Ueber den Heerwurm (Programm der Realschule zu Tilsit, 1857), mit einer Tafel Abbildungen.

Asilici. Bigot (Annales de la soc. entom. V. p. 526 ff.) hat in seiner analytischen Tabelle zur Bestimmung der Gattungen dieser Familie für einzelne Arten früherer Autoren eigene Gattungsnamen aufgestellt, denen zwar jede wissenschaftliche Bedeutung abgeht, die aber der Vollständigkeit halber hier erwähnt werden mögen. Es sind folgende: *Megaphorus* (?) für *Malloptera heteroptera* Macq., *Eichoichemus* (?) für *Erax flavianalis* Macq., *Trupanea* für *Erax completus* Macq., *Cerrozodus* für *Asilus nodicornis* Wied., *Pachychaeta* für *Erax annulipes* Macq., *Eicherax* (?) für *Erax simplex* Macq., *Acanthodelphia* (?) für diejenigen *Proctacanthus*-Arten, welche an der Basis der Gabelung der zweiten Submarginal-Ader keine merkliche Biegung zeigen, *Megadrillus* für *Lophonotus heteroneurus* Macq., *Macronyx* (vergebener Name!) für *Dasypogon longiungulatus* Macq. — Was den Umfang der Familie betrifft, so zieht B. die *Mydasii* und *Apioceridae*, deren nahe Verwandtschaft mit den Asilen schon von Westwood hervorgehoben worden ist, dazu, indem er sie als zwei gleichwerthige Gruppen den Laphrien, Asilen und Dasypogonen coordinirt.

Derselbe errichtete (ebenda p. 288 ff. pl. 6. fig. 3) eine angeblich neue Gattung *Lycomya*, welche nach seiner Ansicht einen Uebergang „zwischen den Asilen einerseits und den Laphrien und Dasypogonen andererseits“ darbietet, und die er für verwandt mit *Laphystia* Loew ansieht. Mit den Dasypogonen hat diese Gattung nach der Abbildung in Rücksicht auf die Mündung der ersten Längsader der Flügel gar nichts gemein, von den Laphrien weicht sie durch die Bildung der Fühler ab, mit den Asilen stimmt sie nicht nur im Habitus, sondern auch in allen wesentlichen Merkmalen überein; als Eigenthümlichkeit würde daher nur übrigbleiben, dass das Unterge-

sicht mit sparsamen, steifen Borsten besetzt ist. (Man sieht daraus abermals, welches Vertrauen den Angaben des Verf. zu zollen ist!) — Die Art: *L. Germainii* stammt aus Chile.

Derselbe (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 330 ff.) beschrieb: *Atomosia similis*, *Dasygogon parvus*, *Senobasis annulatus*, *Mallophora scopifera* und *Gonypes Cubensis* als neue Arten von Cuba.

Walker (Journal of proceed. of the Linnean soc., Zoology I. p. 112 ff.) charakterisirte folgende neue Arten von Borneo: *Dasygogon (Microstylum) incomptus*, *Discocephalus dorsalis*, *Laphria unifascia*, *comptissima*, *rudis*, *producta*, *lepida*, *completa*, *incivilis*, *partita*, *interrupta*, *cingulifera*, *detecta*, *Trupanea inserens*, *Asilus flagrans*, *contortus*, *Leptogaster tricolor* und *inutilis*; letztere Benennung könnte der Verf. mit gutem Grunde vielen seiner Arten beilegen.

Derselbe (Insecta Saundersiana, Diptera Pt. V. p. 455 ff.): *Dasygogon subcontractus* vom Amazonenstrome, *torridus* von Port Natal, *Microstylum partitum* aus Afrika, *Discocephala fervida* von Port Natal und *Laphria purpurascens* vom Amazonenstrome.

Derselbe (Transact. of the entomol. soc. IV. p. 127 ff.): *Dasygogon aequalis* von Pt. Natal, *suavis* aus Australien, *Laphria fortipes* von Pt. Natal, *Lampria cilipes* vom Amazonenstrome, *Trupanea venerabilis* von Pt. Natal, *leucopyga* aus China, *Asilus sericans* vom Amazonenstrome, *firmatus* von Pt. Natal, *mendax* von Celebes, *Shalumus* aus China und *Leptogaster cingulipes* vom Amazonenstrome.

Dasygogon Grantii Newman (ebenda p. 57) ist eine neue Art von der Moreton-Bay.

Neue Arten von Loew sind ferner: *Saropogon aberrans* aus dem südlichen Spanien (Entomol. Zeitung p. 19), *Promachus microlabis* aus Syrien (Verhandl. d. zoolog.-botan. Vereins in Wien VII. p. 84), *Saropogon atricolor* aus Rhodus und *Cyrtopogon longibarbus* aus der Schweiz (Wiener Entomol. Monatsschrift I. p. 3 und 36).

Mydasii. *Mydas igniticornis* Bigot ist eine neue Art aus Chile (Annales de la soc. entomol. V. p. 288), *Mydas effracta* und *signata* Walker (Transact. of the entomol. soc. IV. p. 126) aus Australien; letztere Art ist wohl mit *Mydas concinnus* Macq. identisch.

Empidae. Bigot (Annales de la soc. entom. V. p. 553 ff.) sprach sich über die Charaktere und den Umfang, welche nach seiner Ansicht der Familie der Empiden beizulegen seien, aus und meint, dass dieselbe nicht ferner in der Weise, wie sie von den früheren Autoren aufgefasst worden sei, festgehalten werden könne. Seinem vielbesprochenen Pelottensystem gemäss will er diejenigen Gattungen, welche eine ausgebildete dritte (mittlere) Pelotte haben, von der Familie ausschliessen und zu den Leptiden bringen; dagegen will er auf die Insertion des Fühlergriffels, der bei einigen Gattungen (*Drapetis*,

Ocydromia) eher dorsal als terminal genannt werden muss, kein besonderes Gewicht legen, sondern diese Gattungen vorläufig den Empiden beizählen. Die Gattung Hemerodromia will er in mehrere zerlegen und die Meigen'sche Benennung auf diejenigen Arten beschränken, bei denen eine Diskoidal- und eine Analzelle gleichzeitig vorhanden ist; die Arten, denen letztere fehlt, sollen *Polydromya*, diejenigen, denen erstere fehlt, *Lepidomya*, diejenigen endlich, welchen beide fehlen, *Microdromya* heissen. Für *Platypalpus ambiguus* Macq. schlägt er die Benennung *Crossopalpus* vor und gränzt von *Cyrtoma* diejenigen Arten, welche vier Hinterrandszellen haben, als eigene Gattung *Microcyrtia* ab. — Die Familie der Empiden umfasst nach Bigot drei Gruppen: die Hybotiden, die Empiden und die Lampromyiden, letztere aus der einzigen Gattung *Lampromyia* Macq. bestehend.

Derselbe (ebenda p. 291) beschrieb *Empis variabilis* als neue Art aus Chile.

Neue Arten aus den Vereinigten Staaten Nord-Amerikas sind: *Empis reciproca*, *Hilara plebeja*, *Rhamphomyia expulsa*, *tristis*, *platypalpus vicarius*, *Tachydromia postica* und *vittipennis* Walker (Transact. of the entomol. soc. IV. p. 147 ff.).

Dolichopodides. Die Kenntniss der einheimischen Formen dieser Familie ist durch eine inhaltreiche Arbeit von Loew „die Familie der Dolichopoden“ (Neue Beiträge zur Kenntniss der Dipteren, 5. Beitrag, Meseritz 1857.) sehr wesentlich gefördert worden. Der Verf. giebt darin seine Ansichten über die Feststellung und den Umfang der in dieser Familie oft sehr unsicher begränzten Gattungen kund, bespricht die weniger bekannten Arten und beschreibt eine grössere Anzahl ihm vorliegender neuer. Der Inhalt der Arbeit ist folgender: 1) *Psilopus*. Von bekannten Arten werden *Ps. platypterus*, *nervosus*, *Wiedemanni*, *lobipes*, *albifrons* (= *contristans* Meig.), *contristans* Wied. (*regalis* Meig. ♀) und *longulus* näher besprochen, *Psilopus flavicinctus* aus Constantinopel, *albonotatus* von Rhodus, *tenuinervis* und *euchromus* ohne Angabe des Fundorts, *robustus* von Triest als neue Arten beschrieben. 2) *Sybistroma*. Mit Einschluss von zwei neuen Arten: *Sybistr. longiventris* und *distans* aus Steyermark sind dem Verf. im Ganzen 12 Arten bekannt, welche so auffallende plastische Unterschiede darbieten, dass man versucht werden könnte, ebenso viele Gattungen darauf zu gründen; in Rücksicht auf die wesentlichsten Abweichungen nimmt der Verf. drei Gattungen: *Sybistroma* (auf *S. nodicornis* beschränkt), *Hercostomus* (*S. longiventris*, *fulvicaudus* und *cretifer*) und *Hypophyllus* Halid. (die übrigen Arten umfassend) an. 3) *Dolichopus*. Die hierunter vereinigten Arten sondert der Verf. in vier Gattungen, von denen *Dolichopus* sens. strict. diejenigen umfasst, bei denen der Metatarsus der Hinterfüsse

bewehrt, *Gymnopternus* dagegen diejenigen, wo derselbe unbewehrt ist; von letzteren wird die Gattung *Tachytrechus* Stann. für die Arten mit bis unter die Augen herabsteigendem Gesicht abgezweigt, und von diesen wieder *Dol. latipennis*, *rotundipennis* und *diadema* als eigene Gattung *Hygroceleuthus* getrennt. Ueber einige Arten der Gattung *Dolichopus* im engeren Sinne macht der Verf. synonymische Bemerkungen, unterscheidet unter *Dol. nigripes* Fall. zwei verschiedene Arten *D. Fallenii* und *Meigenii* und beschrieb *Dol. ornaticipes* als n. A. vom Harz, mit *D. signatus* (*pennatus* Meig.) nahe verwandt; auch Bemerkungen über die geographische Verbreitung der Arten in Europa werden eingeflochten. — Von *Tachytrechus* wird eine neue Art: *T. ripicola* aus Italien beschrieben. — Ausführlich geht der Verf. auf die *Gymnopternus*-Arten ein, von denen er einerseits mehrere der bereits beschriebenen näher erörtert, andererseits ihre Zahl durch die Beschreibung neuer vermehrt: *G. ducalis* aus Sicilien, *pulchriceps* von Triest, *conformis* aus Schlesien, *plagiatus* vom Neusiedler-See, *convergens* ebendaher und aus Sicilien, *angustus* aus Klein-Asien, *exarticulatus* von Triest, *costatus* aus Klein-Asien, *rivax* aus dem nördlichen Deutschland, *fugax* aus Süd-Deutschland, *inornatus* von Triest. 4) *Orthochile*, nichts Neues. 5) *Hydrophorus*. Die Gattung wird in drei Untergattungen zerfällt: *Liancalus* (*Anoplomerus* Rond.) für die Arten mit nicht verdickten und unbedornten Vorderschenkeln, *Scellus* für *Hydr. notatus* und *spinimanus* errichtet und *Hydrophorus* sens. strict. für die übrigen Arten. Ausführlich beschrieben werden *Hydroph. viridis* Meig., *inaequalipes* Macq., *brunnicosus* n. sp. von Posen, *callostomus* aus Sibirien. 6) *Campsicnemus*, in dem von Walker festgestellten Umfang angenommen. Neue Arten sind: *Camps. compeditus* von Posen, *platypus* von Ancona, *lumbatus*, *marginatus* und *dasygnemus* von Posen. 7) *Thinophilus*. Zu den drei bekannten Arten fügt der Verf. eine durch das schmale und nach oben noch etwas verengte Gesicht abweichende Art aus Schlesien, für die er deshalb eine eigene Gattung *Peodes* errichtet; die Art wird *P. forcipatus* genannt. 8) *Rhaphium*. Von der Gattung in ihrem bisherigen Umfange werden zunächst drei Arten mit subapicaler Stellung der Fühlerborste, nämlich *Rh. flavicollis*, *cinereum* und *taratum* als eigene Gattung *Achalcus* abgesondert, *Rhaph. Hoffmeisteri* Loew zur Gattung *Argyra* gebracht, über die Synonymie mehrerer Arten der Gattung *Rhaphium* sens. strict. Bemerkungen beigebracht und *Rhaph. auctum*, *quadrifilatum*, *spicatum*, *metathesis* und *adpropinquans* als neue Deutsche Arten beschrieben. Durch diese wird die Zahl der dem Verf. bekannten Arten auf 35 erhoben, welche er nach den Unterschieden in der Bildung einzelner Theile in mehrere Untergattungen *Systemus*, *Syntormon*, *Synarthrus*, *Porphyrops*, *Rhaphium* und *Xiphandrium* vertheilt. 9) *Machaerium*. Der Name wird als schon

an eine Pflanzen-Gattung vergeben (was die Zoologie übrigens nichts angeht, Ref.) in *Smiliotus* umgeändert und eine zweite neue Art als *Smil. thinophilus* von Triest beschrieben. 10) *Argyra*. Neue Arten sind: *Arg. atriceps*, *grata* aus dem Harz. Für *Arg. vestita*, welche sich durch die Nacktheit der Oberseite des ersten Fühlergliedes auszeichnet, wird eine eigene Gattung *Leucostola*, für *Arg. annulata* Macq. die Gattung *Nematoproctus* errichtet, zu der gleichzeitig eine neue deutsche Art *N. longifilus* kommt. 11) *Porphyrops*. Für keine der bisher hierhin gezogenen Arten wird der Name aufrecht erhalten, diese aber, da sie mannigfache Verschiedenheiten darbieten, ebenfalls in mehrere Gattungen vertheilt: *Saucropus* für *Porph. 4-fasciatus*, *Erichsonii*, *suturalis* und *pallidus* (*ochraceus* Meig.), *Xanthochlorus* für *Porph. ornatus* und *tenellus*, *Sympycnus* für *Porph. annulipes* und die ihm verwandten Arten, worunter *S. breximanus* aus Kärnthen neu; *Teuchophorus* für *Porph. spinigerellus* und *calcaratus* Macq. (Medeterus), *Anepsius* für *Porph. flaviventris* Meig. und *Eutarsus* für *Porph. aulicus* Meig. 12) *Diaphorus*. Neben Bemerkungen über bekannte Arten findet sich die Beschreibung folgender neuen: *Diaph. lugubris* von Rhodus, *disjunctus* von Cassel, *latifrons* aus Schlesien, *tripilus* aus Steyermark. 13) *Chrysotus*. Für die zum Theil hellgefärbten Arten errichtet der Verf. eine eigene Gattung *Chrysotimus* und fügt den übrigen unter *Chrysotus* verbleibenden, deren mehrere in ihren Charakteren erläutert werden, folgende neue hinzu: *Chr. melampodius* aus Sicilien, *suavis* vom Rhein und Neusiedler-See, *albibarbus* aus Klein-Asien. 14) *Medeterus*. Neue Arten sind: *Med. signaticornis*, *infumatus*, *melanopleurus*, *tenuicauda* und *micaceus*, letzterer aus Schweden, Wien und Sicilien. 15) *Aphrosylus*. Eine neue Art ist: *Aphr. venator* aus Italien.

Derselbe (Wiener Entomol. Monatsschrift I. p. 37 ff.) machte auch einige neue exotische Formen derselben Familie durch Beschreibungen und Abbildungen bekannt: *Lyroneurus* n. g., von *Diaphorus* durch das auch beim Männchen verhältnissmässig breite Gesicht, die apicale Fühlerborste, die tiefere Einsenkung des Hypopygiums, den Mangel der vier starken Borsten desselben und der äusseren Anhänge, so wie durch das abweichende Flügelgeäder unterschieden; auf *Chrysotus annulatus* Macq. gegründet. Zwei neue Arten: *Lyr. coerule-scens* aus Mexiko und *suavis* aus Surinam. Ferner: *Gymnopternus leucospilus* aus Surinam, *Plagioneurus* n. g., mit *Gymnopternus* in der Fühlerbildung übereinstimmend, aber das erste Glied auf der Oberseite nackt; Untergesicht breit, nicht bis zum unteren Augenrande hinabreichend, Rüssel ziemlich dick, Taster mässig gross, Borstenkranz am hinteren Augenrande sehr kurz, Scheitel sehr wenig vertieft, Beine ziemlich schlank, erstes Glied der Hinterfüsse unbewehrt und sehr verkürzt. Art: *Plag. univittatus* von Cuba. — Die Fühler-

und Flügelbildung der beschriebenen Arten ist auf Taf. I. fig. 9—17 abgebildet.

Derselbe beschrieb (Zeitschrift f. d. gesamt. Naturwiss. X. p. 102) *Tachytrechus genualis* als neue Art aus dem Harz.

Als neue Arten von Borneo beschrieb Walker (Journal of the proceed. of the Linnean soc., Zool. I. p. 119 ff.): *Psilopus allectans*, *alliciens*, *illiciens*, *delectans*, *proliciens*, *prolectans*, *collucens*, *derelectus*, *Dolichopus electus*, *alligatus*, *collectus*, *Diaphorus delegatus*.

Eine neue Art desselben (Transact. of the entomol. soc. IV. p. 149) ist ferner *Psilopus unguilirena* aus den Vereinigten Staaten.

Leptidae. Walker (Transact. of the entom. soc. IV. p. 132) stellte die elf bekannten Gattungen der Leptiden in einer analytischen Tabelle zusammen; die Gattung *Lampromyia* Macq. hält er für näher mit den Bombyliern verwandt.

Derselbe (Journal of the proceed. of the Linnean soc., Zoology I. p. 118) stellte *Chrysopila maculipennis* als neue Art von Borneo auf.

Loew (Wiener Entomol. Monatsschr. I. p. 2) beschrieb *Leptis chrysostigma* als n. A. von Triest, durch die Färbung des Stigma mit *Lept. maculata* Fall. und *immaculata* Meig. zunächst verwandt.

Xylotomae. Walker brachte (Transact. of the entomol. soc. IV. p. 132 f.) die sechs bekannten Gattungen der Thereviten, welche er als Unterfamilie der Bombylier ansieht, unter eine analytische Tabelle und beschrieb *Thereva arida* aus Australien und *scutellaris* vom Amazonenstrom als neue Arten.

Thereva praecedens desselben (Journal of the proceed. of the Linnean soc., Zoology I. p. 118) ist eine neue Art von Borneo, *Thereva innotata* (Insecta Saundersiana, Diptera Pt. V. p. 455) von Neu-Seeland.

Scenopini. Loew (Verhandl. d. zoolog.-botan. Vereins in Wien VII. p. 87—90) handelte über die bis jetzt bekannt gewordenen Arten der Gattung *Scenopinus*, welche sich nach ihm sämmtlich nur auf vier Europäische reduciren: 1) *Scen. niger* de Geer (*rugosus* et *fenestralis* Fab., *tarsatus* Panz., *ater* Fall., *nigripes* Meig., *fasciatus* Walk.). 2) *Scen. fenestralis* Lin. (*saltitans* et *spoliatus* Scop., *senilis* Fab., *sulcicollis*, *vitripennis*, *domesticus* et *rustitarsis* Meig., *furcinnervis* Zeller). 3) *Scen. laevifrons* Meig. (*halteratus* et *orbita* Meig.). 4) *Scen. Zelleri* Loew. — Als neue Art beschreibt der Verf.: *Scenopinus pygmaeus* aus Surinam.

Bombyliarii. Bigot charakterisirte (Annales de la soc. entomol. V. p. 292 ff.) eine neue Gattung *Cyrtophorus*, zur Gruppe von *Ploas*, *Amictus*, *Cyllenina* u. s. w. gehörend; an den Fühlern die beiden ersten Glieder cylindrisch, nach der Spitze hin allmählig dicker werdend, dicht behaart, das erste doppelt so lang als das zweite, das

dritte spindelförmig, glatt, fast von der Länge des ersten; Rüssel vorgestreckt, Palpen verlängert, fadenförmig, von halber Länge des Rüssels; Gesicht und Stirn mit steifen und langen Borsten besetzt; Thorax bucklig, an den Seiten mit sparsamen Borsten bekleidet, Hinterleib konisch, hinten stumpf, herabgesenkt. Art: *C. pictipennis* (pl. 7. fig. 1) aus Chile. — Als neue Art wird ausserdem beschrieben: *Cyllenia elegantula* aus Chile.

Derselbe beschrieb (Annales de la soc. entomol. V. p. 280 ff.) *Hirmoneura brevirostrata* (pl. 6. fig. 1), *barbarossa* und *niveibarbis* aus Chile und (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 332 f.) *Bombylius insularis* und *Anthrax connexa* von Cuba.

Walker (Transact. of the entomol. soc. IV. p. 133 ff.) gab eine analytische Uebersicht der bis jetzt bekannten Bombylier-Gattungen, die er in drei Gruppen oder Unterfamilien: Therevites, Nemestrinites und Anthracites vertheilt. Unter den Nemestrinites nimmt er vier Gattungen an, indem er *Trichophthalma* mit *Hirmoneura* vereinigt; den Anthracites kommen gegenwärtig 35 Gattungen zu. Als neue Arten werden beschrieben: *Trichophthalma laetilinea*, *albibasis*, *primitiva* und *bivitta* aus Australien, *Anthrax convexa*, *dorsalis*, *decemmacula*, *conclusa*, *lucida*, *lineata*, *solita*, *inexacta* vom Amazonenstrome, *commiles* und *argenteilatus* von Pt. Natal, *latifascia* und *combinata* aus China, *albirufa*, (*Neuria*) *subsenex*, *scrobicula* aus Australien, *Lomatia fascicularis* von Pt. Natal, *Bombylius areolatus* aus Australien, *Lepidophora retusta* und *secutor* vom Amazonenstrome, *Phthiria lurida* von Pará, *lineifera* aus Australien, *Geron albidum* vom Amazonenstrome und *Geron* (?) *tenue* unbek. Vaterl. — Unter Anthrax giebt der Verf. für die einzelnen Welttheile und grösseren Inselgruppen die Zahl der bis jetzt bekannten Arten und der durch sie vertretenen Gruppen an.

Derselbe stellte (Journal of the proceed. of the Linnean soc., Zoology I. p. 118 ff.) *Anthrax semiscita* und *satellitica* als neue Arten von Borneo auf.

Loew beschrieb (Entomol. Zeitung p. 17 ff.) *Dischistus multi-setosus* aus dem südlichen Spanien, (Verhandlungen des zoolog.-botan. Vereins in Wien VII. p. 80 ff.) *Anthrax clarissima*, *brunnescens*, *formicata* und *Bombylius floccosus* als neue Arten aus Syrien.

A. Laboulbène, Note sur la nymphe de l'Anthrax sinuata (Annales de la soc. entomol. V. p. 781—790) erzog aus einem Hymenopteren-Neste, welches er für das der *Megachile muraria* hält, zwei *Anthrax sinuata*, deren Puppen in den Zellen des Nestes eingeschlossen waren und deren Larven sich daher von den Larven der Bienen hatten ernähren müssen. Er beschreibt die Puppe ausführlich und giebt eine Abbildung davon auf pl. 15. fig. 2. Sie hat in der Form Aehnlichkeit mit Tagfalter-Puppen, ist an den Seiten des Hin-

terleibs mit Büscheln langer Haare versehen, am Kopfe und Schwanzende mit hornigen Spitzen bewaffnet; auf dem Rücken des zweiten bis fünften Hinterleibssegments zeigen sich je 11 bis 13 in Querreihen gestellte hornige Haken, deren beide Enden frei hervorragen. — Der Verf. stellt die früheren Beobachtungen über die Lebensweise der ersten Stände von *Anthrax* und *Bombylius* zusammen, hat aber übersehen, dass (was schon Westwood, Introduction II. p. 544 anführt) bereits Schaffer das Parasitiren von *Anthrax* in den Nestern der *Megachile muraria* gekannt hat.

Die Puppe derselben Art (*Anthrax sinuata*) ist auch von Fabre in den *Annales des sciences naturelles*, 4. sér. VII. pl. 17 abgebildet und p. 302 f. beschrieben worden. Fabre fand dieselbe in grosser Anzahl in den Zellen der *Osmia tricornis* und zwar in gleicher Art eingesponnen, wie dies von den *Osmia*-Larven mit sich selbst geschieht; das vollkommene Dipteron wurde sowohl aus den Puppen erzogen als auch beim Ablegen seiner Eier in die *Osmia*-Zellen beobachtet.

Pipunculini. *Pipunculus translatus* Walker (Transact. of the entomol. soc. IV. p. 150) ist eine neue Art aus Nord-Amerika.

Henopii. Loew (Wiener Entomol. Monatsschrift I. p. 33 ff.) charakterisirte eine neue Gattung *Pithogaster* mit folgenden Charakteren: „Proboscis brevissima, fere nulla, antennae vertici insertae, oculi hirti, contigui, ocelli duo laterales, tertius anterior indistinctus, prothoracis lobi dorsales distantes; nervi alarum distincti, completi, tertius furcatus, cellula prima posterior longissima, discoidalis parum lata; abdomen 5 annulatum.“ Art: *Pith. inflatus* aus Spanien, 6 lin. lang, auf Taf. I. Fig. 1—8 nebst *Acrocera trigramma* Loew abgebildet.

A. Costa hat in einem Aufsatze „Nota sul genere *Opsebius* fra i Ditteri Enopidei“ (in Briefform an Rondani im Journ. „l'Iride“, Anno II. No. 22 veröffentlicht) nachgewiesen, dass die Gattung *Pithogaster* Loew mit seiner im J. 1856 aufgestellten Gattung *Opsebius* (siehe Jahresbericht 1856. p. 141) zusammenfällt, dass jedoch die Art von der seinigen zu unterscheiden sei; er nennt die von Loew beschriebene daher *Opsebius inflatus*. — Die ausführliche Beschreibung und Abbildung des Costa'schen *Opsebius perspicillaris* aus Neapel ist im J. 1857 im zweiten Bande der *Memorie della Reale Accademia delle scienze di Napoli*, p. 231, (Abbildung auf beifolgender Tafel, Fig. 7) erschienen.

Philipota limosa Walker (Transact. of the entomol. soc. IV. p. 125) ist eine neue Art vom Amazonenstrom.

Tabanii. Eine von Bigot (*Annales de la soc. entomol.* V. p. 286 ff.) aufgestellte neue Gattung *Coenura*, welche der Verf. mit Zweifel seiner Abtheilung der *Coenomyidae* zuweisen will, ist der

gegenwärtigen Familie zuzurechnen, indem sie nach der Abbildung im Flügelgeäder mit *Pangonia* übereinstimmt. Die Fühler sind pfriemenförmig zugespitzt, elfgliedrig, an der Spitze mit einigen feinen Borsten endigend, die beiden ersten Glieder breit, quer, behaart; der Rüssel nicht hervorgestreckt, die Palpen kurz; Thorax und Abdomen breit, aufgeschwollen, letzterer aus vier breiten und fünf schmalen Ringen bestehend, von denen die letzteren eine legeröhrenförmige Verlängerung bilden; Hinter- und Mittelschienen in zwei kurze Dornen endigend. Art: *C. longicauda* aus Chile, auf pl. 6. fig. 2 abgebildet. — *Pangonia conica* neue Art aus Chile, ebenda pl. 6. fig. 4.

Von Walker (Insecta Saundersiana, Diptera Pt. V. p. 450 ff.) wurden *Tabanus intereuns* (!) von Rio-Grande, *temperatus* und *bi-partitus* von Pt. Natal, *signifer* aus China, *Chrysops Sinensis* aus China, *Haematopota ruficornis* und *decora* von Port Natal als neue Arten beschrieben.

Neue Arten desselben Verf. von Borneo (Journal of the proceed. of the Linnean soc., Zoology I. p. 110 ff.) sind: *Tabanus nexus*, *fumifer*, *optatus*, *simplicissimus*, *Chrysops fixissimus* und *Haematopota atomaria*.

Tabanus imponens von Pará, *unicinctus* und *bitinctus* ebendaher, *cingulifer* und *mallophoroides* vom Amazonenstrom, *humillimus* von Celebes und *Silvius nitescens* aus Australien machte derselbe (Transact. of the entomol. soc. IV. p. 122 ff.) bekannt.

Pangonia Walkeri Newman (ebenda p. 56) ist eine neue Art von der Moreton-Bay.

Schiner (Verhandl. d. zoolog.-botan. Vereins in Wien VII. p. 19) lieferte eine genauere Beschreibung des *Chrysops* (*Tabanus*) *marmoratus* Rossi.

Stratiomyidae. Von Walker (Journal of the proceed. of the Linnean soc., Zoology I. p. 108 ff.) wurden ausser einigen neuen Arten von Sarawak auf Borneo auch zwei neue Gattungen bekannt gemacht: 1) *Culcua* n. g. Flügeladerung wie bei *Clitellaria*, die Flügel selbst ziemlich schmal; Kopf klein, mit abschüssiger Stirn, Augen beim Männchen zusammenstossend; Fühler kurz, mit gerundetem dritten Gliede und langer, dünner Endborste; Thorax vorgezogen, länglich konisch, Schildchen mit vier Dornen, Hinterleib dick, fast rund, breiter und kürzer als der Thorax; Beine kurz und einfach. Art: *C. simulans* von Malacca. — 2) *Evaza* n. g. Flügel lang, nicht besonders breit, Aderung wie bei *Clitellaria*; Körper flach, fast glatt; Kopf von der Breite des Thorax, Fühler kurz, erstes Glied länglich, drittes rund mit langer, dünner Endborste; Thorax elliptisch, Schildchen mit vier Dornen, Abdomen fast elliptisch, etwas länger als der Thorax, kaum breiter. Augen beim Männchen gross, zusammenstossend. Art: *E. bipars* von Borneo. — Neue Arten: *Clitellaria*

notabilis, *Cyclogaster detracta*, *infera*, *Sargus latifascia*, sämmtlich von Borneo. Die beiden neuen Gattungen sind auf pl. 6. fig. 1 u. 2 abgebildet.

Derselbe beschrieb (Transact. of the entomol. soc. IV. p. 120 ff.) als neue Arten: *Acanthina porcata* und *longicornis* vom Amazonenstrome, *Stratiomys inanimis* aus China, *Xylophagus basipunctatus* aus Australien.

Bigot charakterisirte (Annales de la soc. entomol. V. p. 283 ff.) eine neue Gattung *Heterostomus* aus der Xylophagiden-Gruppe, welche einige habituelle Aehnlichkeit mit einer *Sesia* (nicht wie der Verf. angiebt mit *Zygaena*) hat. An den Fühlern sind die beiden ersten kurzen und dicken Glieder mit dichten Borsten besetzt, das dritte lang pfriemförmig, achtringlig; von auffallender Form ist das zweite grosse Tasterglied, welches bis zur Mitte seiner Länge sehr dick, cylindrisch, sodann sehr schief und breit abgestutzt und stark nach unten gebogen ist. Ocellen fehlen, die Augen vorn, vor den Fühlern zusammenstossend. Thorax oben gewölbt, Abdomen langgestreckt, fast cylindrisch, nach hinten etwas verdickt und wie abgestutzt, aus sechs sichtbaren Segmenten bestehend; Flügel schmal, den Hinterleib nicht merklich überragend, mit zwei Submarginalzellen und einer ovalen Diskoidalzelle. Beine ziemlich lang, Schienen in zwei lange Dornen endigend, das Basalglied der Tarsen verlängert. Eine Art: *H. curvipalpis* (pl. 6. fig. 5) aus Chile.

Loew (Berl. Entomol. Zeitschr. I. p. 21—34) machte abermals Mittheilungen über die Europäischen Arten der Gattung *Oxycera*, in welchen er sich ausführlich über die Synonymie der bisher beschriebenen Arten auslässt und die Namen einiger ändert, andere, die in Deutschland weniger bekannt sind, auch nochmals beschreibt. So wird z. B. die als *Str. muscaria* Fab. zweifelhaft bestimmte Art aus Dalmatien unter dem Namen *Oxyc. flavipes* eingeführt, *Oxyc. longicornis* Dale näher charakterisirt; zwei neue Arten, die beschrieben werden, sind *Oxycera locuples* von den Schweizer Alpen und *amoena* aus Oesterreich, letztere von Zetterstedt vielleicht als *O. pardalina*, von Macquart als *O. formosa* var. beschrieben.

Schiner (Verhandl. d. zoolog.-botan. Vereins in Wien VII. p. 6 ff.) theilte Bemerkungen über die bei Triest von ihm gesammelten Stratiomyiden mit, die zum Theil für die Feststellung der Arten von Belang sind; als neue Arten werden *Oxycera Ranzonii* und *Nemotelus plagiatus* von dorthier beschrieben.

Snellen van Vollenhoven (Mémoires d'entomologie, publ. p. 1. soc. entomol. des Pays-Bas I. p. 91 ff.) beschrieb neben *Ptilocera quadridentata* Wied. von Sumatra und Java zwei ihr sehr ähnliche Arten, die sich aber durch constante Merkmale unterscheiden: *Ptil. amethystina* von Java und Celebes und *smaragdina* von Celebes; die

Beschreibung der letzteren Art passt mit Ausnahme der Färbung des letzten Fühlergliedes vollständig auf die *Ptil. fastuosa* des Ref. von Ceylon, mit der sie vielleicht identisch ist. — *Rhaphiocera spinithorax* Macq. hält der Verf. für nichts als *Clitellaria bivittata* Wied.

Haliday (Natural history review IV. p. 193) beschrieb die Larve einer *Oxycera*, die vermuthlich der an gleicher Stelle mit ihr vorkommenden *Oxycera Morrisii* angehört und bildete dieselbe auf pl. XI ab. Der Verf. lässt sich auf eine specielle Erörterung derjenigen Merkmale ein, welche sie von den beiden durch Heeger bekannt gemachten Larven der Gattung unterscheiden. — Eine ausführliche Schilderung des inneren und äusseren Baues der Larve von *Nemotelus uliginosus* gab derselbe ebenda p. 194 und eine Abbildung auf pl. XI. Die Larve ist mehr gleichbreit als die von *Oxycera*, ihr Kopf schmaler, das letzte Abdominalsegment mit vier Zähnen, welche einzelne lange Borsten tragen, besetzt; die Borsten der Tracheenmündung am hinteren Körperende sind kurz, unterhalb nahe der beiden mittleren Zähne gelegen.

Syrphici. Walker (Transact. entom. soc. IV. p. 150 ff.) beschrieb eine Anzahl neuer Arten aus der Saunders'schen Sammlung, von denen zwei neue Gattungen bilden: 1) *Lycastris* n. g. mit vorgestrecktem, lanzettlichen Epistom fast von der Länge des Thorax, der Mund selbst kaum kürzer als der Körper; Fühler auf einem Petiolus sitzend, ihr erstes und zweites Glied kurz, das dritte breit, fast elliptisch, mit nackter Borste; Thorax und Hinterleib haarig, Füße einfach, die Vena transversa praebrachialis lang, geschwungen und sehr schräg. Art: *L. albipes* aus Hindostan. — 2) *Rhoga* n. g. mit Paragus verwandt; Kopf schmal, Augen oben nicht zusammenstossend; erstes Fühlerglied lang, drittes kürzer, etwas gekault, mit nackter Borste; Hinterleib sitzend, verkehrt lanzettlich, kaum doppelt so lang als der Thorax; Hinterschienen etwas erweitert, gewimpert, an den Hinterfüßen der Metatarsus erweitert. Art: *Rh. lutescens* von Pará. — Die übrigen neuen Arten sind: *Ceratophya luridescens* vom Amazonenstrom, *bicolor* von Pará, *Ceria divisa* und *Microdon testaceus* von Port Natal, *Helophilus strenuus* ohne Angabe des Vaterlandes, *scitus* und *auratus* vom Amazonenstrom, *Merodon torpidus* ohne Angabe des Vaterlandes, *Syritta transversa* vom Amazonenstrom, *Temnocera trifascia* von Pará, *circumdata* und *integra* vom Amazonenstrom, *Pipiza pica* und *dolosa* ebendaher, *divisa* von Vera-Cruz, *Syrphus subchalybaeus* vom Amazonenstrom.

Derselbe (Dipteren von Borneo, Journal of the proceed. of the Linnean soc. Zoology I. p. 122 ff.) charakterisirte zwei neue Gattungen: 1) *Baryterocera* n. g. von fast linearem Körper, Kopf etwas breiter als der Thorax, Gesicht flach; Fühler mit zwei kurzen Basal- und sehr langem, erweiterten, gebogenen Endgliede mit nackter Borste.

am Grunde; Abdomen fast eiförmig, sitzend, etwas breiter und kürzer als der Thorax; Beine kurz und kräftig, Flügel kurz mit geraden, fast rechtwinklig gegen die Längsnerven verlaufenden Queradern. Art: *B. inclusa* von Borneo. — 2) *Citibaena* n. g. mit linearem, sehr haarigen Körper; Kopf kaum breiter als der Thorax, Gesicht flach, Augen dicht behaart, Fühler kurz, die beiden ersten Glieder quer, das dritte verkehrt kegelförmig, etwas länger und breiter als jene; Fühlerborste nackt, an der Basis entspringend, doppelt so lang als das dritte Glied. Hinterleib viel länger als der Thorax, Beine einfach, zart, Flügel schmal, die äussere Querader zwischen der Cubital- und Präbrachialader gebrochen und daselbst einen kleinen Ast aussendend. Die Gattung ist mit *Chrysochlamys* verwandt. Art: *C. aurata* von Borneo. Andere neue Arten sind: *Merodon varicolor*, *Milesia Zaniel*, *Syrphus divertens*, *cyathifer* von Borneo. Die beiden neuen Gattungen sind auf pl. 6 fig. 3 u. 4 dargestellt.

Neue Arten aus Chile, von Bigot (Annales de la soc. entomol. V. p. 295 ff.) beschrieben, sind: *Phalacromyia nigripes*, *Helophilus luctuosus*, *Cheilosisia aurantipes*.

Syrphus quadrifasciatus und *radiatus* Bigot (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 337) sind zwei neue Arten aus Cuba.

Die Europäischen Arten der Gattung *Cheilosisia* nach ihren wesentlichen Charakteren auseinanderzusetzen hat Loew (Verhandl. d. zoolog.-botan. Vereins in Wien VII. p. 579—616) begonnen. Der Verf. verbreitet sich zunächst in ausführlicher Weise über die Charaktere, welche zur Unterscheidung der Arten benutzt werden können und geht besonders auch auf diejenigen ein, welche durchaus trügerisch und daher für die Aufstellung von Arten verwerflich sind. Von der Gattung im Macquart'schen und Meigen'schen Sinne werden die mit *Syrph. ruficornis* verwandten Arten (*Chrysochlamys* Rond.) ausgeschlossen; die zurückbleibenden zerfällt der Verf. in drei Gruppen: 1) in solche mit behaarter Gesichtsfläche, 2) in solche mit unbehaarter Gesichtsfläche und nackten Augen und 3) in solche mit nackter Gesichtsfläche und behaarten Augen. Der vorliegende Theil der Arbeit erstreckt sich auf eine Beschreibung der den beiden ersten Gruppen angehörenden Arten, 8 in der ersten und 27 in der zweiten; in der ersten Gruppe werden als neu beschrieben: *Ch. barbata* Mitteleuropa, *frontalis* Deutschland, *intonsa* (fraterna Zett.) ganz Europa, *griseiventris* Sicilien; in der zweiten: *Ch. latifacies* Brussa, *Hercyniae* Harz, Oesterreich, *pulchripes* (means Zett.) ganz Europa, *plumulifera* Gebirge Mittel-Europas, *gagatea* Steyermark, *laeviventris*, *venosa*, *sparsa*, *derasa*, *personata* und *insignis* Oesterreich. — Zur leichteren Bestimmung der Arten hat der Verf. ihre Hauptcharaktere in Tabellen analysirt, die den einzelnen Gruppen vorangestellt sind. Zahlreiche von Meigen und Macquart aufgestellte Arten sind

wegen ihrer mangelhaften Charakteristik dem Verf. unenträthselbar gewesen.

Der Verf. schliesst hieran (ebenda p. 617—620) eine Auseinandersetzung der drei Europäischen Arten der Gattung *Chrysochlamys* Rond., nämlich *Ch. ruficornis* Fab., *cuprea* Scop. und *aurea* Rond.

Ueber die Gattungen *Chrysogaster* und *Orthoneura* schrieb derselbe (Wiener Entomol. Monatsschrift I. p. 4 ff.). Er unterscheidet als *Chrysogaster basalis* eine neue zwischen *Chr. coemeteriorum* Fab. und *chalybeata* Meig. in der Mitte stehende Art aus Deutschland, die sich von *Chr. cupraria* Macq. durch dunkelbraun gefärbtes Randmal der Flügel unterscheidet; es folgen ausserdem einige Bemerkungen über die Synonymie und das Vorkommen anderer Arten der Gattung. Von *Orthoneura brevicornis* und *frontalis* werden die bisher unbekannten Weibchen charakterisirt.

Eumerus punctifrons n. A. aus Syrien beschrieb derselbe (Verhandl. d. zoolog.-botan. Vereins in Wien VII. p. 85).

Ein Verzeichniss der Oesterreichischen Syrphiden hat Schiener (Verhandlungen des zoolog.-botan. Vereins in Wien VII. p. 279—447) zusammengestellt und hieran, wie bei den vorhergehenden Verzeichnissen, Tabellen zur Bestimmung der Gattungen und Arten gereiht. Wenn die Arbeit gleich zum grössten Theile nur eine Zusammenstellung von bereits Bekanntem ist, so verdient doch die darauf verwandte Mühe und Sorgsamkeit alle Anerkennung. Dass einzelne Theile, welche in neuerdings erschienenen Monographien von Loew eine gründliche Durcharbeitung erfahren haben, eine grössere Vollständigkeit und Sicherheit in der angeführten Synonymie bekunden als andere, wo der Verf. auf seine eigenen Forschungen angewiesen war, liegt in der Natur der Sache; indessen ist auch bei letzteren das Streben nach Erkenntniss des Richtigen nicht zu verkennen. Da der Verf. neben den Oesterreichischen Arten auch die des übrigen Europa mit aufführt, würde es für die Berichtigung der Synonymie besonders der südlichen Arten, welche oft eine weitere Verbreitung haben, zweckmässig sein, auch die Beschreibungen der Algerischen, Klein-Asiatischen Arten u. s. w. zu vergleichen; z. B. müsste für *Volucella analis* Macq. der frühere Name *Vol. liquida* Erichs. (Wagner, Reisen in Algier 1840) eingeführt werden. — Die einzelnen Syrphiden-Gattungen sind in Oesterreich folgendermassen vertreten (die Zahl der Europäischen Arten ist in Klammern beigefügt): *Callicera* 1 (5), *Microdon* 2 (3), *Chrysotoxum* 11 (12), *Psarus* 1 (1), *Paragus* 8 (8), *Pipiza* 23 (50), (*Triglyphus* 1), *Chrysogaster* 15 (30), *Psilota* 1 (4), *Cheilosia* 56 (88), *Syrphus* 57 (106), *Pelecocera* 2 (4), *Didea* 3 (4), *Doros* 3 (4), *Melithreptus* 9 (19), *Spazigaster* 1 (1), *Myolepta* 1 (1), *Rhingia* 3 (3), *Brachyopa* 4 (9), *Ascia* 8 (11), *Sphegina* 1 (6), *Baccha* 3 (4), *Volucella* 5 (8), *Eristalis* 14 (26), *Mallota*

3 (5), *Helophilus* 10 (18), (*Platynchoetus* 1), *Merodon* 15 (29), *Tropidia* 2 (4), *Xylota* 13 (13), *Syritta* 1 (2), *Eumerus* 12 (32), *Chrysochlamys* 2 (3), *Spilomyia* 7 (7), *Sericomyia* 4 (4), *Criorrhina* 6 (10), *Brachypalpus* 3 (4), *Milesia* 2 (2), (*Sphecomyia* 1), *Ceria* 2 (4).

van der Wulp (*Mémoires d'entomol.*, publ. p. l. soc. entom. des Pays-Bas I. p. 18. pl. 1) gab eine Beschreibung und Abbildung der Larve und Puppe von *Eristalis sepulchralis* Lin. Aus einer Puppe dieser Fliege entwickelte sich ein *Cryptus migratorius*.

Conopidae. *Conops Ramondi* wurde von Bigot (*Historia fisica de la isla de Cuba* VII. p. 339) als neue Art von Cuba aufgestellt.

Nach Schiner's Beobachtungen ist die bei Triest vorkommende *Dalmania* (*Stachynia*) *meridionalis* Macq. das Weibchen der *D. australis* Macq., letztere aber nach Loew identisch mit *Conops aculeata* Lin.

Oestracea. Leidy (*Proceed. of the acad. of nat. scienc. of Philadelphia* 1857. p. 204) machte die Mittheilung, dass eine Oestrus-Larve in Mehrzahl unter der Haut des Rückens, Bauches und der Lenden von einer Taschenmaus (*Tomomys borealis*) gefunden worden sei; die grössten Exemplare derselben massen 9 Linien an Länge.

Muscariae. Zahlreiche neue Arten aus den verschiedenen Gruppen dieser Familie, von Wallace auf Borneo gesammelt, wurden von Walker (*Journ. of proceed. of the Linnean soc.*, Zoology I. p. 125 ff.) bekannt gemacht. Aus der Tachinen-Gruppe: *Eurygaster subferrifera*; aus der Dexien-Gruppe: *Dexia munda* und *extendens*; aus der Sarcophagiden- und Musciden-Gruppe: *Cynomyia fortis*, *Sarcophaga indicata*, *Idia bivittata*, *Musca exempta*. Von Acalypteren: *Aricia inaperta*, *illocata*, *Caenosia insurgens*, *Helomyza fuscicostata*, *aequata*, *limbata*, *prorecta*, *invicta*; *Gauzania* n. g. von schlankem, fast cylindrischen, borstigen Körper, mit nackten Augen, kurzen Fühlern, deren drittes Glied lang konisch und mit behaarter Borste versehen ist; Hinterleib verkehrt lanzettlich, kaum länger, aber schmaler als der Thorax; Beine nicht borstig, Flügel schmal, mit parallelen Adern. Art: *G. devecta* (Abbildung auf pl. 6. fig. 5). — *Lamprogaster basilutea*, *divisa*, *punctata*, *guttata*, *Sophira concinna*, *Rioxa confinis*, *Dacus determinatus*, *figuratus*, *Noeeta latiuscula*, *Trypeta rudis*, *Urophora fasciata*, *Diopsis discrepans*, *Calobata strenua*, *cedens*, *Cardiacephala longicollis*, *Gymnopa* (?) *gutticosta* und *Gymnopa* (?) *infusa*.

Bigot (*Annales de la soc. entomol.* V. p. 299 ff.) beschrieb folgende Arten aus Chile, die zugleich auf pl. 7 abgebildet sind: *Jurinea callipyga*, *Sarconesia* n. g. auf *Sarcophaga chlorogaster* Wied. welche bei Macquart unter *Onesia* steht, gegründet (die Art wird hier nochmals beschrieben und auf pl. 7. fig. 5 abgebildet), nebst einer

zweiten Art: *Sarconesia versicolor*. Ferner: *Pegomyia univittata*, *Amethysa calligyna*, *Urophora flexuosa*.

Als neue Arten aus Cuba (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 340 ff.) stellte derselbe auf: *Tachina elegans*, *Eurygaster obscurus*, *modestus*, *Scopolia nigra*, *Sarcophaga muscoides*, *pusilla*, *incerta*, *Sepsis Guérinii*, *discolor*, *Acinia picciola*, *Ulidia metallica*, *Sciomyza obscuripennis* und *Phora cornuta*.

Loew (Wiener Entomol. Monatsschrift I. p. 44—56) erörterte die mit *Cyrtoneura hortorum* Wied. verwandten Europäischen Arten nach beiden Geschlechtern, nämlich *Cyrt. simplex* (importuna Halid.), eine von England bis Italien, Griechenland und Klein-Asien verbreitete Art und *Cyrt. podagrica* n. A. aus Steyermark und Kärnthen; gründete ferner eine neue Gattung *Anaphalantus* auf eine von Wahlberg im Caffernlande aufgefundenen, mit *Coenosia* verwandte Art, welche sich durch etwas breitgedrückte, beiderseits lang und dicht gefiederte Vorderschienen sehr auszeichnet; sie weicht von *Coenosia* ferner durch den Mangel der Borsten an der Schienenspitze, den Bau des Hinterleibs, der beim Männchen stark von oben nach unten zusammengedrückt ist, die kurzen Stirnborsten, den Mangel der Knebelborsten, das mehr zurückgehende Untergesicht u. s. w. ab. Die Art ist *Anaph. pennatus* genannt und auf Taf. I. fig. 21 abgebildet. — Ferner besprach derselbe die deutschen Arten der Gattung *Heteroneura*, deren ihm fünf bekannt geworden sind: *Het. spurca* Halid., *albimana* Meig., *ruficollis* Meig., *alpina* n. sp. aus dem Hochgebirge und *geomyzina* Fall. — und beschrieb endlich eine ausgezeichnete neue Phoriden-Gattung *Psyllomyia testacea*, von Wahlberg im Caffernlande aufgefunden, nur $\frac{3}{4}$ lin. lang (Taf. I. Fig. 22 abgebildet), durch linsenförmig gewölbten, hornigen Kopf, sehr kleine Augen, zweigliedrige Fühler mit dicht behaarter Borste, vorstehende Taster, langen und geknieten Rüssel, abgerundeten Thorax, besonders stark entwickelte Beine, mit sehr kräftigen Hinterschenkeln und verkürzte, lederartige, den Hinterleib an der Basis bedeckende Flügel bemerkenswerth.

Derselbe (Zeitschrift f. d. gesamt. Naturwiss. X. p. 104 ff.) beschrieb *Anthomyia pulchripes*, *Hydrotaea sylvicola*, *brevipennis*, *Sapromyza decaspila*, *modesta* und *nana* als neue Arten aus dem Harz.

Anthomyia impudica Reiche (Bullet. de la soc. entomol. V. p. IX) ist eine neue Art von Grönland.

Sehr werthvolle und interessante Beiträge zur Naturgeschichte der Trypeten lieferte G. Frauenfeld in den Sitzungsberichten der mathem. - naturwiss. Classe der Akad. d. Wissensch. in Wien XXII. p. 523—557, in welchen er seine langjährigen Erfahrungen über die Nahrungspflanzen dieser Fliegen so wie über die Lebensweise der Larven in denselben mittheilt. Um die Vertheilung der einzelnen

Trypeta-Arten auf die verschiedenen Familien, Gruppen und Gattungen der einheimischen Compositen darzustellen, welche bekanntlich vorwiegend den Wohnsitz für ihre Entwicklung abgeben, stellt der Verf. die einheimischen Corymbiferen, Cynarocephalen und Cichoraceen in systematischer Reihenfolge zusammen und vermerkt bei den einzelnen Gattungen und Arten die aus ihnen erzogenen Trypeten. Es stellt sich dabei heraus, dass unter den Corymbiferen die Eupatorieen und Calendulaceen, beide arm an Gattungen, bisher nicht als Wohnsitz von Trypeten nachgewiesen worden sind; dass dagegen die Inuleen, Anthemideen und Senecioneen reich an solchen sind; dass unter den Cynarocephalen die Carduineen und die Centaurieen überhaupt die meisten Arten (erstere 41, letztere 20) ernähren, während von den Echinopsideen, Carlineen und Xeranthomeen bisher keine Art zur Kenntniss gekommen ist; dass sich endlich unter den Cichoraceen die Trypeten auf die Gruppen der Leontodonten, Scorzoneeren, Hypochoerideen, Chondrilleen, Lactuceen und Crepideen beschränken. Interessant ist auch das Verhältniss, in welchem die von der Trypeten-Larve verursachten Veränderungen in der Pflanze zu den genannten Familien stehen; während nämlich in den Blüthenköpfen bei einem grossen Theile der Cynarocephalen durch den Anstich der Fliegen-Anschwellungen erzeugt werden, fehlen diese ganz allgemein bei den Cichoraceen, deren Achenen nur von den Larven ausgehöhlt werden. Während ferner die meisten Trypeta-Arten an eine bestimmte Gattung und Art gebunden sind, erscheinen andere polyphag und zwar nicht nur in verschiedenen Arten einer und derselben Gruppe, sondern auch in Pflanzen verschiedener Gruppen. — Der Aufzählung der Compositen und ihrer Bewohner lässt der Verf. zahlreiche Bemerkungen über die Lebensweise der einzelnen, von ihm erzogenen Arten so wie über die von denselben an den Pflanzen verursachten Veränderungen folgen und giebt sodann eine Zusammenstellung der aus Compositen erzogenen Trypeten, 59 an Zahl, mit Hinzufügung ihrer Nahrungspflanzen. Von diesen 59 Arten kommen 32 nach den bisherigen Erfahrungen nur an einer einzelnen Pflanze vor, die übrigen an mehreren zugleich; z. B. *Tr. aretii* an 5 Arten und 4 Gattungen von Pflanzen, *flava* an 4 Arten (2 Gattungen), *inulae* ebenso, *marginata* an 7 Arten (3 Gattungen), *onotrophes* an 10 Arten (5 Gattungen), *solstitialis* an 6 Arten (3 Gattungen), *sonchi* an 8 Arten (6 Gattungen), *stellata* an 5 Arten (4 Gattungen). — Zuletzt geht der Verf. zu der Beschreibung einer Anzahl neuer Arten über: *Tr. affinis* aus *Centaurea paniculata*, *amoena* aus *Lactuca*-Arten (in Dalmatien auch aus *Picris hieracioides*), *Eggeri* aus *Doronicum pardalianches* (Steiermark), *intermedia* aus *Tragopogon pratense*, *Mamulae* aus Blätterrosen von *Gnaphalium angustifolium* von Zara, *maura* aus *Inula hirta* und *britannica*, *Schaefferi* aus *Centaurea montana*, *Conyzae* aus

Conyza aegyptiaca in Aegypten und *augur* aus *Zygophyllum album* in der Sinaitischen Halbinsel, sämmtlich in ihren Flügelzeichnungen auf der beifolgenden Tafel abgebildet. Ebenda stellt der Verf. zugleich den Kopf einer männlichen Trypeta dar, welcher mit zwei langen Hörnern, die je vier geknöpfte Fäden tragen, geziert ist; die Art zeigt in der Flügelzeichnung grosse Aehnlichkeit mit *Tr. abrotani* Meig., für deren Männchen der Verf. sie zu halten geneigt ist. — Neben diesen neuen Arten bespricht der Verf. eine grössere Anzahl bereits bekannter in Bezug auf ihre Synonymie, ihre Abänderungen, Nahrungspflanzen u. s. w. und liefert damit auch für diese mannigfache und schätzenswerthe Beiträge.

L. Dufour („Mélanges entomologiques, Annales de la soc. entomol. p. 39 ff.) machte *Phytomyza tropaeoli* als n. A. aus Südfrankreich bekannt, deren Larve die Blätter von *Tropaeolum aduncum* minirt; die Larve, Puppe und das ausgebildete Insekt werden ausführlich beschrieben und auf Taf. 3 dargestellt. — Ebenda p. 50 beschreibt der Verf. die ersten Stände von *Tephritis jaceae* Robin., welche in den Köpfen von *Centaurea nigra* leben; die Fliege, von der er ebenfalls eine Beschreibung giebt, ist von *Tryp. Wiedemanni* Meig., mit der sie Macquart fraglicher Weise zusammenzieht, sehr verschieden; ebenso ist *Tr. florescentiae* Meig., deren Larve in den Köpfen von *Onopordon illyricum* lebt, eine verschiedene Art. — *Urophora quadrifasciata* (p. 53 ff.) bildet harte Gallen in den Blüthenköpfen der *Centaurea nigra*, welche aus zwei bis fünf verschmolzenen Samenkapseln bestehen, in deren jeder eine Larve lebt, welche nebst der Puppe und Fliege beschrieben wird. Abbildungen der Larven und Puppen beider Arten nebst den von ihnen bewohnten Blüthentheilen auf pl. 3. No. II.

Haliday (Natural history review IV. p. 195. pl. XI) beschrieb die ersten Stände der *Anthomyia riparia* Fall. und bildete dieselben nebst einzelnen charakteristischen Merkmalen ab.

Einen Fall von massenhaftem Auftreten der *Chlorops nasuta* Meig. während des Spätsommers in der Oberlausitz, wo dieselbe dichte Wolken über den Dächern der Häuser bildete, theilte v. Kiesenwetter (Berl. Entomol. Zeitschr. I. p. 172) mit.

Coriacea. Kolenati (Die Parasiten der Chiropteren, p. 31—48) gab eine Zusammenstellung der auf Fledermäusen lebenden Coriaceen, von denen er die ihm aus eigener Anschauung bekannten beschreibt, die übrigen nach den von den Autoren gegebenen Charakteristiken aufführt. Die acht Arten, welche der Verf. selbst untersucht hat, gehören sämmtlich der Gattung *Nycteribia* an und unter diesen werden vier unter den Namen: *Nyct. Westwoodii*, *Blasii*, *Hyrtl*i und *Fitzingeri* als neu beschrieben. Die früher von ihm beschriebene Art *N. Frauenfeldii* hält der Verf. jetzt für wahrschein-

lich identisch mit *N. pedicularia* Latr. Westw., die Namen der *N. biarticulata* Herm. und *vexata* Westw. ändert er ohne Grund in *N. Hermannii* Leach und *Montaguei* Kol. um. Ebenso wird bei Anführung der übrigen Fledermaus-Parasiten die Gattung *Raymondia* Frauenf. sehr unkritisch mit *Strebla* Wied., von der sie durch die auffallendsten Charaktere abweicht, vereinigt.

Derselbe „Synopsis prodroma der Nycteribien“ (Wiener Entomol. Monatsschr. I. p. 61) stellte eine analytische Tabelle für die Bestimmung von 16 Nycteribia-Arten, die in dem vorstehend erwähnten Werke von ihm beschrieben sind, zusammen und vertheilte zugleich diese Arten in 5 Gattungen *Megistopoda*, *Eucampsipoda*, *Stylidia*, *Acrocholidia* und *Listropoda*. (Die Gattung Nycteribia ist aber eine durchaus natürliche und da bis jetzt sogar die Kenntniss ihrer Arten noch im höchsten Grade mangelhaft ist, hat die Zerspaltung weder irgend einen Grund noch Nutzen. Ref.)

G. Frauenfeld wies in einer Abhandlung „Ueber *Raymondia* Fr., *Strebla* Wd. und *Brachytarsina* Mcq.“ (Sitzungsberichte der mathem.-naturwiss. Classe der Akad. d. Wissensch. in Wien XXII. p. 468—478) gegen Kolenati und Loew die generische Verschiedenheit seiner Gattung *Raymondia* von *Strebla* und *Brachytarsina* nach, obwohl es in Rücksicht auf die sehr ausgesprochenen Unterschiede, welche zwischen denselben existiren, eines solchen Nachweises gar nicht bedurft hätte. Als neue Art wird anhangsweise *Raymondia diversa* aus Aegypten, auf *Pteropus aegyptiacus* aufgefunden, charakterisirt.

Loew unterschied (Wiener Entomol. Monatsschr. I. p. 8) von *Ornithomyia avicularia* Lin. (*viridis* Leach, *viridula* Meig.) eine neue Deutsche Art, die er als *Ornithomyia ptenoletis* beschreibt.

Aphaniptera. Kolenati (Parasiten der Chiropteren p. 31 ff.) führte sechs Arten von Puliciden als Parasiten der Fledermäuse auf und beschrieb dieselben; fünf davon gehören zur Gattung *Ceratopsyllus* Curt., nämlich: *C. octactenus*, *hexactenus*, *pentactenus*, *tetractenus* und *dictenus* (letzterer gleich *Pulex vespertilionis* Dug.) und eine zur Gattung *Pulex* Lin., nämlich: *Pulex metallescens*, auf *Pteropus aegyptiacus* lebend.

Desselben „Synopsis prodroma der auf Vespertilionen Europa's lebenden Ceratopsyllen“ (Wiener Entomol. Monatsschr. I. p. 65) ist ein nochmaliger Abdruck der Namen der im Obigen beschriebenen fünf Arten.

„Nederlandsche Insekten uit de orde der Siphonaptera, door R. T. Maitland“ (Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland II. p. 310 f.). Eine Aufzählung von 12 Arten der Gattung *Pulex*, die an verschiedenen Säugethieren und Vögeln in den Niederlanden beobachtet worden sind.

Lepidoptera.

Als die bedeutendste Publikation im Gebiete der Lepidopterologie während des Jahres 1857 ist die in den Suites à Buffon erschienene Fortsetzung des „Species général des Lépidoptères par Mm. Boisduval et Guenée“ mit dem 9. und 10. Bande, welche eine systematische Bearbeitung der Familien der „Uranides et Phalénites par M. A. Guenée“ enthalten, zu bezeichnen. Das leider in seinem Erscheinen allzulange unterbrochene Unternehmen Boisduval's hat durch den ebenso thätigen als gründlichen Verfasser der beiden vorliegenden Bände binnen Kurzem eine so rüstige Fortführung erfahren, dass für die auf die Noctuen, Geometriden und Pyraliden folgenden Familien eine in entsprechender Weise umfassende Bearbeitung wohl nun ebenfalls in Aussicht gestellt werden darf, während für die ihnen vorangehenden Heteroceren nach dem Erscheinen der sie behandelnden Cataloge des British Museum ein Gleiches wohl kaum zu erwarten steht. Ganz besonders diesen vom British Museum ausgehenden Publikationen gegenüber, welche allen ferneren wissenschaftlichen Bearbeitungen unüberwindliche Hindernisse entgegensetzen und dieselben fast unmöglich machen, muss jede Arbeit, welche einen dort noch nicht behandelten Abschnitt der systematischen Entomologie in Angriff nimmt, als besonders erwünscht angesehen werden. — Die Guenée'sche Bearbeitung der „Uranides et Phalénites“ (Tome I et II, Paris, Roret, 8.) umfasst zwei starke Bände von 514 und 584 pag. nebst einem Atlas von 24 Tafeln. Dem ersten Bande ist eine Einleitung von LVI pag. vorangeschickt, in welcher der Verf. zunächst auf die natürlichen Charaktere der Geometriden und ihre Unterschiede von den übrigen Familien der Lepidopteren in umfassender Weise eingeht; die Familie ist durch die eigenthümliche Form der Raupe in so scharfer Weise abgegränzt, dass über ihren Umfang in keinem Falle Zweifel entstehen können, wenn auch gerade diese Gleichförmigkeit, die sich nicht nur auf den Bau und die Lebensweise der ersten Stände, sondern auch auf die gleichen Verhältnisse bei der Imago erstreckt, andererseits es ist, welche die Classification äusserst schwierig macht.

Nachdem der Verf. die Charaktere der Raupe, Puppe und der Imago, bei letzterer besonders auch das Flügelgeäder in ausführlicher Weise erörtert hat, geht er in einem zweiten Abschnitte, betitelt: „Classification et Bibliographie des Phalénites“ zu einer kurzen Zusammenstellung der von früheren Autoren gelieferten Arbeiten über die Geometriden über, dasjenige daraus hervorhebend, was auf die allmähliche Entwicklung der Systematik Einfluss ausgeübt hat. Aus den Eintheilungen seiner Vorgänger, unter denen besonders die von Herrich-Schäffer und Lederer näher berücksichtigt werden, Alles schöpfend, was für seine Arbeit in Betracht kam, konnte sich der Verf. den Systemen derselben dennoch nur in beschränkter Weise anlehnen, da wie überall die vergleichende Untersuchung des reichhaltigen und mannigfaltigeren exotischen Materials den auf Europäische Arten ausschliesslich gegründeten Systemen mannigfache Irrthümer und Mängel nachweisen musste. Uebrigens scheint der Verf. von einer übersichtlichen Eintheilung der Familie, in welcher die einzelnen Gruppen durch Charaktere analysirt werden, wie er sie z. B. bei seiner Bearbeitung der Noctuen vorgenommen hat, hier wohl in gerechter Würdigung der sich ihm entgegenstellenden Schwierigkeiten abgestanden zu haben, denn, indem er nur die von ihm vorgenommenen Abänderungen an den Eintheilungen seiner Vorgänger kurz erwähnt, geht er sogleich zu dem speziellen Theil der Arbeit über, in welchem die einzelnen von ihm aufgestellten Gruppen jedesmal nur an der Spitze der unter ihnen vereinigten Gattungen und Arten für sich charakterisirt werden. Die Zahl der vom Verf. beschriebenen Arten ist eine sehr bedeutende, indem ihm nicht nur die bedeutenderen Französischen, sondern auch einige Sammlungen des Auslandes für die Ausarbeitung seines Werkes zu Gebote gestanden haben; sie beträgt für die Familie der Uranidae 20, für die der Phalaenidae 1780. — Der (mit colorirten und schwarzen Abbildungen herausgegebene) Atlas beschränkt sich wie bei den vorhergehenden Bänden auf die Darstellung typischer Formen, indem die meisten Gattungen nur durch eine, selten durch mehr Arten repräsentirt werden; eine Tafel ist den Urani-

den, eine den (im Texte nicht berücksichtigten) Siculiden, die übrigen zwei und zwanzig den Phalaeniden, gewidmet; von letzteren sind zwei für die Erläuterung des Flügelgeäders und die Darstellung von Raupen verwendet worden.

Die Familie der Uranidae theilt der Verf. in vier Gruppen: *Cydimonidae* (Gattung *Cydimon* 6 Arten), *Uranidae* (*Urania* 1 A.), *Nyctalemonidae* (*Álcidis* 1 A., *Nyctalemon* 2 A.) und *Sematuridae* (*Sematura* 5 A., *Coronis* 5 A.). Die Familie der Phalaenidae zerfällt in 26 Gruppen: 1) *Urapteryidae* (muss *Urapterygidae* heissen!) mit den Gattungen *Urapteryx*, *Ripula* n. g., *Choerodes* n. g., *Idiodes* n. g., *Cirsodes* n. g., *Sabulodes* n. g., *Entrapela*, *Mucronodes* n. g., *Cimicodes* n. g., *Clysia* n. g., *Oxydia* n. g. und *Cyclidia* n. g. — 2) *Ennomidae* mit *Drepanodes* n. g., *Crocopteryx* n. g., *Cratoptera*, *Gynopteryx* n. g., *Tetragonodes* n. g., *Periclina* n. g., *Apicia* n. g., *Scardamia* n. g., *Melinodes*, *Priocycla* n. g., *Therapis*, *Drepanogyne* n. g., *Synnomos* n. g., *Epione*, *Hyperythra* n. g., *Sicya* n. g., *Heterolocha*, *Rumia*, *Caustoloma*, *Venilia*, *Angerona*, *Hyperetis* n. g., *Nematocampa* n. g., *Endropia* n. g., *Metrocampa*, *Ellopiia*, *Leucula* n. g., *Caberodes* n. g., *Tetracis* n. g., *Onycodes* n. g., *Prionia*, *Eurymene*, *Pericallia*, *Erosina* n. g., *Selenia*, *Azelina* n. g., *Synemia* n. g., *Odontoptera*, *Crocallis*, *Entomopteryx* n. g., *Metanema* n. g., *Ennomos* und *Himera*. — 3) *Oenochromidae* mit *Monoctenia* n. g., *Oenochroma* n. g., *Arhodia* n. g., *Phallaria* n. g., *Gastrophora* n. g., *Sarcinodes* n. g. und *Hypographa* n. g. — 4) *Amphidasysidae* mit *Meticulodes* n. g., *Ceratomyx* n. g., *Phigalia*, *Chondrosoma*, *Nyssia*, *Apocheima*, *Biston*, *Amphidasys*, *Lophodes* n. g. — 5) *Boarmidae* mit *Amblychia* n. g., *Xylopteryx* n. g., *Hemerophila*, *Nychiodes*, *Melanodes* n. g., *Smyriodes* n. g., *Gastrina* n. g., *Synopsisia*, *Phaselia* n. g., *Calamodes* n. g., *Cleora*, *Boarmia*, *Tephrosia*, *Paraphia* n. g., *Bryoptera* n. g., *Hypochroma* n. g., *Pachyodes* n. g., *Ophthalmodes* n. g., *Cerotricha* n. g., *Elphos* n. g., *Bronchelia* n. g., *Stenotrachelys* n. g., *Xerodes* n. g., *Gnophos*, *Dasydia* n. g., *Psodos*, *Dichromodes* n. g., *Pygmaena*, *Exelis* n. g. und *Mniophila*. — 6) *Boletobidae* mit *Stellidia* n. g., *Xyliodes* n. g. und *Boletobia*. — 7) *Geometridae* mit *Achlora* n. g., *Pseudoterpna*, *Geometra*, *Nemoria*, *Trimetopia* n. g., *Jodis*, *Thalassodes* n. g., *Dyspteris*, *Chlorochroma*, *Eucrostis*, *Omphax* n. g., *Phorodesma*, *Rhacheospila* n. g., *Synchlora* n. g., *Aplodes* n. g., *Thetidia*, *Chlorodes* n. g., *Phyle*, *Agathia* n. g., *Hemithea* und *Amaurinia* n. g. — 8) *Mecoceridae* mit *Ametris*, *Mecoceras* n. g. und *Almodes* n. g. — 9) *Palyadae* mit *Eumelea*, *Palyas* n. g., *Ophthalmophora* n. g. und *Bysodes* n. g. — 10) *Ephyridae* mit *Numia* n. g., *Cyphopteryx* n. g., *Ephyra*, *Anisodes* n. g. — 11) *Acidalidae* mit *Synegia* n. g., *Drapetodes* n. g., *Asellodes* n. g., *Trygodes* n. g., *Pomasia* n. g., *Hyria*,

Cambogia n. g., *Asthena*, *Eupisteria*, *Venusia*, *Cleta*, *Acidalia*, *Timandra*, *Odysia* n. g., *Cnemodes* n. g., *Pellonia*, *Somatina* n. g., *Argyris* n. g., *Zanclopteryx*, *Berberodes* n. g., *Cassyma* n. g.¹, *Pigia* n. g. — 12) *Micronidae* mit *Micronia* n. g., *Nedusia*, *Syngria* n. g., *Fulcinodes* n. g., *Erosia* n. g., *Schidax* und *Molybdophora* n. g. — 13) *Caberidae* mit *Stegania* n. g., *Syllexis* n. g., *Thamnonoma*, *Cabera*, *Acratodes* n. g., *Corycia* und *Aleucis* n. g. — 14) *Macaridae* mit *Amilapis* n. g., *Eilicrinia*, *Macaria* und *Italia*. — 15) *Fidonidae* mit *Tephрина* n. g., *Aplasta*, *Psamatodes* n. g., *Strenia*, *Cinglis* n. g., *Rhoptria* n. g., *Sphacelodes* n. g., *Plutodes* n. g., *Neritodes* n. g., *Liodes* n. g., *Spartopteryx* n. g., *Egea*, *Cyclomia* n. g., *Rhinodia* n. g., *Panagra* n. g., *Ploseria*, *Numeria*, *Pachydia* n. g., *Scodiona*, *Eusarca*, *Selidosema*, *Hyposidra* n. g., *Fidonia*, *Heliothea*, *Cleogene*, *Anthometra*, *Minoa*, *Neurophana* n. g., *Scoria*, *Phyletis* n. g., *Haematopis*, *Lythria*, *Sterrha*, *Osteodes* n. g., *Hypoplectis*, *Gorytodes* n. g., *Aspilates* und *Conchyliia* n. g. — 16) *Hazidae* mit *Hazis*. — 17) *Zerenidae* mit *Panaethia* n. g., *Rhyparia*, *Pantherodes*, *Abraxas*, *Ligdia* n. g., *Lomaspilis*, *Stalagmia* n. g., *Fulgurodes* n. g., *Perigramma* n. g., *Percnia* n. g., *Bombycodes* n. g., *Orthostixis*, *Zerene*, *Nipteria* n. g., *Cosmetodes* n. g. und *Absyrtes* n. g. — 18) *Ligidae* mit *Timia*, *Argyrophora* n. g., *Doryodes* n. g., *Ligia*, *Chlenias* n. g., *Pachynemia* und *Chemerina*. — 19) *Hybernidae* mit *Acalia* n. g., *Hybernia* und *Anisopteryx*. — 20) *Larentidae* mit *Cheimatobia*, *Oporabia*, *Larentia*, *Emmelesia*, *Microdes* n. g., *Eupithecia*, *Collix* n. g., *Lepiodes* n. g., *Rhopalodes* n. g., *Sauris* n. g., *Remodes* n. g., *Lobophora*, *Thera*, *Polyclysta* n. g., *Ypsipetes*, *Melanthia*, *Scordylia* n. g., *Melanippe*, *Anticlea*, *Coremia* n. g., *Camptogramma*, *Phibalapteryx*, *Scotosia*, *Polysemia* n. g., *Syrtodes* n. g., *Spargania* n. g., *Cidaria*, *Pelurga*, *Dineuodes* n. g., *Sybarites* n. g., *Psaliodes* n. g. — 21) *Eubolidae* mit *Eubolia*, *Carsia*, *Anaitis*, *Lithostege* und *Chesias*. — 22) *Sionidae* mit *Terenodes* n. g., *Heteropsis* n. g., *Siona*, *Gypsochroa*, *Heterophlebs*, *Callipia* n. g., *Stamnones* n. g., *Polythrena* n. g., *Tanagra* und *Odezia*. — 23) *Hedylidae* mit *Hedyle* n. g., *Venodes* n. g. und *Phellinodes* n. g. — 24) *Erateinidae* mit *Erateina* und *Trochiodes* n. g. — 25) *Emplocidae* mit *Emplocia*. — 26) *Hypochrosidae* mit *Hypochrosis* n. g. und *Achrosis* n. g.

J. C. Sepp's „Nederlandsche Insecten,“ fortgesetzt von Snellen van Vollenhoven, sind im J. 1857 mit No. XI — XXII. des 8. Bandes weitergeführt worden; jede Nummer besteht aus einem Blatte Text und einer colorirten Tafel.

Die darin beschriebenen und abgebildeten Arten sind: *Tortrix laevigana*, *Noctua festiva*, *Nonagria typhae*, *sparganii*, *Noctua triangulum*, *Herminia barbalis*, *Xylina exoleta*, *Cidaria derivata*, *Lasiocampa populifolia*, *Lithocolletis alnifoliella* und *quercifoliella*.

Freyer's „Neuere Beiträge zur Schmetterlingskunde mit Abbildungen nach der Natur“ sind im J. 1857 mit dem 116.—120. Hefte fortgesetzt worden, welche die Schlusslieferungen des nunmehr vollendeten siebenten Bandes ausmachen. Derselbe (Augsburg, beim Verfasser und in der M. Rieger'schen Buchhandlung, 1858. 4.) umfasst 178 Seiten Text und 100 colorirte Tafeln (Taf. 601—700), welche wie bekannt stets die verschiedenen Entwicklungsstadien von 1 bis 2 Arten nebst der Nahrungspflanze der Raupe darstellen. — Eine Fortsetzung seiner Beiträge in der bisherigen Art und Weise beabsichtigt der Verf. nach einer dem letzten Hefte angehängten Schlussbemerkung nicht mehr, wenigstens sollen dieselben nicht bandweise und unter dem bisherigen Titel erscheinen; vielleicht werden noch Ergänzungen zu den erschienenen Bänden in einzelnen jährlichen Heften geliefert werden.

Der Inhalt der 5 letzten Lieferungen des Werkes ist folgender: Heft 116: *Lycaena Alexius*, *Papilio Podalirius* var., *Bombyx sordida*, *Noctua plecta*, *musiva*, *Acidalia sabaudiarum*, *Nymphula lemnalis*, *Scopula alpinalis*. — Heft 117: *Hipparchia Medea*, *Pharte*, *Psyche graminella*, *Caradrina palustris*, *Larentia psittacata*, *coraciata*, *pimpinellata* und *absinthiata*. — Heft 118: *Hipparchia Euryale*, *Lithosia complana*, *lurideola*, *Noctua candelisequa*, *Cidaria derivata*, *berberata*, *luctuata*. — Heft 119: *Hesperia Sylyius*, *Thyris fenestrina*, *Lithosia eborina*, *Erastria candidula*, *atrata*, *Cidaria reticulata*, *Larentia cassiata*, *rectangulata* und *debiliata*. — Heft 120: *Melitaea Aphaea*, *Hesperia Sylvanus*, *Agrotis obotritica* n. sp. *Noctua montana* (Standfuss), *Idaea remutata*, *compararia*, *Alucita graphodactyla* und *megadactyla*.

Von Herrich-Schäffer's „Neue Schmetterlinge aus Europa und den angränzenden Ländern“ (vergl. Jahresbericht 1856. p. 161) ist bis jetzt kein ferneres Heft erschienen. Ebenso wenig ist nach dem Wissen des Ref. der noch nicht abgeschlossene Text zu den „*Lepidopterorum exoticorum species novae aut minus cognitae*“ desselben Verf. weitergeführt worden.

Von Hewitson's *Exotic Butterflies, being Illustrations of new species* ist im J. 1857 der zweite Band begonnen worden; es liegen von demselben die vier ersten Hefte (Pt. 21—24 des ganzen Werkes) vor. Siehe *Rhopalocera*!

Saunders „*On the transformations of Natal-Lepido-*

ptera“ (Transact. of the entomol. soc. IV. p. 58. pl. 13—15) lieferte Abbildungen der ersten Stände einiger Schmetterlinge von Port Natal, die zum Theil von sehr interessanter Erscheinung sind; von zweien dieser Raupen sind auch die Imagines abgebildet worden. Beschreibungen der Raupen und Nachrichten über ihre Lebensweise sind nicht gegeben worden.

Die Cataloge der Lepidopteren des British Museum sind im J. 1857 mit drei neuen Bändchen, welche eine Fortsetzung der im vorigen Jahre begonnenen Aufzählung und Beschreibung der Noctuinen enthalten, weiter geführt worden: List of the specimens of Lepidopterous Insects in the collection of the British Museum, by Francis Walker. Part XI. XII. XIII. Noctuidae. Printed by order of the trustees. London 1857. (8. p. 493—1236). — Der elfte Band bringt zunächst den Abschluss der Trifidae genuinae mit den Gruppen der Hadenidae, Xylinidae und Heliothidae (p. 493—706); der zwölfte Band enthält die Trifidae minores (— p. 842) und von den Quadrifidae die Abtheilungen der Sericeae und Variegatae, letztere bis zur Gruppe der Gonopteridae; der dreizehnte Band endlich handelt ausser dem Schlusse der Quadrifidae variegatae die Intrusae, Extensae und Limbatae ab, so dass noch die drei letzten Gruppen der Quadrifidae für den Schlussband übrig bleiben. An die Spitze jeder Hauptabtheilung stellt der Verf. eine analytische Tabelle der ihr untergeordneten Gruppen, an die Spitze jeder Gruppe eine gleiche für die ihr zukommenden Gattungen; unter letzteren findet sich wieder eine sehr beträchtliche Anzahl neu aufgestellter, so wie auch das hier verarbeitete Material ausserordentlich reich an neuen ausländischen Arten ist. Es sind daher für die Artkenntniss der Noctuinen die vorliegenden drei Bände ebenso wichtig, wie es die übrigen Cataloge des British Museum wegen des ausserordentlich reichen Materials, welches in diesem Institut angehäuft ist, für jede andere Abtheilung sein müssen; über die Mängel, welche allen von Walker bearbeiteten Catalogen anhaften, ist schon so oft in diesen Berichten geredet worden, dass eine abermalige Herzählung derselben überflüssig sein würde.

Eine Arbeit, welche ebenfalls die Familie der Noctuinen

speziell behandelt, jedoch als Fortsetzung von einer in diesen Berichten früher erwähnten allgemeinen Arbeit über Europäische Lepidopteren, nämlich Lederer's „Versuch, die Europäischen Schmetterlinge in möglichst natürliche Reihenfolge zu stellen,“ anzusehen ist, liegt unter dem Titel: „Die Noctuinen Europa's mit Zuziehung einiger bisher meist dazu gezählten Arten des asiatischen Russlands, Klein-Asiens, Syriens und Labrador's, systematisch bearbeitet von J. Lederer“ (Wien 1857. 8. 251 pag. 4 tab.) vor. Während die früheren Theile der erwähnten Arbeit des Verf. in den Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins abgedruckt waren, ist der vorliegende als selbstständiges Werk erschienen. Der Verf. geht in einer Einleitung auf die differentiellen Merkmale der Eulen von den übrigen Familien der Lepidopteren, auf ihre natürlichen Charaktere und auf die Abgränzung der unter ihnen aufzustellenden Gruppen ein; sodann folgt ein systematisches Namens-Verzeichniss der in Europa und den angränzenden Theilen Asiens vorkommenden Gattungen und Arten und eine analytische Tabelle zur Bestimmung der Gattungen. Den folgenden grössten Theil des Werkes verwendet der Verf. auf eine eingehende Charakteristik der Gattungen, denen er zum Theil einen von den früheren Autoren wesentlich verschiedenen Umfang beimisst und deren Zahl durch ihn abermals vermehrt wird (Guénée hat deren 145 Europäische, L. dagegen 161); die Arten werden hier zwar auch nur namentlich aufgeführt, jedoch besonders in artenreichen oder solchen Gattungen, wo einzelne Körpertheile auffallende Verschiedenheiten zeigen, nach diesen in Gruppen gebracht. Den Schluss bilden Bemerkungen über einzelne Arten, welche über Synonymie, Abänderungen, geographische Verbreitung u. s. w. handeln. Die vier das Werk begleitenden Tafeln enthalten Darstellungen des Flügelgeäders, der Kopf-, Palpen- und Fühlerbildung, der Körperbedeckung, der Beine und Afterklappen.

Einen Nachtrag zur Schmetterlings-Fauna von Beirut lieferte derselbe (Wiener Entomol. Zeitschr. I. p. 90—102) durch Aufzählung von 47 ferner daselbst aufgefundenen Arten nebst Beschreibung der darunter befindlichen neuen;

letztere gehören den Familien der Noctuen, Pyraliden und Tineinen an.

Hopffer hat in den Monatsberichten der Berliner Akademie der Wissenschaften 1857. p. 421 f. die von Peters in Mossambique gesammelten Lepidoptera heterocera, 11 Arten umfassend, vorläufig durch Diagnosen bekannt gemacht.

Von Staudinger erschien (Entomol. Zeitung p. 299—308) ein „Beitrag zur Lepidopteren-Fauna Grönland's,“ in welchem er zwanzig mit Sicherheit aus Grönland herstammende, in der Westermann'schen, den Copenhagener und Berliner Sammlungen sich vorfindende Arten von Lepidopteren aufzählt, dieselben mit kritischen Bemerkungen begleitet und die darunter befindlichen neuen beschreibt. Die von Französischen Autoren als grönländisch angegebenen Arten stammen oft nicht von dort her; die neun von Fabricius in seiner Fauna grönlandica angeführten Arten sind zum grössten Theile unrichtig bestimmt, so dass also sichere Nachrichten über die Lepidopteren Grönlands bisher nicht vorliegen und der hier gegebene Beitrag zur Kenntniss derselben von besonderem Belang ist.

Von den aufgezählten Arten gehören 2 (*Argynnis Chariclea* und *Colias Boothii*) den Rhopaloceren, 15 den Noctuen (*Episema graminis*, *Agrotis islandica*, *rava*, *Dreusenii* n. sp., *Westermanni* n. sp., *Sommeri*, *exulis*, *Polia occulta*, *Plusia parilis*, *diasema*, *gamma*, *Groenlandica* n. sp. (ob Pl. interrogationis var.?), *Anarta amissa*, *leucocycla* und *algida*), 2 den Geometren (*Cidaria polata*, *Chimatobia brumata*) und 1 (*Pempelia carbonariella*) den Tineen an.

A Manual of British Butterflies and Moths, by H. T. Stainton. Vol. I. (Comprising the butterflies and stout-bodied moths). London, I. van Voorst. 1857. (8. 338 pag.). Dieses sowohl in seiner Ausstattung als Abfassung sehr zweckmässige und gefällige Handbuch, von dem im vorigen Jahresbericht nur die erste bis dahin erschienene Lieferung angezeigt wurde, ist in seinem Erscheinen so rüstig fortgeschritten, dass in dem gegenwärtig abgeschlossen vorliegenden ersten Bändchen schon die Familien der Rhopalocera, Sphingides, Bombyces und Noctuae vollständig abgehandelt sind. Die eben so sauber ausgeführten als sehr charakteristischen Holzschnitte, welche dem Texte eingedruckt sind

und von der Mehrzahl der Gattungen einen Repräsentanten darstellen, werden dem angehenden Lepidopterologen die Bestimmung seiner Arten gewiss in hohem Grade erleichtern und die kurz gefasste Charakteristik der Arten mit besonders scharfer Hervorhebung ihrer unterscheidenden Merkmale so wie auch die den Beschreibungen vorangehenden analytischen Tabellen sind nur geeignet, demselben das Studium der heimischen Lepidopteren in bester Weise zugänglich zu machen. Am wenigsten dem Zwecke des Buches angemessen erscheint wohl die Annahme der zahlreichen neueren Gattungen z. B. unter den Bombyciden, die bei Berücksichtigung der exotischen Formen zum Theil sich nicht einmal als gehörig begründet erweisen und welche, da sie meist nur eine oder zwei inländische Arten umfassen, dem Anfänger nur die Uebersicht erschweren können.

In seinem *Entomologist's Annual* 1857, p. 97—130 gab derselbe Verf. Beschreibungen von 17 in England neu aufgefundenen Arten, welche mit Ausnahme einer *Noctua* (*Leucania Vitellina*) den Tortrices und Tineinen angehören; die meisten sind neue Arten und zum Theil auf beifolgender Tafel abgebildet. Dieser Publikation schliesst sich wie bisher eine Aufzählung seltnerer Arten an, die im J. 1856 in verschiedenen Gegenden England's gefangen worden sind.

Von der Belgischen Entomologischen Gesellschaft ist in ihren *Annales de la soc. entomol. Belge* I. p. 1—110 ein neues Verzeichniss der Schmetterlinge Belgiens veröffentlicht worden, welches gegen das von Selys-Longchamps im J. 1845 herausgegebene um eine Anzahl von Arten vermehrt ist. Die Aufzählung ist wie dort nach der Reihenfolge des Boisduval'schen Catalogs der Europäischen Lepidopteren vorgenommen, die einzelnen Arten mit Notizen über Vorkommen, Futterpflanze der Raupe u. s. w. versehen. Bis jetzt liegen nur die *Macrolepidoptera* bis zum Schlusse der *Noctuen* vor und zwar kommen auf die *Rhopaloceren* 94, die *Sphingiden* 38, die *Bombyciden* 113 und die *Noctuen* 232 Arten.

Snellen van Vollenhoven theilte in den *Mémoires d'entomologie, publiés par la soc. entom. des Pays-Bas* I. p. 99—131 Beobachtungen über die ersten Stände und die

Lebensweise einer Anzahl inländischer Lepidopteren aus den Familien der Rhopaloceren, Sphingiden, Bombyciden, Noctuen und Geometriden mit. („Eenige opmerkingen omtrent de eerste toestanden en leefwijze van sommige soorten onzer inlandsche Macrolepidoptera.“) Da der Raum es nicht gestattet, auf die einzelnen Beobachtungen des Verf. näher einzugehen, dieselben auch wenigstens zum Theil nur von untergeordnetem Interesse sind, so beschränkt sich Ref. auf die Anführung der einzelnen Arten, über welche Mittheilungen gemacht werden.

Diese sind: *Vanessa Cardui*, *Hipparchia Egeria*, *Sesia apiformis*, *Deilephila Celerio*, *Saturnia Carpini*, *Notodonta Camolina*, *Hepialus sylvinus*, *Lithosia eborina*, *Pygaera reclusa*, *Euprepia urticae*, *Cymatophora octogesima*, *Agrotis segetum*, *exclamationis*, *valligera*, *tenebrosa*, *Noctua augur*, *baja*, *brunnea*, *festiva*, *bella*, *C-nigrum*, *triangulum*, *ditrapezium*, *plecta*, *Triphaena comes*, *sinbria*, *janthina*, *Polia herbida*, *Apamea didyma*, *strigilis*, *testacea*, *basilinea*, *Mithymna xanthographa*, *Orthosia instabilis*, *gracilis*, *Caradrina Morpheus*, *cubicularis*, *alsines*, *Simyra venosa*, *Leucania pallens*, *straminea*, *obsoleta*, *lithargyrea*, *Nonagria paludicola*, *typhae*, *Gortyna micacea*, *Xanthia ferruginea*, *Cosmia subtusa*, *Xylina putris*, *polyodon*, *Cleophana pinastri*, *Abrostola urticae*, *triplasia*, *Plusia festucae*, *chrysitis*, *jota*, *Heliothis marginata*, *Fidonia aescularia*, *Acidalia bilineata*, *Eupithecia subnotata*, *Cidaria ligustraria*, *montanaria*, *Zerene rubiginata* und *marginata*.

Ver Huell, „Eigenschaften van twee exotische Lepidoptera“ (ebenda p. 131 f.). Der Verf. berichtet über die eigenthümliche Flugart der Brasilianischen *Nymphalis Feronia* Cramer und bemerkt, dass *Urania Patroclus* Cram. an der Küste von Borneo in mehreren Exemplaren auf einem Schiffe gefangen worden sei.

„Nederlandsche schubvleugelige Insekten, Lepidoptera, medegedeeld door H. W. de Graaf, te Leiden.“ (Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland I. p. 1—50.) Der Verf. giebt ein systematisches Verzeichniss der in Holland als einheimisch bekannt gewordenen Lepidopteren mit Citaten von Abbildungen und Beschreibungen der einzelnen Arten, so wie auch mit Angaben über ihre speziellen Fundorte. — Rhopalocera 61, Sphingides 18, Chelonariae et Bombyces 99, Noctuae 216, Geometrae 176, Pyralides 48, Tortrices 85, Tineina 148, Pterophoridae 13, im Ganzen 864 Arten.

Desselben „Aanvulling der Nederlandsche schubvleuge-

lige Insekten, Lepidoptera“ (ebenda I. p. 215—269) ist ein durch fernere Entdeckungen bereichertes Verzeichniss der Holländischen Macrolepidoptera bis zum Schlusse der Noctuen, mit steter Angabe aller dem Verf. bekannt gewordenen Fundorte der einzelnen Arten in Holland, so wie mit kurzen Angaben über die Erscheinungszeit und die Nahrungspflanze der Raupe.

In gleicher Weise abgefasst ist auch die „Tweede Aanvulling der Nederlandsche schubvleugelige Insekten“ desselben Verf.'s (ebenda II. p. 143—204), die sich von der vorhergehenden ausser der Hinzufügung einzelner neuer Arten noch durch die angefügte Aufzählung der Geometrae unterscheidet.

Desselben „Dierkundige Verscheidenheden, Opmerkingen over Lepidoptera (ebenda II. p. 71—73) handeln über *Lycæna Aegon*, *Satyrus Statilinus*, *Colias Hyale* und die Raupe von *Lasiocampa quercifolia*.

Ein Verzeichniss der in Roesel von Rosenhof's „De naturlijke historie der Insekten“ abgebildeten Europäischen Schmetterlinge stellte Metzner (Bouwstoffen voor eene Faunavan Nederland I. p. 112 ff.) zusammen.

Ein sehr reichhaltiges Verzeichniss der in der Umgegend von Fiume vorkommenden, von ihm selbst gesammelten Lepidopteren stellte Mann (Wiener Entomol. Monatsschr. I. p. 143—189) zusammen; dasselbe erstreckt sich auf alle Familien der Macro- und Microlepidoptera und enthält Angaben über die Flugzeit und die speciellen Fundorte der einzelnen Arten; einige darunter befindliche neue werden kurz charakterisirt.

Lepidopteren-Fauna von Mährisch-Trübau, systematisch zusammengestellt von R. Czerny (Verhandl. des zoolog.-botan. Vereins in Wien VII. p. 217—224). — Es sind darin die Macrolepidopteren mit Einschluss der Geometriden verzeichnet, deren Artenzahl 586 beträgt.

J. Müller, Prodrömus der Lepidopteren-Fauna von Brünn (Lotos, 6. Jahrg. p. 143—166 ff.) — Ein Namensverzeichniss der um Brünn vorkommenden Schmetterlinge aus den Familien der Rhopaloceren, Sphingiden, Bombyciden und Noctuen.

J. Mayburger, die Schmetterlinge der Umgebung Salzburg's (Jahresbericht der K. K. Unter-Realschule in Salzburg 1856—57) ist im Literaturblatte der Allgem. Deutschen Naturhist. Zeitung III. No. 12 angezeigt. Hiernach sind von dem Verf. die in der Umgebung von Salzburg vorkommenden Schmetterlinge nach Ochsenheimer systematisch zusammengestellt und zwar die Rhopaloceren durch 113, die Sphingiden durch 34, die Bombyciden durch? (die Angabe fehlt hier), die Noctuen durch 135 und die Geometriden durch 103 Arten vertreten.

„Lepidopterologische Beobachtungen“ von La Roquette (Allgem. Deutsche Naturhist. Zeitung III. p. 296 — 312 und p. 343—350) enthalten Mittheilungen über die ersten Stände einer Anzahl einheimischer Heteroceren, ihre Lebensweise und Verwandlungsgeschichte.

Assmuss lieferte (Entom. Zeitung p. 381—391) einen „Beitrag zu einer Aufzählung der Lepidopteren in den Moskau'schen, Kaluga'schen und Tambov'schen Gouvernements. Diese Aufzählung erstreckt sich vorläufig auf die Rhopalocera und enthält Angaben über die speziellen Fundorte, die Häufigkeit und die Flugzeit der einzelnen Arten.

Melitaea 7, Argynnis 13, Vanessa 10, Limenitis 2, Apatura 1, Hipparchia 16, Lycaena 13, Polyommatus 7, Thecla 5, Pieris 7, Colias 6, Papilio 2, Doritis 1, Hesperia 12 Arten.

Bellier de la Chavignerie, Observations sur les Lépidoptères des Basses-Alpes (Annal. de la soc. entom. V. p. 587—597). Diesmal wird hauptsächlich eine Aufzählung der vom Verf. in den Basses-Alpes gesammelten Noctuen nebst Bemerkungen über ihr Vorkommen gegeben; ausserdem werden auch einige Geometriden und Microlepidopteren erwähnt.

Derselbe, Observations sur quelques Lépidoptères d'Islande (ebenda p. 5—12). — Bemerkungen über 17 Arten Lepidopteren (Noctuen, Geometriden und Microlepidopteren), die von Staudinger in Island gesammelt worden sind, und über welche letzterer selbst (siehe oben unter Insekten!) in viel umfassenderer und gründlicherer Weise Auskunft gegeben hat.

Der Verf. glaubt *Agrotis Islandica* Staud. für *A. obelisca* W. V. Archiv f. Naturgesch. XXIV. Jahrg. 2. Bd.

var. halten zu müssen; *Hadena borea*? Staud. ist nach ihm nicht mit *Had. borea* Boisduv. identisch, sondern wahrscheinlich gleich *Had. adusta* var.

Bruand (Bullet. de la soc. entomol. p. CVI ff.) gab eine Aufzählung der von ihm in der Umgegend von la Grande-Chartreuse gesammelten Lepidopteren.

Rhopalocera. Hewitson's Exotic Butterflies, being Illustrations of new species Pt. 21—24 bringen abermals die Beschreibung und Abbildung einer grösseren Anzahl neuer Süd-Amerikanischer Arten dieser Familie; neben den schon früher behandelten Gruppen der Heliconier, Nymphaliden, Satyriden, Eryciniden und Pieriden ist diesmal auch mit den Hesperien, denen zwei Tafeln gewidmet sind, begonnen worden.

Fr. Moore hat (Proceed. of the zoolog. soc. of London 1857, p. 102 ff. pl. 44. 45 — auch abgedruckt in den Annals and magaz. of nat. hist. XX. p. 383 ff.) einige neue Tagfalter aus Nord-Indien bekannt gemacht: „Descriptions of some new species of Lepidopterous Insects from Northern India“. Dieselben gehören den Gruppen der Equites und Pieriden an.

Sallé (Annales de la soc. entomol. V. p. 20 ff.) gab eine Notiz über die schon von v. Humboldt erwähnten sackartigen Raupennester aus Mexiko, welche unter dem Namen *Capullo de Madroño* bekannt sind. Die Schmetterlinge, deren Raupen diese Säcke verfertigen, gehören nicht zu den Bombyciden, wie v. Humboldt angiebt, sondern zu den Rhopaloceren. Sallé glaubt, dass nach den Puppen eine *Hesperia* darunter zu vermuthen sei (Schmetterlinge sind nicht ausgekommen), Boisduval giebt aber an, dass es die Gattung *Euterpe* sei und weist auf Westwood's Mittheilung über den Gegenstand in den Transact. of the entomol. soc. I. p. 38 hin.

Standfuss hat seine „Bemerkungen über einige an den Küsten von Spanien und Sicilien fliegende Falter“ in der Entomol. Zeitung XVIII. p. 21—35 zu Ende geführt. Es werden darin folgende Arten mehr oder weniger ausführlich abgehandelt: *Thecla Aesculi* (deren Artrechte von Th. Ilcicis dem Verf. zufolge vielleicht zu beanstanden sind), *Leucophasia Sinapis*, *Pieris Brassicae*, *rapae*, *Anthocharis Daplidice*, *Cardamines*, *Colias Edusa*, *Rhodocera Cleopatra*, *Papilio Podalirius* (Feisthamelii), *Machaon*, *Syrichthus malvarum*, *marubii* (wobei zugleich die Artrechte von *Syr. altheae* ausführlich begründet werden), *lavaterae*, *Proto*, *Sertorius*, *Thanaos Tages*, *Hesperia lineola*, *Actaeon* und *pumilio*.

Th. Sendtner theilte (ebenda p. 46 ff.) Notizen über das Vorkommen von Alpenfaltern im Bayerischen Hochgebirge mit; bei der Beschreibung von lepidopterologischen Excursionen auf die Allgäuer Berge im Bayerischen Schwaben geht der Verf. auf die vertikale Ver-

breitung einer Anzahl Tagfalter, besonders aus den Gruppen der Hipparchien, Lycaeniden und der Gattung *Colias* ein, für welche er ihr niedrigstes und höchstes Vorkommen vermerkt.

Equites. — Montrouzier beschrieb in seiner Fauna der Insel Woodlark (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VIII. p. 394 ff.): *Ornithoptera Boisduvalii* (6—6½ Zoll Flügelspannung), *Papilio Ormenus* Boisd. fem., *Dunali*, *Severus* (Cram.?), *Godartii*, *Aegistus* und *Telemachus* als neue oder weniger gekannte Arten aus dem Neuholändischen Archipel.

Papilio Janaka Moore (Proceed. zoolog. soc. 1857. p. 102 ff. pl. 45) ist eine neue Art von Darjeeling; sie ist 5 Zoll breit, mit *Pap. Bootes* zunächst verwandt.

Die Larve und Puppe des *Papilio Policenes* Cram. von Port Natal wurden durch Saunders (Transact. of the entomol. soc. IV. pl. 13. fig. 1) abgebildet.

Pieridae. — *Leptalis Rhetes* Boisd. i. l. wurde von Hewitson (Exotic Butterflies, pt. 24) als n. A. aus Columbia beschrieben und abgebildet, ebenso *Leptalis Orise* Boisd.

Pieris Nama (Doubleday mscpt.), *Seta*, *Sanaca*, *Indra* und *Durasa* Moore (Proceed. zoolog. soc. of London 1857. p. 102 ff., pl. 44., Annals and magaz. of nat. hist. XX. p. 383 ff.) sind neue Arten aus Nord-Indien.

Terias Arabella (Lefébvre Mscpt.) wurde von Lucas (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 220) als neue Art von Cuba beschrieben.

Bellier de la Chavignerie (Annales de la soc. entomol. V. p. 600) machte die Raupe der *Anthocharis Simplonia* bekannt; sie lebt in den Bassen-Alpes auf einer Höhe von 1800 bis 1900 Mètres auf mehreren Cruciferen-Arten zu Ende des Juli, überwintert als Puppe und giebt im April und Mai des folgenden Jahres den Schmetterling.

C. Amerling, „Interessante Wanderung der Kohlraupe am Smichow bei Prag“ (Lotos 6. Jahrg. p. 196) handelt über massenhaftes Auftreten dieser Art.

Danaidae. — *Euploea transfixa*, *Hisme* (Boisd.?) und *Vitella* (Cram.?) wurden von Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VIII. p. 404) als Arten von der Insel Woodlark beschrieben.

Heliconidae. — Hewitson (Exotic Butterflies pt. 21) gab Beschreibungen und Abbildungen von sechs neuen Arten aus Neu-Granada: *Ithomia Alema*, *Amalda*, *Cidonia*, *Roxena*, *Ulla* und *Zabina*.

Nymphalidae. — Neue Arten aus Süd-Amerika, von Hewitson (Exotic Butterflies, pt. 21—24) beschrieben und abgebildet, sind: *Cybelis Capenas* vom Amazonenstrom, *Caralis*, *Caresa*, *Carias*, *Catagramma Yeba* und *Tryphena* aus Neu-Granada, *Aretas* aus Vene-

zuela (Pt. 21). — *Epiphile Epimenes*, *Epicaste* und *Eriopis* aus Neu Granada (Pt. 22), *Callithea Markii* und *Eubagis Gisella* aus Neu Granada, *Onias* vom Amazonasstrom, *Callithea Batesii* Hew. nochmals abgebildet (Pt. 23), *Eresia Emerantia* und *Eranites* aus Neu Granada, *Esora* aus Brasilien (ist = *Eresia Eunica* Boisd. nec Hübn.) und *Ezorias* (ist = *Eresia Phillyra* Hew. mas) aus Mexico.

Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VIII. p. 406) beschrieb *Limenitis Woodlarkiana* als neue Art von der Insel Woodlark und ausserdem *Diadema Lassinassa* Boisd.

Megalura Poeyi (Lefébvre mscpt.) wurde von Lucas als neue Art von Cuba bekannt gemacht (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 241).

Morphidae. — Ueber die prachtvollen Ostindischen Arten dieser Gruppe hat Westwood in einem Aufsatz: „On the oriental species of Butterflies related to the genus Morpho“ (Transact. of the entomol. soc. IV. p. 158—189. pl. 17—21) gehandelt. Der Verf. diskutirt in einer umfangreichen Einleitung die Merkmale, nach denen überhaupt die Tagfalter zu classificiren sind und geht auf die Ansichten der früheren Autoren (Swainson, Horsfield u. a.) über die Stellung der Morphiden zu den übrigen Gruppen der Lepidoptera diurna, unter Anderem auch auf den Vergleich, den sie mit den Gallinaceen unter den Vögeln und den Hufern unter den Säugethieren haben aushalten müssen, näher ein. Besonders sind es die Raupen der in ihren ersten Ständen bekannt gewordenen Arten, welche mit denen der verwandten Nymphaliden und Hipparchien in Vergleich gebracht werden; wenn nach diesen die Morphiden eine entschiedene Verwandtschaft mit den Hipparchien zeigen (wozu ausserdem noch die Ocellen auf der Unterseite der Flügel bei der Imago kommen), so nähert sich der ausgebildete Schmetterling doch entschieden mehr der Nymphaliden-Form; sie bilden daher am passendsten eine eigene Gruppe, die zwischen jene beiden einzuschalten ist. Uebrigens lassen sich nach Westwood die Gattungen *Discophora*, *Zeuxidia*, *Amathusia*, *Dyctis* und *Kallima* von den Morphiden durch keine auch nicht einmal künstliche Demarkationslinie trennen. — Die drei Ostindischen Morphidengattungen, deren Arten im folgenden Theil der Arbeit beschrieben und zum Theil abgebildet werden, sind *Thaumantis* Hübn., *Drusilla* Swains. und *Clerome* Boisd. Die Arten der ersten Gattung sind: *Thaumantis Odana* God. (*Morpho* Klugius Zinken pro parte), *Diores* Doubl., *Ramdeo* n. sp. von Darjeeling (ob Varietät der vorigen Art?), *Klugius* Zinken, *Lucipor* Westw. (auf pl. 19 in beiden Geschlechtern abgebildet), *Noureddin* Westw. (auf pl. 20 in beiden Geschlechtern abgebildet), *Aliris* n. sp., eine prachtvolle Art, deren Weib auf pl. 17 abgebildet wird, *Camadeva* Westw., *Howqua* Westw. (Abbildung auf pl. 18), *Nourmahal* Westw. (Weibchen auf pl. 18 abgebildet). — Zu

den fünf bekannten Arten der Gattung *Drusilla* (*Urania* Lin., *Horsfieldii* Swains., *Catops* Boisd., *Selene* Boisd. und *Mylaecha* Westw.) wird eine neue unter dem Namen *Drusilla Phorcas* (Abbildung auf pl. 21) hinzugefügt, deren Fundort nicht bekannt ist. — Die Gattung *Clerome* umfasst ausser den bekannten Arten (*Arcesilaus* Fab., *Eumeus* Drury, *Phaon* Er. und *Faunula* Westw.) noch zwei neue: *Clerome Stomphax* (pl. 21. fig. 3 und 4) von Borneo und (*Xanthotaenia*) *Busiris* von Malacca. — Die bisher den Nymphaliden beigezählte Gattung *Discophora* wird ebenfalls mit einer neuen Art: *Discophora Zal* (pl. 21. fig. 5 u. 6) aus Ostindien bereichert.

Satyridae. — *Pronophila Prosymna* und *Propylea* sind zwei neue Arten aus Neu-Granada von Hewitson (*Exotic Butterflies* pt. 23); ebenda wird *Pron. Zapatoza* Westw. nochmals abgebildet.

Haetera diaphana Boisd. i. lit. wurde als neue Art aus Cuba von Lucas (*Historia fisica de la isla de Cuba* VII. p. 252) beschrieben.

Erycinidae. — Hewitson (*Exotic Butterflies*, pt. 24) gab Abbildungen und Beschreibungen von *Mesosemia Mevania* n. A. aus Neu-Granada, *Lamachus* Boisd. i. l. aus Honduras und *Moesia* aus Brasilien; ausserdem wird *Mesosemia Telegone* Boisd. nochmals beschrieben und abgebildet.

Lycaenidae. — In der *Historia fisica de la isla de Cuba* VII. p. 257 ff. wurden von Lucas folgende neue Arten von Cuba bekannt gemacht: *Thecla Marius* Boisd. i. l., *Paseo* Leféb. mscpt., *Aon* Leféb. mscpt., *Celida* Boisd. i. l., *Tollus* Boisd. i. l., *Lycaena Theonus* Leféb. mscpt., *Ammon* Leféb. mscpt. und *Astenida* Boisd. i. l.

Als neue Art aus Spanien wurde *Polyommatus Miegii*, mit *P. Virgaureae* zunächst verwandt, von Vogel (*Allgem. Deutsche Naturhist. Zeitung* III. 1857. p. 201) beschrieben und auf einer beifolgenden Tafel in beiden Geschlechtern abgebildet.

Lederer (*Wiener Entomol. Monatsschr.* I. p. 25—32) schrieb „über die Lycaeniden-Gattungen der Europäischen Fauna.“ Er giebt ein berichtigtes Namensverzeichniss der Europäischen und Klein-Asiatischen Lycaeniden-Arten mit Hinzufügung der hauptsächlichsten Synonyme und der Varietäten, ordnet dieselben in natürliche Gruppen nach der Bildung der Flügel, der Färbung u. s. w. und modificirt den Umfang der bisher angenommenen Gattungen in so fern, als er nur Arten mit nackten und mit behaarten Augen vereinigt lässt (jedenfalls ein Gattungsmerkmal von sehr prekärer Bedeutung, dessen Haltbarkeit mindestens erst durch die zahlreichen exotischen Arten bestätigt werden müsste). Gattungen mit nackten Augen sind *Cigarites* Luc. (einzige Art *L. Acamas* Klug) und *Polyommatus* Latr. (ausser den goldrothen Arten auch zahlreiche Bläulinge einschliessend); mit behaarten Augen: *Lycaena* Fab. mit normal gebildeten Beinen (die übrigen

Bläulinge und die Thecla-Arten der Autoren umfassend) und Thestor Hübn. mit kolbigen Vorderschenkeln, sehr kurzen Vorder- und Mittelschienen, von denen entweder erstere oder auch beide durch eine starke hornige Krallen ausgezeichnet sind (Ballus Fab., Callimachus Ev. und Nogellii Herr.-Schff.).

Hesperiadae. — Hewitson (Exotic Butterflies pt. 22) machte folgende neue Arten durch Abbildungen und Beschreibungen bekannt: *Pyrrhopyga Patrobas* aus Neu-Granada, *Papias* vom Amazonasstrome, *Praecia* und *Plutia* ebendaher, *Paseas* aus Brasilien, *Pityusa* und *Pionia* aus Neu-Granada, *Pieria* vom Amazonasstrome und *Pialia* aus Brasilien.

Von Lucas (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 267 ff.) wurden folgende neue Arten von Cuba (von Lefébvre in Mscpt. benannt) beschrieben: *Eudamus Santiago*, *Habana*, *Batabano*, *Sumadue*, *capucinus*; *Trinidad*, *San-Antonia*, *Maysi*, *Jagua*, *Thanaos Velasquez*, *Potrillo*, *Jarucco*, *Hesperia Alamada*, *Misera*, *Baracoa* und *radians*.

„Die körperlichen Auszeichnungen der Europäischen Hesperiden“ erörterte Lederer (Wiener Entomol. Monatsschr. I. p. 75--80). Die Arten zerfallen zunächst in zwei Gruppen: 1) Hinterschienen mit Mittel- und Endspornen — hierzu gehören alle schwarz und weiss gewürfelten Arten, die Arten der Gruppe *H. lineola*, *comma* etc. und *H. Steropes*. 2) Hinterschienen nur mit Endspornen, Mittelschienen mit Dornborsten — hierher nur *H. Paniscus*, *Sylvius* und *argyro stigma* Eversm. — Die Arten der ersten Gruppe zerfallen wieder in solche, deren Männchen die Hinterschienen mit einem Haarpinsel und den Hinterleib mit zwei convergirenden häutigen Stielen über einer tiefen Grube besetzt haben, und in solche, wo diese Merkmale fehlen. Unter diesen und weiteren Unterabtheilungen sind die Europäischen und Klein-Asiatischen Arten namentlich aufgeführt und mit Bemerkungen über ihre Varietäten versehen.

Die Raupe der *Hesperia lineola* Ochs. wurde von de Graaf (Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland I. p. 187) beschrieben.

Sphingides. Als neue Arten wurden bekannt gemacht:

Von Hopffer (Monatsberichte der Berlin. Akad. d. Wissensch. 1857. p. 421): *Nephele comma* n. A. aus Mossambique.

Von Lucas (Annales de la soc. entomol. V. p. 601 -608. pl. 13): *Zonilia Schimper* und *Smerinthus abyssinicus*, n. A. von Chartum; erstere ist mit *Zon. Morpheus* Cram. verwandt, letztere, nur im weiblichen Geschlechte beschrieben, scheint nach dem im hiesigen Museum aus Guinea befindlichen Männchen von *Smerinthus* generisch abzuweichen.

Von demselben (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 289): *Macroglossa Lefébvrei* n. A. aus Cuba.

Von Newman (Transact. of the entomol. soc. IV. p. 54):
Deilephila Dalii und *Macroglossa Nox* von Moreton-Bay.

Sauunders gab (ebenda pl. 13. fig. 2) die Abbildung einer schönen Sphinx-Raupe von Port Natal, aus der Verwandtschaft der *Sph. Nerii*, deren Schmetterling bis jetzt nicht bekannt ist.

Kirtland (Proceed. of the acad. of nat. scienc. of Philadelphia 1857. p. 148) beschrieb die von Swainson unrichtig abgebildete Raupe des *Thyreus Abbotii*, welche von den Blättern der *Ampelopsis quinquefolia* lebt und ihre vollständige Grösse im August erreicht.

Nach Boie (Entom. Zeitung p. 192) lebt die Raupe von *Sphinx Elpenor* bei Kiel auf *Epilobium angustifolium* und *Impatiens noli me tangere*. — Laubenheimer (Sechster Bericht der Oberhessisch. Gesellsch. f. Natur- und Heilkunde 1857. p. 82) fand die Raupe der *Deilephila Euphorbiae* auf *Polygonum aviculare* und ernährte sie damit bis zur Verwandlung.

Mittheilungen über die Lebensweise der Raupe von *Sesia conopiformis* Esp. machte Libbach (Berlin. Entomol. Zeitschr. I. p. 159).

Chelonariac. Von Hopffer (Monatsberichte der Berlin. Akad. d. Wissensch. 1857. p. 421 f.) wurden *Arniocera* (n. g.) *auriguttata*, *Syntomis bifasciata*, *Crocota unicolor* und *Aletis Libyssa* als neue Arten aus Mossambique vorläufig durch Diagnosen bekannt gemacht.

Von Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VIII. p. 409 ff.): *Glaucopis Boisduvalii*, *Leptosoma bimaculatum*, *Haxis translucida*, *Lithosia leucomelas* und *formosa* als neue Arten von der Insel Woodlark beschrieben.

Von Lucas (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 283 ff.): *Glaucopis syntomoides* Boisd. i. l., *Amphitrite* Boisd. i. l., *Thomae* Boisd. i. l., *Glaucopis? mors* Leféb. und *Ctenucha virgo* Boisd. i. l. als neue Arten von Cuba aufgestellt.

Derselbe erwähnte (Bulletin de la soc. entomol. V. p. XIX) eine Farben-Varietät der *Arctia fulginosa* von Tanger, deren klimatische Abweichungen von den Europäischen Individuen er erörtert.

Bellier de la Chavignerie (Annales de la soc. entom. V. p. 600) beschrieb die Raupe der *Arctia sordida* Hübn. Sie erinnert an die der *A. menthastri*, ist bei Larche in den Basses-Alpes sehr häufig und lebt auf verschiedenen niederen Pflanzen.

Pfaffen-zeller (Entomol. Zeitung p. 84—90) machte interessante Mittheilungen über die Lebensweise der seltenen *Euprepia flavia*, welche auf einer beifolgenden Tafel in ihren drei Entwicklungsstadien abgebildet wird. Die Raupe lebt im Ober-Engadin 6000'

hoch auf Felsen, wo sie sich von *Mespilus cotoneaster* ernährt; sie ist schwarz, mit sehr langen, grünlich gelben Haaren gürtelweise besetzt, überwintert zweimal und ist ausgewachsen fast vier Zoll lang. Sie verpuppt sich in einem Gespinnst tief zwischen Felsenspalten gegen Ende Juni's; der Falter erscheint zu Ende Juli und Anfang August's.

Dieselbe Art wurde auch von G. Bischoff (Zehnter Bericht des Naturhist. Vereins in Augsburg 1857. p. 43 ff.) nach allen drei Ständen beschrieben und auf einer beifolgenden Tafel durch Geyer sehr schön abgebildet; der Verf. giebt ausführliche Mittheilungen über die Zucht der Raupe, die er mit niederen Pflanzen, (*Leontodon*, *Plantago*, *Euphorbia*, *Alsine*) fütterte.

J. Müller (Wiener Entom. Monatsschr. I. p. 88) fütterte die Raupen der *Pleretes matronula* mit *Lonicera* und brachte sie binnen zwei Monaten (Juli und August) zum vollendeten Wachsthum; sie überwinterten, verspannen sich Anfangs April und lieferten binnen vier Wochen den Schmetterling.

Hepialini. Assmuss (Wiener Entom. Monatsschr. I. p. 137) beschrieb die Raupe von *Hepialus sylvinus*, welche in den Wurzeln von *Lavatera communis*, ausserdem auch in denen von *Malva* und *Alcea* lebt; nach 22 Tagen im August entwickelt sich daraus der Spinner.

Bombycides. Neue Arten sind: *Nyctemera Leuconoë* und *Lacipa gracilis* Hopffer (Monatsberichte der Akad. d. Wissensch. zu Berlin 1857. p. 422) aus Mossambique, *Castulo Doubledayi* Newman (Transact. of the entomol. soc. IV. p. 55) von der Moreton-Bay, *Oikeiticus Poeyi* Lucas (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 303. pl. 17. fig. 6) aus Cuba, *Lebeda cuneilinea* Walker (Transact. of the entom. soc. IV. p. 58. pl. 15) von Port Natal, *Bombyx psidii* Sallé (Annales de la soc. entomol. V. p. 15 ff.) aus Mexiko; letztere Art ist eine Gastropacha, welche unseren einheimischen *G. quercus*, *rubi* und *trifolii* nahe steht.

Sallé, Note sur la soie sauvage du Mexique et description du *Bombyx*, qui la produit (Annales soc. entomol. p. 15—19) machte ausser dem Schmetterlinge in beiden Geschlechtern auch die Raupe der *Bombyx psidii* bekannt (Abbildung auf Taf. I); sie ist der Raupe der *B. rubi* sehr ähnlich, lebt auf *Psidium pyrifera* in Vera-Cruz und fertigt ein Cocon an, welches, wie schon v. Humboldt erwähnt, zum Spinnen von Seide in Mexiko benutzt wird.

Die ersten Stände einiger Bombyciden von Port Natal bildete Saunders (Transact. of the entomol. soc. IV. pl. 13—15) ab; von *Attacus Mythimna* Westw. Raupe und Gespinnst pl. 13; von *Anthona arata* Westw. Raupe und Puppe, von *Egybolia Vaillantina* Boisd. die ersten Stände und den Schmetterling, ausserdem eine Raupe, die mit

den beiden vorigen nahe verwandt scheint, pl. 14; die drei Entwicklungszustände der *Lebeda cuneilinea* Walk. und eine Raupe nebst Puppe von einer unbekannten Art, die aber den Gastropachen nahe verwandt sein muss, pl. 15.

Lucas (Bullet. d. l. soc. entomol. p. XXXIV) machte Mittheilungen über eine aus Nord-Afrika stammende Varietät der *Clostera reclusa* Fabr.

Psychidae. — Millière, „Création d'un genre nouveau *Apterona* et histoire des insectes, qui le composent.“ (Annales de la soc. Linnéenne de Lyon IV. 1857. p. 181 ff.) theilte (bereits bekannte) Beobachtungen über die Entwicklung von Raupen aus unbefruchteten Eiern dreier Psychiden mit, die er in Rücksicht darauf, dass ihm die Männchen derselben nicht bekannt geworden sind (weshalb er meint, sie existirten überhaupt nicht), zu einer eigenen Gattung *Apterona* erhebt. Die eine dieser Arten ist *Psyche helicinella*, die beiden anderen werden als neu beschrieben und *Apterona subtriquetrella* und *pinastrella* genannt; letztere soll in der Form ihres Sackes grosse Aehnlichkeit mit *Solenobia pineti* Zell. haben, von der sie der Verf. hauptsächlich aus dem Grunde trennen will, dass von letzterer das Männchen als geflügelt bekannt sei, während ein solches von seiner Art nicht existire (?). — Die Raupen und Säcke aller drei Arten sind auf zwei beifolgenden Tafeln stark vergrössert dargestellt.

Einige Bemerkungen über das Vorkommen von *Psyche atra* Freyer theilte Schedl (Wiener Entomol. Monatsschr. I. p. 73 ff.) mit; er fand die männlichen Raupensäcke, die sonst äusserst selten sind, in grosser Menge, jedoch einerseits anders angesponnen als die weiblichen, andererseits die Säcke beider Geschlechter an verschiedenen Lokalitäten.

Psyche Kahri Lederer (ebenda p. 80) ist eine neue Art aus Neapel.

Noctuae. Hopffer (Monatsberichte der Akad. der Wissensch. zu Berlin 1857. p. 422) machte *Aganais Aphidas*, *Acontia discoides*, *Spirama Pyrula* und *Ophiodes Tettensis* als neue Arten aus Mossambique durch Diagnosen bekannt.

Die schöne Gattung *Phyllodes* Guenée bereicherte Snellen van Vollenhoven (Mémoires d'entomol. des Pays-Bas I. p. 159 ff.) mit einer neuen Art *Phyllodes Verhuelli* von Java; nach der auf pl. 8 gegebenen colorirten Abbildung schliesst sich diese Art, welche mit den bereits bekannten in Färbung und Zeichnung wesentlich übereinstimmend gebildet ist, zunächst an *Ph. inspicillator* Guenée an.

Aspilates Duponchelii Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VIII. p. 410) ist eine neue Art von der Insel Woodlark.

Lederer (Wiener Entomol. Monatsschr. I. p. 88 u. p. 92 ff.)

beschrieb *Orrhodia (Cerastis) torrida* von Palermo, *Bryophila contristans*, *Amphipyra micans*, *Calophasia producta* und *Madopa inquinata* von Beirut.

Desselben „Die Noctuiden Europa's“ sind oben unter Lepidoptera berücksichtigt.

Staudinger (Entomol. Zeitung p. 289—298) lieferte einen „Beitrag zur Kenntniss der nordischen Anarta-Arten,“ in welchem er die 9 im Norden vorkommenden und ihm bekannt gewordenen Arten der Gattung Anarta in ihren Charakteren und ihrer Synonymie feststellt. Es sind folgende: *Anarta myrtilli*, *cordigera*, *melaleuca* Thunb., *melanopa* Thunb. (*vidua*, *tristis* et *rupestris* Hübn., *nigrita* Herr.-Sch.), *amissa* Lef. (*lapponica* Thunb.?), *Zetterstedtii* Staud. n. sp. aus Lappland, *funesta* Payk. (*funebria* Treitschke, *amissa* fem. Lef.), *leucocyclus* Staud. n. sp. aus Grönland und *algida* Lef. (*Schönherri* Zett.?).

Derselbe (Lepidopteren Islands, Entomol. Zeitung p. 232 ff.) beschrieb *Agrotis Islandica* n. sp. nebst ihrer Raupe, welche auf *Plantago latifolia* lebt; setzte ferner die Synonymie der *Hadena exulis* Lef., deren zahlreiche Farbenvarietäten zur Aufstellung mehrerer Arten Anlass gegeben haben, auseinander (Synonyme derselben sind: *Hadena gelata* Lef., *Groenlandica* Dup., *borea* Boisd., *cervina* Germ., *diffusa* Hübn., *gelida* Guen., *poli* Guen., *marmorata* Zett.?) und beschrieb die Raupen von *Hadena exulis* und *Sommeri*.

Derselbe (ebenda p. 302 ff.) beschrieb *Agrotis Dreusenii* und *Westermanni* als neue Arten aus Grönland; von *Plusia interrogatio* wird eine fragliche Varietät (vielleicht eigene Art) unter dem Namen *Plusia Groenlandica* beschrieben.

Bellier de la Chavignerie (Annales de la soc. entom. V. p. 13) beschrieb *Cleophana Ferrieri* als neue Art aus Piemont, im Juni, der subalpinen Region angehörend; Abbildung auf pl. 1.

Eversmann hat seine Aufzählung und Beschreibung der Russischen Noctuen (Les Noctuérites de la Russie, par le Dr. Eversmann) im Bulletin de la soc. imp. des naturalistes de Moscou 1857. I. p. 48—150 und IV. p. 355—439 fortgesetzt und beendet. Die in den beiden vorliegenden Theilen der Arbeit abgehandelten Gattungen sind nach der vom Verf. angenommenen Reihenfolge mit Hinzusetzung der Artzahlen folgende: Xylinidae: *Cucullia* 31, *Xylina* 14, *Cleophana* 4. — Plusiidae: *Abrostola* 3, *Plusia* 30. — Heliothidae: *Heliothis* 13, *Anarta* 13. — Acontidae: *Acontia* 4, *Catephia* 2. — Ophiuridae: *Catocala* 19, *Ophiodes* 2, *Toxocampa* 5, *Ophiura* 12. — Anthophilidae: *Anthophila* 23, *Hydrelia* 3, *Erastria* 4. — Goniatiidae: *Euclidia* 6. — Brepidae: *Brepheos* 2. — Als neu sind folgende Arten zu erwähnen: *Cucullia Inderiensis* vom Ural, *Xylina scenica* vom Altai und Ural, *Cleophana senescens* Nordm. aus Georgien, *Plusia*

siderifera Nordm. von Sarepta, *Catocala Helena* von Kiachtha, *Ophiodes profana* Nordm. aus dem Caucasus, *Ophiusa Astrida* Nordm. aus Armenien.

Diejenigen Europäischen Noctuen, welche sich auch in andereⁿ Welttheilen vorfinden, stellte v. Prittwitz (Entomol. Zeitung p. 138—142) aus Guenée's Werk zusammen und erweiterte die über ihre Verbreitung von Guenée gemachten Angaben durch Hinzufügung neuer Fundorte.

Nach Lucas (Bullet. d. l. soc. entomol. p. XII) kommen *Acronycta tridens*, *Gonoptera libatrix*, *Abrostola triplasia* und *Catocala elocata* ganz übereinstimmend mit den Europäischen Exemplaren auch bei Tanger in Nord-Afrika vor, ebenso (Bullet. p. CXXXVIII) *Agrotis puta* Hübn. und *Glottula Pancratii* Duf. in Algier.

v. Prittwitz (Entomol. Zeitung p. 142) beschrieb die Raupe von *Caradrina uliginosa* Boisd. und setzte ihre Unterschiede von derjenigen der *C. Morpheus* auseinander; sie überwintert im Moos von Kieferwäldern und verpuppt sich im März. — Ebenda p. 372 ff. die Raupe von *Cucullia fraudatrix* Eversm., welche auf *Artemisia vulgaris* lebt und neuerdings auch in Schlesien gefunden worden ist.

Boie (Entomol. Zeitung p. 192), Notiz über die Raupe von *Noctua Haworthii*, welche er zur Gattung *Orthosia* bringen will.

Ueber das Vorkommen der *Noctua basilinea* (Raupe) an Weizen, Mais u. s. w. schrieb Roessler (Jahrbücher d. Vereins f. Naturk. im Herzogthum Nassau XII. p. 392); über dieselbe als dem Getreide schädlich: v. Prittwitz (Entomol. Zeitung p. 372 ff.).

Uranidae. *Urania Mac Leayi* Montrouzier (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VIII. p. 410) ist eine neue Art von der Insel Woodlark.

Geometrae. Staudinger (Lepidopteren Islands, Entom. Zeitung p. 252 ff.) beschrieb als neue Art: *Eupithecia scoriata* und gab eine Charakteristik der Raupen von *Cidaria munitata* Hübn., *caesiata* W. V., *Thulearia* Herr.-Sch., *clutata* Hübn., *Eupithecia scoriata* und *satyrata* Hübn.

Acidalia praeustaria Mann (Wiener Entomol. Monatsschr. I. p. 155) ist eine neue Art von Fiume.

Urapteryx bimaculata (equestraria Boisd.?) n. A. von der Insel Woodlark, von Montrouzier (Annales d. l. soc. d'agriculture de Lyon VIII. p. 411) beschrieben.

Rössler, Ueber *Acidalia straminaria* Tr. und *Acidalia oloraria* n. sp. (Jahrbücher des Vereins f. Naturk. im Herzogth. Nassau XII. p. 393 ff.) glaubt, dass unter der *A. straminaria* der Autoren zwei verschiedene Arten vermengt seien, deren Charaktere er auseinander setzt; indem er der von Treitschke beschriebenen Art den Namen

A. straminaria belässt, stellt er für die zweite, die vielleicht mit der Herrich-Schäffer'schen Art gleiches Namens identisch ist, die Benennung *A. oloraria* auf. Von beiden Arten sind dem Verf. die Raupen bekannt; die der letzteren Art, welche auf *Chenopodium*, *Thymus* u. a. lebt, wird ebenfalls beschrieben.

Derselbe lieferte (ebenda p. 383—392) in seinen „Beiträgen zur Naturgeschichte einiger Lepidopteren“ eine Beschreibung der ersten Stände und ihrer Lebensweise von einer Reihe von Arten dieser Familie. Es sind folgende: *Larentia luctuaria* (Raupe auf *Epilobium montanum*), *Larentia suffumaria* (Raupe auf *Galium*), *Larentia rivaria*, *molluginaria* und *galiaria* (Raupen auf *Galium*), *Larentia silacearia* (Raupe auf *Epilobium montanum*), *Larentia capitaria* und *quadrifasciaria* (Raupen auf *Impatiens noli me tangere*), *Larentia tersaria*, *vitallbaria* und *undularia* (Raupe der letzteren Art auf Saalweiden), *Boarmia abietaria* (die Raupe lebt abweichend von anderen Angaben auf jungen Eichen), *cinctaria* (Raupe auf *Galium*), *Ploseria diversaria*, *Acidalia silvestraria* (Raupe auf Hauswurz, Salat u. a.), *Acidalia suffusaria* (ebenso), *Hemithea bupleuraria* und *Acidalia mutaria* (Raupe auf *Thymus*).

v. Hornig (Wiener Entom. Monatsschr. I. p. 69) beschrieb die ersten Stände der *Gnophos ophthalmicata* Led.; die aus dem Ei erzeugene Raupe wurde mit Salat gefüttert und lebte vom Mai bis zum April des nächsten Jahres.

Kropp (Entomol. Zeitung p. 41 ff.) fand die Raupe der *Larentia strobilata*, von welcher de Geer angiebt, dass sie in grünen Tannenzapfen lebe, in den an Fichten vorkommenden Gallen von *Chermes viridis* und *sanguineus*. Diese Gallen werden von den Raupen oft ganz ausgefressen und erst zur Zeit der Verpuppung verlassen.

Ueber das Weibchen der *Fidonia progemma* Hübn. handelte Snellen van Vollenhoven in einem Aufsatz: „Over het wijfje van *Fidonia progemma* Hübn.“ in den *Mémoires d'entomol.*, publ. p. l. soc. entomol. d. Pays-Bas I. p. 28 ff. Dasselbe ist schon von Kleemann in der Fortsetzung zu Rösel abgebildet, aber von den späteren Autoren verkannt worden.

Pyralides. *Hercyna lugubralis* aus dem Berner Oberland, *Botys concoloralis* und *Spilomela? rectinalis* aus Beirut wurden von Lederer als neue Arten (Wiener Entomol. Monatsschr. I. p. 82 und p. 100 bekannt gemacht.

Tortrices. Millière, Description d'un Platyomide nouveau et histoire des métamorphoses de la larve (Annales de la soc. entomol. V. p. 799—805. pl. 14). — Der Verf. fand in der Gegend von Hyères in den Stengeln von *Asphodelus ramosus* kleine Schmetterlingsraupen, welche sich zur Verwandlung durch eine runde Oeffnung des Stengels aus der Pflanze herausbegaben und zwischen Moos ein-

spannen. Aus den Puppen erhielt er eine mit *Tortrix palleana* und *flavana* verwandte Art, die er für neu hält und unter dem Namen *Hastula hyerana* beschreibt und abbildet. Er theilt diese Art einer besonderen Gattung *Hastula* zu, weil das Männchen gewimperte Fühler besitzt; von der Gattung *Amphisa* Curt., die diesen Charakter theilt, unterscheidet sie der Flügelschnitt, so dass sie zwischen *Tortrix* und *Amphisa* zu stehen kommt.

Stainton (Entomologist's Annual for 1857. p. 100 ff.) beschrieb *Tortrix latiorana* und *Dicrorhampha tanacetii* als neue Arten aus England, Lederer (Wiener Entomol. Monatsschr. I. p. 83): *Cochylis incretana* vom unteren Ural.

v. Hornig (ebenda p. 72) gab von den ersten Ständen der *Grapholitha* *Hornigiana* Led. Nachricht; die Raupe lebt in den Blüthenköpfen der *Inula oculus Christi* und ist Anfangs Juni erwachsen; sie verfertigt sich einen festgeleimten, ovalen Cocon, der sich seiner Zähigkeit wegen schwer zerreißen lässt.

Staudinger (Entomol. Zeitung p. 268) beschrieb die Raupen von *Teras maccana* und *Tortrix pratana*.

Tineina. Stainton's Prachtwerk „The natural history of the Tineina,“ über welches im Jahresberichte 1855. p. 165 nähere Mittheilungen gemacht wurden, ist im J. 1857 mit einem zweiten Bande fortgesetzt worden, welcher die Naturgeschichte von 24 Arten der Gattung *Lithocolletis* enthält. Der Verf. hat hier wie im ersten Bande vorläufig nur solche Arten herangezogen, die ihm nach allen verschiedenen Entwicklungszuständen bekannt geworden sind, und deren Naturgeschichte er daher in durchaus erschöpfender Weise behandeln konnte; die Art, in welcher dies geschehen, ist bereits bei Besprechung des ersten Bandes dargelegt worden. Die acht beifolgenden, sehr sauber ausgeführten Tafeln bringen je drei Arten nebst den ihnen angehörenden Raupen und einem von diesen minirten Blatt ihrer Futterpflanze zur Anschauung, entsprechen also in ihrer Anlage ganz denen des ersten Bandes oder der von Douglas in den *Transact. of the entomol. soc.* 1853 veröffentlichten. Die in dem vorliegenden Bande dargestellten Arten sind: *Lithocolletis viminetorum*, *salicicolella*, *viminiella*, *corylifoliella*, *coryli*, *carpinicolella*, *torminella*, *spinicolella*, *faginella*, *lantanellella*, *vacciniella*, *Bremiella*, *Stettinensis*, *Schreberella*, *alnifoliella*, *sylvella*, *Messaniella*, *ulmifoliella*, *populifoliella*, *Staintoniella*, *quinquenotella*, *trifasciella*, *scabiosella*, *emberizaepennella*.

Eine Aufzählung und Beschreibung der in den Niederlanden vorkommenden Depressarien, 15 an Zahl, lieferte de Graaf in den *Mémoires d'Entomologie publiés par la soc. entom. des Pays-Bas* I. p. 46—63. In den Beschreibungen wird besonders auf die unterscheidenden Charaktere der einzelnen Arten von den zunächst verwandten,

ausserdem auch auf die ersten Stände, wo sie bekannt sind, eingegangen. Die erörterten Arten sind: *Depressaria costosa*, *pallorella*, *assimilella*, *arenella*, *propinquella*, *Alstroemeriana*, *conterminella*, *ocellana*, *Yeatiana*, *applanata*, *angelicella*, *cnicella*, *heracleana*, *pulcherrimella* und *nervosa*.

Desselben „Bijdrage tot de soortkennis der Hyponomeutae of Stippelmotten“ (Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland I. p. 123—137) enthält eine Aufzählung und Charakteristik von 9 in Holland einheimischen Hyponomeuta-Arten, nämlich: *H. rufimitrella*, *20-punctata*, *plumbella*, *irrorella*, *variabilis*, *rorella*, *malinella*, *evonymi* und *padi*.

Mühlig und Frey, Beitrag zur Naturgeschichte der Coleophoren (Vierteljahrsschrift d. Naturf. Gesellsch. in Zürich II. p. 10—28). — Die beiden Verf. erläutern die Naturgeschichte einiger bei Frankfurt a. M. aufgefundenen Coleophora-Arten durch eingehende Beschreibungen der verschiedenen Entwicklungsstufen. Es sind folgende: *Coleoph. silenella* H.-Sch. (Raupe auf *Silene otites*), *nutantella* n. sp. (Raupe auf *Silene nutans*), *dianthi* H.-Sch. (Raupe auf *Dianthus Carthusianorum*), *virgaureae* Staint. (Raupe auf *Solidago virgaurea* H.-Sch.) *succursella* H.-Sch. (Raupe auf *Artemisia campestris*), *odorariella* n. sp. (Raupe auf *Serratula cyanoides*).

Zeller beschrieb (Entomol. Zeitung p. 271 ff.) folgende von Staudinger in Island gesammelte neue Arten: *Crambus extinctellus*, *Plutella septentrionum*, *Gelechia Thuleella* und *Coleophora algidella*.

Stainton (Entomologist's Annual for 1857. p. 104 ff.): *Coleophora genistae*, *inflatae*, *virgaureae*, *vitisella*, *Elachista taeniatella*, *Nepticula lutella* und *atricollis* als neue Arten aus England. — Ebenda p. 121—130 theilte derselbe eine Reihe von Beobachtungen über Britische Tineinen mit, welche sich auf das Vorkommen der Arten, die Futterpflanzen der Raupen u. s. w. beziehen.

Als neue Arten von Fiume wurden von Mann (Wiener Entom. Monatsschr. I. p. 171 ff.) durch kurze Diagnosen bekannt gemacht: *Ephestia rapidella*, *Gelechia lutilabrella* Zell. i. l., *patruella* Zell. i. l., *campicolella* Koll. i. l., *Choreutis micalis* Koll. i. l., *Coleophora flavella* und *drymidis*.

Chimabacche? syriaca Lederer (ebenda p. 102) neue Art von Beirut.

Goureaux (Bullet. de la soc. entomol. p. XXVI) hat aus kleinen Schmetterlingsraupen, die in den Köpfen der *Carlina vulgaris* fressen, eine neue Art der Gattung *Parasia* Dup. gezogen, welche er *Parasia carlinella* nennt. Ausserdem machte derselbe Mittheilungen über die ersten Stände und deren Lebensweise von *Lita Vigeliella* Dup.

Bruand, „Classification des Tinéides et examen des caractères et de leur importance relative d'après la méthode naturelle.“ (Anna-

les de la soc. entomol. V. p. 807—826). Unter diesem vielversprechenden Titel giebt der Verf., nachdem er seine Ansichten über Classification überhaupt dargelegt hat und auf einige Hauptmodifikationen der einzelnen Körpertheile der Lepidopteren eingegangen ist, eine kurze Charakteristik der Tineen im Allgemeinen und sodann der Gruppen „Diurnetae“ mit den Gattungen *Diurnea* Kirby, *Lemmatophila* Tr., *Epigraphia* St. und der „Yponomeutidae“ mit den Gattungen *Myelophila* Tr., *Aedia* Dup. und *Yponomenta*. Unter den Gattungen sind diejenigen Arten dem Namen nach aufgeführt, welche der Verf. als zu denselben gehörig ansieht. — Was mit dieser Probe bezweckt werden soll, hat der Verf. weder angegeben, noch lässt es sich aus derselben ersehen.

Herrieh - Schäffer hat (Correspondenzblatt des zoologisch-mineralog. Vereins in Regensburg XI. 1857. p. 33—67) die von Stainton und Frey verfassten Arbeiten über Tineen einer ausführlichen Besprechung unterworfen und in denselben über eine grössere Anzahl ihrer Arten sein Urtheil abgegeben; ebenso diskutirt er den Umfang der von ihnen angenommenen Gruppen und stellt eine „Verwandtschaftstafel der Tineinen“ auf, in welcher er die Beziehungen der von ihm selbst aufgestellten Gruppen zu einander erörtert.

Pterophoridae. *Pterophorus Islandicus* Staudinger ist eine neue Art aus Island (Entomol. Zeitung p. 280).

Hemiptera.

Ausser den schon erwähnten faunistischen Arbeiten von Montrouzier (Faune de l'île de Woodlark), Guérin (in Ramon de la Sagra's Historia física de la isla de Cuba) und Perris (Nouvelles excursions dans les Grandes-Landes), in welchen neben anderen Insekten-Ordnungen auch besonders die Hemipteren eine Bereicherung an neuen Formen erfahren haben, ist für die vorliegende Ordnung speziell nur noch zu nennen:

Catalogue of the Homopterous Insects collected at Sarawak, Borneo by A. R. Wallace, with descriptions of new species, by F. Walker (Journal of the proceed. of the Linnean society, Zoology I. p. 141—175. pl. 7 u. 8). — Das hier gelieferte Verzeichniss der von Wallace auf Borneo gesammelten Homopteren umfasst im Ganzen 184 Arten, welche den verschiedenen Familien dieser Abtheilung mit Ausnahme der Pflanzenläuse angehören und zum grössten Theil

als neu beschrieben werden. Es findet sich darunter auch eine beträchtliche Anzahl ausgezeichneter Formen, welche zur Begründung neuer Gattungen Veranlassung gaben und von Westwood auf zwei sehr schön lithographirten Tafeln nebst ihren charakteristischen Körpertheilen dargestellt sind. Eine nähere Berücksichtigung finden dieselben bei den einzelnen Familien, denen sie angehören.

Kolenati's Meletemata entomologica, von denen im Bullet. de la soc. imp. des natur. de Moscou 1857. No. II. p. 399—444 der 7. Fascikel erschienen ist, welcher die Homoptera stridulantia des Caucasus enthält, sind ebenfalls bei dieser Familie in Betracht gezogen worden. (Vgl. Stridulantia!)

Als Nachtrag zu den früheren Jahresberichten mag hier noch der von de Graaf und Snellen van Vollenhoven in Herklots' Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland I. p. 169—185 gelieferten systematischen Zusammenstellung der in Holland vorkommenden Hemipteren erwähnt werden. Das Verzeichniss, in welchem die einzelnen Arten mit Citaten aus den bekanntesten Handbüchern und mit Angaben über ihr Vorkommen versehen sind, weist im Ganzen 169 Species auf: Pentatomidae 24, Coreodes 7, Lygaeodes 26, Capsini 32, Membranacei 9, Reduvini 6, Riparii 2, Hydrodromici 7, Nepini 3, Notonectici 3, Fulgorina 8, Cicadellina 12, Aphidina 29, Coccina 1.

Pentatomidae. Montrouzier (Annales d. scienc. phys. d. l. soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 91 ff.) beschrieb folgende, meist neue Arten von der Insel Woodlark: *Scutellera Banksii* (cyanipoda Boisd.) wird nach ihren zahlreichen Varietäten charakterisirt, *Scutellera variabilis*, *metallica*, *splendida*, *leucocyanea*, *Pentatoma tricolor*, *erythraspis* Boisd. var., *polychroa*, *lugubris*, *marmoratum* (!), *glaucomelas*, *bimaculatum*, *sulcatum*, *viride*, *Tesseratoma ostraciopterum* und *dilatatum*. Ausserdem folgen Bemerkungen über *Megymenum affine* Boisd. und *Agapophyta bipunctata* Guér.

Von Guérin (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 151 ff.) wurden *Pentatoma* (*Brochymena*) *Poeyi*, (*Mecistorhinus*) *variegata*, (*Cathecona*) *Gundlachii* als neue Arten von Cuba und anhangsweise *Prooxys brevispinis* als n. A. von New-Orleans beschrieben.

Menaccarus pallidus Perris (Annales d. l. soc. Linnéenne de Lyon IV. p. 158) ist eine neue Art aus den Grandes-Landes.

Coreodes. *Anisoscelis bidentatus* (sehr nahe mit *A. australis* Fabr. verwandt), *Alydus erythromelas*, *Astacops Boisdualii*, *variegatus*, *fuscus* und *viridis* Montrouzier (Annales d. l. soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 101 ff.) sind n. A. von der Insel Woodlark.

Aus Cuba beschrieb Guérin (a. a. O. p. 156 ff.) folgende neue Arten nebst einer neuen Gattung: *Sephina Gundlachii*, *Archimerus affinis*, *Gonocerus Andresii*, *Zicca delicatula*, *Paryphes Whitei*, *Anisoscelis thoracicus*, *Leptoscelis annulipes* (und anhangsweise *Leptoscelis ventralis* n. A. aus Cayenne). Ferner: *Petalotoma* n. g. mit *Leptoscelis* nahe verwandt, die Fühlerglieder aber unbehaart, flachgedrückt, das zweite etwas kürzer als das erste und dritte; Thorax mit scharfen Ecken am Seitenrand, die durch eine erhabene Querleiste auf der Oberfläche verbunden werden; Beine schlank und dünn, auch die Schenkel, die ohne alle Dornen sind; Hinterschienen in ihrer ganzen Länge blattförmig erweitert. Art: *Pet. unicolor* von Cuba, auf pl. XIII. fig. 8 dargestellt. — *Leptocorisa geniculata* n. A. aus Cuba.

Lygaeodes. Signoret hat in den Annales de la soc. entomol. de France V. p. 23—32. pl. 2 einen „Essai monographique du genre *Micropus* Spinola“ veröffentlicht, in welchem er zunächst die von Spinola nur oberflächlich berührten Charaktere der Gattung genauer feststellt, und sodann die Beschreibung von 13 ihm bekannt gewordenen Arten folgen lässt; 10 derselben sind zugleich auf der beifolgenden pl. 2 in vergrössertem Maassstabe colorirt dargestellt. Es sind folgende: *Micropus collaris* aus Venezuela, *Sallei* aus Mexiko, *fulvipes* de Geer, *variegatus* von Neu-Granada, *Gayi* Spin., *falicus* Say, *agilis* Spin., *sabuleti* Fall., *Genei*, Spin., *Spinolae* aus Frankreich, *leucopterus* Say, *pusillus* Dall. und *brunnipennis* Germ.; letztere beide Arten sind dem Verf. nicht in natura bekannt gewesen. (Ausserdem wären vier von Stål aus dem Caffernlande im J. 1855 beschriebene Arten, die dem Verf. entgangen sind, hier anzureihen. Ref.)

Léon Dufour, Sur quelques espèces algériennes du genre *Ophthalmicus*, (Annales de la soc. entomol. V. p. 68 ff.) führt sechs in Algier vorkommende Arten dieser Gattung auf, von denen er drei als neu beschreibt: *Ophthalmicus erythrops*, *boops*, *occipitalis*. Die bereits bekannten Arten sind: *O. albipennis*, *pallidipennis* und (nach Lucas, Explor. de l'Algérie) *erythrocephalus*.

v. Baerensprung, *Myrmedobia* und *Lichenobia*, zwei neue einheimische Rhynchoten-Gattungen (Berl. Entom. Zeitschr. I. p. 161 ff.). Die erste dieser Gattungen *Myrmedobia* wird auf *Microphysa myrmedobia* Märk. Germ. errichtet, welche mit *Salda coleoptrata* Fall. identisch ist und von *Microphysa pselaphiformis* Westw. durch die Bildung der Oberflügel und Schnabelscheide abweicht. Der genauen Auseinandersetzung der Gattungscharaktere lässt der Verf. die Beschreibung der Fallen'schen und einer neuen Art: *M. rufoscutellata* aus

Süddeutschland folgen. Die zweite Gattung *Lichenobia* ist auf eine kleine, mit der vorigen nahe verwandte Art gegründet, die für neu angesehen und als *L. ferruginea* beschrieben wird. Sie ist jedoch nach A. Dohrn (Entomol. Zeitung 1858. p. 163) mit *Ceratocombus Mulsanti* Sign. und *Bryocoris muscorum* Fall. identisch und muss den Namen *Ceratocombus* Sign. *muscorum* Fall. erhalten. — Des Vergleiches halber lässt der Verf. am Schlusse eine nochmalige Charakteristik der Gattung *Microphysa* Westw. folgen.

Neue Arten, von Montrouzier (Annales d. scienc. phys. de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 105 ff.) beschrieben und von der Insel Woodlark stammend, sind: *Lygaeus Woodlarkianus*, *dichroa*, *cruciatus*, *Fabricii*, *lugubris* und *violaceus*.

Von Guérin (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 164 ff.): *Lygaeus Dallasi*, *Platygaster Signoretii*, *Beosus Burmeisteri*, *abdominalis*, *minimus*, *Plocionerus Servillei*, *Dohrnii*, *Amyoti*, *triguttatus*, *Pterotmetus stenoides* und *Largus sellatus* n. A. von Cuba.

Von Perris (Annales de la soc. Linnéenne de Lyon IV. p. 159 ff.): *Heterogaster typhae*, *Anthocoris testaceus*, *crassicornis* und *Microphysa bipunctata* aus den Grandes-Landes.

Capsini. Guérin (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 168 ff.) stellte zwei neue Gattungen in dieser Familie auf: *Heterocoris* n. g. Körper elliptisch, Kopf kurz, stumpf dreieckig, zweites Fühlerglied einfach, ohne Erweiterung an der Spitze, Flügeldecken mit eigenthümlichen Erweiterungen am Aussenrande, die erste winklig gelappt, die zweite abgerundet und von der ersten sowohl als von der Spitze durch einen Einschnitt abgesondert. Art: *Het. dilatata*, pl. XIII. fig. 11 abgebildet. — *Pynoderes* n. g., mit der vorigen Gattung in den wesentlichsten Charakteren übereinstimmend, aber mit einfachen, nicht erweiterten Flügeldecken und eigenthümlich geformtem, am Hinterrande vierlappigem Halsschilde. Art: *Pyn. quadrimaculatus*, auf pl. XIII. fig. 12 abgebildet. — Eine neue Art aus Cuba ist ferner: *Capsus dimidiatus*.

Perris (Annales de la soc. Linnéenne de Lyon IV. p. 162 ff.) charakterisirte *Phytocoris irroratus*, *Signoretii*, *Capsus obesus*, *limbatus*, *adenocarpus*, *palliatu*s, *tamarisci*, *delicatus* und *cruentatus* als neue Arten aus den Grandes-Landes.

Membranacei. Neue Arten sind: *Aradus thoracoceras* Montrouzier (*lugubris* Boisd.?) von der Insel Woodlark (Annales de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 107) und *Syrtis* (*Macrocephalus*) *rugosipes*, *Westwoodii*, *Phymata emarginata* und *acutangula* Guérin (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 169 ff.) von Cuba.

Reduvini. Ueber die Gattung *Prostemma* Lap. (*Meta-temma* Am. Serv.) schrieb F. Stein in der Berl. Entomol. Zeitschr. I. p. 81 — 96. Nach eingehender Erörterung der Gattungscharaktere und der

den meisten Arten zukommenden Eigenthümlichkeit, nicht selten eine unvollständige Ausbildung der beiden Flügelpaare zu zeigen, geht der Verf. zur Beschreibung von acht ihm bekannten Arten über; von diesen sind neu: *P. aeneicolle* aus Ungarn und Italien, *7-guttatum* aus Süd-Afrika, *fuscum* aus Pensylvanien, alle drei mit ganz schwarzem Prothorax; *albinacula* aus Portugal und *ruficolle* vom Cap mit zum Theil oder ganz rothem Prothorax. Diesen Arten folgt dann noch die Anführung von vier dem Verf. unbekannt gebliebenen. — Zur Feststellung der Synonymie von *P. lucidulum* Spin., *bicolor* Ramb. und der verwandten Arten wäre noch *P. lucidulum* Costa (in dessen *Cimicum Regni Neapolitani Centuria* p. 18 beschrieben) zu vergleichen gewesen, da dieses von der Spinola'schen Art in mehreren Punkten abzuweichen scheint.

Von Montronzier (*Annales d. scienc. phys. de la soc. d'agriculture de Lyon* VII, 1. p. 108 ff.) wurden folgende neue Arten von der Insel Woodlark beschrieben: *Reduvius armatus*, *megagaster*, *acanthifer*, *leucomelas*, *polyacanthus*, *Zelus marginatus* und *Ploiaria pallida*.

Von Guérin (*Historia fisica de la isla de Cuba* VII. p. 171 ff.): *Apiomerus Burmeisteri* und *Zelus clavatus* als n. A. von Cuba.

Riparii. *Salda Signoretii* Guérin (ebenda p. 167) ist eine neue Art von Cuba.

Ploteres. *Hydrometra Caraiba*, *Velia Fieberi* und *Microvelia capitata* Guérin (ebenda p. 173 ff.) n. A. von Cuba.

Galgulini. *Galgulus macrothorax* Montrouzier (*Annales de la soc. d'agriculture de Lyon* VII, 1. p. 110) neue Art von der Insel Woodlark.

Nepini. *Belostoma medium*, *curtum*, *capitatum*, *angustatum* und *Ranatra Fabricii* Guérin (*Historia fisica de la isla de Cuba* VII. p. 175 ff.) sind neue Arten von Cuba.

Notonectici. *Corisa reticulata* Guérin (ebenda p. 177) eine neue Art von Cuba.

Stridulantia. Neue Arten aus Borneo, von Walker (*Journal of the proceed. of the Linn. soc., Zoology* I. p. 141 ff.) beschrieben, sind: *Dundubia decem*, *duarum* und *Huechys facialis*.

Von Guérin (*Historia fisica de la isla de Cuba* VII. p. 178): *Cicada (Platypleura) Poeyi*, *Sagrae* und *Walkerii* von Cuba.

Hartwig (*Allgem. Deutsche Naturhist. Zeitung* III. 1857. p. 313) stellte unter dem Namen *Cicada saxonica* eine angeblich neue (?), in einem Exemplare in der Sächsischen Schweiz gefundene Art auf; ihre Körperlänge misst 24 mill.; sie soll sich mit keiner der bis jetzt beschriebenen Arten identificiren lassen.

Hagen (*Etudes entomol.* VI. p. 42) gab eine Aufzählung der

Cicaden Russlands nebst Bemerkungen über die Verbreitung der einzelnen Arten. Es sind im Ganzen zehn: *Cic. haematodes*, *plebeja*, *orni*, *querula*, *hyalina*, *atra*, *montana*, *adusta*, *prasina* und *tibialis*.

Kolenati (Bullet. d. l. soc. d. natur. de Moscou 1857. No. II. p. 399—444) zählte zehn im Caucasus vorkommende Cicaden auf und gab auf zwei beifolgenden Tafeln colorirte Abbildungen von denselben; in den Beschreibungen und der Feststellung der Synonymie hat sich der Verf. genau an Hagen's Monographie gehalten, von der er sich nur durch die Aufnahme der (nichtssagenden) Amyot'schen Subgenera entfernt.

Fulgoroellae. Eine wesentliche Bereicherung an ausgezeichneten neuen Formen erhielt diese Familie abermals durch die Beschreibung der von Wallace auf Borneo gesammelten Homopteren F. Walker's im Journal of the proc. of the Linnean soc., Zool. I. p. 142 ff. — Zur Gruppe Fulgoroides gehören: *Hotinus intricatus* und *cultellatus*. — Zur Gruppe der Lystroides: *Aphaena saturata*, *veris-amor* und *uniformis*. — Zur Gruppe der Dictyophoroides: 1) *Leusaba* n. g. (pl. 7. fig. 1) mit Dictyophora verwandt; Kopf kurz, mit gerandetem Scheitel, flacher, länglich viereckiger, vorn breiterer Stirn und lanzettlichem Gesichte, welches etwas kürzer als die Stirn ist. Prothorax gerandet, vorn stark bogenförmig gerundet, mit ausgehöhltem und innen gewickeltem Hinterrande; Mesothorax dreiriesig, Beine lang, Vorderflügel aussen breiter, mit sehr langen Basalzellen, kürzeren Scheiben- und Randzellen; einzelne Randadern gegabelt, kleine quere Costal- und Submarginal-Adern fehlen. Art: *L. marginalis*. 2) *Isporis* n. g. (pl. 7. fig. 2), der vorigen Gattung nahe stehend; Kopf kurz, stark bogenförmig hervortretend, der Scheitel hinten ausgehöhlt und gerandet, Stirn und Gesicht gerandet und in der Mitte gekielt, die Stirn fast quadratisch, vorn breiter, das Gesicht dreieckig. Thorax kurz, Pro- und Mesothorax dreiriesig, die Seitenkiele sehr schräg verlaufend; Vorderflügel schmal, die Basalzellen sehr lang, die Diskal- und Marginalzellen kürzer, die Randadern einfach; einige äussere quere Costaladern, aber keine Submarginal-Queradern vorhanden. Art: *I. apicalis*. 3) *Epora* n. g. (pl. 7. fig. 3) mit Dictyophora verwandt; Kopf dreikeilig, quer, Scheitel konisch, Stirn sehr lang, linear, Gesicht kürzer, lanzettlich. Prothorax vierkeilig, stark geschwungen, Mesothorax dreikeilig, Beine ziemlich lang. Vorderflügel ziemlich schmal, die Basalzellen sehr lang, fast die beiden ersten Dritttheile der Länge einnehmend, die Diskal- und Marginalzellen fast gleich gross, die queren Rippenadern schräg, parallel, die submarginalen fehlen. Art: *E. subtilis*. — Neue Arten sind ferner: *Dictyophora speicarina* und *Daradax acris*. — Zur Gruppe der Cixioides kommen: 4) *Ostama* n. g. (pl. 7. fig. 4). Kopf kurz, Scheitel fast quadratisch mit etwas erhabenen Seiten, Stirn flach, länglich viereckig, vorn

breiter, Gesicht lanzettlich; Fühler länglich, fadenförmig, ihr zweites Glied nicht länger als das erste, die Borste kurz. Mesothorax dreieckig; auf den Vorderflügeln die Basalzellen viel länger als die Marginalzellen, die Randadern zahlreich, einige gegabelt. Art: *O. juncta*. 5) *Erana* n. g. (pl. 7. fig. 5). Kopf mit erhabenen Seiten und mittlerem Kiele, Scheitel fast konisch, Stirn ziemlich quadratisch, gegen das Gesicht hin breiter, dieses lanzettlich, Fühler lang, derb, fadenförmig, das erste Glied kurz, das zweite lang, die Borste fehlt; Mesothorax mit drei parallelen Kielen; die Basalzellen der Vorderflügel dreimal länger als die Diskal- und Marginalzellen, quere Costaladern in geringer Anzahl und sehr schräg verlaufend. Art: *E. operosa*. 6) *Rhotala* n. g. (pl. 7. fig. 6). Kopf oben konisch, mit erhabenen Seiten, Stirn und Gesicht flach, verlängert, punktirt; Fühler kurz, fadenförmig, das zweite Glied länger als das erste, die Borste lang, zart. Prothorax ziemlich gross, das Mittelfeld konisch, dreieckig; Vorderflügel mit sehr langen Basalzellen, äussere Queradern zahlreich, Rippen-Queradern sparsam. Art: *Rh. delineata*. — Neue Arten: *Cixius ferreus, diffinis, guttifer, aequus, perplexus, inclinatus, simplex, vilis, modicus, nexus, despectus, deductus, munitus, trahens, pallens, finitus, dilectus, dotatus, insuetus, Bidis pictula, punctifrons* und *contigua*. — Zur Gruppe der Issites: 7) *Hiracia* n. g. (pl. 7. fig. 7). Körper elliptisch, convex, Kopf mit kaum erhabenen Rändern, Scheitel konisch, dreieckig, Stirn und Gesicht mit drei wenig deutlichen Kielen, letzteres lanzettlich, erstere verkehrt kegelförmig, vorn ausgehöhlt. Prothorax quer, fünfeckig, vorn schmaler, Mesothorax dreieckig, dreieckig, hinten scharf zugespitzt. Vorderflügel mit scharfer Spitze, die Adern und Queräderchen zahlreich und erhaben. Art: *H. ignava*. — Neue Arten sind: *Issus praecedens, compositus, retractus, furtivus, patulus, iners, gravis, arctatus, sobrinus, ovalis, litorosus, lineatus, Hemisphaerius niger, typicus, torpidus, Eurybrachys conserta, vetusta, intercepta* und *surrecta*. — Zur Gruppe der Flatoides: 8) *Serida* n. g. (pl. 7. fig. 8). Kopf etwas ansteigend, mit erhabenen Seiten, welche beiderseits einen spitzen Winkel bilden, Scheitel linear, Stirn schmal, gekielt, vorn erweitert, Gesicht lanzettlich, leicht gekielt. Thorax dreieckig, Vorderflügel mit abgerundeten Ecken, die Rippen- und Randadern zahlreich. Zwei Arten: *S. latens* und *ferrens*. 9) *Paricana* n. g. (pl. 8. fig. 1). Kopf glatt, eben, Scheitel kurz, Stirn länglich viereckig, Gesicht lanzettlich; Fühler mit langer, zarter Borste. Thorax dreieckig, Vorderflügel an der Spitze breit gerundet, die mittleren und Randzellen an Länge gleich. Art: *P. dilatipennis*. 10) *Nicerta* n. g. (pl. 8. fig. 2). Körper schlank, Kopf zusammengedrückt, sehr schmal, Scheitel mit stark erhabenen Seiten, Stirn messerförmig, Gesicht lanzettlich; Fühler mit langem, cylindrischen zweiten Gliede. Flügel schmal, die vorderen mit weni-

gen Adern und einigen äusseren und hinteren Queradern. Drei Arten: *N. submentiens*, *flammula* und *fervens*. 11) *Eucarpia* n. g. (pl. 8. fig. 3). Kopf kurz mit stark erhabenen Rändern, Scheitel quer, fast quadratisch, Gesicht und Stirn gekielt, ersteres lanzettlich, letztere fast quadratisch. Thorax kurz, zweikielig; Beine kurz, dünn; Flügel schmal, die vorderen mit sehr wenigen Diskal- und zahlreichen Randzellen. Art: *E. univitta*. 12) *Rhotana* n. g. (pl. 8. fig. 5). Scheitel messerförmig, Stirn dreieckig, Gesicht lanzettlich; Prothorax sehr kurz, Mesothorax mit zwei kaum sichtbaren Kielen und erhabenen Seiten; Flügel breit, die vorderen mit wenigen Längs- und Queradern. Art: *Rh. latipennis*. 13) *Ficarasa* n. g. (pl. 8. fig. 4). Kopf mit erhabenen Seiten, Scheitel geschwungen, Stirn leicht gekielt, mit winkligen Seiten, Gesicht lanzettlich, Prothorax mit stark geschwungenem Vorderrande, Mesothorax dreikielig; Vorderflügel mit sehr langen Basal- und gleich langen Mittel- und Randzellen, die äusseren und Rippen-Queradern zahlreich. Art: *F. pallida*. — Neue Arten: *Flatoides veterator*, *posterus*, *limitaris*, *stupidus*, *Ricania osmyloides*, *subacta*, *Benna canescens*, *clarescens*, *praestans*, *Pochazia convergens*, *Nephesa grata*, *guttularis*, *volens*, *lutea*, *deducta*, *tripars*, *Poeciloptera rorida*, *deplana*, *Eupilis hebes*.

A. Costa (Memorie della Reale Accademia delle scienze di Napoli II. p. 227) beschrieb eine mit *Caliscelis* Lap. zunächst verwandte neue Gattung *Homocnemia* aus der Issiden-Gruppe, für welche er folgende Charaktere aufstellt: Stirn vertikal, mit dem horizontalen Scheitel einen rechten Winkel bildend, beim Weibchen leicht gewölbt; Fühler dreigliedrig, das 3. Glied in einer Spalte des vorhergehenden eingefügt und in eine lange Borste endigend; Ocellen nicht bemerkbar; Deckflügel kurz, das erste Abdominalsegment nicht oder kaum überragend, hinten abgestutzt, ohne Areolae, der einzige Subcubital-Nerv deltaförmig, ausserdem mit einem inneren Suturnalnerv und zwei äusseren, die an der Schulter zusammenstossen; Vorderbeine drehrund, den mittleren ähnlich. Art: *Homocn. alborittata*, fig. 5 u. 6 abgebildet, 1 lin. lang, aus Neapel.

C. Stål, Description du genre *Copicerus* Swartz (Annales de la soc. entomol. V. p. 337—339. pl. 12). — Der Verf. giebt eine Charakteristik der von Swartz in den Acta Holmiae 1802 aufgestellten, aber von den späteren Autoren nicht gekannten Gattung *Copicerus*, die mit *Asiraca* und *Araeopus* in nächster Verwandtschaft steht, von beiden aber durch die Fühler-, Kopf- und Fussbildung abweicht. Die von Swartz beschriebene Art *C. irroratus* von Jamaica wird hier nochmals charakterisirt und die Beschreibung einer neuen von Rio-Janeiro, *Copicerus Swartzii* auf pl. 12 abgebildet, beigelegt. — Eine Diagnose beider Arten hat der Verf. auch in einem kurzen Ar-

tikel „Ny art af Copicerus Swartz“ (Öfversigt af Kongl. Vetensk. Akad. Förhandl. XIV. 1857. p. 53) gegeben.

Guérin (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 179 ff. pl. XIII) charakterisirte folgende neue Arten von Cuba: *Poiocera constellata*, *Fulgora* (Pseudophana?) *Spinolae*, *sponsa*, *Holotus* n. g. aus der Verwandtschaft von *Asiraca* Latr. und *Araeopus* Spin., mit weit über die Augen nach vorn hervortretender Stirn, ausgerandeten Augen, fehlenden Ocellen, verlängerten Fühlern, die zwei Dritttheilen der Körperlänge gleichkommen, aus zwei langen, unterhalb angeschwollenen Gliedern und einer feinen Endborste bestehen und in der Ausrandung der Augen eingelenkt sind; Schienen mit langem Enddorne. Art: *Hol. thoracicus*, pl. XIII. fig. 17. — *Acanonia Servillei* und *Phalaenomorpha tortrix*. — Anhangsweise wird ausserdem *Holotus obscurus* als n. A. aus Brasilien diagnosticirt. (Die Gattung *Holotus* fällt mit *Copicerus* Swartz zusammen.)

Montrouzier (Annales des scienc. phys. de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 111) beschrieb *Flata rubra*, *flava* und *rostrata* als neue Arten von der Insel Woodlark.

Perris (Annales de la soc. Linnéenne de Lyon IV. p. 170 ff.): *Delphax Fairmairei*, *Aubei* und *lineata* n. A. aus den Grandes-Landes.

Kolenati (Bullet. d. l. soc. imp. des natur. de Moscou 1857. II) beschrieb unter dem Namen *Tettigometra hexaspina* eine neue Art aus dem Caucasus; Abbildung tab. VI. fig. 13.

Membracina. Neue Arten sind: *Centrotus subsimilis*, *limbatus*, *latimargo*, *densus*, *paripes*, *cicadiformis*, *consocius* und *Microeune metuenda* Walker (Journal of proceed. of the Linn. soc., Zoology I. p. 163 ff.) aus Borneo, *Hoplophora Fairmairei* Guérin (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. 181) von Cuba.

Cicadellina. Zahlreiche neue Arten dieser Familie, auf Borneo (Sarawak) von Wallace gesammelt, wurden von F. Walker (Journal of proceed. of the Linnean soc., Zoology I. p. 165 ff.) beschrieben; auf zwei derselben wurden neue Gattungen errichtet. — Zur Gruppe *Cercopides* gehören: *Cercopis semipardalis*, *delineata*, *semirosea*, *undulifera*, *subdolens*. — Zur Gruppe *Aphrophorides*: 1) *Amarusa* n. g. (pl. 8. fig. 6). Kopf kurz, mit gebogenem Vorderrande, an den Seiten von gleicher Länge wie in der Mittellinie, die Stirn mit Querfurchen; das Rückenschild vorn eingedrückt, mit tief ausgebuchtetem Hinterrande. das Schildchen verkehrt lanzettlich; Beine sehr kurz, Flügel spindelförmig. Art: *A. picea*. Neue Arten: *Ptyelus ineffectus*, *Perinola exclamans*, *signifera*, *expressa*. — Zur Gruppe *Serripedes*: *Tettigonia elongata*, *lineolata*, *angularis*, *invadens*, *scitipennis*, *lepidipennis*, *eburnea*, *signifera*, *polita*, *glabra*, *inclinans*, *difficilis*, *Ledra tuberculifrons*, *dilatifrons*, *tenuifrons*, *longifrons*, *conicifrons*, *planifrons*, *arcuatifrons*, *ranifrons*, *obtusifrons*, *truncatifrons*, *Epicli-*

nes obliqua. — 2) *Isaca* n. g. (pl. 8. fig. 7). Körper kurz, Kopf quer, convex, Stirn quer, Gesicht quer, dreieckig; Fühler sehr kurz mit langer Borste von mehr als halber Körperlänge; Vorder- und Mittelbeine kurz, die hinteren lang mit sehr stacheligen Schienen; Flügel schmal mit sparsamen Adern. Art: *J. bipars*. — Ferner: *Acocephalus discigutta*, *Coclidia dirigenis*, *pardalis*, *albisigna*, *cupraria*, *Bythoscopus*, *testaceus*, *metallicus*, *lateralis*, *cephalotes*, *biarcuatus*, *laetisigna*, *nigrilinea* und *ignicans*.

Montrouzier (Annales des scienc. phys. de la soc. d'agriculture de Lyon VII, 1. p. 112) beschrieb *Cercopis Boitardi*, *Centrotus rugosus* und *Tettigonia flarescens* als neue Arten von der Insel Woodlark.

Perris (Annales de la soc. Linnéenne de Lyon IV. p. 172 ff.) beschrieb *Athysanus maritimus*, *cinctus*, *conspurcatus*, *ornatus*, *nymphaeae* und *Laboulbènei* als neue Arten aus den Grandes-Landes. — An einigen Exemplaren des *Athysanus maritimus* bemerkte Perris zwischen den Hinterleibssegmenten einen kleinen, sphärischen, braunen Körper, der nach Art der Strepsipteren-Puppen mit seinem einen Ende in die Gelenkhaut zweier Segmente eing bohrt war; es entwickelte sich daraus nach Berstung des freien Endes eine Larve, die später den *Gonatopus pedestris* als Imago ergab. Nach P.'s Ansicht ist dieser *Gonatopus* erst der Parasit eines anderen Parasiten von *Athysanus*, denn abgesehen von dem puppenartigen Körper, aus welchem die Larve hervorging, hatte dieselbe innerhalb jenes noch eine gespinntartige Hülle zu durchbrechen.

Aphidina. Das von Herrich-Schäffer herausgegebene Werk von C. L. Koch: „Die Pflanzenläuse, Aphiden, getreu nach dem Leben abgebildet und beschrieben, mit 54 fein ausgemalten Kupfertafeln. Nürnberg 1857“ (8. 335 pag.) liegt gegenwärtig abgeschlossen vor. Neben der ausführlichen Beschreibung eines sehr reichhaltigen Materials an einheimischen Aphiden liefert das Buch zugleich eine bildliche Darstellung sämtlicher dem Verf. bekannt gewordenen Arten in stark vergrößerten, colorirten Abbildungen, die zur Determination dieser schwierigen und ausserdem in brauchbarer Weise kaum zu conservirenden Geschöpfe gewiss von bedeutendem Nutzen sein werden, so dass, da der systematische Theil der Arbeit offenbar der bei weitem unbedeutendere ist, die Species-Kenntniss wenigstens dadurch an Ausdehnung gewonnen hat. Dass in literarischer Beziehung die Arbeit des Verf. mehrfache Lücken erkennen lässt, indem z. B. sämtliche neuere Publikationen von Walker, Westwood, Dahlbom u. A., die für die Kenntniss der einheimischen Arten von Wichtigkeit sind, darin keine Berücksichtigung erfahren haben, ist schon früher in diesen Berichten bemerklich gemacht worden; es erklärt sich diese Unvollständigkeit zur Genüge aus dem Umstande, dass eine

seit 12 Jahren liegende Arbeit zum grössten Theile unverändert dem Drucke übergeben worden ist. Was den Inhalt der in diesen Berichten noch nicht näher berücksichtigten letzten Lieferungen des Werkes (Lief. 8 ff., p. 237—335) betrifft, so sind darin folgende Gattungen abgehandelt: *Lachnus* 9 A., *Asiphum* (*Aphis populi* Fab.) 2 A., *Phyllaphis* (*Aph. fagi* Lin.) 1 A., *Cladobius* (*Aph. populea* Kalt.) 1 A., *Toxoptera* 1 A., *Vacuna* Heyd. 1 A., *Glyphina* 1 A. (*betulae* Kalt.), *Schizoneura* 4 A., *Pachypappa* 2 A., *Anoecia* (*Aph. corni* Fab.) 1 A., *Mindarus* 1 A., *Prociphilus* (*Aph. bumeliae* Schr.) 3 A., *Stagona* (*Aph. xylostei* de Geer) 1 A., *Tetraneura* Hart. 1 A., *Pemphigus* 2 A., *Thecabius* 1 A., *Tychea* 2 A., *Amycla* 3 A., *Trama* Heyd. 3 A., *Forda* Heyd. 2 A., *Endeis* 2 A., *Chermes* 2 A., *Anisophleba* 2 A. (Anhangsweise folgen am Schlusse noch 4 Aleurodes-Arten). — Kaltenbach, dem das Manuskript der Koch'schen Arbeit zur Durchsicht vorgelegt worden ist und der dasselbe zum Theil mit synonymischen Bemerkungen versehen hat, gibt am Schlusse derselben noch eine Reihe nachträglicher Bemerkungen, in denen er eine Anzahl von Koch als neu aufgestellter Arten mit den seinigen identificirt.

R. Neumann (Achter Bericht des Vereins für die Fauna der Provinz Preussen, Neue Preuss. Provinz. Blätter XI. 1857) hat ein Verzeichniss der Blattläuse der Provinz Preussen zusammengestellt, welches 59 Arten der Gattung *Aphis*, 4 *Lachnus*, 1 *Schizoneura*, 1 *Vacuna*, 2 *Pemphigus*, 1 *Tetraneura* und 2 *Chermes* enthält; bei jeder Art ist die Erscheinungszeit und die Wohnpflanze angegeben.

Gli Afidi, Memoria del Prof. G. Passerini (Estratto dal giornale J Giardini XII. Giugno 1857. 20 pag. in 8.) ist eine populär abgefasste Darstellung der Naturgeschichte der Blattläuse, in welcher über ihre Lebensweise, Fortpflanzung, ihren Schaden, ihre Vertilgung u. s. w. gehandelt wird.

Mittheilungen über die Naturgeschichte der *Aphis cerealis* Kalt. machte Kollar (Sitzungsberichte des zoolog.-botan. Vereins VII. p. 155); die Eier wurden zur Ueberwinterung zu 100 in die Stoppeln der Gerstenfelder gelegt, so dass die ganze Höhlung derselben von der oberen Oeffnung bis zum nächstfolgenden Knoten davon angefüllt waren.

Parasita.

Aubé (Bullet. de la soc. entomol. V. p. CLVIII) fand auf einer mit Phthiriasis behafteten Elster eine *Ornithomyia*, welche auf ihrem Körper eine Anzahl Anopluren (die Gattung und Art ist nicht angegeben) trug; er glaubt daraus

schliessen zu dürfen, dass die *Ornithomyia* die Vermittlerin ist, um jene Parasiten auf andere Elstern, die sich in gleichem krankhaften Zustande befinden, zu übertragen, und dass die Krankheit des Vogels eine nothwendige Bedingung für die Existenz der Parasiten abgebe.

Der Verf. führt zur Begründung dieser sehr einleuchtenden Annahme ein zweites Factum an, welches dieselbe noch mehr bekräftigt; von fünf in einem Stalle befindlichen Kühen, welche mit anderen ihres Gleichen nie zusammenkamen, wurde eine von der Läuse-sucht befallen und zu gleicher Zeit von Myriaden von Flöhen heimgesucht, ohne dass nur ein einziger derselben sich auf den übrigen Kühen auffinden liess. Diese Parasiten wurden nach Aubé offenbar ebenfalls durch Dipteren (*Hippobosca*, *Tabanus*, *Oestrus*) auf die Kuh übertragen und vermehrten sich, durch die für ihre Existenz günstigen Bedingungen der Hautkrankheit, in ausserordentlicher Weise. Aehnliches lässt sich oft bei jungen Hunden beobachten; sowohl bei diesen als in dem eben angeführten Falle sind die Flöhe offenbar nicht als Ursache, sondern als Folge der Krankheit anzusehen; der eigenthümliche Geruch, der durch die Hautaffektion bewirkt wird, lockt die Parasiten an.

Eine in Chr. Nitzsch's handschriftlichem Nachlasse befindliche Charakteristik der Federlinge, *Philopterus*, hat Giebel in der Zeitschrift für die gesammte Naturwiss. IX. p. 249—263 abdrucken lassen. Sie liefert eine ausführliche Schilderung des äusseren Körperbaues der *Philopteriden*, deren Kenntnissnahme zu empfehlen ist.

„*Parasitica in Nederland waargenomen door R. T. Maitland.*“ (Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland II. p. 303—309.) Verf. liefert eine Zusammenstellung der von ihm in den Niederlanden beobachteten Parasiten, welche er nach Nitzsch, Walckenaer und Denny bestimmt hat und die er mit deren Citaten aufführt. Von *Pediculinen* werden 1 *Phthirius*, 8 *Haematopinus* und 3 *Pediculus*, von *Mallophagen* 1 *Ornithobius*, 2 *Goniocotes*, 3 *Goniodes*, 10 *Lipeurus*, 6 *Nirmus*, 15 *Docophorus*, 5 *Trichodectes*, 7 *Colpocephalum*, 2 *Menopon*, 4 *Trinotum*, 2 *Laemobothrium*, 1 *Physostomum* und 1 *Gyropus* angeführt.

2. Myriapoden.

Das weiter unten (siehe Crustaceen) nochmals erwähnte „Beschreibende Verzeichniss der Myriapoden und Crustaceen Graubündtens“ von Am Stein (Jahresbericht d. naturforsch. Gesellsch. Graubündtens 1855. I. p. 112—148) liefert nach den von Giebel in der Zeitschr. f. d. gesamt. Naturwiss. IX. p. 552 gegebenen Mittheilungen eine Aufzählung und Beschreibung der dort einheimischen Myriapoden, unter denen mehrere als neu angesehen werden.

Die einzelnen Gattungen sind folgendermassen vertreten: *Polyxenus* 1, *Glomeris* 4, *Julus* 8, *Blannius* 2, *Craspedosoma* 4, *Chordeuma* 1, *Polydesmus* 2, *Lithobius* 8, *Cryptops* 1, *Geophilus* 3, *Pachymerium* 1, *Stenotaenia* 1, *Linotaenia* 2. Von diesen sind folgende Arten neu: *Glomeris alpina*, *Julus transversosulcatus*, *Blannius fuscus*, *Craspedosoma rhaeticum*, *angulosulcatum*, *gibbosum*, *Lithobius pilosus*.

Die in den Niederlanden vorkommenden Myriapoden verzeichnete F. Maitland („Nederlandsche veelpootige Insekten“ in Herklots' Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland II. p. 284—286). Aus der Familie der Juliden werden 1 *Polyxenus*, 3 *Polydesmus*, 5 *Julus* und 2 *Glomeris*, aus der Familie der Scolopendren: 1 *Scutigera*, 4 *Lithobius*, 2 *Cryptops* und 6 *Geophilus* aufgezählt, mit Citaten aus Walckenaer und Koch und mit Bemerkungen über ihr Vorkommen versehen.

Chilognatha. Waga (Annales de la soc. entomol. V. p. 829 ff.) beschrieb unter dem Namen *Gervaisia costata* eine neue Gattung und Art aus den Karpathen, welche sich von *Glomeris* nur durch die Anzahl der conglomerirten Augen, fünf jederseits, unterscheidet. Die kreideweiss gefärbte Art hat durch die raue Oberfläche und die verdickten, aufgebogenen Ränder der Körpersegmente ein sehr zierliches Ansehn; sie ist auf pl. 14. No. 4 abgebildet.

3. Crustaceen.

Burmeister behandelte in seinen „Zoonomischen Briefen“ (Leipzig, Wigand 1856, 2 Theile 8.), in welchen er eine allgemeine Darstellung der thierischen Organisation

zu geben versucht, von den Gliederthieren (Th. II. p. 326—451) nur die Crustaceen, Arachniden und Myriapoden, während die eigentlichen Insekten, wenn das Werk überhaupt weiter fortgesetzt wird, für den dritten Band aufgespart sind. Die Arthropoden bilden nach der Ansicht des Verf., wie er dies schon in früheren Werken kund gegeben hat, zusammen mit den Würmern die grosse Abtheilung der Gliederthiere und sind im Gegensatze zu jenen als „heteronome Gliederthiere mit constantem Numerus“ anzusehen. Als Charaktere der Crustaceen hält er auch hier noch die von ihm als constant angenommene Zahlenverhältnisse der Brustkastenringe fest, „welche niemals die einfache Grundzahl der Ringe enthalten dürfen, sondern stets ein Multiplum derselben sind,“ wobei freilich für die Malacostraceen als Grundzahl 5, für die Entomostraceen dagegen 3 angenommen wird, und wo beide nicht zutreffen, das supponirte Eingehen des einen oder anderen Ringes als Aushülfe dienen muss. Gewiss ist der Nachweis einer Gesetzmässigkeit in Zahlenverhältnissen von grossem Werth, wenn er sich überzeugend führen lässt; ihn jedoch durch Addition oder Subtraktion, je nach Bedürfniss, herbeizuführen, ist gewiss misslich, da dann natürlich die Gültigkeit des Prinzips in Frage gestellt wird; wenn der Verf. z. B. den siebenten Ring des Hinterleibs bei den Malacostraceen als einen solchen ansieht, der nicht mitgezählt werden darf, nur um die Zahl 5 als allgemeingültige Grundzahl für die Hinterleibsringe der Arthropoden aufzustellen, so kann man gewiss mit Recht Zweifel an der Gültigkeit dieser Zahl überhaupt erheben, abgesehen davon, dass sie auch in vielen anderen Fällen (die Libellen haben z. B. abweichend von der sehr verbreiteten Zahl 9 der Hinterleibsringe der Insekten 11 solcher) sich keineswegs constant erweist. — Die Myriapoden sieht der Verf. bekanntlich als eine besondere Abtheilung [der Arachniden an, eine Ansicht, die er auch in dem vorliegenden Werke von Neuem geltend zu machen sucht; er stellt sie den eigentlichen Arachniden als „homonome Gliederthiere mit gegliederten, nur fussartigen Bewegungsorganen und innerer Tracheen-Respiration“ gegenüber.

Derselbe verfocht in einem Aufsätze „Noch einige Worte über die systematische Stellung der Räderthiere“ (Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie VIII. p. 152 ff.) nochmals die zuerst von ihm aufgestellte Ansicht, dass die Rotatorien der Classe der Crustaceen beizuzählen seien, besonders durch den von Vogt gegen Leydig geäußerten Widerspruch veranlasst. Von dem Grundsatz ausgehend, dass es in der Systematik keinen Charakter gebe, von dem nicht bis zu einem gewissen Grade Ausnahmen vorkommen könnten und unter den Insekten als analoges Beispiel die Strepsipteren anführend, welche Coleopteren seien (zu denen sie aber unter allen Insektenordnungen gewiss am wenigsten gehören), sucht der Verf. die Rotatorien nur als einen in mehrfacher Hinsicht aberrirenden Typus der Crustaceen darzustellen. Entscheidende Charaktere für ihre Krebssthier-Natur findet er zuvörderst in der Zahl 6 der Thoraxringe, die bei den Entomostraceen typisch sei, sodann in der Lage der Genitalöffnung beim Beginne des Hinterleibs; der mit zwei Kiefern bewaffnete Schlundkopf der Rotatorien entspreche dem Mundkieferpaare der Entomostraceen. Was an den Rotatorien der Crustaceen-Natur widerspricht, wie die Lage der Räderorgane am Kopftheile, die Flimmerbewegung an mehreren Organen u. s. w., spricht er dagegen als Charaktere von geringer systematischer Bedeutung an. — Jedenfalls kann eine Frage, wie die vorliegende, durch so exclusiv subjective Beurtheilung der entscheidenden Punkte nicht zum Abschlusse gebracht werden.

Ein Artikel von Dana über die Classification der Crustaceen ist aus seinem grossen Werke in der United - States exploring Expedition nochmals einzeln in Silliman's American Journal of science and arts, Vol. XXII. p. 14—29 veröffentlicht worden. („A review of the classification of Crustacea with reference to certain principles of classification, by James D. Dana.“) Der Verf. legt seiner Classification die Idee zu Grunde, dass bei den höchst entwickelten Formen eine Centralisation, bei den niedrigeren dagegen eine allmählig grössere Entfernung der Hauptkräfte (wohl besser Organe) von einander sich kundgebe. Wenigstens sucht er

die Verwirklichung dieser Idee bei dem ersten Haupttypus der Crustaceen, den Decapoden nachzuweisen und er glaubt die Centralisation der Kräfte hier eine „Cephalisation“ nennen zu können, indem der grössere Theil der Organe sich den Funktionen des Kopfes (Mund- und Sinneswerkzeuge) accomodire.

Insofern stellt er als den höchst entwickelten Typus die Majaceen-Gruppe auf, bei welcher durch die Annäherung der Fühler und der Augen auf einen möglichst engen Raum die stärkste Centralisation bewirkt ist. Eine verminderte Centralisation tritt nun zuerst durch die Erweiterung des Raumes zwischen den Fühlern (Parthenopiden, Cancriden) auf, eine zweite in einer Erweiterung der äusseren Maxillarfüsse (Cancer, Lupea, Corystoiden), eine dritte in der Verlängerung der Fühler (Corystoiden); dazu kommen als fernere Kennzeichen einer verminderten Centralisation die Verbreiterung des Sternum und Abdomen (Grapsoiden), der verminderte Anschluss des Hinterleibs an den Cephalothorax (Corystoiden), die grössere Entfernung der Vulvae von einander (Dromia), das Schwinden der innern Fühlergruben (Latreillia) u. s. w. Bei den Anomuren zeigt sich sodann in dem Mangel der Augengruben, dem Treten des zweiten Fühlerpaares auf die Aussenseite der Augen, der fussähnlichen Bildung der äusseren Maxillarfüsse, der Verlängerung des Hinterleibs eine weitere Decentralisation der Organe, welche bei den Macrouren und den Squillen ihre weitere Ausbildung erreicht. — Bei den übrigen von Dana angenommenen Primaer-Typen der Crustaceen, den Tetradecapoden, Entomostraceen, Cirrhipedien und Rotatorien versucht der Verf. einen ähnlichen Nachweis, stösst jedoch hier (besonders bei den Entomostraceen, wo die Mannigfaltigkeit der Körperbildung eine viel grössere ist) auf bedeutende Schwierigkeiten, wie sie bei dergleichen theoretischen Versuchen sehr natürlich sind.

Claus (dies. Archiv. f. Naturgesch. XXIII, 1. p. 3 ff.) machte einige Bemerkungen über „das System der Crustaceen so wie über die Stellung der Cyclopiden in demselben.“ Der Hermaphroditismus der Cirrhipedien scheint dem Verf. keinen Grund abzugeben, sie nicht als mit den übrigen Entomostraceen nahe verwandt anzusehen (Zenker), da derselbe augenscheinlich durch die festsitzende Lebensweise der entwickelten Individuen bedingt werde. Die Annäherung von Argulus an die Branchiopoden (Zenker) missbilligt er, glaubt vielmehr eine nähere Verwandtschaft mit den hö-

heren Parasiten (d. h. Caligiden u. s. w.) nachweisen zu können; dagegen schliesst er sich der Zenker'schen Vereinigung der Copepoden mit den Siphonostomen an, will jedoch beide zusammen den Lernaeen gegenüberstellen, indem, wie er meint, die höheren Siphonostomen nur temporär, die Lernaeen dagegen zeitlebens schmarotzten (als wenn die Larven der Lernaeen nicht eben so frei herumschwömmen wie die der Caligiden! Ref.), erstere auch durch den Besitz von Ruderfüssen ausgezeichnet seien (die nach Brühl's jüngster Entdeckung aber den Lernaeen auch nicht fehlen! Ref.).

Der um die Kenntniss der Wirbelthier-Fauna des Indischen Archipels hochverdiente Dr. P. Bleeker hat jetzt damit begonnen, auch den Crustaceen der Sunda-Inseln seine Aufmerksamkeit zuzuwenden und im zweiten Theile der Acta Societatis Scientiarum Indo-Neerlandicae (Verhandelingen der Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indië, Deel II. Batavia 1857) unter dem Titel: „Recherches sur les Crustacés de l'Inde archipélagique“ zwei Abhandlungen veröffentlicht, von denen die eine „Sur les Décapodes oxyrhines de l'Archipel Indien“ eine Aufzählung und Beschreibung der den Sunda-Inseln eigenthümlichen Majaceen, die andere „Sur les Isopodes Cymothodiens de l'Archipel Indien“ ein Gleiches für die parasitischen Isopoden, welche Bleeker während seiner langjährigen ichthyologischen Studien auf verschiedenen Fischen gefunden und gesammelt hat, liefert. Wenn es in der ersten Abhandlung an neuen Arten, die hier zuerst beschrieben werden, nicht fehlt, so ist die letzte ganz besonders reich daran, indem von den sieben aufgezählten Cymothoden überhaupt nur eine bisher bekannt war; dieselben werden auf zwei beifolgenden Tafeln zugleich sämtlich abgebildet.

W. Stimpson hat in seinem „Prodromus descriptionis animalium evertibratorum, quae in expeditione ad Oceanum Pacificum septentrionalem, a Republica Federata missa, observavit“ (Proceed. of the acad. of natur. scienc. of Philadelphia 1857. p. 216 ff.) auch die auf der Expedition gesammelten Crustaceen aufzuzählen und zu beschreiben be-

gonnen; der bis jetzt vorliegende Theil der Arbeit erstreckt sich auf die *Brachyura oxyrrhyncha*.

Derselbe lieferte in einer zweiten Arbeit: „*The Crustacea and Echinodermata of the Pacific shores of North-America, by W. Stimpson*,“ (Cambridge 1857. 8. 92 pag. c. tab. 6; auch enthalten im *Journal of the Boston society of natural history*, Vol. VI) eine Aufzählung der an der Westküste Nord-Amerika's aufgefundenen Crustaceen, nebst einer Beschreibung und Abbildung der darunter enthaltenen neuen Gattungen und Arten. Die verzeichneten Arten gehören fast ausschliesslich den Ordnungen der Decapoden, Isopoden und Amphipoden an und vertheilen sich auf die einzelnen Gruppen folgendermassen: *Brachyura* 38, *Anomura* 26, *Macroura* 31, *Stomatopoda* 1, *Isopoda* 19, *Amphipoda* 20 und *Poecilopoda* 1. Auch viele der früher beschriebenen Arten werden nochmals ausführlicher charakterisirt und zum Theil mit Bemerkungen über ihre Synonymie versehen; besonders gilt dies auch von mehreren Arten, welche vom Verf. schon im Jahre 1855 in den *Proceedings of the Californian Academy of natur. scienc.* (einer dem Ref. bisher unzugänglichen Zeitschrift) bekannt gemacht worden sind. Die neu aufgestellten Gattungen und Arten sind zum grössten Theile auf sechs beifolgenden Tafeln abgebildet worden.

Desselben Verf.'s „*Notices of new species of Crustacea of Western North America*“ in den *Proceedings of the Boston society of natural history* VI. p. 84—89 enthalten nur vorläufige Charakteristiken der in der oben erwähnten Arbeit ausführlicher beschriebenen Arten.

In dem schon oben (Insekten) erwähnten 7. Theil der von Ramon de la Sagra herausgegebenen *Historia fisica, politica y natural de la isla de Cuba* (Crustaceos, Aragnides é Insectos. Paris 1857. fol.) sind die Crustaceen (p. VI—XXIII. tab. 1—3) von Guérin-Ménéville bearbeitet worden. Näheres siehe unter Insekten!

Eine grössere Anzahl von Crustaceen verschiedener Familien (Decapoden, Amphipoden und Isopoden) aus Mittel-Amerika machte H. de Saussure (*Rev. et Magas. de Zoologie* IX. p. 99—102. p. 304—308 und p. 501—505) vorläufig

durch Diagnosen bekannt. „Diagnoses de quelques Crustacés nouveaux de l'Amérique tropicale“ und „Diagnoses de quelques Crustacés nouveaux des Antilles et du Mexique.“

Philippi hat (dies. Archiv f. Naturgesch. XXIII, 1. p. 124—129 und p. 319—329. Taf. 8 und 14) mehrere zum Theil sehr interessante neue Crustaceen-Formen von der Küste Chile's beschrieben und abgebildet. Dieselben gehören hauptsächlich den Stomatopoden, zum Theil auch den Decapoden an.

v. Martens machte interessante Mittheilungen über einige (Fische und) Crustaceen Italiens (dies. Archiv f. Naturgesch. XXIII, 1. p. 149—204. Taf. 10); dieselben enthalten Beobachtungen über lebende *Telphusa fluviatilis* (p. 160), Beschreibungen einer neuen Caride und eines Isopoden (p. 158 ff.) und Bemerkungen über das Vorkommen mariner Crustaceen-Formen im süßen Wasser (p. 188 u. 192).

Burgersdijk, „Land- en Zoetwater-Schaaldieren“ (in Herklots' Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland I. p. 164—167) lieferte eine systematische Aufzählung der bisher in den Niederlanden aufgefundenen Crustaceen. Im Ganzen sind 31 Arten genannt, und zwar 1 Decapode, 2 Amphipoden, 8 Isopoden, 1 Phyllopoide, 10 Cladoceren, 3 Ostracoden, 2 Copepoden, 2 Siphonostomen und 1 Lernaeide.

Ein beschreibendes Verzeichniss der Myriapoden und Crustaceen Graubündtens lieferte Am Stein im Jahresberichte der naturforsch. Gesellsch. Graubündtens 1855. I. p. 112—148. Da dem Ref. die Arbeit nicht selbst vorgelegen hat, muss er sich darauf beschränken, den von Giebel (Zeitschrift f. d. gesamt. Naturwiss. IX. p. 552) gegebenen Bericht hier mitzutheilen.

Nach diesem liefert der Verf. eine Aufzählung der in Graubündten einheimischen Crustaceen nach der Koch'schen Nomenklatur, indem er zugleich von jeder Art eine Beschreibung entwirft. Die Arten gehören folgenden Gattungen an: *Astacus* 2, *Gammarus* 1, *Armadillo* 3, *Itia* 1, *Trichoniscus* 1, *Porcellio* 9, *Oniscus* 1. Neue Arten sind nicht beschrieben.

„Museum of natural history. — List of British Crustacea“ (Journal of the Royal society of Dublin I. p. 104—110). — Ein Namens-Verzeichniss der (im Dubliner Museum befind-

lichen?) Englischen Decapoden und Stomatopoden; ist ohne Interesse.

A. White, A popular history of British Crustacea, comprising a familiar account of their classification and habits, (London, Reeve 1857. 12.) ist in den Annals and magaz. of nat. hist. XX. p. 141 angezeigt.

Fossile Crustaceen.

Den Brachyuren angehörig ist eine von de Berville (Bullet. de la soc. géologique de France XIV. p. 108 ff. pl. II) beschriebene und abgebildete Art, aus dem Grobkalke des Pariser Beckens, welcher der Name *Pseudocarcinus Chauvinii* beigelegt wird.

Zu den Notopoden würden „Einige neue Krebse aus der Mästrichter Tuffkreide,“ von v. Binkhorst (Verhandl. des Naturhist. Vereins der Preuss. Rheinl. und Westphalens XIV. p. 107—110. Taf. 6, 7) beschrieben und abgebildet, zu rechnen sein.

Es sind *Notopocorystes Mülleri*, *Eumorphocorystes* (n. g.) *sculptus*, mit der vorhergehenden Gattung zu denjenigen Formen gehörend, welche zwischen *Corystes* und *Homola* die Mitte halten, übrigens von *Notopocorystes* wenig verschieden, indem nur die breiten, stumpfen Zähne des Stirnrandes und die eigenthümliche Skulptur der Oberfläche (der Abbildung nach) sie davon abtrennen. Die dritte beschriebene und abgebildete Art ist *Dromilites Ubaghii*.

Eine neue Macrouren-Form ist der von C. Gould (Quarterly Journal of the geolog. soc. of London XIII. p. 360 ff.) beschriebene und abgebildete *Tropifer laevis*. „Description of a new fossil Crustacean from the Lias Bone-bed,“ by Charles Gould.

Von dem auf p. 361 im Holzschnitte dargestellten Fossil ist der Cephalothorax und die drei ersten Abdominalsegmente bekannt geworden, welche allerdings von so eigenthümlicher Bildung sind, dass man mit dem Verf. über die systematische Stellung des Thieres in Zweifel bleiben kann. Nach der Form des Cephalothorax und den seitlich stehenden Augen tritt es in Beziehung zu den Loricaten (*Scyllarus*), von denen es durch den Mangel der verbreiterten Antennen abweicht; unter den Astaciden zeigt *Nephrops* in der Furchenbildung der Oberfläche einige Aehnlichkeit. Die Gattungsdiagnose des Verf. lautet: „Carapace flattened, keeled, slightly longer than

broad, truncate in front, and having the posterior angles slightly produced; eyes large, remote; abdomen somewhat flattened, sculptured.“

E. v. Otto, „*Callianassa antiqua* aus dem unteren Quader von Malter in Sachsen“ (Allgem. Deutsche Naturhist. Zeitung III. 1857. p. 212f.). Der Verf. stellt das Vorkommen des Fossils im unteren Quader fest und beschreibt die zum Theil sehr schön erhaltenen, daselbst aufgefundenen Reste.

Als wahrscheinlich den Stomatopoden angehörig bezeichnet Huxley ein von ihm (Quarterly Journal of the geolog. soc. of London XIII. p. 363—369. pl. XIII) beschriebenes und abgebildetes Crustaceum von sehr absonderlicher Form, welches er *Pygocephalus Cooperi* nennt. „Description of a new Crustacean from the Coal Measures.“

Das Fossil zeigt sieben kurze Thoraxsegmente, an deren Seiten deutliche Krebsbeine eingelenkt sind und die allmählig an Breite abnehmen; an das breiteste reiht sich ein grosses, dreilappiges Schild, einigermassen an den Thorax der Trilobiten erinnernd, an, wogegen sich nach der Seite des schmalsten Ringes hin fühl- und scheerenartige Organe bemerkbar machen. Das grosse dreilappige Schild, welches der Verf. zuerst für den Vordertheil (Cephalothorax) zu halten geneigt war, spricht er nach näherer Untersuchung von drei Exemplaren als stark erweitertes Endstück des Schwanzes an, wie es bei den Squillen vorkommt; überhaupt glaubt er diese und Mysis als die nächsten Verwandten des nach seiner Ansicht zu den Podophthalmen gehörenden Thieres annehmen zu müssen.

Symonds machte Mittheilungen über eine neue Art von *Eurypterus* aus dem älteren rothen Sandstein in Herefordshire (British Associat. for the advanc. of science 1857, Edinburgh new philosoph. Journ. new ser. VI. p. 257), welche zusammen mit Silurischen Fischen und Muscheln aufgefunden wurde und von Salter als *Eurypterus Symondsii* beschrieben werden soll.

Neue Trilobiten wurden von W. Thomson „On some species of *Acidaspis* from the Lower Silurian Beds of the south of Scotland“ und J. W. Salter „On two Silurian species of *Acidaspis*, from Shropshire“ (Quarterly Journal of the geolog. soc. of London XIII. p. 206—211. pl. 6) bekannt gemacht.

Von Thomson wurden beschrieben und abgebildet: *Acidaspis Lalage*, *hystrix*, *callipareos*, *unica*, von Salter: *Acidaspis coronata*

(A. Brightii Salter antea) und die schon früher bekannt gemachte *Acidaspis Caractaci*.

J. W. Kirby (ebenda p. 213 ff. „On some Permian Fossils from Durham“) beschrieb einige Exemplare des *Prosoponiscus problematicus* (Trilob. problem. Schloth.) und bildete dieselben auf pl. 7 ab; nach einer dem Verf. zugekommenen Mittheilung von Bates will dieser das Thier den Isopoden beizählen.

Im Journal of the Royal society of Dublin I. pl. 6 werden Abbildungen verschiedener Exemplare von *Cromus arcticus* Haughton, die vom Capt. M'Clintock aus den arktischen Gegenden mitgebracht wurden, gegeben.

Den schon von Linné aus Schweden beschriebenen Paradoxides Tessini fand Römer auch in silurischem Quarzfels bei Freiburg in Schlesien (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. IX. p. 511).

Giebel (Zeitschr. f. d. gesamt. Naturwiss. IX. p. 382 ff Taf. 6) machte unter dem Namen *Buria rugosa* eine neue fossile Crustaceen-Form bekannt, die mit *Sculda pinnata* Münst. Aehnlichkeit hat und die der Verf. zu den Isopoden rechnen will. (Ob nicht Decapode?)

R. Jones „Note on the *Estheria minuta*“ (Quart. Journal of the geolog. soc. of London, Novbr. 1856, Annals and Magaz. of nat. hist. XIX. p. 104). Der Verf. hat sich davon überzeugt, dass das genannte kleine Fossil der Triasformation nicht zu den Mollusken, sondern zu den bivalven Phyllopoden gehört und mit *Limnadia* nahe verwandt ist. Er erörtert die geographische Verbreitung der Gattung, die nicht nur in England, sondern auch in Nord-Amerika und Indien aufgefunden worden ist.

Desselben Monographie der Britischen tertiären Entomostraceen (in den Schriften der Palaeontograph. society of London 1856), worin 54 Arten beschrieben sein sollen, liegt dem Ref. nicht zur Einsicht vor.

Entomostraceen aus der Trias Thüringen's machte v. Seebach (Zeitschr. der Deutsch. Geolog. Gesellsch. IX. p. 198—206. Taf. 8) bekannt; sie sind bisher nur in den beiden oberen Formationen der Trias, dem Muschelkalk und Keuper aufgefunden worden.

Als Ostracoden des Keupers werden beschrieben und abgebildet: *Bairdia Pirus*, *procera*, *teres* und *Cythere dispar*; die erstere dieser Arten scheint auch im Muschelkalk vorzukommen. Ebenfalls

aus dem Keuper stammt eine neue Art der Poecilopoden-Gattung *Halicyne*, welche unter dem Namen *Hal. plana* bekannt gemacht wird; zugleich werden die Charaktere der Gattung näher erörtert.

Boll (ebenda VIII. p. 321—324) beschrieb *Beyrichia Jonesii*, *spinulosa* und *hians* als neue Arten, in den silurischen Geröllen Meklenburgs aufgefunden.

Decapoda.

Haeckel, de telis quibusdam Astaci fluviatilis. Dissert. inaug. Berolini 1857, liegt dem Ref. augenblicklich nicht zur näheren Einsicht vor.

Remarks on the habits and distribution of Marine Crustacea on the eastern shores of Port Philip, Victoria, Australia; with descriptions of undescribed species and genera, by J. R. Kinahan (Journal of the Royal Dublin society I. p. 111—134. pl. 3, 4). Der Verf., welcher sich während eines sechswöchentlichen Aufenthalts in Port Philip mit dem Sammeln und Beobachten der daselbst vorkommenden Decapoden beschäftigt hat, giebt in der vorliegenden Abhandlung eine Zusammenstellung und Beschreibung der von ihm aufgefundenen Arten, 16 an Zahl, welche zum grössten Theile den Brachyuren angehören. Von den fünf darunter befindlichen neuen Arten werden zwei zu besonderen Gattungen (den Catometopa und Oxystomata angehörig) erhoben; sowohl diese als einige andere bisher nicht abgebildete Arten sind auf den zwei beifolgenden Tafeln dargestellt.

Desselben „Remarks on Crustacea collected in Peru, the High-Seas and South-Australia, with descriptions of undescribed species“ (ebenda p. 328—352. pl. 14) erstrecken sich in gleicher Weise nur auf die Ordnung der Decapoden, von denen im Ganzen 27 an den genannten Lokalitäten gesammelte Arten aufgezählt, mit Bemerkungen begleitet und die darunter befindlichen fünf neuen Arten eingehend beschrieben und auf der beifolgenden Tafel abgebildet werden.

Derselbe „On a Crangon new to science, with notices of other nondescript Crustacea and observations of the distribution of the Crustacea Podophthalma of the Eastern or Dublin marine district of Ireland“ (Natural history review, Proceed. of societ. p. 80 ff.) zählte 29 an der Irischen Küste

bei Dublin vorkommende Decapoden auf, von denen er drei (1 Crangon, 1 Pagurus und 1 Porcellana) für neu hält und beschreibt. In einem zweiten Artikel „On Xantho rivulosa and other Decapodous Crustacea occurring at Valentia Island“ (ebenda p. 58—69) zählt derselbe ebenfalls eine grössere Reihe Irischer Arten aus der Ordnung der Decapoden auf, welche er mit Notizen über ihre Verbreitung u. s. w. begleitet.

Spence Bate („On the development of Carcinus Maenas,“ Proceedings of the Royal society of London, June 1857, Annals and magaz. of nat. hist. XX. p. 297) wies die zuerst von Thompson gemachte Beobachtung, dass die Gattung Zoëa (in der Milne Edwards eine Jugendform von Anomuren vermuthet) der Larvenzustand von Carcinus sei, durch Darlegung der allmählichen Uebergangsstufen zwischen Zoëa und Megalopa einerseits und zwischen Megalopa und Carcinus andererseits, als begründet nach. Beim Ausschlüpfen aus dem Eie fehlt, dem Verf. zufolge, den Brachyuren das letzte (siebente) Segment des Kopfes, eins oder mehrere des Thorax und das vorletzte des Hinterleibs; je mehr abwärts in der Reihe der Formen ein Crustaceum steht, desto mehr nähert sich die Larvenform der des ausgebildeten Thieres. (Gegen die Richtigkeit dieser Theorie liessen sich nach beiden Seiten hin mehrfache Beispiele anführen. Ref.) Die Anhängsel, welche die wesentlichen Theile der Larve ausmachen, werden zu secundären Theilen der entsprechenden Organe beim erwachsenen Thier, wie z. B. die unteren Antennen der Larve durch den Fühleranhang des ausgebildeten Krebses repräsentirt werden; der wirkliche Fühler des letzteren entwickelt sich aus der Basis des Embryo-Fühlers, welche nachher als schuppenförmiger oder dornartiger Anhang bei den Macrouren auftritt. Die Rudimente der künftigen Beine hat der Verf. kurz nach dem Ausschlüpfen der Larve beobachtet.

In Rücksicht auf den von Spence Bate gelieferten Nachweis des Zusammenfallens von Zoëa und Megalopa als Jugendformen mit Carcinus sieht sich Ref. veranlasst, hier zugleich einige von Guérin und Philippi unter jenen Gattungen beschriebene und abgebildete Formen aufzuführen. Guérin (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. XX ff. Tab. III) machte *Zoëa Leachii*, *Souleyetii*, *Boscii* und *West-*

woodii als n. A. von Cuba bekannt und fügt denselben unter dem Namen *Zoëides Guepratii* zugleich eine neue Gattung bei, die sich von *Zoëa* durch die hornige Consistenz des Cephalothorax, welcher glockenförmig ist und in einen langen, geraden Schnabel endigt (und daher in seiner Form einigermaßen an einen Gänseschädel erinnert), unterscheidet. Das erste und zweite Fusspaar ist mit einem geisselartigen Anhang versehen, der in einen Büschel langer Borsten endigt; das letzte Abdominalsegment ist gross, rund, scheibenförmig, das letzte Abdominalfusspaar in zwei Lamellen auslaufend. Abbildung Tab. III. Fig. 8.

Philippi beschrieb (dies. Archiv für Naturgesch. XXIII, 1. p. 328. Taf. 14. Fig. 5) als neue Art von der Chilenischen Küste: *Megalopa Valdiviana*, die demnach wahrscheinlich die Larve einer mit *Carcinus* nahe verwandten Gattung ist.

Eine der merkwürdigsten und interessantesten von den bis jetzt bekannt gewordenen Larven-Formen der Decapoden ist die von Couch (Natural history review IV., Proceed. of societ. p. 251. pl. XVII) beschriebene und abgebildete der Gattung *Palinurus*, welche nach der Abbildung gewissermaßen an *Phyllosoma* erinnert. Der Cephalothorax der aus dem Ei geschlüpften *Palinurus*-Larve ist kurz eiförmig, halbkuglig gewölbt, vorn in einen kurzen, stumpfen Fortsatz endigend; die Augenstiele, zu beiden Seiten dieses Stirnfortsatzes entspringend, sind so lang wie der Cephalothorax selbst. Der Hinterleib ist schmal, sechsringlig, die vier ersten Ringe jederseits einen langen, peitschenartigen Anhang, der vielgliedrig und bald nach dem Ursprunge zweitheilig ist, tragend; jeder dieser Theile endigt in eine lange Borste.

Brachyura. Oxyrrhyncha. — Ueber die den Sunda-Inseln eigenthümlichen Majaceen hat P. Bleeker „Sur les Décapodes oxyrhinques de l'Archipel Indien“ (Acta societ. scient. Indo-Neerlandicae, Vol. II) nähere Auskunft gegeben. Durch die früheren Autoren, wie Latreille, Leach, Guérin, Milne Edwards und White waren im Ganzen 15 Arten von dorthier bekannt geworden; diesen werden von Bleeker 8 andere hinzugefügt, von denen zwei schon anderweitig aufgefunden worden waren, die sechs übrigen als neu beschrieben werden. Diese Arten vertheilen sich auf die Gruppen und Gattungen folgendermassen: 1) Inachoiden: *Camposcia* 1, *Egeria* 1, *Doclea* 6. 2) Majoiden: *Micippe* 1, *Chorinus* 1, *Criocarcinus* 1, *Zebrida* 1. 3) Parthenopiden: *Lambrus* 6, *Parthenope* 2, *Gonatonotus* 1, *Ceratocarcinus* 1, *Oethra* 1. Im Ganzen 12 Gattungen mit 23 Arten. Die Verbreitung dieser Arten erläutert der Verf. dadurch,

dass er für jede der grösseren Inseln (Java, Sumatra, Borneo, Celebes) oder der Insel-Gruppen (Molukken) die ihnen zukommenden aufzählt. — Als neue Arten werden beschrieben: *Doclea hybridoides* von der Westküste Sumatra's, *macracanthus* von Amboina, *microchir* von der Westküste Sumatra's, *Sebae* (*Araneus* seu *Cancer marinus rotundus* Seba) von Sumatra und Amboina, *brachyrrhynchos* von der Westküste Sumatra's, *Lambrus Rumphii* (*Cancer longimanus minor* Rumph) von Amboina. Die bereits beschriebenen Arten sind mit ausführlicher Synonymie aufgeführt und werden mit Bemerkungen über Vorkommen, besondere Eigenthümlichkeiten der dem Verf. vorliegenden Exemplare u. s. w. begleitet.

Die auf einer von den Vereinigten Staaten veranstalteten Weltumsegelung erbeuteten Majaceen hat W. Stimpson (Proceed. of the acad. of natur. scienc. of Philadelphia 1857. p. 216—221) aufgezählt und die darunter befindlichen neuen Gattungen und Arten charakterisirt. Die Zahl der aufgeführten Arten beträgt 40; davon sind neu: *Doclea gracilipes* und *canalifera* von Hongkong, *Hyas latifrons* von der Berings-Strasse, *Micropsia* n. g. „Carapax late ovatus, paulo convexus, vix spinosus, rostro bifido, spina praeorbitali sat valida; orbita supra unifissa, subtus aperta, oculi retractiles, non latentes; antennae externae articulo primo apice externo dentigero, parte mobili aperta; manus maris adulti digitis hiantibus, ad apices denticulatos solum contiguus. Pisae Syraeque affinis.“ Art: *M. ovata* von den Cap Verdischen Inseln. — *Tiarinia depressa* aus Japan, *spinigera* von den Inseln Ousima und Tanegasima, *Micippa spinosa* von Port Jackson, *Scyra compressipes* aus Japan, *Mithrax suborbicularis* aus dem Hafen Gaspar, *Achaeus lacertosus* von Port Jackson. — *Achaeopsis* n. g. „Carapax ovato-triangularis, convexus, spinulosus; rostrum breve, bifidum; spina praecularis acuta; oculi longi, ad carapacis latus retractiles, orbitis carentes, spina parvula postoculari. Antennae externae apertae, articulo basali angustissimo curvato. Fossae antennulariae amplae. Hectognathopoda eleganter granulosa vel spinulosa; mere articulo quinto ad angulum externum gerente. Chelopoda sat longa. Pedes ambulatorii graciles. Dactyli pedum sex posticorum falciformes. Abdomen in femina sexarticulatum. Eurypodio Achaeoque affinis.“ Art: *A. spinulosus* vom Cap. — *Stenorhynchus falcifer* vom Cap, *Menaethius dentatus* von den Amakirrima-Inseln, *Eurynome longimana* vom Cap, *Lambrus rugosus* von den Cap Verdischen Inseln, *tuberculosis* von Hongkong, *Cryptopodia contracta* aus China, *Ceratocarcinus albolineatus* (*Harrovia albolineata* Ad. und White) von Hongkong, *Oncinopus subpellucidus* von Port Jackson.

Derselbe (Crustacea of the Pacific shores of North-America p. 8 ff.) beschrieb folgende neue Gattungen und Arten: *Chionoecetes Behringianus* aus der Behrings-Strasse (= *Peloplastus Pallasii* des Ref.),

Loxorhynchus n. g. mit birnförmigem Cephalothorax und mehr oder weniger stacheliger, haariger Oberfläche; von *Pisa* durch weniger ausgehöhlte Orbitae, eine einzelne obere Fissur derselben, den Mangel der Dornen an den Tarsen und das breitere Basalglied der äusseren Fühler unterschieden; durch letzteres Merkmal zugleich von *Herbstia* und *Halimus* abweichend, von den *Chorininae* durch kürzeren und breiteren Rüssel und das Freiliegen der äusseren Fühler, von *Paramicippa*, mit der sie durch den herabgebogenen Rüssel übereinstimmt, durch längeres Epistom und die tiefere Stellung der äusseren Fühler abweichend. — Zwei Arten: *Lox. grandis* von S. Francisco und *crispatus*, ebenfalls von Californien.

Guérin (in Ramon de la Sagra, *Historia física de la isla de Cuba* VII. p. XII) beschrieb *Libinia distincta* als neue Art von Cuba.

Kinahan (*Journal of the Royal society of Dublin* I. p. 334): *Acanthonyx concamerata* von den Chinchas-Inseln, auf pl. XIV. fig. 1 abgebildet und p. 117 *Halimus auritus* (M. Edw. ?) von Port Philip.

H. de Saussure (*Rev. et Magas. de Zoologie* IX. p. 501) diagnosticirte *Pericera spinosissima*, *bicornis*, *Mithrax cornutus* und *Lambrus crenulatus* als neue Arten von den Antillen.

Cyclometopa. — Kinahan (*Journal of the Royal society of Dublin* I. p. 116) charakterisirte eine neue Gattung *Litocheira* mit einer von Port Philip stammenden Art *Lit. bispinosa*, welche nach der auf pl. III. fig. I. gegebenen Abbildung in der Form auffallend an *Galene bispinosa* de Haan erinnert. Der Cephalothorax ist quer quadratisch, gewölbt, die Stirn von der halben Körperbreite, in der Mitte seicht gebuchtet, die Seiten hinter dem äusseren Augenhöhlenspalte mit einem zweiten scharfen Zahne besetzt, von dem sich eine erhabene Kante nach hinten zieht; die inneren Fühler quer gestellt, die äusseren unter den Augen inserirt und den Spalt der Augenhöhle einnehmend, das Epistom von grosser Ausdehnung. Hinterleib des Männchens mit durchweg getrennten Ringen, die Beine zusammengedrückt, das letzte Tarsenglied des fünften Paares etwas erweitert, flachgedrückt und behaart. — Derselbe beschrieb ferner folgende Arten: *Ozius* (?) *serratifrons* n. sp. von Port Philip, pl. IV. fig. 1, *Pilumnoides perlatus* Edw. ebendaher, *Pilumnoides Danai* n. sp. von den Chinchas-Inseln (Pern) pl. XIV. fig. 2, *perlatus* Poepp. von Calao, *Lupa Sayi* (Gibbes ?) vom 23. Grad nördl. Breite.

de Saussure (*Rev. et Magas. de Zool.* IX. p. 502 ff.) gab Diagnosen von folgenden neuen Arten: *Panopeus occidentalis*, *serratus*, *americanus* und *Portunus Guadalupensis* von Guadeloupe, *Lupaea anceps* von Cuba. — Ebenda p. 304 von *Chlorodius Americanus* von Haiti.

Stimpson (*Crustacea of the Pacific shores of North - America*

p. 18 ff.) beschrieb *Cancer antennarius* n. A. von San Francisco; Abbildung pl. 18.

Portunus carcinoides wurde von Kinahan (Natural history review IV. Proceed. of societ. p. 66) als fragliche neue Art von der Irischen Küste beschrieben; sie ist mit *P. corrugatus* nahe verwandt.

Farran, On the occurrence of the marbled swimming-crab, *Portunus marmoreus*, at Birterbie-Bay (ebenda p. 58).

Catometopa. — de Saussure (Rev. et Magas. de Zool. IX. p. 305) stellte eine neue Gattung *Pseudotelphusa* auf, deren Schale wie bei *Boschia* geformt ist aber der Crista postfrontalis und der Zähnelung entbehrt; Kieferfüsse wie bei *Telphusa*, doch das dritte Glied fast dreieckig; Regiones jugales glatt; Mundöffnung von filzigem Ueberzuge umgeben. Art: *Pseudotelphusa americana* von Haiti. — Neue Arten sind ferner: *Sesarma americana* und *miniata* von St. Thomas, *Gecarcinus depressus* und *Cardisoma quadrata* von Haiti, (p. 502) *Metopograpsus gracilis* und *miniatus* von St. Thomas.

Kinahan (Journal of the Royal society of Dublin I. p. 123 ff.) machte ausführliche Mittheilungen über die Lebensweise des *Myctiris subverrucatus* White bei Port Philip und gab Beschreibungen (p. 341 ff.) von *Goniograpsus simplex* Dana, *Cyclograpsus punctatus* M. Edw. und *Cyclograpsus gnathierion* n. A. von Peru.

Oxystomata. — Stimpson (Crustacea of the Pacific shores of North-America p. 32 ff.) beschrieb eine neue Gattung *Randallia*, welche auf *Ilia ornata* Rand. bedründet ist und sich von *Ilia* durch folgende Charaktere unterscheidet: Cephalothorax oval, fast kuglig, glatt, hinten mit zwei Zähnen bewehrt, die seitlichen Mundgegenden gewinkelt, die Stirn schmal aber dick, in der Mitte concav, die Augenhöhlen dreispaltig, die Fühlergruben klein, schief, sehr hoch; das Basalglied der inneren Fühler deckelförmig, die Grube schliessend und den zurückgeschlagenen Theil des Fühlers verbergend. Abbildung der Art auf pl. XX.

Eine zweite Gattung *Bellidilia* begründete Kinahan (Journal of the Royal society of Dublin I. p. 117) auf eine bei Port Philip vorkommende Art: *Bellid. 11 - spinosa*, welche nach der Abbildung pl. III. fig. 2 ganz das Ansehn einer *Ilia* hat. Cephalothorax fast kreisrund, hinten mit drei Dornen besetzt, von denen der mittlere länger ist und höher steht; Augenhöhlen offen, oben mit zwei Fissuren, Fühlergruben fast quer, mit den Augenhöhlen nicht communicirend, Stirn kürzer als das Epistom; dieses sehr schmal; am Abdomen beider Geschlechter das dritte bis sechste Segment verwachsen, von den Beinen das erste Paar verlängert, mit zusammengedrückter Scheere, deren Finger schmal, blattartig dünn, am Innenrande crenulirt sind.

Notopoda. R. A. Philippi, „Abrote, ein neues Geschlecht

der Crustaceen aus der Familie der Hippaceen“ (in diesem Archiv f. Naturgesch. XXIII, 1. p. 124—129. Taf. 8). — Die Gattung und Art, welche der Verf. hier unter dem Namen *Abrote spinimana* als neu beschreibt und abbildet, ist bereits von Milne Edwards und Lucas (Archives du muséum d'hist. nat. II. 1841. p. 474. pl. 28) als *Albunhippa spinosa* ohne Angabe des Vaterlandes beschrieben und abgebildet worden; das hiesige Museum erhielt dieselbe aus Peru durch v. Tschudi, während Philippi seine Exemplare an der Chilenischen Küste auffand.

Remipes Cubensis n. A. von Cuba wurde von de Saussure (Rev. et Magas. de Zoologie IX. p. 502) diagnosticirt.

Pagurini. Folgende neue Arten dieser Familie wurden beschrieben:

Von Stimpson (Crustacea of the Pacific shores of North-America p. 42 ff.): *Eupagurus Samuelis* aus der Tomales-Bay und *Clibanarius turgidus* pl. 21. fig. 1, aus dem Puget-Sund.

Von Guérin (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. XIV): *Pagurus cinctipes* von Cuba.

Von de Saussure (Rev. et Magas. de Zoologie IX. p. 503): *Pagurus insignis* von Guadeloupe.

Von Kinahan (Natural history review IV. p. 84): *Pagurus Eblanensis* aus Irland und (Journal of the Royal society of Dublin I. p. 350 ff.) *Paguristes Weddellii* Edw. (hirtus Dana?) und *Clibanarius tomentosus* (M. Edw.?) von den Chinchas-Inseln.

Galatheidæ. Guérin (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. XVI) stellte die in Cuba einheimischen Arten der Gattung Porcellana in einer analytischen Tabelle zusammen, in dieser ihre unterscheidenden Merkmale entwickelnd. Die Arten sind folgende: *Porcellana violacea*, *laevigata*, *granulosa* (striata M. Edw.), *Poeyi*, *angulosa*, *punctata* (cristata M. Edw.), *Sagrae*, *Gundlachii*, *Desmarestii*, *amoena*, *galathina* Bosc., *tuberculata* (lobifrons M. Edw.), *tuberculata* M. Edw. (affinis Guér.), *grossimana* und *Parrai*. Diese Arten sind zum Theil schon von Guérin 1835 im Bullet. de la soc. des scienc. natur. beschrieben worden und später von Milne Edwards in seiner Hist. nat. des Crust. unter anderen Namen aufgeführt.

Kinahan (Journal of the Royal society of Dublin I. p. 345 ff.) beschrieb *Porcellana granulosa* Guér. (striata M. Edw.), *violacea* Guér., *carinata* n. A. von den Chinchas-Inseln bei Peru, pl. XIV. fig. 3 abgebildet, und *dubia* n. A. von Callao (Peru), pl. XIV. fig. 4.

Derselbe (Natural history review IV., Proceed. of societ. p. 84): *Porcellana priocheles* und (p. 228) *Galathea Andrewsii* neue Arten aus Irland.

Stimpson (Crustacea of the Pacific shores of North-America

p. 40): *Porcellana rupicola* n. A. von der Californischen Küste, auf pl. XX. fig. 2 abgebildet.

Loricata. Couch (Natural history review IV), Ueber die Larve der Gattung *Palinurus*. Siehe oben Decapoda!

Astacini. H. de Saussure, „Note carcinologique sur la famille des Thalassides et sur celle des Astacides.“ (Rev. et Magas. de Zoologie IX. p. 99—102). — Der Verf. bespricht zuerst die nahe Verwandtschaft der Thalassiniden mit den Astaciden, in Betreff deren er sich der Ansicht de Haan's und des Ref. anschliesst, ohne indess beide Gruppen vereinigen zu wollen. Als einen Uebergang zwischen beiden sieht er eine neue Gattung *Halopsyche* mit einer Art *Hal. lutaria* von Cuba, die hier charakterisirt wird, an. Der Verf. hat sich jedoch mit dieser Gattung geirrt, welche, wie er selbst in einer brieflichen Mittheilung an den Ref. anerkannt hat, mit *Alpheus* identisch ist und also den Cariden zugehört. — Ferner beschreibt der Verf. zwei neue Amerikanische *Astacus*- (*Cambarus*) Arten: *C. consobrinus* von Cuba mit zwei seitlichen Dornen am Schnabel und *C. Montezumae* aus Mexiko, ohne solche Dornen.

Ebenda p. 503 diagnosticirt de Saussure: *Cambarus Aztecus* als neue Art aus Mexiko.

Kinahan (Journal of the Royal society of Dublin I. p. 130) beschrieb *Trypaea porcellana* n. A. von Port Philip, auf pl. 4. fig. 2 abgebildet.

Stimpson (Crustacea of the Pacific shores of North-America p. 50 ff.): *Callianassa longimana* von Fort Steilacoom pl. 21. fig. 5, *Astacus nigrescens* aus Californien, *Trowbridgii* von Astoria und *Klamathensis* aus dem Klamath-See.

Carides. Als neue Arten wurden in diese Familie aufgestellt:

Von Guérin (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. XVIII ff.): *Atya Poeyi*, *Alpheus Sauleyi*, *Candei*, *Poeyi*, *simus*, *Pontonia mexicana*, *Caridina americana*, *Gnathophyllum americanum* und *Hippolyte elongatus* (sic!) von Cuba.

Von Stimpson (Crustacea of the Pacific shores of North-America p. 55 ff.): *Crangon Franciscorum* aus dem Puget-Sund (pl. 22. fig. 5), *nigricauda* (vulgaris Owen) von San Francisco, *Hippolyte Taylori* aus Californien und *Pandalus Danae* aus dem Puget-Sund pl. 21. fig. 6 u. 7 abgebildet.

Von de Saussure (Rev. et Magas. de Zoologie IX. p. 504) durch Diagnosen folgende *Palaemon*-Arten bekannt gemacht: 1) Scheeren cylindrisch, dünn. a) Carpus kürzer als die Finger: *Palaemon Aztecus* und *Montezumae* von Vera-Cruz. b) Carpus länger als die Finger: *Pal. mexicanus* von Cuba und Mexico, *consobrinus* von Vera-Cruz. — b) Schneiderrand der Scheeren concav, Füsse des zweiten

Paares sehr ungleich: *Pal. Faustinus* von Haiti. — Ferner: *Caridina mexicana* von Vera - Cruz. — Ebenda p. 306: *Sicyonia cristata* von Cuba.

Von Herklots (Mémoires d'entomologie publ. p. l. soc. entom. des Pays-Bas I. p. 96): *Palaemon Vollenhorii* von der Küste Guinea's.

Von Kinahan (Journal of the Royal society of Dublin I. p. 131): *Hippolyte ignobilis* von Port Philip und (Natural history review IV., Proceed. of societ. p. 81): *Crangon Allmanni* aus Irland, im Holzschnitte abgebildet.

Von v. Martens (in dies. Archiv f. Naturgesch. XXIII. p. 183): *Palaemon lacustris* aus dem Albaner-See, auf Taf. 10 abgebildet.

Cumacea. Spence Bate, „On the genus Cuma“ (Annals and magaz. of nat. hist. XIX. p. 106) erwiderte auf Agassiz's Behauptung, dass gewisse Cumaceen trotz der bei anderen nachgewiesenen Geschlechtsreife dennoch Larven von Macrouren seien: Ag. habe wohl Goodsir's Nachweis von dem Vorhandensein von Eiern bei *Cuma scorpioides* übersehen. Auch theilt er einen Brief von Couch mit, der sich mit den Larvenformen der Englischen Macrouren viel beschäftigt, aber niemals Cumaceen darunter wahrgenommen hat.

Stomatopoda.

Philippi machte (in dies. Archiv f. Naturgesch. XXIII, 1. p. 320 ff. Taf. 14) eine neue Gattung *Hoplites* (mehrfach vergebener Name!) aus dem Atlantischen Ocean bekannt, die zur Familie der Caridioiden und in die nähere Verwandtschaft von Mysis gehört. Der Cephalothorax endigt nach vorn in einen langen, scharf zugespitzten, an der Basis mit einem grossen Stirnzahn bewaffneten Schnabel; die oberen Fühler erreichen nur drei Vierteltheile des Schnabels, bestehen aus einem dicken Stiele von $\frac{2}{3}$ der Fühlerlänge und zwei kurzen, gleich gebildeten Geisseln. Die unteren Fühler sind von halber Körperlänge, ihre Schuppe länger als der Stiel der oberen, ihr Stiel aus zwei kurzen Basal- und einem langen, linearen Endgliede bestehend, ihre Geissel doppelt so lang als der Stiel. Hinterleib aus sechs freien Segmenten bestehend, von denen das zweite (die beiden ersten rechnet Philippi zum Cephalothorax) oben in einen langen, schräg nach hinten gerichteten Dorn endigt. Die Art: *H. longirostris* wurde unter 25° N. B., 22° W. L. im Atlantischen Ocean gefangen. — Eine neue Art der Gattung *Thysanopus* wird als *Th. australis* von der Chilenischen Küste beschrieben (p. 319), ebenso *Leucifer Zybrantsii* n. sp. aus dem Atlantischen Ocean, 25° N. B., 22° W. L. (p. 323).

Die Gruppe der Erichthinen bereicherte derselbe (ebenda p. 324 ff.) mit zwei neuen Arten der Gattung *Alima*, die unter dem Namen *Alima*

Valdiviana und *ctenura* beschrieben und auf Taf. 14 abgebildet werden; beide wurden vor dem Hafen von Valdivia gefangen. Eine eigenthümliche neue Gattung, wie der Verf. glaubt, mit *Erichthus* verwandt, wird unter dem Namen *Euacanthus* beschrieben und auf Taf. 14 abgebildet; ihre geringe Grösse ($6\frac{1}{2}$ Lin.) verbunden mit der sehr abweichenden Körperbildung giebt der Vermuthung Raum, dass man es hier nur mit einer Larvenform zu thun hat. Der (von oben betrachtet) eiförmige Cephalothorax endigt vorn in einen sehr langen Stachel, dreimal so lang als der Cephalothorax selbst; hinten läuft er in zwei ebenfalls sehr lange und dünne, gerade Stacheln aus, die ihn selbst an Länge etwas übertreffen. Der Hinterleib ist vom Cephalothorax zum grössten Theile überdeckt, sechsringlig und endigt in eine breite Schwanzflosse, die am Hinterrande mit dreizehn langen, gefiederten Borsten besetzt ist. Die Augen sind gross, kurz gestielt, die ersten Fühler dreigliedrig, nur doppelt so lang als die Augen, die zweiten Fühler zweiästig, die beiden Aeste gleich lang. Nur zwei Paar Brustfüsse vorhanden, welche zweiästig und am Endgliede des längeren Astes mit fünf langen, steifen Borsten besetzt sind; drei Paar stummelartige Abdominalfüsse, aus zwei Gliedern bestehend. — Art: *Euacanthus longispinus* von der Chilenischen Küste.

Guérin (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. XXII. pl. III) beschrieb und bildete ab: *Smerdis d'Orbigny* und *Alimerichthus cylindricus* als neue Arten von Cuba.

Amphipoda.

Eine systematische Eintheilung der in England einheimischen Amphipoden hat C. Spence Bate unter dem Titel: „A Synopsis of the British Edriophthalmous Crustacea, Part I. Amphipoda“ in den Annals and magaz. of nat. hist. XIX. p. 135—152 veröffentlicht. Die Arbeit ist eine weitere Ausführung der schon im Jahresberichte 1856. p. 203 erwähnten analytischen Tabelle der Familien, Unterfamilien und Gattungen der Englischen Amphipoden und ist vom Verf. in Gemeinschaft mit Westwood ausgearbeitet. Sowohl die Familien, Gruppen und Gattungen als die Arten sind durch Diagnosen festgestellt, bei letzteren, die zum grössten Theil neu sind, die speciellen Fundorte angegeben. — Für die einzelnen Körpertheile bringt der Verf. zum Theil neue Termini in Anwendung, indem er die sieben Thoraxsegmente, welche auf den Kopf folgen, als „Pereion“ und zwar die beiden ersten als „Anterior Pereion,“ die fünf hinteren als

„Posterior Pereion“ bezeichnet; ebenso wird für das Abdomen (Postabdomen) die Bezeichnung „Pleon“ und zwar „Anterior Pleon“ für die drei ersten Segmente, „Posterior Pleon“ für die folgenden gebraucht. Die dem „Anterior Pereion“ ansitzenden Beine heissen „Gnathopoda,“ die dem „Posterior Pereion“ angehörigen „Pereiopoda,“ die des Postabdomen „Pleopoda;“ letztere zerfallen wieder in „Anterior und Posterior Pleopoda.“ — Die vom Verf. gegebene Eintheilung ist folgende:

I. Gruppe. Amphipoda normalia.

Divisio 1. Gammarina.

Subdivisio I. Vagantia. Bauen keine Wohnhüllen.

Tribus 1. Saltatoria.

1. Fam. *Orchestidae*. Obere Antennen kürzer als die unteren; Hüften stark ausgebildet; die hinteren Abdominalfüsse kurz und kräftig, die letzten unpaarig. — Gattungen: 1) *Orchestia*, darunter *Talitrus*, *Talorchestia* und *Orchestia* als Untergattungen vereinigt. Vier Englische Arten. — 2) *Allorchestes* Dana, zwei neue Arten. — 3) *Galanthis* n. g. Untere Antennen kaum länger als die oberen, Mandibeln ohne Palp, hintere Abdominalfüsse wie bei *Orchestia*. Eine neue Art.

Tribus 2. Natatoria.

2. Fam. *Gammaridae*. Körper zusammengedrückt, Beine lang und schlank, hintere Abdominalfüsse stark entwickelt, die letzten in der Regel die längsten. a) Subfam. *Stegocephalides*. Fühler fast gleich, Hüften der vier Vorderbeine sehr stark entwickelt. — Gattungen: 1) *Montagua* n. g. Obere Fühler ohne Anhang, Mandibeln ohne Palp, beide Gnathopoden mit fast scheerenförmigen Fingern, hintere Abdominalfüsse einästig. Vier Arten, z. B. *M. monoculoides* Montagu. — 2) *Danaia* n. g. Erstes Gnathopoden-Paar einfach, letztes Paar der Abdominalfüsse mit einfachem Stachel. Eine Art. — b) Subfam. *Lysianassides*. Obere Fühler kurz, birnförmig, zweites Gnathopoden - Paar lang, schwach, verkümmert scheerenförmig. 3) *Lysianassa* M. Edw. 4 Arten. — 4) *Scopelocheirus* n. g. Obere Fühler mit Anhang, erstes Gnathopoden - Paar in einen Pinsel endigend, zweites scheerenförmig. Eine Art. — 5) *Anonyx* Kroyer, 5 Arten. — c) Subfam. *Tetromatides*. Vier Augen, obere Fühler vor den unteren entspringend. 6) *Tetromatus* n. g. Kopf schnauzenförmig vorgezogen, obere Fühler von der Spitze entspringend, untere weiter hinten, Mandibeln mit Palp, Gnathopoden unvollkommen zum Greifen. 2 Arten. — d) Subfam. *Pontoporeides*. Kopf vorn kappenartig entwickelt, obere Fühler vor den unteren entspringend. 7) *West-*

woodia n. g. Kopf in eine Spitze ausgezogen, obere Fühler ohne Anhang. Eine Art. — 8) *Kroyeria* n. g. Kopf wie bei der vorigen Gattung, Carpus der Gnathopoden bis zur Spitze des Fingers vorgezogen. Eine Art. — 9) *Phoxus* Kroyer. 3 Arten. — 10) *Sulcator* Bate. 2 Arten. — e) Subfam. *Gammarides*. Obere Fühler nicht vor den unteren und niemals rudimentär, Gnathopoden in der Regel zum Greifen, letztes Paar der Abdominalfüsse in zwei Stacheln endigend, die mehr oder weniger gewimpert sind. 11) *Darwinia* n. g. Thorax aufgeschwollen, obere Fühler ohne Anhang, alle Füsse in einen einfachen Haken endigend. Eine Art. — 12) *Iphimedia* Rathke mit einer Art. — 13) *Acanthonotus* Owen mit einer Art. — 14) *Dexamine* Leach, 4 Arten. — 15) *Calliope* Leach, 1 Art. — 16) *Isaca* M. Edw. 1 Art. — 17) *Lembos* n. g. Obere Fühler mit kleinem Anhang, erstes Gnathopoden-Paar grösser als das zweite, erstes Paar der hinteren Abdominalfüsse kurz, das letzte sehr lang. 4 Arten. — 18) *Lonchomerus* n. g. von der vorigen Gattung durch die in einen langen Dorn ausgezogenen Schenkel des ersten Gnathopoden-Paares unterschieden. 1 Art. — 19) *Eurytheus* n. g. Erstes Gnathopoden-Paar kleiner als das zweite, obere Fühler mit Anhang. 1 Art. — 20) *Gammarella* n. g. Fühler wie bei *Gammarus*, die oberen mit Anhang, letztes Abdominal-Fusspaar mit einfachem Ast. 1 Art. — 21) *Amathia* Rathke 1 Art. 22) *Gammarus* auct. 17 Arten. — 23) *Urothoë* Dana. 1 Art. — 24) *Niphargus* Schioedte. 1 A. — 25) *Thersites* n. g. Das zweite Glied der oberen Fühler tritt vor der Unterseite des ersten hervor, zweites Gnathopoden-Paar in einen Pinsel endigend. 2 Arten. — f) Subfam. *Leucothoides* mit der einzigen Gattung: 26) *Leucothoë* Leach, 2 Arten.

Subdivisio II. Domicola. Leben in selbstgebauten Wohnungen.

3. Fam. *Corophiidae*. Die Hinterleibssegmente nicht mit einander verschmolzen. a) Subfam. *Podocerides* (*Nidifica*) bauen sich ihre eigenen Nester; Pedunculus der oberen Fühler viel kürzer als der der unteren, letztere sehr kräftig, zum Stützen anwendbar; letztes Paar der Abdominalfüsse in starke kurze Haken endigend. — Gattungen: 1) *Pleonexes* n. g. Obere Fühler ohne Anhängsel, Pedunculus der unteren Fühler fast bis zur Spitze der oberen reichend, Gnathopoden fast scheerenförmig, hintere Thoraxfüsse zum Greifen. Eine Art: *P. gammaroides*. — 2) *Amphithoë* Leach, 2 Arten. — 3) *Sunamphithoë* n. g. Gnathopoden des zweiten Paares grösser als die des ersten, hintere Abdominalfüsse mit einem schuppenförmigen Ast, der andere in zwei Haken endigend. 2 Arten. — 4) *Podocerus* Leach. 4 Arten. — 5) *Cyrtophium* Dana 1 A. — b) Subfam. *Cerapides* wohnen in Röhren, die sie aus verschiedenen Stoffen zusammenbauen. 6) *Erichthonius* M. Edw. 1 Art. — *Siphonoecetus* Kroyer 2 Arten. — c) Subfam. *Corophides* mit der einzigen Gattung 8) *Corophium* Latr. 1 Art.

4. Fam. *Cheluridae*. Die drei letzten Hinterleibssegmente in Eins zusammengeschmolzen. Gattung: 1) *Chelura* Phil. 1 Art.

Divisio 2. *Hyperina*.

5. Fam. *Hyperidae* mit der einzigen Gattung *Hyperia* Latr. 2 Arten.

6. Fam. *Phronomidae*. Gattung *Phronoma* Latr. 1 Art.

7. Fam. *Typhidae*. Gattung *Typhis* Risso. 1 Art.

II. Gruppe. *Amphipoda aberrantia*.

8. Fam. *Dyopedidae*. Letztes Thorax- und Abdominalsegment fehlt, die Hüften der beiden letzten Thoraxfusspaare mit dem Körper verschmolzen. Gattung: *Dyopedos* n. g. 6tes und 7tes Fusspaar am sechsten Thoraxsegmente befestigt, letztes Abdominalfusspaar fehlt. 2 Arten.

9. Fam. *Caprellidae*. Abdomen rudimentär, Hüften mit dem Körper verwachsen. Gattungen: 1) *Proto* Leach 2 Arten. — 2) *Prorella* Dana 1 Art. — 3) *Caprella* Lam. 5 Arten. — 4) *Cyamus* Latr. 4 Arten.

Die Englische Amphipoden-Fauna ist hiernach eine sehr reichhaltige, sie umfasst 104 Arten in 46 Gattungen; ein Ergebniss, welches keineswegs auffallend ist, da bekanntlich die Amphipoden der gemässigten und nördlichen Zone vorzüglich zukommen.

Als neue Arten verschiedener Familien wurden beschrieben:

Von Stimpson (Crustacea of the Pacific shores of North-America p. 73 ff.: *Caprella californica*, *Corophium spinicorne*, *Salmonis*, *Erichthonius rapax*, *Orchestia Traskiana*, *Allorchestes seminuda*, *plumulosus*, *Gammarus conferviculus* (!) und *Phoxus grandis* von San Francisco.

Von de Saussure (Rev. et Magas. de Zoologie IX. p. 505): *Amphithoë Aztecus* von Vera-Cruz.

Von Spence Bate (Natur. history review IV., Proceed. of societ. p. 229. pl. XVI): *Iphimedia Eblanae* n. A. aus Irland.

In einer Inaugural-Dissertation „De Gammaro puteano“ (Berlin 1857. fol. 14 pag. c. tab. 2) erörterte A. de la Valette St. George einige spezielle anatomische Verhältnisse der genannten Art. Eigenthümliche, kurz gestielte, cylindrische Organe hat derselbe an den Geisseln der vorderen Fühler, besonders zahlreich an ihrem Ende beobachtet (ob Geruchs- oder Tastorgane?). Von inneren Organen wird auf den Tractus intestinalis, das Gefässsystem und die Genitalien kurz eingegangen; am Schluss folgt eine Angabe der Längsverhältnisse aller Körpertheile. Als fragliches Synonym zu *Gammarus puteanus* zieht der Verf. *Gammarus stygius* Schiödte.

Isopoda.

Idotacidae. Die schon im Jahresbericht für 1852--53. p. 95

erwähnte, durch ihre enorme Grösse ausgezeichnete *Idotaeiden*-Form aus dem Antarktischen Meere, *Glyptonotus antarcticus* Eights, ist jetzt auch in Silliman's American Journal of science and arts, Vol. XXII. p. 391—394 ausführlich beschrieben und auf pl. 2 u. 3 in Lebensgrösse von der Ober- und Unterseite abgebildet worden. Sowohl durch ihre Form als Grösse, welche ($3\frac{1}{2}$ Zoll lang) diejenige von mittelgrossen Decapoden erreicht, ist diese Gattung eine der ausgezeichnetsten bisher bekannt gewordenen Crustaceen-Formen.

Idotaea consolidata und *resecata* Stimpson (Crustacea of the Pacific shores of North-America p. 63 ff. pl. XXII. fig. 7) sind zwei neue Arten von San Francisco.

Oniscodea. Ueber die in Irland einheimischen Gattungen und Arten dieser Familie liegt eine Arbeit von J. Kinahan (Natural history review IV, Proceed. of societ. p. 258—282. pl. XIX—XXII) unter dem Titel: „Analysis of certain allied genera of terrestrial Isopoda, with descriptions of a new genus and a detailed list of the British species of *Ligia*, *Philongria*, *Philoscia*, *Porcellio*, *Oniscus* und *Armadillidium*“ vor. Der Verf. unterwirft darin die Classification der Familie durch Brandt, Milne Edwards u. A. einer näheren Besprechung, erörtert sodann diejenigen Charaktere, welche nach seiner Ansicht zur Abgränzung der Gruppen und Gattungen von Belang sind, wie die Entwicklung der Epimeren, die Form des Kopfes, die Fühlerbildung, die Form und das Verhältniss des letzten Abdominal-segments zu seinen Anhängen u. s. w. und geht sodann zur Charakteristik der in Irland vorkommenden Gattungen und Arten über. Diese sind: *Armadillidium* 1 Art, *Oniscus* 2 A., *Porcellio* 7 A., davon *Porcellio cingendus* als neue Art aufgestellt, *Ligia* 1 A., *Philoscia* 1 A. und *Philongria* n. g., nach der Abbildung dem einheimischen *Ligidium Personii* Br. nahe stehend und mit diesem in eine und dieselbe Abtheilung (aber nicht zu *Trichoniscus*) gehörend. Die Charaktere sind: Kopf rundlich, ohne Lappen, innere Fühler verborgen, dreigliedrig, äussere Fühler mit rundem, nicht gelappten zweiten Gliede und fünfgliedriger Endgeissel, letztes Abdominalsegment quer, in der Mitte des Hinterrandes ausgebnchtet, seine Anhänge (letztes Abdominal-Fusspaar) mit gablig getheiltem Basalglied, welches zwei dornartige Endglieder trägt, deren äusseres scheinbar gegliedert ist. Art: *Philoceler* aus Irland und England. — Die beifolgenden Tafeln enthalten stark vergrösserte Abbildungen einiger Arten und zahlreiche Detail-Darstellungen der charakteristischen Körperteile.

H. de Saussure (Rev. et Magas. de Zoologie IX. p. 306 ff.) machte mehrere neue Arten und eine neue Gattung aus Cuba und Mexiko durch Diagnosen bekannt: *Armadillo Cubensis*, *Porcellio Poeyi*, *Cubensis*, *Sumichrasti* und *Cotillai* aus Cuba, *Porcellio Aztecus*, *mexicanus* und *Montezumae* aus Mexiko. — *Pseudarmadilla* n. g., Kopf-

bildung zwischen Armadillo und Armadillidium die Mitte haltend, der Vorderrand des Kopfes mit drei Hervorragungen, von denen aber die seitlichen den Fühlern nicht als Stütze dienen; das zweite Glied des letzten falschen Abdominal-Fusspaares füllt die Lücke zwischen den beiden letzten Segmenten aus und trägt an seinem Hinterwinkel ein rudimentäres drittes Glied. Der Körper ist missgestaltet; alle Thoraxsegmente haben ihren unteren Rand nach hinten verlängert, das Abdomen ist dachförmig gekerbt und die Augen scheinen zu fehlen. Art: *Ps. carinulatus* aus Mexico oder Cuba (?).

Waga (Annales de la soc. entomol. V. p. 827 ff.) beschrieb *Philoscia nctata* als neue Art von den Karpathen und bildete dieselbe auf pl. 14. No. 4 ab; sie ist nicht ganz so gross wie *Phil. muscorum*, schwarz, mit gelbgefleckten Seiten der vorderen Abdominalringe.

Lygia dilatata Stimpson (a. a. O. p. 63 ff., pl. XXII. fig. 8) ist eine neue Art von Fort Steilucoom.

Cymothodae. Von P. Bleeker ist in den Acta societatis scientiarum Indo-Neerlandicae Vol. II eine Abhandlung "sur les Isopodes Cymothodiens de l'archipel Indien" erschienen, in welcher er die von ihm auf verschiedenen Fischen des Sundä-Archipels gefundenen parasitischen Isopoden dieser Familie beschreibt und auf zwei beifolgenden Tafeln abbildet. Die 16 Arten, welche der Verf. auführt sind sämmtlich neu; die einzige bisher beschriebene Art, *Livoneca indica* M. Edw. von Sumatra, ist ihm unbekannt geblieben. *Aega macronema* auf der Haut verschiedener Fische von Batavia, *Nerocila trivittata* mit drei braunen Längsbinden, *phaiopleura* mit zwei seitlich braunen Längsbinden, *sundaica* ohne dunkle Längsbinden, erstere Art von Amboina, die beiden letzteren von Batavia. *Livoneca emarginata*, *Renardii* (Zee-Luys, Pou de mer Renard) und *Boscii* von Batavia; bei den ersten Arten ist der Kopf deutlich vom ersten Thoraxring eingeschachtelt, bei *L. emarginata* die Stirn concav und weit über die Basis der inneren Fühler hervortretend, bei *L. Renardii* convex und nicht über die Basis der Fühler heraustretend; bei *L. Boscii* ist der Kopf nicht merklich vom ersten Thoraxringe eingeschlossen. — *Anilocra leptosoma*, *rhodotaenia* und *dimidiata* von Batavia; die Arten gehören zur Gruppe *Canolira* Leach, die erste ist viermal so lang als breit, die äusseren Fühler erreichen das erste Thoraxsegment, die zweite ist fast dreimal so lang als breit, die äusseren Fühler erreichen das zweite Thoraxsegment, die dritte ist weniger denn dreimal so lang als breit, die äusseren Fühler erreichen das zweite Thoraxsegment. — *Cymothoa irregularis* von Amboina, *Edwardsii*, *Stromatei*, *marginata* und *rhinoceros* von Batavia; bei den vier ersten Arten sind die inneren Fühler durch die Stirn getrennt, bei der letzten berühren sie sich mit ihrer Basis. — *Lobothorax* n. g., mit

Cymothoa nahe verwandt, der Kopf ist jedoch ebenso lang als breit, die Thoraxringe in der Mitte des Hinterrandes eingeschnitten, die Verlängerungen des ersten Ringes an der Basis verengt, der fünfte Ring fast ganz vom vierten bedeckt, der fünfte bis siebente zusammen genommen kaum so lang als der vierte, der letzte Abdominalring quer, viel breiter als lang. Art: *Lob. typus* von Batavia.

de Saussure (Rev. et Magas. de Zoologie IX. p. 306 u. 505) beschrieb *Cymothoa parasita* von Cuba und *Anilocra mexicana* aus Mexiko als neue Arten.

Stimpson (Crustacea of the Pacific shores of North - America p. 63 ff.): *Livoneca vulgaris* von San Francisco, pl. XXII. fig. 9 abgebildet.

Sphaeromidae. Neue Arten sind: *Sphaeroma amplicauda* Stimpson (Crustacea of the Pacific shores of North-America p. 63 ff., pl. XXIII. fig. 1) aus der Tomales-Bay und *Sphaeroma fossarum* v. Martens (dies. Archiv f. Naturgesch. XXIII. p. 186. Taf. 10) aus den Pontinischen Sümpfen.

Bopyrini. Von Stimpson (a. a. O. p. 71 ff.) wurde ausser einer neuen Art: *Argeia pauperata*, welche parasitisch auf *Crangon Franciscorum* an der Californischen Küste vorkommt, eine Gattung *Phyllodurus* charakterisirt, deren Weibchen ziemlich kräftige, ankerförmige Thoraxbeine mit Klauen, aber ohne Kiemenanhänge besitzt. Der Hinterleib ist mit Kiemenanhängen versehen, von denen die oberen seitlich, mit zwei gleichen, verlängerten Lamellen, die unteren warzenförmig sind; erster Hinterleibsring mit klauenförmigen Rückenborsten versehen. Art: *Phyll. abdominalis*, auf *Gebia*-Arten in Californien parasitirend.

Branchiopoda.

J. Lubbock, An account of the two methods of reproduction in *Daphnia* and of the structure of the ephippium. (Philosoph. Transact. of the Royal soc. of London, Vol. 147. Pt. 1. p. 79—100. pl. 6, 7). — Der Verf. hat auf die seit Strauss und Jurine bekannte zwiefache Fortpflanzungsweise der Daphnien durch freie und durch die im Ephippium eingekapselten Eier von Neuem sein Augenmerk gerichtet und dieselbe vorzüglich in Rücksicht auf eine etwa auch hier statthabende Parthenogenesis geprüft. Er nennt in der vorliegenden, viele interessante Beobachtungen enthaltenden Abhandlung die sich frei in der Bruthöhle entwickelnden Eier „agamic eggs,“ freilich allein auf die schon den ältesten

Autoren bekannte und von ihm selbst wiederholt beobachtete Thatsache sich stützend, dass dieselben ohne unmittelbar vorhergegangene erneute Befruchtung zu wiederholten Malen zur Reife gelangen und abgelegt werden können, ohne jedoch mit Sicherheit in Abrede stellen zu können, dass eine Befruchtung überhaupt stattgefunden habe; denn da die Entwicklung von Eiern nicht an solchen Individuen festgestellt worden ist, welche von ihrem Ausschlüpfen an isolirt gehalten worden sind, kann wohl die einfache Annahme, dass beim Mangel eines Receptaculum seminis (welches bei näherer Untersuchung doch vielleicht nachzuweisen wäre), eine etwa früher stattgefundene Befruchtung keine nachhaltige Wirkung haben könne, nicht als beweisend für eine ungeschlechtliche Fortpflanzung erachtet werden. Ebenso wenig hat der Verf. mit Sicherheit nachgewiesen, dass Ephippialeier nur nach vorangegangenem Coitus sich entwickeln können, wenn er sie auch besonders zahlreich bei Anwesenheit vieler Männchen vorfand und sie zu wiederholten Malen nach beobachtetem Coitus auftreten sah; vielmehr möchte man sich durch seine Beobachtung, dass Weibchen nach Ablegung von Ephippialeiern, ohne inzwischen erfolgte Begattung abwechselnd freie Eier und dann abermals Ephippien erzeugten, zur Annahme veranlasst fühlen, es existire zwischen den Eiern beider Arten selbst kein Unterschied, am wenigsten aber ein solcher, der dem zwischen den Keimen und Eiern der Aphiden bestehenden entspräche. Ist hiernach das Dunkel, welches über der Fortpflanzungsweise der Daphnien bisher ruhte, noch keineswegs vollständig durch die Untersuchungen des Verf. gehoben, so werden wir durch dieselben doch über manche interessante Punkte, sowohl was die Entwicklung der Eier in den Ovarien als die eigentliche Natur des Ephippium betrifft, sehr eingehend belehrt. Für die innere Kapsel des Ephippium, deren Verhältniss zu der äusseren, die eine Verdickung der beiden Schalen ist, noch unbekannt war, hat der Verf. nämlich nachgewiesen, dass sie eine Fortsetzung der sich ablösenden alten Haut, mit der sie sich zu gleicher Zeit vom Körper trennt, darstellt; dem frei werdenden Ephippium haftet daher noch die abgeworfene Körperhaut an. Für die übrigen speziellen Beobachtungen

des Verf. müssen wir auf die interessante Abhandlung selbst verweisen.

Phyllopoda. Eine äusserst interessante Entdeckung ist die des seit hundert Jahren vergeblich gesuchten Männchen des *Apus canceriformis* Schöff., welche von Kozubowski („Ueber den männlichen *Apus canceriformis*“, dies. Archiv für Naturgesch. XXIII, 1. p. 312—318. Taf. 13) bekannt gemacht wurde. Der Verf. fand bei Krakau im Juli unter 160 Exemplaren des *Apus* 16 ohne Eiertaschen am 11ten Fusspaare, welches im Gegentheil mit den zunächstliegenden von ganz übereinstimmender Bildung war. Das Männchen ist durchschnittlich um ein Drittheil kleiner als das Weibchen, sein Rumpf schmäler, sein Cephalothorax mehr flachgedrückt; es ist von grösserer Lebenskraft, indem es in der Gefangenschaft weniger schnell stirbt und schwimmt im Wasser ununterbrochen und schnell auf der Oberfläche umher, indem es den Weibchen nachjagt. Die Untersuchung der inneren Geschlechtsorgane hat diese Thiere (Exemplare von Krakau liegen dem Ref. jetzt ebenfalls vor) unzweifelhaft als Männchen bestätigt. Die Hoden verzweigen sich ähnlich wie die Eierstöcke, haben dieselbe Lage zu beiden Seiten des Darms und werden von zahlreichen warzenförmigen Muskeln durchstrickt. Der Ausführungsgang der Samenkanälchen mündet mit einer sehr feinen Oeffnung an der hinteren Fläche des elften Fusspaares, aus welcher, wenn man ein Haar hineinschiebt, sogleich die weissliche Samenflüssigkeit hervortritt. Die Spermatozoen haben die Form von rundlichen Zellen mit körnigem Inhalt. — Auf Taf. 13 hat der Verf. eine vergrösserte Darstellung des Hodens und Eierstocks gegeben.

Lophyropoda.

Copepoda. C. Claus, „Das Genus *Cyclops* und seine einheimischen Arten“, mit einer Fortsetzung: „Weitere Mittheilungen über die einheimischen Cyclopiden“ (dies. Archiv f. Naturgesch. XXIII, 1. p. 1—40 und 205—210. Taf. 1—3 und Taf. 11). Der Verf. unterwirft zunächst den Körperbau der Cyclopiden einer genauen Beschreibung und berichtigt dabei manche von früheren Autoren gemachten Angaben. Er weist z. B. nach, dass sowohl beim Männchen als beim Weibchen das Abdomen aus sechs Ringen bestehe; bei letzterem, dem Fischer und Liljeborg nur fünf Segmente zuschreiben, ist das erste verkürzt und mit dem folgenden am Hinterrande verwachsen; dass es als selbstständiges Segment ursprünglich vorhanden ist, zeigen die früheren Entwicklungsperioden. Die vorderen grossen Antennen bestehen aus 17, 14, 12 oder 10 Gliedern, je nach den Arten; elfgliedrige Antennen, wie sie von Fischer bei einer Art angegeben werden, erkennt der Verf. bei vollständig entwickelten Formen

nicht an, sondern sieht die damit begabten Thiere als jüngere Formen solcher an, die bei vollständiger Ausbildung 17gliedrige Fühler besitzen. Die Mundtheile bestehen aus zwei Kieferpaaren und zwei Paaren Maxillarfüsse, nicht wie Milne Edwards angiebt aus dreien von jeder Art. Von inneren Organen werden die Kittdrüsen beider Geschlechter näher erläutert; die männlichen sondern einen Klebstoff zur Bildung der Spermatophoren ab, welche jedoch nicht durch die Vulva in die Eierstöcke hineingeschoben werden (Zenker), sondern an der unteren Seite des zweiten Abdominalsegments des Weibchens befestigt werden. — In dem folgenden speciellen Theile hat der Verf. einen Versuch gemacht, den *Cyclops quadricornis* der Autoren in eine Anzahl verschiedener Arten aufzulösen, die er nach constant wiederkehrenden Charakteren in der Form der einzelnen Körpertheile (Antennen, Füsse, Hinterleib, Schwanzanhänge, Endborsten) feststellt. Mit 17gliedrigen Fühlern: *Cyclops coronatus*, *tenuicornis*, *brevicornis* (vergebener Name in der Gattung!), *Leuckartii*, *pennatus*, *gigas*, *furcifer*, *bicuspidatus*; mit 14gliedrigen Fühlern: *Cyclops insignis*. (Die beiden Fischer'schen Arten: *C. serrulatus* und *canthocarpoides* werden ebenfalls beschrieben.) Die frühere Literatur ist bei der Sichtung dieser Arten nicht herangezogen worden, eine Sache, die freilich bei der ungenauen Beschreibung z. B. der Koch'schen Arten ihre Schwierigkeiten hatte. Die charakteristischen Merkmale der vom Verf. aufgestellten Species sind auf den vier beifolgenden Tafeln stark vergrössert dargestellt.

Ein Auszug dieser Arbeit („Die einheimischen Copepoden, eine kurze Notiz zur Lokalfauna Giessen's“) findet sich im 6. Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- u. Heilkunde, 1857. p. 117 ff. abgedruckt.

J. Lubbock, Description of eight new species of Entomostraca found at Weymouth. (Annals and magaz. of nat. hist. XX. p. 401—410. pl. X u. XI.) Die Copepoden-Formen, welche der Verf. durch Beschreibungen und Abbildungen zur Kenntniss bringt, sind für die geographische Verbreitung der niederen Crustaceen von Interesse, indem drei derselben zu Gattungen gehören, die bisher noch nicht aus den Nord-Europäischen Meeren bekannt geworden sind; zwei sind sogar Repräsentanten von Unterfamilien, die noch nicht als der Englischen Fauna angehörig nachgewiesen wurden. Die Arten sind folgende: *Calanus Euchaeta*, *anglicus*, *Diaptomus Baleanus*, *longicaudatus*, *Pontella Wollastoni*, *Pontellina brevicornis*, *Corycaeus anglicus*, *Monstrilla anglica*. — Auf den beifolgenden Tafeln sind einzelne charakteristische Körpertheile der beschriebenen Arten, wie Fühler, Füsse, Abdominalsegmente u. s. w. im Umriss dargestellt.

Siphonostomata.

Lernaeadae. Van Beneden, sur un Lernanthropé nou-

veau du Serranus Goliath. (Bulletins de l'académie royale des sciences de Belgique XXIV, 1. p. 51—62. c. tab.) Die hier beschriebene und abgebildete Art, welche an den Kiemen von Serranus Goliath in Mossambique aufgefunden wurde, wird *Lernanthropus Petersi* genannt; sie ist in beiden Geschlechtern bekannt geworden, welche sich wie gewöhnlich durch die Grösse des Körpers von einander unterscheiden, in der Form dagegen wesentlich übereinstimmen. Beim Männchen fehlt jedoch die grosse kreisrunde Rückenplatte des letzten Cephalothoraxringes so wie zwei seitliche Blätter an der Bauchseite des vorletzten Ringes, welche zwischen sich die Eiertrauben einschliessen; letztere hängen nicht frei herunter, sondern sind schleifenartig zusammengerollt. Von eigenthümlicher Form sind die schmalen, bandförmigen Anhänge der hinteren Cephalothoraxringe, welche, was der Verf. übersehen zu haben scheint, offenbar die verwandelten Schwimmfüsse sind.

Caligina. Derselbe, Sur un nouveau Dinémoure provenant du Scimnus glacialis“ (ebenda XXIV, 1. p. 226—234. c. tab.) lieferte eine ausführliche Beschreibung und eine Abbildung einer neuen Art: *Dinemura elongata*, von der Haut des Scimnus glacialis, nur im weiblichen Geschlechte bekannt. Das Thier ist von besonders langgestreckter Form und dadurch ausgezeichnet, dass der letzte grosse Cephalothoraxring nicht die kleinen Abdominalringe mit ihren blattartigen Anhängen von oben her bedeckt.

Eine nochmalige ausführliche Beschreibung und Abbildung von *Cecrops Latreillei* Leach und *Laemargus muricatus* Kroyer nach beiden Geschlechtern veröffentlichte van der Hoeven in einer Abhandlung: „Over *Cecrops* en *Laemargus*, twee geslachten van parasitische schaaldieren“ (Mémoires d'entomologie publiés par la soc. entom. des Pays-Bas I. p. 67—87. pl. 3 u. 4). Die an den Geschlechtsöffnungen des Weibchens der letzteren Art haftenden gestielten Blasen weist er als Spermatophoren nach, die bei der Begattung vom Männchen daselbst angeheftet werden. Beide Arten fand der Verf. parasitisch an den Kiemen von *Orthagoriscus mola*. Die beiden Tafeln enthalten vergrösserte Abbildungen der Thiere selbst nach beiden Geschlechtern so wie der verschiedenen Fusspaare und Mundwerkzeuge.

Argulina. Durch Heller („Beiträge zur Kenntniss der Siphonostomen“, Sitzungsberichte der mathem.-naturwiss. Classe der Akad. der Wissensch. zu Wien XXV. p. 89—108. Taf. I—III) wurde diese bis jetzt nur auf eine Gattung und wenige Arten beschränkte Familie durch einige interessante neue Formen bereichert: *Gyropeltis* nov. gen., von *Argulus* durch das Vorhandensein zweier grossen Hakenfüsse an der Stelle der vorderen grossen Saugnäpfe, den Mangel des vor dem Munde liegenden, von einer besonderen Scheide einge-

schlossenen Stachels und das mit einem Ruderanhang in gleicher Weise wie die beiden ersten versehene dritte Schwimmfusspaar unterschieden. Der schildförmige Cephalothorax läuft nach hinten in zwei runde seitliche Lappen aus, in deren Mitte das Abdomen liegt; auf der Oberseite zwei von einander entfernte Augen; Mund in einen kurzen Rüssel ausgezogen, die Mandibeln am Vorderrande gesägt; Fühler viergliedrig, zweites Maxillarfusspaar dicht neben dem Munde gelegen, mit kräftigem Endhaken; Schwanz zweilappig. Zwei Arten: *Gyropeltis longicauda* auf den Kiemen von *Hydrocyon brevidens* in Brasilien und *Kollari* ebenfalls aus Brasilien, Wohnthier unbekannt. — Zwei neue Arten von *Argulus* sind: *Argulus Nattereri* und *elongatus* ebenfalls aus Brasilien, erstere Art mit *Gyropeltis longicauda* zusammen auf *Hydrocyon* (Kiemen und Körperoberfläche). Alle diese Arten unterwirft der Verf. einer sehr gründlichen und ausführlichen Beschreibung sowohl nach ihren zoologischen als anatomischen Charakteren und zwar ist es besonders die erste Gattung *Gyropeltis*, über welche in Betreff ihrer Hautbedeckung, ihres Muskel- und Nervensystems, ihrer Circulations-, Respirations-, Verdauungs- und Geschlechtsorgane eingehende Beobachtungen mitgetheilt werden. Abbildungen der einzelnen Arten so wie ihrer charakteristischen Körperteile sind auf 3 Tafeln gegeben.

4. Arachniden.

Blanchard legte der Akademie der Wissenschaften zu Paris (*Comptes rendus*, 6. Avril 1857, *Rev. et Magas. de Zoologie* IX. p. 185) „*Observations relatives à la génération des Arachnides*“ vor. Der Verf. hat Untersuchungen über die Fähigkeit der weiblichen Spinnen, ohne vorangegangene Befruchtung entwicklungsfähige Eier hervorzubringen, wofür mehrere vorliegende Beobachtungen zu sprechen schienen, angestellt, ist jedoch dabei zu dem Resultate gekommen, dass eine solche Fähigkeit nicht angenommen werden könne, dass jedoch eine einmalige Befruchtung hinreiche, um zu wiederholten Malen fruchtbare Eier abzulegen.

In Ramon de la Sagra's *Historia física, política y natural de la isla de Cuba*, 2. Parte: *Historia natural*, Tom. VII. *Crustaceos, Aragnides é Insectos* (Paris 1857. fol.) sind die Arachniden von Lucas (p. XXIV ff. tab. 4, 5) bearbeitet worden. Näheres ist bei der obigen Berücksichtigung des Werkes (siehe Insekten!) mitgetheilt worden.

Eine zweite in faunistischer Beziehung wichtige Arbeit ist der in der *Natuurk. Tijdschr. voor Nederland. Indië* XIII. p. 399—434 nebst zwei Tafeln, erschienene „Bijdrage tot de kennis der Arachniden van den Indischen Archipel,“ door C. L. Doleschall. Der Verf. beschreibt darin eine beträchtliche Anzahl neuer Arachniden meist von Amboina, die mit wenigen Ausnahmen der Ordnung Araneidea angehören. Ausser den neuen Arten sind auch diejenigen, welche sich nach den früheren Autoren bestimmen liessen, aufgeführt und mit Bemerkungen über ihr Vorkommen versehen worden. Von den beifolgenden Tafeln enthält die erste Abbildungen zweier merkwürdigen neuen Formen, die zweite erläutert die Augenstellung von einer Reihe der beschriebenen Arten.

Endlich hat auch Kolenati (*Bullet. de la soc. imp. des naturalistes de Moscou* 1857. II. p. 430 ff.) einige Arachniden verschiedener Ordnungen, den Araneiden, Pseudoscorpionen und Acarinen angehörend, aus den Caucasus-Ländern und anderen Gegenden beschrieben.

Araneidea.

Ueber die Spinnen der Umgebung Presburg's machte G. Boeckh (*Verhandlungen des Vereins für Naturkunde zu Presburg* II. Jahrg., 2. Heft, p. 72—86) nähere Mittheilungen und stellte ein Verzeichniss der daselbst bisher aufgefundenen Araneiden in systematischer Reihenfolge zusammen. In demselben sind die Familien und Gattungen kurz charakterisirt, die Arten mit Notizen über Vorkommen und Lebensweise und mit der Synonymie aus den älteren und neueren Hauptwerken versehen.

Die aufgezählten Arten, im Ganzen 88 an Zahl, vertheilen sich auf die einzelnen Gattungen folgendermassen: *Dybdera* 1, *Clusiona* 2, *Segestria* 2, *Amaurobius* 2, *Drassus* 4, *Melanophora* 2, *Lycosa* 5, *Dolomedes* 2, *Ocyale* 1, *Sphasus* 1, *Eresus* 1, *Attus* 5, *Calliethera* 2, *Thomisus* 10, *Artamus* 1, *Philodromus* 2, *Sparassus* 2, *Epeira* 12, *Singa* 3, *Zylla* 4, *Mithras* 2, *Tetragnatha* 1, *Linyphia* 3, *Theridium* 11, *Tegenaria* 4, *Agelena* 1, *Argyroneta* 1 und *Pholcus* 1. — Neue Arten sind nicht beschrieben, doch wird eine Publikation solcher in Aussicht gestellt.

G. A. Six, Lijst van Spinnen in de Provincie Utrecht gevonden en getetermineerd (Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland II. p. 292—302). Der Verf. zählt die in der Provinz Utrecht von ihm aufgefundenen Araneiden in systematischer Reihenfolge mit Citaten von Walckenaer, Koch und Hahn und mit Angaben über ihr Vorkommen auf. Ihre Gesamtzahl beträgt 113 und zwar kommen auf die Epeiriden 15, Theridiiden 41, Ageleniden 5, Drassiden 6, Lycosiden 17, Thomisiden 11, Attiden 15 und Dysderiden 3 Arten. Ein Theridium, welches der Verf. für neu hält, wird diagnosticirt.

Supplement to a Catalogue of British Spiders, including remarks on their structure, functions, economy and systematic arrangement, by J. Blackwall (Annals and magaz. of nat. hist. XX. p. 497—503). Der Verf. vervollständigt hier abermals sein Verzeichniss der Britischen Araneiden (siehe Jahresbericht 1854. p. 197) durch Aufzählung der neuerlich entdeckten Arten, giebt zugleich Berichtigungen und Vervollständigungen zur Synonymie früher beschriebener und führt für seltene Arten neue Fundorte an.

Recensio critica Aranearum Suecicarum, quas descriperunt Clerckius, Linnaeus, de Geerus. Scripsit T. Thorell. Upsaliae 1856. — Ist dem Ref. nur dem Titel nach bekannt geworden.

Kirsch theilte (Entomol. Zeitung p. 318) eine Beobachtung über den Spinnenfaden mit, nach welcher eine grosse grüne Spinne (die Art ist nicht näher bezeichnet), welche mit einem Holzstäbchen vom Boden aufgenommen wurde, einen $2\frac{3}{4}$ Ellen langen Faden in schräger Richtung nach aufwärts gegen einen anderen festen Gegenstand ausspritzte und an dem Faden emporlief, nachdem sie sich durch Anziehen desselben überzeugt hatte, dass er erstarrt sei und dort festhafte.

Lucas legte der Akademie der Wissenschaften zu Paris (Comptes rendus, 28. Decbre 1857, Rev. et Magas. de Zoologie IX. p. 587 ff.) eine Abhandlung „Sur la rétractilité ou la non-rétractilité des ongles dans les tarsi des Aranéides du genre Mygale“ vor, in welcher er nachweist, dass bei einigen

Mygale-Arten (*M. Blondii* und *nigra*), die er lebend beobachtet hat, die Klauen der Füße nach Art der Katzen zurückziehbar, dagegen die Haken der Mandibeln wenig beweglich und nicht hervorstreckbar seien. Bei anderen Arten (den Algerischen *M. barbara*, *gracilipes* und *africana*) dagegen sind die Fussklauen nicht zurückziehbar, dafür aber die Haken der Mandibeln aufschlagbar und zum Furchengraben in der Erde dienlich. L. schlägt vor, die zahlreichen und einander sehr ähnlichen Mygale-Arten nach diesem Charakter in zwei Hauptabtheilungen zu bringen.

Derselbe beschrieb folgende neue Arten aus Cuba: *Filistata cubaecola*, *Sphasus Poeyi*, *Drassus insularis*, *Salticus Sagraeus* (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. XXVI ff. tab. IV), und diagnosticirte (Bullet. de la soc. entomol. p. CLX) als zwei neue Nord-Afrikanische Arten: *Olios geniculatus* aus der Algerischen Sahara und *annulipes* aus der Gegend von Tanger.

Von Kolenati (Bulletin de la soc. imp. des naturalistes de Moscou 1857. II. p. 440 ff.) wurde *Lycosa Singoriensis* Laxm. (*tarentula* et *Latreillei* Hahn) aus den Kirgisensteppen und *Lycosa albidorsa* als neue Art aus Sibirien beschrieben.

Dolleschall (Bijdrage tot de Kennis der Arachniden van den Indischen Archipel, Natuurk. Tijdschr. voor Nederl. Indië XIII. p. 406 ff.) beschrieb folgende neue Arten von Amboina: *Tegenaria argentata*, *Theridion miniaceum*, *Pholcus sisypoides*, *Tetragnatha serra*, *rubri-ventris*, *Ariadne* n. g. wahrscheinlich in die Nähe von *Tetragnatha* gehörig, folgendermassen charakterisirt: „Oculi octo, in antica cephalothoracis parte elevatione conica in series duas dispositi, prima ex oculis duobus, reliquis paullo maioribus, secunda antrorsum deflexa, ex ocellis sex constans. Mandibulae parvae, conicae, perpendiculares. Abdomen filiforme, longissimum, cephalothoracem longitudine multoties superans, sensim in processum flagelliformem exiens, organis telariis in ventris antica parte sitis. Palpi tenues, thoracis longitudine. Pedes tenues, antici reliquis paullulum longiores et fortiores, pare tertio brevissimo.“ — Art: *Ariadne flagellum* von Amboina auf Taf. I abgebildet. — *Epeira* (*Nephila*) *Walckenaëri*, *penicillum*, *imperialis*, (*Argyopes*) *crenulata*, *striata*, *trifasciata*, *Epeira radja*, *moluccensis*, *unicolor*, *manipa*, *malabarica*, *orichalcea*, *coccinea*, *thomisoides*, *Plectana brevispina*, *Bleekeri*, *Sturii*, *centrum*, *argoides*, *Olios mygalinus*, *malayanus*, *javensis* und *lunula* von Java, *Thomisus amboinensis*, *Sparassus psittacinus*, *Sphasus striatus*, *Attus alfurus*, *cornutus* und *obisoides*.

J. Blackwall, Descriptions of the male of *Lycosa tarentu-*

loides Maderiana Walck. and of three newly discovered species of the genus *Lycosa*. (Annals and magaz. of nat. hist. XX. p. 282—287.) Das Männchen der *Lycosa tarentuloides* Maderiana, welches der Verf. einer ausführlichen Beschreibung unterzieht, stammt von Porto Santo; die als neu beschriebenen Arten sind: *Lycosa ingens* von den Desertas (bei Madeira), *herbigrada* aus England und *pallipes* aus Algier.

Six (Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland II. p. 294) beschrieb *Theridium Henricae* n. A. aus den Niederlanden.

Derselbe „Opmerkingen omtrent de kleurverandering van *Epeira Heerii* Hahn en eenige andere spinnen“ (Mémoires d'entomol. publ. p. I. soc. entom. des Pays-Bas I. p. 168 ff.) beobachtete, dass *Singa nitidula* Koch mit weissen Streifen in *Singa trifasciata* Koch mit gelben und endlich auch in *Singa nigrifrons* Koch mit orange-rothen Streifen durch Verfärbung übergeht, so dass die Vereinigung dieser drei Arten zu *S. Heerii* Walck. gerechtfertigt erscheint. Auch bei einigen anderen Arten hat der Verf. eine ähnliche Schwankung in der Farbe beobachtet.

van Hasselt (ebenda I. p. 164) „Over huid- en kleurverwisseling van *Dolomedes fimbriatus* Hahn, in verband mit zijne soortbepaling en die van andere spinnen uit dit geslacht“ beobachtete ähnliche Haut- und Farben-Veränderungen an einigen *Dolomedes*-Arten. *Dolomedes limbatus* Hahn verwandelte sich in *Dol. fimbriatus* während des Sommers, letztere Form dagegen in erstere wieder während des Winters. Walckenaër und Koch gaben zwar schon die Identität beider Arten an, betrachten sie aber als Varietäten. Auch *Dolomedes plantarius* und *riparius* Hahn hält der Verf. mit Walckenaër für dieselbe Art, ebenso *D. sacer* und *oblongus*.

Pedipalpi.

Phrynides. Lucas (Historia fisica de la isla de Cuba VII. p. XXV. pl. 5. fig. 4) gab Beschreibung und Abbildung einer neuen Art: *Telyphonus Antillianus* von Cuba.

Dole schall (Natuurk. Tijdschr. voor Nederl. Indië XIII. p. 404) machte *Telyphonus seticauda* n. A. von Amboina bekannt.

Solifugae.

Galeoden. Léon Dufour (Annales de la soc. entomol. V. p. 64 ff.) gab eine Beschreibung des Weibchens von *Galeodes phalangista* Savigny aus Algier und bildete dasselbe auf pl. 4 ab.

Pseudoscorpiones.

Pseudoscorpiones. Von Kolenati (Bulletin de Moscou 1857. II. p. 430 ff.) beschrieb *Chelifer brevimanus* als neue Art aus

dem Caucasus, wo sie in Häusern und unter Baumrinde lebt; die Unterschiede von *Chel. cancroides* werden auseinandergesetzt. — Ferner: *Obisium pusio* n. A. von Calcutta.

Phalangita.

Phalangita. *Phalangium Amboinense* n. A. von Dole-schall (Natuurk. Tijdschr. voor Nederl. Indië XIII. p. 403) aus Amboina beschrieben.

Acarina.

Krätze und Räude, entomologisch und klinisch bearbeitet von A. C. Gerlach. Mit 8 Tafeln Abbildungen. Berlin 1857. (8., 178 pag.) — Der Verf. hat in dieser Arbeit die Ergebnisse seiner mehrjährigen Studien über die den Krätz- und Räude-Ausschlag des Menschen und der Hausthiere bedingenden Sarcoptiden niedergelegt und die Kenntniss dieser Thiere selbst so wie besonders ihre Naturgeschichte in ausgezeichneter und umfassender Weise gefördert. Hauptsächlich stellt er darin zuerst fest, dass die Hautkrankheit der Hausthiere durch zwei sowohl im äusseren Körperbau als in der Lebensweise ganz verschiedene Milben hervorgerufen wird, indem nur die Gattung *Sarcoptes* sich in die Haut eingräbt und in derselben die bekannten Gänge erzeugt, zwei andere dagegen, welche *Dermatodectes* und *Symbiotes* genannt werden, dies niemals thun, auch ihrem Körperbaue nach nicht dazu geeignet sind.

Während bei *Sarcoptes* die Rückenfläche des Körpers mit Papillen besetzt ist, die zwei vorderen Beinpaare sehr kurz sind, die hinteren fast in der Mitte der Unterseite des Körpers entspringen, fehlen bei *Dermatodectes* und *Symbiotes* (der Name ist bei den Coleopteren vergeben!) die Papillen der Oberseite, die Beine sind langgestreckt und die beiden hinteren Paare dicht am Seitenrande des Körpers eingelenkt. Bei *Dermatodectes* kann der spitze Rüssel perspektivartig eingezogen und vorgeschoben werden und der Stiel der Haftscheibe an den Füßen ist deutlich gegliedert; bei *Symbiotes* ist der Kopf kürzer und nicht perspektivartig ausschiebbar, ohne Rüssel, die Stiele der sehr grossen Haftscheibe kurz und nicht gegliedert. — Von *Sarcoptes* sind dem Verf. 6 Arten bekannt geworden, welche er nach den Woonthieren *Sarcoptes hominis*, *equi*, *suis*, *canis*, *cati* und *caniculi* nennt und nach beiden Geschlechtern in starker Vergrösserung abbildet; nach den Abbildungen möchten jedoch die vier ersten einer

und derselben und die beiden letzten ebenfalls einer (zweiten) Art angehören. (In Anerkennung des Mangels unterscheidender Merkmale hält der Verf. sie auch selbst nur deshalb für verschiedene Arten, weil sie nur auf demselben Wirthiere fortkommen, dagegen auf andere übersiedelt unkommen sollen.) Auch an den drei *Dermatodectes*-Arten, *D. equi*, *bovis* und *oris* möchten sich wohl kaum spezifische Differenzen nachweisen lassen, ebenso wenig an *Symbiotus equi* und *bovis*. — Eine Milbe, die an einer Maus Räudeausschlag am Ohr erzeugte, ist auf Taf. 8 ebenfalls abgebildet.

Die auf dem Körper der Fledermäuse lebenden Schmarotzer-Milben hat Kolenati (die Parasiten der Chiropteren, Dresden 1857) einer speziellen Untersuchung unterworfen und auf p. 15–30 ausführlich beschrieben. Es sind ihm im Ganzen 44 Arten, die sich auf 8 Gattungen vertheilen, bekannt geworden und zwar sind dieselben mit wenigen Ausnahmen als neu angesehen und aufgestellt worden. Von den Gattungen gehören zwei den Microphthiren, vier den Ixodinen und zwei den Gammasiden an.

Von Microphthiren ist die Gattung *Caris* Latr. durch vier Arten vertreten, welche *C. elliptica* (*Caris Vespertilionis* Latr.), *longimana*, *decussata* und *inermis* genannt werden. Die zweite Gattung *Otonissus* Kolen., deren Arten die Ohrränder und einzeln auch die Flughaut der Fledermäuse bewohnen, hat einen ovalen, walzigen, weichen Körper, zwei Augenpunkte am Vorderrande der Brust, perlschnurartig gegliederte Beine, die Tarsen ohne Haftlappen, zurückschlagbare oder nicht retraktile Krallen, ein scheerenförmiges Endglied der Taster u. s. w. Es werden davon 7 Arten unter den Namen *O. aurantiacus*, *flavus*, *puniceus*, *pinnipes*, *amplificatus*, *moneta* und *seminulum* beschrieben. — Die vier Gattungen der Ixodinen sind: 1) *Dermanissus* Dug. mit acht Arten: *D. flavus*, *granulosus*, *rubiginosus*, *lobatus*, *brunneus*, *glutinosus*, *scutatus* und *setosus*. 2) *Sarconissus* Kolen. auf *Ixodes flavipes* Koch begründet, ausser dieser mit fünf Arten: *S. brevipes*, *hispidulus*, *exaratus*, *Kochii* (*Vespertilionis* Koch) und *flavidus*. 3) *Haemalastor* Koch mit einer bekannten Art. 4) *Ixodes* Latr. mit 1 Art (*holsatus* Fab.). — Zu den Gammasiden gehören: 1) *Ancystropus* Kolen., eine sehr merkwürdige Form mit ovalem, plattgedrückten, lederartigen Körper und sehr kräftig entwickeltem vorderen Beinpaar, welches in zwei sehr starke, divergirende Klauen endigt. Art: *A. Zeleborii* von der Flughaut des *Rhinopoma microphyllum*. 2) *Pteroptus* Duf. mit 14 Arten von verschiedenen Fledermäusen: *Pt. arcuatus* Koch, *myoti*, *dasycnemi*, *barbastelli*, *transversus*, *discolor*, *emarginatus*, *carnifex* Koch, *punctolyra*, *psi*, *interruptus*, *hipposideros*, *lateralis* und *conspersus*.

Derselbe (Bullet. d. l. soc. imp. des natural. de Moscou 1857. No. II. p. 432 ff.) beschrieb *Ixodes cornuger* (!), pl. VI. fig. 52 abgebildet, aus den Steppen beim Aral-See, wo er am Grase sitzt und häufig auf Schafe, Pferde und Kameele übergeht, *Ixodes hispanus* Fabr. und *holsatus* Fabr., beide ebenfalls in den Kirgisensteppen vorkommend, *Haemalastor crassipes* n. sp., in Aegypten auf *Rhinolophus elivus* vorkommend.

Desselben „Synopsis prodroma der Flughaut-Milben (Pteroptida) der Fledermäuse“ (Wiener Entomol. Monatsschr. I. p. 59) enthält eine Zusammenstellung und Unterscheidung der 25 dem Verf. bekannten Pteroptus-Arten, von denen 16 bereits in den „Parasiten der Chiropteren“ beschrieben sind, in einer analytischen Tabelle und eine versuchte Trennung derselben in mehrere Gattungen, welche *Periglischus*, *Tinoglischus*, *Leiostaspis*, *Meristaspis*, *Tristaspis*, *Diplostaspis* und *Monostaspis* genannt werden.

A. Scheuten, „Einiges über Milben“ (in dies. Archiv f. Naturgesch. XXIII, 1. p. 104—112. Taf. 6 u. 7). Verf. fand in schwarzen, pustelartig aufgetriebenen Flecken von Birnbaumblättern unter der Epidermis kleine längliche Milbenlarven mit zwei Fusspaaren jederseits nahe an der Mundöffnung, und zugleich auf denselben Blättern ausgebildete Milben mit vier Fusspaaren; da sich Uebergänge zwischen beiden Formen auffinden liessen, hält er dieselben nur für Entwicklungsstufen einer und derselben Art, welche er für neu hält und *Typhlodromus pyri* (Abbildung Taf. 6) nennt. Zu einer anderen Milbenlarve von Birnbaumblättern, die sich von der ersten durch konischen Körper (Taf. 6. Fig. 8) unterscheidet, ist die erwachsene Form noch nicht aufgefunden worden. — Eine zweite sowohl in der Larven- als ausgebildeten Form bekannte Milbe, ebenfalls von Lindenblättern, wird auf Taf. 7 abgebildet und mit dem Namen *Flexipalpus tiliae* belegt; der Verf. rechnet sie zusammen mit *Typhlodromus* den Gammasiden Dug. zu. Zu den Trombidien bringt er eine dritte schön grün gefärbte Milbe mit rothen Augen (Taf. 7. Fig. 13, 14) die er *Sannio rubrioculus* nennt.

Ueber massenhaftes Auftreten von *Tetranychus telarius* Lin. an den Lindenbäumen in Bautzen berichtete v. Kiesenwetter (Berl. Entom. Zeitschr. I. p. 172).

A. Bernstein (Acta societatis scientiarum Indo-Neerlandicae II) in seinem „Bijdrage tot de nadere kennis van het geslacht Collocalia Gr.“ bildete eine auf *Collocalia* (Cypselus) esculenta gefundene Milbe unter dem Namen *Acarus Collocaliae* ab, ohne dieselbe jedoch zu beschreiben.



Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Mollusken während des Jahres 1857.

Vom

Herausgeber.

Von Pfeiffer's „Novitates conchologicae, Abbildung und Beschreibung neuer Conchylien“ erschienen 1857 die Lieferungen 8 und 9. Die darin abgebildeten Arten gehören den Gattungen Clausilia, Bulimus, Achatina, Trochatella, Helicina, Cyrena, Schasicheila, Pterocyclos, — ferner Cataulus, Chondropoma, Ceres, Helix, Ctenopoma, Megalomastoma an, wo sie unten näher bezeichnet sind.

Das Jahr 1857 brachte von der Küster'schen Ausgabe des Martini-Chemnitzer'schen Conchylien-Cabinets die Lieferungen 153—160. In ihnen sind die Gattungen Bulimus (No. 366—373 Schluss), Partula mit 23 Arten, Achatinella mit 15 Arten abgehandelt, Clausilia ist von No. 149—169, Achatina von 1—15 fortgeführt. Ferner sind Cassis mit 35, Cassidaria mit 3, Oniscia mit 7, Dolium mit 18, Eburna mit 9, Harpa mit 11 Arten abgeschlossen. Einige neue Arten s. unten.

Die „Conchologia iconica, or figures and descriptions of the shells of Molluscous animals, with critical remarks on their synonymes, affinities and circumstances of habitation“ by Lovell Reeve hat ihren Fortgang gehabt. Im Jahre 1857 sind die Lieferungen 163—170 erschienen. Dieselben enthalten die Gattungen Solellectina mit 21 Arten, Capsula mit 16 Arten, Psammobia mit 60 Arten, Sanguinolaria mit 5 Arten, Psammotella Desh. nov. gen. mit 7 neuen Arten, Avicula mit 75 Arten, Littorina mit 91 Arten, Mytilus mit 29 Arten, noch nicht vollendet, Modiola mit 48 Arten, Litho-

domus noch nicht vollendet. Aus genannten Gattungen sind meist zahlreiche neue Arten unten namhaft zu machen.

Part XVII von Sowerby's *Thesaurus Conchyliorum*, welcher 1857 erschien, enthält den Anfang einer Monographie der Gattung *Conus*, nämlich 15 Tafeln mit Abbildungen. Der Text wird in dem folgenden Theile enthalten sein.

Von Maria Emma Gray's Werke „*Figures of Molluscous animals, selected from various authors, etched for the use of students*“ hat der fünfte Band, London 1857, die Conchiferen und Brachiopoden gebracht. Er besteht aus 69 Tafeln mit 49 Seiten Text. In letzterem ist eine Erklärung der Abbildungen mit Angabe der Werke, aus denen sie copirt sind, enthalten, so wie eine systematische Anordnung der Figuren. Letztere kann zugleich als Schlüssel zu dem System des Dr. Gray betrachtet werden. Der Hauptwerth des Werkes, welches hiermit wohl abgeschlossen sein dürfte, liegt in der Vereinigung einer überaus grossen Anzahl von Abbildungen der Thiere, welche zerstreut in vielen oft theuren Werken nur Wenigen in der hier vorliegenden Vollständigkeit in den Originalen zugänglich sein möchten. Das ganze Werk umfasst nunmehr 381 Tafeln, für deren Anfertigung wir der Verfasserin zu Dank verpflichtet sind.

Ueber das Werk von Henry und Arthur Adams „*Shells and their Inhabitants; the genera of recent Mollusca, arranged according to their organization*. London, Van Voorst. 8.“ können wir leider immer noch nicht nach eigener Einsicht berichten, da es uns selbst auf buchhändlerischem Wege nicht zugänglich geworden ist. Wir entnehmen aus einer Anzeige in den *Annals nat. hist.* XIX. p. 74, dass die Zahl der Gattungen unter den Schnecken 680, der UnterGattungen 437, der aufgezählten Species 13000 beträgt. Bei allem Lobe, welches dem Werke wegen der Ausstattung ertheilt wird, wird jedoch gewarnt, das Buch nur mit Vorsicht und nicht ohne Kritik zu benutzen.

Von dem bekannten Werke „*The terrestrial air-breathing Mollusks of the united states and the adjacent territories of North-America, described and illustrated by Amos Binney; edited by Augustus Gould*“ ist der dritte Band

erschienen. Er enthält 74 Tafeln sehr zierlich ausgeführter colorirter Abbildungen zu dem bereits in den ersten beiden Bänden enthaltenen Texte nebst der Erklärung. Einige später in den Proceedings Boston Soc. nat. hist. aufgestellte Arten, so wie einige Arten von Shuttleworth und Redfield sind beschrieben. Durch die Herausgabe dieser schönen Abbildungen hat sich der Verf. ein grosses Verdienst um die Kenntniss der Nordamerikanischen Landconchylien erworben.

Ein „Verzeichniss der Conchylien-Sammlung des verstorbenen Herrn Consul Gruner, welche im Ganzen verkauft werden soll. Bremen 1857“ giebt Zeugniss von der Reichhaltigkeit derselben.

Catalogus Conchyliorum, quae reliquit Suenson; scripsit O. A. L. Mörch. Hafniae 1857, verdient deshalb Erwähnung, weil hier einige, wie ich glaube, neue Namen für grössere Gastropodenabtheilungen vorkommen. Unter dem Namen *Musioglossata* sind die Pulmonaten mit den Siphonarien, Tectibranchiaten, Pyramidellen, Eulimen, Scalarien und Janthinen vereinigt; sie scheinen also wohl alle Schnecken mit zahlreichen Platten in jeder Querreihe der Radula umfassen zu sollen. Die zweite Abtheilung *Arthroglossata* begreift dann die *Taenioglossata*, *Ancistroglossata* mit drei Platten in jedem Gliede, jedoch mit Einschluss der Volutaceen, und die *Toxoglossata* in sich. Ihnen folgen dann die Rhipidoglossata und Cephalopoda.

J. E. Gray hat unter dem Titel: „Guide to the systematic distribution of Mollusca in the british Museum Part I. London 1857“ von Neuem ein System der Mollusken geliefert, welches gegen sein Früheres manche Veränderungen und jedenfalls den Vorzug bietet, dass alle Gruppen bis auf die sehr zahlreichen Gattungen herab charakterisirt sind. Als Zierde des Buches figuriren besonders die Abbildungen der Zahnplatten in Copien nach Lovén, denen einige Originalzeichnungen hinzugefügt sind; eine Zierde, die das Verständniss sehr erleichtert. Offenbar hat Verf. den grössten Theil der Gattungen nicht selbst untersucht, und es wird deshalb noch mancher Prüfstein angelegt werden müssen.

Nachdem Verf. fünf Klassen von Mollusken unterschieden hat, indem die Gasteropoda und Conchifera als *Pedifera* zu einer, die Brachiopoda, Pteropoda und Cephalopoda als *Apoda* zur anderen Gruppe unnatürlich genug vereinigt werden, bringt der vorliegende Band die Ausführung der Gasteropoden mit Ausnahme der Lungenschnecken. Die Gasteropoden zerfallen in Pectinibranchiata, Scutibranchiata, Pleurobranchiata, Gymnibranchiata und Pneumobranchiata, wobei es auffällt, dass Verf. noch immer die Scutibranchiata für Zwitter mit Selbstbefruchtung hält, eine längst beseitigte Vorstellung. Die weitere Eintheilung ist folgende:

Pectinibranchiata.

1. *Toxifera*. (Fam. Conusidae, Aeusidae, Pleurotomidae).
2. *Proboscidifera*. I. *Edriophthalma*. a. *Hamiglossa* (Fam. Cassidulidae, Muricidae, Buccinidae, Pusionellidae, Turritidae, Cancellariidae, Olividae, Lamellariidae). b. *Odontoglossa* (Fam. Fascioliariidae, Turbinellidae). c. *Rachiglossa* (Fam. Volutidae). d. *Taenioglossa* (Fam. Cassididae, Doliidae, Tritoniidae, Verenadae; Sycotypidae; Velutinidae; Naticidae, Neritopsidae). e. *Ptenoglossa* (Fam. Ianthinidae, Scalaridae). — II. *Iniophthalma*. a. *Ptenoglossa* (Fam. Acteonidae). b. *Taenioglossa* (Fam. Cerithiopsidae). c. *Gymnoglossa* (Fam. Pyramidellidae, Architectomidae, Tylodinidae).
3. *Rostrifera*. I. *Platypoda*. a. *Podophthalma* (Fam. Ampullaridae). b. *Edriophthalma* (Fam. Amphiperasidae, Cypraeadae, Pediculariidae, Aporrhaidae, Cyclophoridae, Oligyridae, Proserpiniidae, Littorinidae, Lacunidae, Truncatellidae, Planaxidae, Rissoadae, Caccidae, Melaniadae, Cerithiidae, Turritelladae, Barleeiadae, Viviparidae, Calyptraeadae, Capulidae, Vanicoroidae, Valvatidae). c. *Opiophthalma* (Fam. Aciculidae, Rissoellidae). — II. *Protopoda* (Fam. Vermetidae). — III. *Leptopoda* (Fam. Strombidae, Phoridae). — IV. *Heteropoda* (Fam. Pterotracheidae, Atlantidae).

Scutibranchiata.

1. *Rhipidoglossa*. I. *Pseudobranchia* (Fam. Proserpinadae). — II. *Scutibranchia* (Fam. Neritinae, Rotellidae, Turbinidae, Liotiidae, Trochidae, Stomatellidae). — III. *Schismatobranchia* (Fam. Scissurellidae, Haliotidae). — IV. *Dicranobranchia* (Fam. Fissurellidae).
2. *Heteroglossa*. I. *Cirrhobranchia* (Fam. Dentaliidae). — II. *Cervicobranchia* (Fam. Tecturidae, Gadiniidae, Lepetidae). — III. *Cyclobranchia* (Fam. Patellidae). — IV. *Polyplacophora* (Fam. Chitonidae).

Pleurobranchiata.

I. *Tectibranchia* (Fam. Philinidae, Amphisphyridae, Bullinadae, Bullidae, Amplusiidae, Aplysiidae, Lophocercidae). — II. (kein Name) (Fam. Pleurobranchidae, Tylodiniidae, Umbrellidae, Runcinidae).

Gymnobranchiata.

I. *Pygobranchia* (Fam. Onchidoridae, Dorididae, Goniodoridae, Polyceradae, Triopidae, Ceratosomidae). — II. *Inferobranchia* (Fam. Phyllidiidae, Diphyllidiidae). — III. *Polybranchia* (Fam. Tritoniidae, Scyllaeidae, Tethyidae). — IV. *Cerabranchia* (Fam. Dendronotidae, Proctonotidae, Heroidae, Dotonidae, Glaucidae, Eolididae, Fionidae, Hermaeidae). — V. *Placobranchia* (Fam. Elysiidae). — VI. *Pellibranchia* (Fam. Limapontiidae, Phyllirhoidae).

In Betreff einzelner Faunen sind folgende Schriften zu erwähnen:

Mac Andrew erstattete in Report of the 26. Meeting of the British Association for the advancement of science, held at Cheltenham in August 1856. London 1857. p. 101 Bericht über seine Untersuchungen mit dem Schleppnetz über die marinen Mollusken des nordöstlichen atlantischen Oceans und der benachbarten Meere.

Seine Nachforschungen erstreckten sich während 12 Jahre von den Canarischen Inseln bis zum Nord-Cap, also etwa 43 Grad Breite. — Die Arten sind nun in einer Tabelle mit 7 Columnen verzeichnet; die erste Columnne enthält den Namen, die zweite die geographische Verbreitung, die dritte die Tiefe, die vierte die Lokalität der häufigsten Entwicklung, die fünfte die Beschaffenheit des Grundes, die sechste die Häufigkeit, die siebente Anmerkungen. Dann folgen p. 134 Bemerkungen über einzelne Arten; ferner p. 137 eine Tabelle um die Verbreitung übersichtlicher zu machen, worin Nordscandinavien, Drontheim, Schottland, Kanal, Nordspanien, Portugal, Mittelmeer, Mogador, Kanarische Inseln, Madeira, und Azoren als Faunen angesehen sind. — Im Ganzen sind 750 Arten, 275 Acephalen, 14 Pteropoden, 460 Gasteropoden aufgezählt. Davon wurden erhalten 188 Arten (88 Acephalen, 100 Gasteropoden) im Norddistrikt, 176 Arten (83 Acephalen, 93 Gasteropoden) an der Küste von Nord-Drontheim, 260 Arten (117 Acephalen, 1 Pteropode, 142 Gasteropoden) an den Küsten Schottlands, 258 Arten (122 Acephalen, 136 Gasteropoden) an der Südküste von England, 217 Arten (94 Acephalen, 123 Gasteropoden) an der Nordküste von Spanien, 164 Arten (90 Acephalen, 74 Gasteropoden) an der Küste von Portugal, 425 Arten (184

Acephalen, 7 Pteropoden, 233 Gasteropoden, 1 Cephalopode) in Spanien und im Mittelmeer, 108 Arten (44 Acephalen, 64 Gasteropoden) zu Mogador, 267 Arten (78 Acephalen, 9 Pteropoden, 179 Gasteropoden, 1 Cephalopode) an den Canarischen Inseln, 169 Arten (56 Acephalen, 6 Pteropoden, 107 Gasteropoden) bei Madeira. — Ueberall sind die Zahlen der Arten, welche zugleich an den übrigen Localitäten gefunden sind, verzeichnet.

Ueber die Mollusken, welche an der Küste von Nord-Wales vorkommen und über die Perlen von *Unio margaritifera* im Conway River findet sich eine Notiz von Robert Garner Report of the 26. meeting of the british association held at Cheltenham. p. 92.

Macdonald hat eine Notiz über die Schnecken und Muscheln von Conway Reef gegeben, danach scheint die Fauna sehr dürftig. Annals nat. hist. XX. p. 239.

Greville und Miles erstatteten Bericht über den Schleppnetzfang bei Holy Island, Lamlash Bay, den sie während einiger Wochen im Sommer 1856 erlangt hatten. Es sind 96 Arten von Mollusken verzeichnet. Report of the 26. meeting of the british association held at Cheltenham. London 1857. p. 47.

Patterson berichtete über die Mollusken von Strangford Lough und eines Theils des Irischen Kanals. Es waren 100 Arten mit dem Schleppnetze erhalten, 57 Bivalven und 43 Univalven. British Association 1857; Edinburgh new phil. Journ. N. S. VI. 1857. p. 331.

Fischer hat Journ. de Conchyl. 1857. p. 350 durch ein Supplement sein Verzeichniss der Muscheln, welche an den Küsten Frankreichs leben (ib. 1851. p. 274 u. 373) vervollständigt.

M'Andrew und Barrett haben Untersuchungen über die Tiefenverbreitung der Mollusken an den Küsten von Nordland und Finmark angestellt. Die Verf. theilen den Raum zwischen der höchsten Fluth und 200 Faden in vier Zonen: die erste oder Littoralzone liegt zwischen dem Hochwasser und Tiefwasser; die Laminarienzonen vom Tiefwasser bis zu 20 Faden; die Korallinenzone zwischen 20 und 60 Faden; und die Tiefseezone zwischen 60 Faden und der grössten

erforschten Tiefe. Von jeder Zone sind die beobachteten Arten verzeichnet. *Annals nat. hist.* XX. p. 267.

Zetterstedt machte der Schwedischen Academie eine Mittheilung über einige Schnecken, welche er im Sommer 1856 in der Umgebung von Bagnères de Luchon und Saint Béal, im südlichen Theile des Departements Haute-Garonne gefunden, und verzeichnete dieselben. Es sind: 1 *Succinea*, 12 *Helix*, 1 *Clausilia*, 1 *Balea*, 1 *Pupa*, 1 *Planorbis*, 1 *Physa*, 4 *Limnaeus*, 1 *Cyclostoma*, 1 *Pomatias*. Öfversigt af Kongl. Vetenskaps akad. Förhandlingar 1857. p. 273. Diese Mittheilung ist von Creplin in der *Zeitschr. für die ges. Naturwiss.* von Giebel und Heintz IX. p. 482 übersetzt.

Adolf Schmidt veröffentlichte ein Verzeichniss der Binnenmollusken Norddeutschlands mit kritischen Bemerkungen. *Zeitschr. für die Gesammten Naturwissenschaften* von Giebel und Heintz VIII. p. 120.

Zunächst spricht sich Verf. gegen die neuerlich Mode gewordene Neigung, den ältesten Namen unbedingt wieder herzustellen, aus; und ich stimme seiner Ansicht vollkommen bei. Als südlichste Grenze des hier berücksichtigten Gebietes ist ungefähr der 50. Breitengrad angenommen. Das Verzeichniss enthält 2 *Daudebardia*, 6 *Arion*, 7 *Limax*, 5 *Vitrina*, 12 *Zonites*, 38 *Helix*, 1 *Azeca*, 14 *Pupa* (mit Einschluss von 4 *Vertigo*), 1 *Balea*, 22 *Clausilia*, 4 *Succinea*, 1 *Carychium*, 10 *Limnaeus*, 1 *Amphipeplea*, 2 *Physa*, 16 *Planorbis*, 2 *Ancylus*, 1 *Acicula*, 1 *Cyclostomus*, 2 *Paludina*, 2 *Bythinia*, 4 *Hydrobia*, 6 *Valvata*, 1 *Neritina*, 4 *Pisidium*, 6 *Cyclas*, 8 *Unio*, 5 *Anodonta*, 1 *Tichogonia*; also zusammen 194 Arten in 30 Gattungen, 167 Schnecken und 27 Muscheln.

Reibisch zählte in der *Allg. deutschen naturh. Zeitung* I. 1855. p. 409 die „Mollusken, welche bis jetzt im Königreich Sachsen aufgefunden wurden, nebst Angabe ihres Vorkommens und ihrer Fundorte“ auf.

Es besteht aus 4 *Arion*, 2 *Limax*, 2 *Daudebardia*, 3 *Vitrina*, 3 *Succinea*, 31 *Helix* (unter denen *H. fruticum* Müll. 1774 als *H. carduelis* Schulze figurirt, weil dieser die Schnecke zuerst im 7. Bande des Neuen Hamburgischen Magazins von 1770 beschrieben hatte), 3 *Bulimus*, 2 *Achatina* (*lubrica* und *acicula*), 7 *Pupa* (einschliesslich *Vertigo*), 1 *Balea*, 11 *Clausilia*, 1 *Carychium*, 8 *Limnaeus* (mit Einschluss von *Amphipeplea*), 11 *Planorbis*, 2 *Physa*, 2 *Ancylus*, 2 *Paludina*, 1 *Bythinia*, 3 *Valvata*, 1 *Neritina*, 6 *Cyclos* (mit Einschluss von *Pisidium*), 6 *Unio*, 6 *Anodonta*, 1 *Congeria*; also 100 Schnecken,

19 Muscheln, zusammen 119 Arten. — Dass es *U. patavus* heisst, ist wohl als Druckfehler auf Rechnung der sächsischen Aussprache des Setzers zu bringen.

Bielz gab in den Verhandlungen des Siebenbürgischen Vereines für Naturw. 1856. No. 12 „Malacologische Notizen aus Siebenbürgen.“ Den Schluss bildet ein Verzeichniss der siebenbürgischen Land- und Süsswasser-Mollusken. — Von letzterem erschien im März 1857 eine zweite, berichtigte und vermehrte Ausgabe. Danach kommen in Siebenbürgen vor: 4 *Arion*, 2 *Limax*, 1 *Daudebardia*, 3 *Vitrina*, 3 *Succinea*, 42 *Helix*, 6 *Bulimus*, 2 *Achatina*, 15 *Pupa* einschliesslich *Vertigo*, 3 *Balea*, 34 *Clausilia*, 1 *Carychium*, 8 *Limnaea*, 2 *Physa*, 10 *Planorbis*, 2 *Ancylus*, 1 *Cyclostoma*, 1 *Acme*, 1 *Valvata*, 4 *Paludina*, 1 *Neritina*, 4 *Anodonta*, 4 *Unio*, 3 *Cyclas*, 4 *Pisidium*.

Auf die Reisebemerkungen über einige Binnenschnecken Italiens von E. v. Martens in den Malakoz. Blättern p. 120 — 155 muss ich den Leser selbst verweisen, da sie eines Auszuges nicht wohl fähig sind. Verf. beobachtete in den Gegenden nördlich der Wasserscheide der Alpen mit Einschluss des Thals des Inn und der Saone 40 Land- und 3 Süsswassermollusken; — in Oberitalien bis zur Wasserscheide der Apenninen und im mittleren Rhonethal 40 Land- und 17 Süsswassermollusken; — in Unteritalien, einschliesslich Genua und der Küste Südfrankreichs 59 Land- und 14 Süsswassermollusken. Darunter leben auf Kalbboden 81 Land- und 12 Süsswasser-Mollusken; auf vulkanischem Boden 29 Land- und 9 Süsswasser-Mollusken; auf Urgebirge und Sandstein 42 Land- und 3 Süsswasser-Mollusken; auf Alluvium (Tiefen) 22 Land- und 19 Süsswassermollusken.

Illustrazione sistematica, critica, iconografica de Testacei extramarini della Sicilia ulteriore e delle isole circostanti, di Luigi Benoit. Napoli 1857. 4. Nach der Anzeige im Journ. de Conchyl. 1857. p. 289 ein Prachtwerk mit Abbildungen, von dem bereits 2 Lieferungen erschienen sind, die die Gattungen *Testacella*, *Daudebardia*, *Vitrina*, *Succinea*, *Helix* enthalten.

Descrizione di alcuni nuovi testacei vivanti nel mediterraneo di Nic. Tiberi. Napoli 16 pag. ist eine andere

Schrift, die mir aus einer Anzeige im Journ. de Conchyl. 1857 p. 291 bekannt geworden ist. Es sind darin 8 neue Arten beschrieben, die unten genannt sind.

In der Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich 1856 p. 395 findet sich ein Verzeichniss der von Schäfli eingekommenen zweiten malakologischen Sendung von Mousson. Es sind vier Arten von Sinope, 17 Arten von Trapezunt, 3 Arten von Batum in Gurien, 8 Arten von Chysirkaleh, 28 von Reduktaleh, 1 Art von Jenibazar zwischen Varna und Schumla, 5 Arten von Schumla. Darunter sind sieben neue Arten, die jedoch nur sehr oberflächlich charakterisirt sind; s. unten.

Mousson hat bei Gelegenheit einer Zusendung von Schnecken von den Azoren die von diesen Inseln bekannten Arten zusammengestellt. Das Verzeichniss enthält: 4 Zonites, 1 Patula, 12 Helix, 8 Bulimus, 1 Zua, 1 Pupa, 1 Balea, 1 Craspedopoma. Darunter ist ein Bulimus und eine Balea neu. Verf. erkennt hieraus einige interessante Beziehungen, die in der Notiz selbst nachgesehen werden mögen. Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellsch. in Zürich III. p. 163.

Morelet hat im Journ. de Conchyl. 2. Sér. I. p. 349. II. p. 39 und p. 369 Beiträge zur Conchyliologie von Algerien geliefert.

In einem neunten Fascikel der Specimina mosambicana stellte Bianconi einige neue Muscheln auf. Memorie della accademia delle scienze dell' istituto di Bologna VII. 1856. p. 403—411. Es werden in dieser Schrift Arten aus den Gattungen Avicula, Arca, Venus, Cytherea, Mytilus, Tridacna, Cardium, Mactra und Dolium besprochen. Die neuen Arten sind unten genannt.

Traill hat auf einer Reise von England nach Madras während der Monate April bis Juni 1856 pelagischen Mollusken seine Aufmerksamkeit geschenkt und darüber in The Madras Journal of literature and science, edited by the committee of the Madras literary society and auxiliary royal asiatic society. Vol I. new series. Madras 1857. p. 147. berichtet.

Auf einer Karte sind die verschiedenen Punkte verzeichnet, an denen Verf. die Thiere gefangen und beobachtet hat. Alle beobachteten Thiere sind auf drei Tafeln abgebildet, sie gehören zu den Gattungen Argonauta, Janthina und den Heteropoden und Pteropoden. Die über sie gegebenen Notizen würden noch mehr Interesse haben, wenn die Species bestimmt wären. Verf. hat sich jedoch wegen Mangels an literarischen Hülfsmitteln ausser Stande gesehen, dies zu thun.

Eichwald hat einen Beitrag zur Naturgeschichte des Kaspischen Meeres geliefert. *Nouveaux Mém. de la soc. imp. des Naturalistes de Moscou* X. p. 285—323.

Nach geognostischen und physikalischen Betrachtungen über die frühere Gestaltung der russischen Gewässer, worin zugleich die Ursachen für die Eigenthümlichkeiten der Faunen angenommen werden, wird die Fauna des Kaspischen mit der des Schwarzen Meeres verglichen. — Zuletzt folgen einige speciell zoologische Beschreibungen von Schalthieren des Meeres. Im Ganzen 12 Arten, von denen mehrere ausgestorben. Einige neue Arten s. unten.

Theobald hat im *Journal of the asiatic society of Bengal* 1857. p. 245 einen ersten Theil eines Verzeichnisses der indischen Land- und Süsswasser-Mollusken geliefert.

Das Verzeichniss besteht aus 31 Cyclotomiden, 60 Heliceen, 3 Auriculaceen, die sich folgendermassen in Gattungen vertheilen: 2 Pterocyclos, 13 Cyclophorus mit zwei neuen Arten, 2 Leptopoma, 5 Alycaeus, 2 Megalomastoma, 1 Raphaulus, 2 Pupina, 1 Otopoma, 3 Hydrocaena, 43 Helix, 1 Hypsolostoma Benson, 1 Streptaxis, 1 Vitrina, 1 Cryptosoma nov. gen. s. unten, 2 Succinea, 7 Bulimus, 1 Achatina, 1 Pupa, 2 Clausilia, 2 Auricula, 1 Pythia.

Zollinger hat über die Höhenverbreitung und das Vorkommen der Land- und Süsswasser-Mollusken auf Java und den Sundainseln Bemerkungen gemacht. *Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich* II. 1857. p. 300.

Er unterscheidet folgende Regionen: 1. Die eigentliche Strandregion, in der die Mollusken bald in der Luft, bald im Wasser leben und zwar a. marine Mollusken, welche zur Fluthzeit im Salzwasser sind, mehrere Arten Auricula, Scarabus und Nematura; b. die eigentlichen Amphibien, welche bald im Salzwasser, bald im süssen Wasser, zur Zeit der niedrigsten Ebbe in der Luft leben, Navicella maculifera, manche Neritinen und Cerithien. — 2. Die Ebene, nicht bloss die niedrig gelegenen Flächen des Landes, sondern auch höhere bis 1200 Fuss über dem Meere, ist am reichsten an Arten; die Gat-

tungen *Nanina*, *Helix*, *Bulimus*, *Clausilia*, *Limnaeus*, *Planorbis*, *Cyclostoma*, *Ampullaria*, *Paludina*, *Pirena*, *Melanopsis*, *Melania*, *Neritina*, *Navicella*, *Cyrena*, *Unio*, *Margaritana* und *Anodonta* sind vertreten. — 3. Die H \ddot{u} gelregion 500' bis 2000'; die getrennten Vorberge der eigentlichen Vulkane und die wellenf \ddot{o} rmigen H \ddot{u} gel der Kalkbildung. Die Zahl der Arten nimmt schon ausserordentlich ab, es sind 17 Arten genannt. — 4. Eigentliches Gebirge von 2000' bis 11000'. Die Zahl der Arten wird nach der H \ddot{o} he immer geringer, 9 Arten sind genannt. — Ganz ungewisse 5 Arten. — Die Trockenheit hat in Indien dieselben Folgen wie die K \ddot{a} lte in Europa; die Schnecken graben sich bis 1½ Fuss tief in Erde und Schlamm ein.

Gassies ist durch die Sammlung eines Herrn Eugène Magen in den Stand gesetzt worden, einen Beitrag zur Molluskenfauna von Neu-Caledonien zu liefern. Er z \ddot{a} hlt 3 *Helix*, 7 *Bulimus*, 3 *Physa*, 1 *Melanopsis*, 6 *Neritina*, 1 *Cyrena*, zusammen 21 Arten auf. Die neuen sind unten namhaft gemacht. Journ. de Conchyl. 1857. p. 270.

Durch eine kleine Schrift von Morelet, *Testacea nova Australiae*, Metz 1857. 8 pag. ist gleichfalls ein Beitrag zur Molluskenfauna von Neu-Caledonien gegeben, darin werden 18 neue Arten beschrieben. Bei Gelegenheit einer Anzeige im Journ. de Conchyl. 1857. p. 300 ist eine Art *B. Souvillei* abgebildet.

Philip Carpenter hat die Mollusken der Westk \ddot{u} ste Nordamerika's zum Gegenstande seiner Untersuchungen gemacht, und einen Bericht \ddot{u} ber den gegenw \ddot{a} rtigen Stand unserer Kenntnisse derselben in Report of the 26. meeting of the british association for the advancement of science, held at Cheltenham im August 1856. London 1857. p. 159—368 ver \ddot{o} ffentlicht.

Verf. h \ddot{a} lt die Westk \ddot{u} ste Amerika's besonders geeignet f \ddot{u} r das Studium der geographischen Verbreitung der Mollusken, da sie abgeschlossen durch den grossen Ocean von der Indo-pacifischen Fauna und durch Amerika selbst von dem Karaiben-Meere die am mindesten eingeschnittene K \ddot{u} stenlinie der Welt bildet, die von dem Eise des Nordens bis zu einem s \ddot{u} dlichen Vorgebirge sich erstreckt, welches die S \ddot{u} dspitze der alten Welt noch um 20° \ddot{u} berragt. Er weist auf die Irrth \ddot{u} mer hin, denen die Vaterlandsangaben unterworfen sind, und mahnt zur gr \ddot{o} ssten Vorsicht. Die K \ddot{u} ste wird folgendermassen in Faunendistrikte getheilt: I. N \ddot{o} rdliche Fauna: a) der circumpolare, b) der asiatische und c) amerikanische Distrikt. II. Gem \ddot{a} ssigte Fauna:

a) Oregon, b) Ober-Californien, c) Unter-Californien. III. Tropische Fauna: a) Der Golf von Californien, b) Mexiko oder Centralamerika, c) Panama, d) Ecuador, e) Gallapagos. — Nun werden die zahlreichen Quellen durchgenommen, d. h. die Verzeichnisse der Arten sind abgedruckt, welche von den verschiedenen Schriftstellern bis in die neueste Zeit bekannt gemacht worden sind. Dann folgt das Generalverzeichniss in Form einer Tabelle, in der die einzelnen Arten in die Distrikts-Columnen eingetragen sind. Vom Eis-Cap (Icy-Cape) sind 13 A. bekannt, von Sitcha 102 A., von Oregon 144 A., von Ober-Californien 202 A., von Unter-Californien 137 A., aus dem Golf von Californien 808 A., von Panama 667 Arten. Die Summe der tropischen Fauna Nordamerikas ist 1416 Arten. Für das Weitere müssen wir auf die fleissige und interessante Arbeit selbst verweisen. — Hierzu gehören vier Tafeln mit Abbildungen, welche dazu bestimmt sind auffallende Variationen der Form darzustellen, welche bei Individuen derselben Art vorkommen, und die wohl als verschiedene Species beschrieben sind. Dargestellt sind *Arca grandis*, *Cyrena mexicana*, *Avicula sterna*, *Gadinia pentagoniostoma*, *Glyphis inaequalis* (mit Einschluss von *Fissurella pica* Sow. und *mus* Reeve), *Fissurella rugosa* Sow. (*chlorotrema* Mke, *humilis* Mke, *viminea* Mke), *Crepidula nivea* Adams (*Calypt. squama* Brod., *Lessonii* Brod., *Crep. striolata* Mke), *Crepidula unguiformis* Lam. juv., *Crepidula aculeata* Gmel (*Cal. echinus* Brod., *hystrix* Brod., *Crep. californica* Nutt., *costata* Mke), *Lophyrus articulatus* Sow., *Fissurella virescens* Sow. monstr., *Crucibulum imbricatum* Sow., *Crepidula dorsata* Brod., *Crucibulum spinosum* Sow. (*Calyptopsis tenuis*, *hispida*, *maculata* Brod.), *Caecum undatum* (*C. diminutum*, *pygmaeum*, *monstrosum*, *eburneum*, *firmatum* Adams), *Neritina crassiculum* Sow.

Carpenter's Catalogue of the Reigen collection of Mazatlan Mollusca in the British Museum. London 1857. 552 pag. ist mir nicht zugänglich geworden.

Die von Captain Sir Edward Belcher im Norden von Beechey's Insel gesammelten Conchylien hat Lovell Reeve beschrieben. The last of the arctic voyages, being a narrative of the expedition in H. M. S. Assistance Vol. II. 1855. p. 392—399. Von den 45 Arten sind 12 neu, und kaum die Hälfte ist bisher als von Grönland stammend bekannt. Die neuen Arten s. unten.

In dem naturhistorischen Beitrag zu „Grönland, geographisk og statistisk beskrevet af H. Rink. Kjöbenhavn 1857 ist p. 75—94 eine Aufzählung der grönländischen Mollusken von Mörch enthalten, welches aus 201 Arten in 87 Gat-

tungen besteht. Einige neue Arten sind nicht oder doch nur ganz kurz charakterisirt, und nur zwei, eine *Helicella* und eine *Aeolis*, die mit Namen versehen sind, können unten namhaft gemacht werden.

Lewis hat ein Verzeichniss der Mollusken aus kleinen Seen in der Nähe von Mohawk, Otsego, New-York gegeben, wo dieselben so zahlreich vorkommen, dass sie Schichten bis 20 Fuss Tiefe bilden. Es sind 29 Arten, worunter eine neue *Valvata*. Proc. Philadelphia VIII. p. 259.

In Reports of explorations and surveys to ascertain the most practicable route for a railroad Vol. V. 1856. p. 330 ist ein Verzeichniss der Conchylien enthalten, theils Süßwasserschalen vom Colorado, theils marine Formen von der Küste zwischen San Francisco und San Diego. Es ist bearbeitet von Gould, und enthält 44 Arten. Die neuen Arten sind abgebildet. Die neuen Süßwasserschnecken sind bereits in Proc. Boston Soc. 1855 aufgestellt worden, und in dem entsprechenden Berichte namhaft gemacht; die marinen sind gleichfalls bereits 1855 aufgestellt, im Appendix to Prelim. Geol. Report of W. P. Blake und damals von uns übersehen, daher führen wir sie jetzt unten auf; sie gehören den Gattungen *Potamis*, *Phasianella*, *Bulla*, *Cardium* und *Tapes* an.

Deshayes hat eine vorläufige Notiz über die von Schramm in Guadeloupe zusammengebrachte Sammlung von Mollusken gegeben, die bei der Ausstellung von 1855 in Paris aufgelegt war. Einige neue Arten und eine neue mit *Tritonia* verglichene Gattung *Tridachia* werden wohl später noch gründlicher bekannt gemacht werden. Journ. de Conchyl. 1857. p. 137.

Von der Zoologie der „Expedition dans les parties centrales de l'Amérique du Sud, de Rio de Janeiro à Lima, et de Lima au Para, exécutée par ordre du Gouvernement français pendant les années 1843—1847 sous la direction du Comte Francis de Castelnau“ ist in den Lieferungen 21—24 der Abschnitt über Mollusken auf 12 Bogen Text und mit 20 Tafeln vollständig erschienen. Er ist von Hupé bearbeitet.

Die auf dieser Expedition theils in Brasilien, theils in Bolivien und Peru, gesammelten Mollusken sind vorzugsweise Land- und Süßwassermollusken, die ersteren besonders Heliceen. Von Cephalopoden sind nur 2 Arten *L. brasiliensis* und *brevis* Blainv. beobachtet. Von Landschnecken sind 2 *Vaginulus*, 4 *Vitrina*, 2 *Succinea* aufgeführt; unter den 47 Arten der Gattung *Helix* sind 11 Arten der Gruppe *H. pellis serpentis* charakteristisch, unter denen einige neue bereits in der *Rev. et Mag. de zool.* 1853 beschrieben sind; ferner gehören 11 *Streptaxis*, 4 *Tomigerus*, 5 *Anostoma*, 250 *Bulimus*, 2 *Pupa*, 2 *Tornatellina*, 1 *Limnaeus*, 1 *Physa*, 6 *Planorbis*, 1 *Ancylus*, 5 *Cyclostoma* (2 *Cyclotus*, 2 *Cyclophorus*, 1 *Cistula*) und 12 *Helicina* dieser Fauna an. *Ampullaria* ist reich an Arten, 6 *Melania*, 6 *Aplysia*, 2 *Doris*, 1 *Glaucus*. Unter den Muscheln sind die Gattungen *Castalia*, *Hyria* und *Mycetopus* für die Fauna charakteristisch.

Philippi lieferte in der Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften von Giebel und Heintz p. 89 Bemerkungen über die in Chile einheimischen Arten *Helix*, so wie p. 94 über die Conchylien der Magellanstrasse.

Pfeiffer hat in den *Malakoz. Blättern* 1857. p. 29 kritische Bemerkungen über die in Gould's Expedition Shells beschriebenen und abgebildeten Landschnecken gegeben.

Sie beziehen sich auf mehrere Arten *Vitrina*, *Succinea*, *Helix* und andere Heliceen, so wie über einige Heliceinen. Von folgenden Arten hat Verf. nach sicheren Exemplaren neue Diagnosen entworfen: *Succinea caduca* Mighels, *Helix strigosa* Gould, *Helix paucillius* Gould, *Helicina multicolor* Gould und *Helicina trochlea* Gould.

Fischer hat *Journ. de Conchyl.* 1857. p. 258 Betrachtungen über die Symmetrie der Mollusken angestellt.

Mit den Cuticularbildungen im Darne der Thiere beschäftigt, hat Kölliker auch die Magenzähne von *Aplysia*, die Kiefer von *Aplysia*, *Pleurobranchaea*, *Diphyllidia* und einiger Cephalopoden, so wie die Reibmembran von *Carinaria* und *Loligo* histologisch untersucht. *Verh. der phys.-med. Gesellsch. in Würzburg* VIII. p. 43.

Er erklärt alle diese Bildungen für von Zellen ausgeschiedene Massen, und tritt der früher von ihm vertretenen Ansicht ausdrücklich entgegen, namentlich bei den Kiefern, dass dieselben aus Zellen zusammengesetzte Horngelbilde seien. — Die Bildung der Reibmembran hinten in der Zungenscheide erklärt er durch einen Zungenkeim (*matrix*), der von der oberen Mittellinie der Zungenscheide als ein besonderes Gebilde in ihre Höhlung hineinhängt, und der die

Form eines mit longitudinalen Blättern versehenen und mit blattförmiger dünner Basis aufsitzenden Längswulstes hat, der in der ganzen Länge der Zungenscheide sich erstreckt, hinten niedrig beginnt, und vorn wie abgestutzt aufhört. In den Zwischenräumen dieser anhängenden Blätter würde dann, wenn ich es recht verstanden habe, von dem sie überziehenden Epithel die Zahnmasse ausgeschieden werden, die dann die Zwischenräume, gleichsam die Form, ausfüllte. Wenn an dem sogenannten Längswulste longitudinale Blätter anhängen, die dann doch nach allen Seiten Zahnschubstanz um sich herum ausscheiden mussten, so scheint es mir, als wenn eine compacte Substanz gebildet werden müsste, in der die Blätter Vertiefungen darstellen würden; da aber die einzelnen Zungenplatten von einander völlig getrennt sind, so möchte ich vielmehr aus der Darstellung des Verf. mir den Zungenkeim als eine das hintere Ende der Zungenscheide einnehmende Walze denken, welche mit regelmässig angeordneten Vertiefungen versehen wäre, die dann mit der Zahnschubstanz ausgefüllt würden, und so die Form für die einzelnen Zahnplatten abgäben. Ein Querschnitt solcher Walze, wenn er gerade die Zahnformen trifft, muss nothwendig dasselbe Bild geben, welches Verf. abgebildet hat. — An den Platten, namentlich bei den Heteropoden, hat Verf. Kanälchen gesehen, welche quer von einem Seitenrande zum anderen verlaufen, und die mit kleinen deutlichen Mündungen ausgehen.

Auch auf die secundären Zellenausscheidungen und Cuticularbildungen auf der äusseren Haut haben sich ib. p. 61 die Untersuchungen in Betreff der Mollusken erstreckt. Die Schalen der Mollusken und die Saugnäpfe der Cephalopoden bildeten hier das Object. In Betreff des Näheren verweise ich auf die Abhandlung selbst.

Ueber das Gehörorgan der Mollusken hat A. Schmidt Untersuchungen angestellt, und seine gewonnenen interessanten Resultate in der Zeitschr. für die ges. Naturw. von Giebel und Heintz VIII. p. 389 mit 8 Tafeln veröffentlicht.

Verf. hat auf die verschiedene Zahl und Gestalt der Otolithen sein Augenmerk gerichtet. Nach ihm haben die Gattungen *Littorina*, *Bythinia*, *Hydrobia*, *Lithoglyphus*, *Truncatella*, *Cyclostomus* und *Leonia* nur einen Otolithen; *Neritina* hat ungemein zahlreiche, *Melanopsis* und *Melania* haben einen colossalen unter zahlreichen kleineren Otolithen; *Hydrocena* und *Valvata* nähern sich in der Beschaffenheit der Otolithen mehr den *Stylommatophoren*, von denen die verschiedenen Formen abgebildet sind. Für die chemische Beschaffenheit der Gehörsteinchen, die man für kohlensauren Kalk gehalten hat, ist die Erfahrung des Verf. wichtig, dass die in Glycerin aufbewahrten Oto-

lithen sich bei höherer Temperatur auflösen, während dies in der Kälte weniger geschah. Die Bewegung der Otolithen durch Flimmern der Kapselwand bezweifelt Verf. Er möchte sie durch den Einfluss einer unsichtbaren Kraft des Organismus deuten (? !). Als die wichtigste Entdeckung bezeichnet Verf. mit Recht einen von der Kapsel nach aussen führenden Gehörgang, der sich am besten bei *Plysa fontinalis* beobachten lassen soll. Ich stimme dem Verf. gern darin bei, dass die nähere Kenntniss der Gehörorgane ein wichtiges Moment für die Classification der Mollusken bieten könne, bin aber nicht der Meinung, dass die Bildung dieser Organe für den Beweis in die Waagschale falle, dass die Mollusken höher stehen als die Insekten.

Carpenter hat sich von Neuem über die Entwicklung von *Purpura lapillus* geäußert, und beharrt bei seiner früheren Ansicht. Namentlich hebt er hervor, dass Busk durch unabhängige Beobachtungen zu gleichen Resultaten gekommen sei, und sich von dem wesentlichsten Punkte des Streites mit Koren und Danielssen überzeugt habe, dass nämlich ein Mund mit Schlund bei den jungen, aus einzelnen Eiern entstandenen Embryonen vorhanden sei. *Annals nat. hist.* XX. — Ib. p. 127 bringt Carpenter ferner das Zeugniß von Dysten für seine Ansicht bei.

Marcel de Serres hat wieder auf die Modifikationen aufmerksam gemacht, welche die Muscheln und Schnecken während ihres Lebens eingehen. *Mém. de l'acad. de Montpellier* III. p. 413.

Verf. spricht von dem Abreiben der Wirbel bei den ersteren, von der Abnutzung der ersten Windungen bei den letzteren. Die Localität hat darauf Einfluss, indem die Süsswassermollusken mehr Beispiele liefern, als die marinen. Das Abreiben der Wirbel schiebt er auf eine Folge mechanischer Reibung, um die Schalen leichter zu machen, die Abnutzung der ersten Windungen bei den Schnecken darauf, dass das Thier keinen Platz mehr darin habe, und daher diese Theile der Schale keinen Antheil mehr an dem allgemeinen Lebensprocesse nehmen. Bereits in urweltlichen Zeiten haben dieselben Erscheinungen stattgefunden, selbst bei den Cephalopoden, an denen dergleichen in der Jetztwelt nicht mehr beobachtet wird. — An demselben Orte p. 424 hat Verf. die Beschaffenheit der Flüssigkeit zu untersuchen unternommen, mittelst welcher die Schnecken die ersten Windungen ihrer Schale zerstören. Er fand den Schleim bei *Bulinus decollatus* bald ein wenig alkalisch, bald neutral, bald ein wenig

sauer, und glaubt gefunden zu haben, dass der Schleim des vorderen Körpertheils alkalisch, der des hinteren Theiles sauer (*acide urique*) sei. Das Material zur Untersuchung scheint jedoch ziemlich roh geschieden zu sein, indem Verf. nicht die einzelnen Organe berücksichtigt hat, sondern das Thier in eine vordere und eine hintere Hälfte zerschnitten zu haben scheint. Er hält die Harnsäure der hinteren Hälfte seltsamer Weise für ein genügendes Mittel für das Thier, um sich der ersten Schalenwindungen zu entledigen.

Weinland hat bei allen von ihm untersuchten Anodonten kleine runde Löcher gefunden, welche die Epidermis durchbohren, und zuweilen in den Höhlungen kleine Würmer. Er setzt voraus, dass diese Anbohrung der in dem Wasser enthaltenen Kohlensäure den Weg bahne, um die Wirbel, und selbst oft die ganze Schale anzufressen. *Proc. Boston Soc.* VI. p. 57.

Durch die eben erwähnte Notiz veranlasst, hat sich auch Lewis in Mohawk über diesen Gegenstand *ib.* p. 150 geäußert.

Er leugnet nicht den Einfluss parasitischer Würmer, glaubt jedoch beobachtet zu haben, dass in solchen Gewässern, welche grosse Mengen von Kalksalzen aufgelöst enthalten, die Muscheln sich wenig zum Zerfressen eignen; während da, wo wenig Kalk ist, und viele Alkalien und Eisensalze aufgelöst sind, dieselben stark angefressen werden. Namentlich wird ein langsam fliessendes Wasser bei dem Orte Mohawk angeführt, in welchem die Muscheln im Allgemeinen sehr wenig zerfressen vorkommen; weiter unten jedoch, nachdem bei jedem Regen die weggeworfene Asche einer Anstalt ausgelaugt, und so Mengen von Alkalien in das fliessende Wasser gebracht werden, finden sich alle Schalen mehr oder weniger angefressen, welche Erscheinung noch weiter unten wieder aufhört.

Koehler hat die Platten von der Zunge der *Helix pomatia* chemisch untersucht, und will gefunden haben, dass sie nicht aus Chitinsubstanz, sondern aus Horngewebe bestehen. Giebel und Heintz *Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften* VIII. p. 112.

Ueber die milchige Gährung der Austern schrieb Bizio: *Fermentazione lattica dei corpi delle ostriche (Ostrea edulis L.) e separazione del principio produttore dell' acido, chiamato Ostreina. Memorie dell' J. R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti* VI. Venezia 1856. p. 25.

In einer kleinen Schrift „Essai sur les animaux domestiques des ordres inferieurs. Bruxelles et Paris 1857“ hat Phipson p. 21—27 auch einen Abschnitt über die Mollusken. Er spricht von dem Nutzen der Cephalopoden, Schnecken und Muscheln, und scheint sie zu einer Art Domesticierung empfehlen zu wollen.

Neue Bemerkungen über das Einsammeln von Mollusken von Petit finden sich im Journ. de Conchyl. 1857. p. 61. Derselbe empfiehlt das Einsenken von Körben mit gewissem Köder in grössere Tiefen, das Aufbrechen von Seeigeln, und das Aufheben grosser Steine bei der Ebbe. — Martin empfiehlt ib. p. 165 das Oeffnen des Magens gewisser Fische, namentlich Trigla, und der Asterien, um Conchylien, die in grosser Tiefe leben, zu erlangen. — Petit erinnert ferner ib. p. 269 an ein von Jeffreys angewendetes Verfahren; derselbe legte die durch das Schleppnetz aufgebrachten Pflanzen in süsses Wasser, um die kleinen Conchylien zu tödten, und sonderte sie dann aus.

Rossmæssler hat einen sehr einfachen aber recht sinnreichen Verhältniss-Maassstab zum Messen relativer Längen am Molluskengehäuse in den Malakoz. Blättern p. 117 angegeben, und durch eine Abbildung erläutert.

Cephalopoda.

Schlossberger hat das Blut der Cephalopoden chemisch untersucht. Annalen der Chemie und Pharmacie April 1857. p. 86; Bibl. univ. de Genève 36. p. 373.

Williams hat Annals nat. hist. XIX. p. 193 den Schluss seiner Untersuchungen über den Mechanismus der Wasser-Respiration und über die Struktur der Athmungsorgane bei den Wirbellosen geliefert, indem er die Cephalopoden abhandelt.

Das Wasser wird in die innere Achse der Kiemen durch die Zwischenräume der Kiemenlappchen eingesogen. Bei Octopus und Sepia faltet sich die Kieme so um sich selbst, dass sie eine cylindrische Achse einschliesst, was bei Loligo und Loligopsis nicht so der Fall ist; Verf. möchte daher die Ordnung der Dibranchiaten in zwei Unterordnungen theilen, bei deren einer die Kieme einen Cylinder;

bei deren anderer sie einen Halbcylinder bildet. Verf. empfiehlt diese interessante Thatsache solchen Beobachtern, denen ein reicheres Material zu Gebote steht. Die Abbildungen erläutern die klare Darstellung des Textes vortrefflich.

Die „Bemerkungen über die Cephalopoden von Messina“ des Referenten in diesem Archiv p. 41 hatten hauptsächlich den Zweck die von Steenstrup beobachteten Thatsachen in Betreff des Hectocotylismus zu bestätigen und zu erweitern, zugleich aber auch dieselben für die Classification zu verwerthen.

Philonexidae. Ref. hat *Philonexis microstomus* d'Orb. bei Messina beobachtet und ihn beschrieben. Bei dieser Gelegenheit liess sich der junge Cephalopode der Südsee (Souleyet Voy. de la Bonite) mit grosser Wahrscheinlichkeit als ein jugendlicher *Philonexis* bestimmen. Dies Archiv p. 44.

Octopidae. *Octopus vulgaris* ist, wie Madame Jeanette Power Annals nat. hist. XX. p. 336 berichtet, ungemein gefrässig. Sie beobachtete einmal, wie ein solcher Octopus eine *Pinna nobilis* belauerte, ihr, als sie die Schale geöffnet hatte, einen Stein dazwischen schob, dadurch das Schliessen der Schale verhinderte, und sie verzehrte.

Die neue Gattung *Scaeurigus* des Ref., welche den hectocotylisirten Arm an der linken Seite hat, s. dies Archiv p. 51.

Myopsidae. Die Verany'sche Angabe, dass die Weibchen von *Rossia dispar* mit grossen Saugnäpfen versehen sind, hat Ref. dahin berichtigt, dass diese den Männchen zukommen. Dies Archiv p. 62.

Die von Couch als britisch angegebenen Schalstücke von *Sepia biserialis* (vergl. vor. Bericht p. 123) möchte Adler vielmehr der *Sepia elegans* zugehörig vermuthen. Annals nat. hist. XIX. p. 474.

Oigopsidae. *Enoploteuthis polyonyx* Trosch. dies Archiv p. 67 von Messina.

Thysanoteuthis n. gen. Trosch. dies Archiv p. 69 mit zwei neuen Arten *Th. Rhombus* und *elegans* von Messina.

Nautilacea. Gould hat Proc. zool. soc. 1857. p. 20; Annals nat. hist. XX. p. 57 bemerkt, dass unter dem Namen *Nautilus umbilicatus* zwei verschiedene Arten verwechselt werden, die sich bestimmt unterscheiden lassen. Den Namen *umbilicatus* wendet er für die von Lister abgebildete Art an, den Solander'schen Namen *N. scrobiculatus* für die Art, welche von sämmtlichen späteren Schriftstellern als *umbilicatus* beschrieben ist. Er unterscheidet sie durch folgende Diagnosen:

N. umbilicatus testa suborbicularis, ventricosa, striis confertis volventibus insculpta, utrinque late umbilicata; marginibus umbilicorum vix rotundatis; umbilico pervio, infundibuliformi, nigro, margine externo vix rotundato; rufescens, postice radiatim ferrugineo strigata, strigis angustis, confertis.

N. scrobiculatus testa suborbicularis, subdepressa, laevis, nitida, lateribus radiatim fluctuatis, utrinque late umbilicata, umbilico crateriformi, margine externo rotundato, late flavescens, postice radiatim ferrugineo strigata, strigis latis, remotis.

Weitere Beobachtungen über *Nautilus* von Macdonald (Proc. Royal soc. 1857. Febr.; Annals nat. hist. XIX. p. 379) beziehen sich auf das Gehörorgan und auf den grossen Seitenmuskel. Die Art, an welcher seine Beobachtungen angestellt sind, und welche Verf. früher für *N. umbilicatus* hielt, wird als *N. macromphalus* berichtet, und Verf. ist der Vermuthung geneigt, diese Art möge das Männchen von *N. umbilicatus* sein.

Cephalophora.

Von des Referenten „Gebiss der Schnecken, zur Begründung einer natürlichen Classification“ erschien im Jahre 1857 die zweite Lieferung. Sie behandelt den Schluss der mit Deckel versehenen Lungenschnecken, nämlich die Cyclostomaceen, Helicinaceen, Hydrocaenaceen, Proserpinaceen, Truncatellaceen und Ampullariaceen, so wie den Anfang der Kammkiemer, nämlich die Valvaten, Paludinen, Bythinien, Lithoglyphen, Hydrobien, Ancyloten und Thiaren.

Aus diesen speciellen Untersuchungen mag als Hauptresultat hervorgehoben werden, dass die Helicinaceen, Hydrocaenaceen und Proserpinaceen wirkliche Rhipidoglossen sind, also sich unmittelbar an die Neritaceen anschliessen, während die Cyclostomaceen, Truncatellaceen und Ampullariaceen dem Gebisse nach sich den Kammkiemern nähern. Es lässt sich schon jetzt übersehen, dass auf die Lungenathmung weniger Werth zu legen sein wird, als man bisher annahm, und dass man die Lungenschnecken in mehrere Ordnungen wird vertheilen müssen. In der in Rede stehenden Lieferung ist dies noch nicht so scharf ausgesprochen. Bemerkenswerth bleibt dabei immer der Uebergang von den Cyclostomaceen zu den Helicinaceen, durch die tief kammförmig eingeschnittenen äusseren Seitenplatten. Die oben genannten Gruppen der Kammkiemer sind durch die Beschaffenheit ihrer Radula bestimmt verschieden, worüber das Specielle in dem Buche selbst nachgesehen werden möge.

Allgemeine Bemerkungen über die Zungenbewaffnung

der Mollusken hat Fischer Journ. de Conchyl. 1857. p. 120 gemacht. Sie sind keines Auszuges fähig. Es sei jedoch bemerkt, dass ich in manchen Punkten den Ansichten des Verf. widersprechen muss. So hält er jede Mittelplatte für eine Fusion zweier seitlichen, was gewiss, wenigstens in den meisten Fällen, nicht richtig ist. Verf. scheint besonders die Land- und Süßwasserschnecken im Auge zu haben.

Gray hat Notizen über Thier und Gebiss einiger Schnecken, jedoch ohne Abbildungen in den Annals nat. hist. XIX. p. 96 gegeben.

Sie beziehen sich auf folgende Arten: *Fusus pallidus*, *Typhis tetrapterus*, *Pisania elegans*, *Triumphis distorta*, *Cyclope (Nassa) neritinea*; *Cuma sulcata*, *Fasciolaria salmo*, *Leucozonia angulata*, *Malea ringens*, *Ranella caelata*, *Imperator n. sp.*, *Callopoma saxosum*, *Tegula pellis serpentis*, *Aplysia depilans*, *Tylodina punctulata*, *Umbrella mediterranea* und *Proserpina*.

Heteropoda.

Krohn hat weitere Beobachtungen über die Entwicklungsgeschichte der Heteropoden in Messina angestellt. (Müller's Archiv für Anat. 1857. p. 466; vergl. den vor. Bericht p. 124.

Die Larven der Pterotracheen sind mit Fühlern versehen, während unmittelbar nach der Metamorphose keine Spur mehr von diesen anzutreffen ist, auch das fühl器lose Weibchen der von ihm beobachteten Firoloidesart, besitzt sie als Larve. Die früher von Krohn als *Carinaria* angesprochene Larve ist gleichfalls eine Pterotracheenlarve. — Die Larve von *Carinaria* hatte eine Schale von $2\frac{1}{2}$ Windungen und ein Velum mit 3 Wimpelpaaren; die Fühler waren sehr lang. Sie zeigt schon eine Combination der Charaktere der Atlanten und Firoloiden.

Arthur Adams beschreibt eine neue Art *Macgillivraya echinata* von den Capverdischen Inseln, die wohl ebenso wie ihre Verwandten, einem Larvenzustande irgend einer Schneckengattung zuzuschreiben sein wird. Annals nat. hist. XIX. p. 373. Dasselbe gilt von zwei neuen Heteropoden, die derselbe Verf. ib. p. 461 unter dem Namen *Sinusigera d'Orbigny* und *Macgillivraya setigera* beschrieben hat.

Gasteropoda.

Macdonald hat seine Ansichten über die natürlichen

Verwandtschaften und die Classification der Gasteropoden geäußert. *Proceedings of the Royal Society of London* Febr. 1857, *Annals nat. hist.* XIX. p. 398.

Verf. verwirft die von der Schale und den Athmungsorganen hergenommenen Merkmale als Charaktere ersten Ranges. Vorzüglich wichtig erscheinen ihm die Geschlechtsorgane, ob zwittrig oder getrennten Geschlechts, und demnächst die Gehörorgane und die Mund- und Magenähne. Die Gehörsteinchen sind entweder einzeln (Otolithen) oder Gruppen kleiner Granula (Otoconia). Die Zungenplatten stehen entweder auf einer kurzen und breiten Membran (Pflaster, pavement) oder auf einem schmalen langen Bande (Riemen, ribbon or strap). Bei letzteren ist eine Rhachis und eine Pleura zu unterscheiden, von denen die eine oder die andere fehlen kann. Die Kiefer nennt Verf. Lippenplatten (labial plates). — Die Vorstellungen des Verf. über die Entwicklung der Zunge sind nur im Allgemeinen bezeichnet. Er sagt, zuerst entstehen einige Platten der Rhachis, dann die ihr zunächst liegenden Platten, so verbreitete und verlängere sich die Zungenmembran. Der Vorstellung, die Glieder der Zunge rücken allmählich von hinten nach vorn vor, schenkt er nicht seinen Beifall. Die Tabellen, welche nur als Proben der Anordnung folgen, sind ziemlich unvollständig, und scheinen mir auch Irrthümer zu enthalten. So steht z. B. Patella und Dentalium unter den Zwitter-schnecken! Um die Litteratur scheint sich Verf. nicht viel bekümmert zu haben.

Fischer machte auf den Unterschied beim Kriechen der Schnecken aufmerksam, und bemerkt, dass die einen ohne Hülfe des Kopfes auf der Sohle gleiten, wie *Helix*, *Limax*, *Limnaeus*, *Buccinum*, *Voluta* et., während die andern mit Hülfe des Kopfes spannen, wie *Cyclostoma*, *Truncatella*, *Strombus*, *Xenophora* et. *Journ. de Conchyl.* 1857. p. 34. — Ueber das Kriechen von *Chondropoma crenulatum* und *Cyclophorus Beauianum* vergl. ib. p. 113.

Pulmonata operculata.

Pomatiacea. In der unten zu besprechenden Schrift von Claparède über *Cyclostoma elegans* ist beiläufig auch die Radula von *Pomatias maculatus*, so wie deren Kiefer beschrieben und abgebildet. Auffallend ist es, dass Verf. zuweilen Exemplare antraf, bei denen die Mittelplatten fast ganz verkümmert waren. Die Kiefer will Verf. nicht als solche anerkennen, sondern nennt sie *lorica palatina*; dies kommt nur auf einen Wortstreit hinaus. Ich nenne die

Theile der die Mundhöhle auskleidenden zarten Chitinmembran, welche eine festere Beschaffenheit haben, aus schuppenartigen Elementen zusammengesetzt sind, und am Eingange der Mundhöhle liegen, Kiefer, und finde durchaus, dass diese Theile von Pomatias dasselbe sind, wie die Kiefer von Helix.

Cyclotacea. Die auf Jamaica vorkommenden Arten der Gattung *Cyclotus* hat Chitty studirt, Proc. zool. soc. 1857. p. 142. Er fand innerhalb derselben sechs verschiedene Formen des Deckels, wonach die Arten geordnet werden: 1) mit einer erhabenen nach aussen gebogenen, abstehenden Lamelle; der obere Rand ausgebreitet und der Fläche des Deckels parallel ohne die folgende Windung zu berühren; Ebene des Deckels flach: *C. corrugatus*, *Portlandicus*, *notatior*, *notatus*, *novae spei*, *cycloatus*, *dubiosus* Ad., *suturalis* Sow.; 2) mit vorragenden Windungen, deren obere Ränder verdickt und herabgebogen sind und die folgende Windung berühren; Ebene des Deckels flach: *C. varians* Ad., *subrugosus* Sow., *corrugator*, *gemma*, *ziczac*; 3) mit schwach erhabenen, stumpf verdickten und ausgebreiteten Windungen, deren Ränder ganz an die Ebene angedrückt sind: *C. seminudus* Ad., *burghaeanus*, *rudis-planusque*, *pretiosus*, *Bairdianus*, *ruber*; 4) mit schmalen Windungen, welche flach und stumpf an den Rändern und schmal nach aussen ausgedehnt sind; die Fläche des Deckels überall excentrisch und scharf gestreift: *C. Jamaicensis* Chemn., *dentistigmatus*, *novus-saltus*, *crassus* Ad., *inutilis*; 5) mit erhabenen Windungen, welche scharf am Rande sind und fast senkrecht auf der Fläche stehen, der Rand kaum umgebogen: *C. rupisfontis*, *corrugatissimus*; 6) mit hoch erhabenen Windungen, deren Ränder scharf und herabgebogen sind, innen convex und aussen concav: *C. jugosus* Ad., *pallescens* Ad., *Westmorelandensis*, *nodosus*, *Beswicki*, *perpallidus*.

Benson stellte Annals nat. hist. XIX. p. 201 eine neue Gattung *Streptaulus* auf: Testa umbilicata, pupiniformis, nitens; peristoma circulare, non continuum, superne tubulo suturali interno et externo, continuo, ad extremitates ambas aperto, siphonem mentiente, perforatum. Operc.? Eine neue Art: *St. Blanfordi* von Darjiling im Himalaja.

Derselbe beschrieb ib. folgende neue Arten: *Diplommatica diplocheilus* vom Khasia-Gebirge, *pachycheilos* von Darjiling, *polypleuris* von Nancalai; *Alycaeus prosectus* von Teria-Ghat, *styliifer* von Darjiling, *hebes* von Teria-Ghat; *Leptopoma cybeus* von Nancalai; *Cyclophorus pinnulifer* von Teria-Ghat, *tomotrema* von Teria-Ghat, *cryptomphalus* von Ava in Burmah, *Theobaldianus* von Thyet-Myo, *baleatus* von Pegu, *scurra* ebendaher.

Cyclophorus Haughtoni und *affinis* sind neue Arten von Theobald von Maulmein in Indien. Journ. Asiatic soc. of Bengal 1857.

p. 246. — Ebenso *C. aequivocum* von Madagascar und *lignarium* von Neuseeland von Pfeiffer Proc. 1857. p. 112. — *C. Courderti* Fischer et Bernardi Journ. de Conchyl. p. 299. pl. 10. Fig. 3—5 von Neu-Caledonien.

Megalomastoma digitale Gundlach Malak. Bl. p. 114. von Trinidad auf Cuba.

Leptopoma Wallacei Pfeiffer Proc. zool. soc. 1857. p. 112 von Borneo.

Pupina Moulinsiana Fischer et Bernardi Journ. de Conchyl. 2. Sér. Tom. I. p. 299. pl. 10. Fig. 6—7 von Neu-Caledonien.

Aulopoma sphaeroideum Dohrn Malak. Bl. p. 85 von Ceylan.

Ein kritischer Versuch über einige Arten der Gattung *Cyclostoma* von Shuttleworth hat den Zweck *C. distinctum* Sow., *C. orbella* Lam. und *C. solum* Richard aufzuklären. Hierbei werden *Cyclotus granadensis* von der Insel Granada, *martinicensis* von Martinique, *floccosum* von Haiti und *Cyclophorus Schrammi* von Guadeloupe als neue Arten unterschieden. Journ. de Conchyl. 2. Sér. Tom. I. p. 261.

Bei Pfeiffer Novit. conchol. sind abgebildet: *Pterocyclostener* Menke Taf. 25. Fig. 13—15, *Cataulus Cumingi* Pfr. Fig. 16—17, *Megalomastoma Gundlachi* Pfr. Taf. 26. Fig. 20—22 und *M. leoninum* Pfr. Fig. 23—25.

Cyclostomacea. Einen werthvollen Beitrag zur Anatomie von *Cyclostoma elegans* hat Claparède als Inaugural-Dissertation geliefert „*Cyclostomatis elegantis anatome*. Berolini 1857. 4.“

Das Nervensystem mit den Gehörkapseln ist genau beschrieben und abgebildet. Den Mundtheilen ist besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die Radula ist abgebildet. Die Speicheldrüsen, die Leber, die Circulationsorgane und die Niere sind auf ihre feinere Structur untersucht. Dann ist ein Organ beschrieben, welches Verf. für den *Cyclostoma* eigenthümlich hält; es ist eine grosse Drüse zwischen den Windungen des Darmes, die sich auch bis zwischen Niere, Herz und Lungenhöhle erstreckt, und wird muthmasslich für eine accessori-sche Niere gehalten. Endlich wird noch ein Organ hervorgehoben, das zwischen Mund und Fuss liegt, und von dem Verf. vermuthet, dass es die Substanz liefere, um den Weg schlüpfrig zu machen. Sowohl die männlichen als die weiblichen Geschlechtsorgane sind beschrieben und abgebildet.

Cyclostoma tubulum unbekannten Vaterlandes und *C. Eugeniae* von Mauritius sind von Reeve aufgestellt. Erstere ist verwandt mit *C. Belairi* und *Boivini* also wohl zur Gattung *Cyclostomus* gehörig;

letztere verwandt mit *C. filosum*, also wohl gleichfalls ein Cyclostomus. Annals nat. hist. XX. p. 524.

Gundlach beschrieb drei neue Arten von Cuba: *Chondropoma perlatum*, *Ctenopoma deficiens* und *Ctenopoma immersum*, alle aus der Umgegend von Matanzas. Malak. Bl. p. 41.

Derselbe beschreibt das Thier von Cyclostoma Agassizi Charp. ib. p. 47.

Gundlach stellte auf: *Ctenopoma echinatum*, *Ct. sculptum*, *Choanopoma Arangianum*, *Ch. perplicatum*, *Chondropoma revocatum* Malak. Bl. p. 176.

Chondropoma Tortolense Pfr. von der Insel Tortola ib. p. 158.

Bei Pfeiffer Novit. conch. sind abgebildet *Chondropoma Cordovanum* Pfr. Taf. 25. Fig. 18—19, *Ch. egregium* Gundl. Taf. 26. Fig. 1—5, *Ch. Shuttleworthi* Pfr. Fig. 6—11, *Ch. dissolutum* Pfr. Fig. 12—16, *Ctenopoma coronatum* Poey Fig. 17—19.

Aciculacea. Nach der Beobachtung des Thieres von *Truncatella dubiosa* Adams hält Fischer dafür, dass diese Art in die Familie der Aciculaceen gehöre. Journ. de Conchyl. 2. Ser. Tom. I. p. 232.

Truncatella californica Pfeiffer Proc. zool. soc. 1857. p. 111 von San Diego in Californien.

Ampullariacea. v. Martens hat die Ampullarien des Berliner Museums einer Revision unterworfen, und namentlich versucht die Synonymie der Philippi'schen und der Reeve'schen Arbeit festzustellen. Die in jener Sammlung befindlichen Arten sind in 12 Gruppen getheilt. Eine Art *A. pomatia* aus der achten Gruppe *Heliciformes* wird für neu gehalten. Malak. Bl. p. 181—213.

Ampullaria ormophora Morelet von Neu-Caledonien Test. nov. Austral. l. c.

Ueber das Athmungsorgan der Ampullarien hat Hupé im Castelnau'schen Reisewerke p. 63 eine von der bisher allgemeinen abweichende Ansicht ausgesprochen; er hält die über der Kiemenhöhle gelegene Tasche nicht für eine Lunge, sondern nur für einen Wasserbehälter, um zur Zeit der Trockenheit auszuhelfen. In Rücksicht auf die positiven Angaben früherer Reisenden, dass diese Schnecken Luft athmen, und auf die anatomischen Verhältnisse, scheint diese Angabe vorsichtig aufgenommen werden zu müssen. — Neue Arten dieser Gattung sind: *A. Castelnaudi* pl. 11. fig. 1 aus dem Amazonasflusse, *Swainsoni* (Amp. fusiata Swains. Illustr. pl. 103. fig. 2) aus Brasilien, *physis* pl. 12. fig. 2 aus dem Amazonasflusse, *prunella* pl. 12. fig. 4, *armeniaceum* pl. 13. fig. 5 aus dem Amazonasflusse.

*Ctenobranchiata.**Taenioglossata.*

Potamophila. *Valvata exigua* Adolf Schmidt aus Griechenland Zeitschr. für d. Allg. Naturw. von Giebel und Heintz p. 160 in der Anmerkung. — *V. striata* Lewis aus dem Staate New-York Proc. Philadelphia VIII. p. 260.

H. Dohrn stellte 13 neue Arten von Ceylon aus der Cuming'schen Sammlung auf, Proc. zool. soc. 1857. p. 123, nämlich: *Paludina ceylonica*; *Bithynia stenothyroides*, *inconspicua*; *Paludomus fulguratus*, *nasutus*, *sphaericus*, *solidus*, *distinguendus*, *Cumingianus*, *dromedarius*, *Skinneri*, *Swainsoni*, *nodulosus*.

Frauenfeld hat die Paludinen aus der Gruppe der *Paludina viridis* untersucht, und verglichen. Wiener Sitzungsberichte XXII. p. 569—578. In einem Schema werden die Gattungen unterschieden, welche aus der alten Gattung *Paludina* Lam. hervorgegangen sind, und unter ihnen auch *Amnicola* Gld., *Hydrobia* Hartm. und *Paludinella* für generisch verschieden anerkannt, indem bei *Amnicola* die Mündung die Hälfte der Schale einnimmt, bei *Hydrobia* und *Paludinella* weniger als die Hälfte; bei ersterer ist dann die Schale kegelförmig zugespitzt, bei letzterer cylindrisch-eiförmig abgestutzt. Ob diesen Differenzen generischer Werth beizulegen sei, muss ich bezweifeln. *P. viridis* gehört in die Abtheilung *Paludinella*, aus der 35 Arten angeführt werden. Von ihnen sind abgebildet: *Pal. viridis* Poir., *austriaca*, *compressa*, *cylindrica* Parr., *Dunkeri* und *opaca* Ziegl.

Paludina seminium Morelet Journ. de Conchyl. 1857. p. 376 von Algerien. — *P. spica* Eichwald Mém. de Moscou X. tab. 10. fig. 8—9 aus dem Caspischen Meere.

Melania rustica, *digitalis*, *arctecava*, *granospira*, *monile* Mousson Journ. de Conchyl. 1857. p. 160 von Java. — *M. macrospira* und *speciosa* Morelet Test. nov. Austral. I. c.

Melanopsis lineolata Gassies von Neu-Caledonien Journ. de Conchyl. 1857. p. 276. pl. 9. fig. 9—10. — *M. brevis*, *variegata* und *frustulum* Morelet von Neu-Caledonien Test. nov. Austral. I. c.

Littorinacea. Clark hatte Gelegenheit das Thier von *Rissoa pulcherrima* lebend zu beobachten, und hält sie für eine der zahlreichen Varietäten von *Rissoa inconspicua*. Annals nat. hist. XX. p. 262.

Patterson sprach in der British Association über die Quantitäten von *Littorina*, welche zu Belfast während der Jahre 1853—56 verladen wurden. Edinburgh new phil. Journ. N. S. 1857. VI. p. 332.

In den Lief. 166—168 von Reeve's Conchol. iconica sind 16

Tafeln der Gattung *Littorina* gewidmet. Unter den 91 Arten sind als neu abgebildet: *L. ahenea* Senegal, *Philippinea* Philippinen, *arboricola* Singapore, *Newcombi* Sandwich, *Fortunei* China, *Fraseri* Westafrika, *glans*, *simplex* Cap Verd, *ambigua* Nuttall MS. Sandwich, *luctuosa* Neu-Seeland, *balteata* China, *Novae Zelandiae* Neu-Seeland, *thersites* Valparaiso, *granocostata* Australien, *feejeensis* Feeje-Inseln, *picea*, *paludinella* Tasmania, *Adamsii* (puchella Adams MS.) Jamaica, *rufa* Recluz MS.

Die vorgeblich neue *Skenea tricarinata* (vergl. vor. Bericht p. 132) wird nun von Webster als Varietät von *S. rota* bezeichnet. *Annals nat. hist.* XIX. p. 269.

Fischer sieht *Journ. de Conchyl.* 1857. p. 42, 168, 284 eine kleine Gruppe von Gattungen, nämlich: *Skenea* Flem, *Spira* Brown, *Cyclostrema* Marryat, *Adeorbis* Wood und *Pseudorotella* Fischer als der Familie der Trochoiden angehörig an, zählt die zahlreichen Arten nach ihrer geographischen Vertheilung auf und giebt die Beschreibung und Abbildung folgender neuen Arten: *Adeorbis Verreauxii* von Californien, *Adeorbis Beauii* von Guadeloupe, *Adeorbis Orbigny* von Cuba, *Adeorbis Adamsii* von Guadeloupe, *Cyclostrema Schrammii* von Guadeloupe und *Skenea Petitii* ebendaher. — (Falls die genannten Gattungen wirklich alle zu derselben Gruppe gehören, dürfen sie nicht den Trochoiden, sondern vielmehr den Rissoen zugezählt werden. Von *Skenea planorbis* wenigstens habe ich durch die Untersuchung der Mundtheile aufs Entscheidendste nachgewiesen, dass sie in die Nähe von *Rissoa* gehört. Vgl. mein Gebiss der Schnecken III. p. 128. Taf. X. Fig. 10, welche leider auf der Tafel fälschlich als Fig. 9 bezeichnet ist, indem eine Verwechslung der Ziffern 10 und 9 stattgefunden hat.)

Cerithiacea. *Potamis pullatus* Gould Reports of explorations and surveys V. p. 233. pl. 11. Fig. 23, 24 von San Diego.

Baudon beschrieb *Journ. de Conchyl.* 1857. p. 347 als neue Art *Fossarus Lanoei* von Jaffa im Syrischen Meere.

Marseniadae. Bergh lieferte in *Meddelelser naturh. Foren. Kjöbenhavn* 1857. p. 110 einen Beitrag zu einer anatomischen Untersuchung von *Marsenina prodita* Lov. Die drei Arten der Gattung *Marsenina* gehören dem nördlichen Theile der östlichen Halbkugel an, *M. prodita* Lov., *M. micromphala* Bgh. (*Oithonella micromphala* Mörch) und *M. groenlandica* Möll. Die Untersuchung bezieht sich auf die erstere dieser Arten. Ausser der Schilderung der äusseren Beschaffenheit des Thieres und der Schale hat besonders das Gebiss mit Kiefern und Zungenbewaffnung die Aufmerksamkeit des Verf. angezogen, auch der Schlundring mit seinen vier Ganglien ist auf der beigegebenen Tafel abgebildet.

Xenophorea. Fischer machte bei Gelegenheit der Be-

schreibung einer neuen Art *Xenophora caribaea* von den Antillen Bemerkungen über die Stellung dieser Gattung, ohne jedoch zu einem Resultate zu kommen. *X. caperata* Phil. ist auch abgebildet. Die Zahl der bekannten lebenden Arten beläuft sich auf 12. Journ. de Conchyl. 2. Sér. Tom. I. p. 243. — Vergl. eine spätere Notiz ib. Tom. II. p. 24.

Das Thier von *Onustus trochiformis* (Phorus exustus) beschrieb Mörch Journ. de Conchyl. 1857. p. 304, bildete es auch pl. 13. fig. 1—3 ab. Er möchte die Gattung in die Nähe der Heteropoden bringen, und sie als einen litoralen Heteropoden bezeichnen, wodurch sich zugleich der Mangel des Kieles erklären soll.

Alata. *Strombus taurus* Reeve Annals nat. hist. XX. p. 522 von den Amiranthen.

Ranellacea. *Triton Barthelemyi* Bernardi Journ. de Conchyl. 1857. p. 54. pl. 1. fig. 1.

Cassidea. *Dolium luteostomum* aus dem Indischen Ocean und *D. Lischkeanum* von Manila Küster Conch. Cab.

Cassis nucleus Küster Conch. Cab. p. 43 ist nach einer alten Chemnitz'schen Zeichnung aufgestellt.

Involuta. *Cypraea Barclayi* Reeve Annals nat. hist. XX. p. 522 von der Insel Diego-Garcia bei Mauritius.

Toxoglossata.

Conoidea. *Conus Villepinii* Fischer et Bernardi Journ. de Conchyl. 2. Sér. Tom. I. p. 292 von Marie-Galante. — *C. Macarac* Bernardi ib. II. p. 56. pl. 2. Fig. 2. — *C. Chenui* Crosse ib. p. 381. pl. 11. Fig. 3.4 von Neu-Caledonien. — *C. Pazii* Bernardi ib. p. 385. pl. 11. Fig. 1. 2.

Terebracea. Deshayes beschrieb 36 neue Arten der Gattung *Terebra* im Journ. de Conchyl. 1857. p. 65. Sie sind auf drei Tafeln abgebildet: *T. formosa* von Panama, *Cumingii* China, *regina* Senegal, *lima* China, *insignis* Panama, *fimbriata*, *consobrina* Rothes Meer, *splendens* China, *festiva* Senegal, *decorata* Sumatra, *histrion*, *circumcincta* Rothes Meer, *solida* Japan, *Fortunei* China, *Hindsi* China, *pura* Zanzibar, *virginica* Zanzibar, *Bernardii* Australien, *Petiveriana* Panama, *marginata* Gambia, *pallida* Marquisen, *Reevei* Molukken, *trochlea* Zanzibar, *Gouldi* Sandwich, *tiarella* Natal, *buccinulum* Australien, *Sowerbyana* Gambia, *pulchella* China, *Verreauxi*, *Jukesi* Port-Essington, *plicatella* Vandiemensland, *ustulata* Vandiemensland, *concinna* Japan, *circinnata* China, *acuta* China, *glabra* China.

Terebra Hupei unbekannten Vaterlandes und *T. Bermonti* von

Taiti Journ. de Conchyl. 1857. p. 388. pl. 12. fig. 1 und fig. 2 sind neue Arten von Lorois.

Pleurotomacea. *Pleurotoma (Turris) Rombergii* Moersch von Realejo Meddelelser nat. Forening 1857. p. 340; Journ. de Conchyl. 1857. p. 281. — *P. nuperrimum* Tiberi l. c.

Rhachiglossata.

Volutacea. *Marginella Loroisii* Bernardi Journ. de Conchyl. 2. Sér. Tom. I. p. 290. pl. 8. fig. 6—7.

Voluta Beauii Fischer et Bernardi Journ. de Conchyl. 2. Sér. Tom. I. p. 296. pl. 10. fig. 1—2.

Olivacea. Eine Arbeit von Ducros de Saint-Germain „Revue critique du genre Oliva, Clermont 1857. 8. 120 pages, 3 planches, ist mir leider nur aus einer Anzeige in Journ. de Conchyl. p. 302 bekannt geworden. Dasselbst werden die Ansichten des Verf. über die Species angefochten. Er hat die Duclos'sche Sammlung zur Benutzung gehabt, und schon deshalb ist der Arbeit ein Werth beizulegen. Er nimmt 119 Arten an. Als neu darunter sind folgende beschrieben: *O. Verreauxii* von Marie-Galante pl. 3. fig. 86, *Sowerbyi* pl. 3. fig. 103 ebendaher, *Deshayesiana* pl. 3. fig. 67 von Californien, *Barthelemyi* pl. 3. fig. 58 von Java, *Jayana* pl. 3. fig. 44 von Oceanien, *Broderipii* pl. 2. fig. 39, *Maria* pl. 2. fig. 16 von Californien, *Lecocquiana* pl. 2. fig. 20 von China, *Fabrei* pl. 2. fig. 18, *magnifica* pl. 1. fig. 4 von Mindanao.

Canalifera. *Columbella Lafresnayi* Fischer et Bernardi Journ. de Conchyl. 2. Sér. Tom. I. p. 357. pl. 12. fig. 4—5 von Marie-Galante.

Fusus arthriticus Bernardi Journ. de Conchyl. 1857. p. 386. pl. 12. Fig. 3 von Japan. — *F. tortuosus* und *spitzbergensis* Lovell Reeve von Beechey's-Insel l. c. p. 394. pl. 32. Fig. 5. 6. — *F. (Volutopsius) castaneus* und *harpa* Moersch Meddelelser nat. Forening 1857. p. 340 von Sitka.

Pyrula (Rhizochilus) De Burghiae Reeve Annals nat. hist. XX. p. 523 von China.

Muricea. *Murex Barclayi* Reeve Annals nat. hist. XX. p. 523 von St. Brandon-Shoal bei Mauritius. — *M. Beauii* Fischer et Bernardi Journ. de Conchyl. 2. Sér. Tom. I. p. 295. pl. 8. fig. 1 von Marie-Galante. — *M. Benoiti* Fieberi l. c. ist nach Fischer Journ. de Conchyl. 1857. p. 291 = *M. tectum sinense*.

Buccinea. *Buccinum Belcheri* Lovell Reeve von Beechey's Insel l. c. p. 394. pl. 32. fig. 7.

Phos Beauii Fischer et Bernardi Journ. de Conchyl. 2. Sér. Tom. I. p. 358. pl. 12. fig. 8—9 von Marie-Galante.

Eine Note von Fischer über *Purpura melones* Duclos, die nach dem Deckel eine wirkliche *Purpura* sei s. Journ. de Conchyl. 1857. p. 164.

Ptenoglossata.

Scalarina. *Scalaria pernobilis* Fischer et Bernandi Journ. de Conchyl. 2. Sér. Tom. I. pl. 8. fig. 2—3 Marie-Galante.

Rhipidoglossata.

Stoastomidae. Chitty hat in Proc. zool. soc. 1857. p. 162 über diese Familie Mittheilungen gemacht. Er theilt sie in sieben Gattungen und beschreibt 61 neue Arten, sämmtlich von Jamaica, wodurch die Zahl der von Jamaica bekannten Arten auf 80 steigt; dazu kommt eine Art von Polynesien. *Stoastoma pisum* ist in Holzschnitt abgebildet.

Die Genera sind folgende, bei denen zugleich die neuen Arten genannt werden: 1) *Lewisia* die Schale hat gleichsam zwei Mündungen, dahin L. Agassiziana Ad., Philippiana Ad., Woodwardiana und Macandrewiana. 2) *Wilkinsonaea*. Letzte Windung weit vorgezogen; Schale scheibenförmig, mit einigen starken Querlinien, zwischen denen viele feinere. Dahin W. Wilkinsonaeana Ad., Gouldiana Ad., Schomburghkiana, Abbottiana, Jardineiana, Greenwoodiana, Laidlawiana, Tappaniana, Hollandiana, Dysoniana, Hanleyana, Bensoniana, Moussoniana. 3) *Fadyenia*. Spira etwas deprimirt, winklig an dem oberen Theile der letzten Windung, gerade oder flach an dem Umfange und wieder winklig an der Basis. Dahin F. Fadyeniana Ad., Bowerbankiana, Grayana. 4) *Stoastoma*. Kuglig. Dahin St. pisum Ad., Pfeifferianum Ad., Livesayanum, succineum Sow. 5) *Metcalfesia*. Niedrig kegelförmig. Dahin M. Metcalfesiana, Chittyana Ad., Bacquiéana, Sutherlandiana, Moerschiana, Verreauxiana, Sinclairiana, Mitchelliana, Dohrniana, Layardiana, Swiftiana. 6) *Petitia*. Kuglig scheibenförmig. Dahin P. Petitiiana Ad., Cumingiana Ad., Anthoniana Ad., Stevensiana, Fortuneana, Adamsiana, Tayloriana, Stricklandiana, Stokesiana, Grevilleana, Carpenteriana, Barroniana. 7) *Lindsteya*. Kuglig kegelförmig. Dahin L. Lindsteyana Ad., Pickeringiana, Redfieldiana Ad., Jayana Ad., Leana Ad., Denisoniana, Polyblankiana, Albersiana, Fischeriana, Moricandiana Ad., Reeveana, Shuttleworthiana, Boissieriana, Gaskoiniana, Newcombiana, Riiseana, Poeyana, Henryana, Alderiana, Bridgesiana, Salléana, Arthuriana, Gutierreziana, Oweniana, Wollastoniana. 8) *Blandia*. Fast scheibenförmig. Dahin B. Blandiana Ad., Jeyffreysiana, Bairdiana, Mac Gillivrayana, Troscheliana, Hilliana, Trailliana, Luke-siana, Loweana.

Helicinacea. *Trochatella petrosa* Gundl., *rubicunda* Gundl. und *capillacea* Pfr. von Trinidad auf Cuba, Malak. Bl. p. 111.

Helicina Sprucei von den Anden in Peru, *merguensis* von Mergui, Pfeiffer Proc. zool. soc. 1852. p. 111. — *H. concinna* Gundlach Malak. Bl. p. 178. — *H. togatula* Morelet von Neu-Caledonien Test. nov. Austr. l. c.

Alcadia capax Gundlach von Trinidad auf Cuba Malak. Bl. p. 113.

Lucidella nana Pfeiffer ib. von Jamaica.

Pfeiffer bildete in seinen Novit. conchol. folgende Arten dieser Familie ab: *Trochatella* Taf. 23. Fig. 7. 8; *Helicina cataliensis* Fig. 1—3, *denticulata* Fig. 9—10, *columellaris* Gundl. Fig. 11—13, *Blandiana* Gundl. Fig. 14—16, *rubromarginata* Gundl. Fig. 17—19, *granum* Fig. 20—23, *phasianella* Sow. Fig. 24—27, *Hjohmarsoni* Fig. 28—31; *Schasicheila Nicoleti* Shuttl. Taf. 25. Fig. 7—9, *alata* Menke ib. Fig. 10—12.

Proserpinacea. *Ceres colina* Duclos und *Salleana Cuming* sind bei Pfeiffer Nov. conchol. Taf. 25. Fig. 1—6 abgebildet und beschrieben.

Hydrocaenacea. *Hydrocaena chinensis* von China, *vulpina* von den Fuchsinselfn, ferner *H. (Omphalotropis) cerea* von den Norfolk-Inselfn, *guamensis* von Guam und *navigantium* von den Schifferinseln sind neue Arten von Pfeiffer Proc. zool. soc. 1857. p. 112.

Neritacea. Eine sehr gründliche Arbeit über die Anatomie und Entwicklungsgeschichte der *Neritina fluviatilis* hat Claparède in Müller's Archiv für Anatomie 1857. p. 109—248 geliefert.

In dem anatomischen Theile handelt der Verf. 1) von der Hautbedeckung und der Struktur der Schale. In letzterer kommen sehr enge Kanäle vor, welche für das Produkt eines schmarotzenden Wesens gehalten werden. Der Deckel ist seiner mikroskopischen Struktur nach von der Schale durchaus verschieden, was für ein Argument gegen die Ansicht, als sei der Deckel gleichsam eine zweite Schale, angesehen wird. 2) Der Schlundring besteht aus zwei oberen Ganglien, die durch eine lange und ziemlich dicke Commissur verbunden sind, die zur unteren Ganglienmasse verlaufenden Schenkel sind jederseits doppelt, die untere Ganglienmasse besteht aus zwei Ganglienpaaren, die einen Ring bilden. 3) Als Sinnesorgane werden die Fühler als Tastorgane, die gestielten Hörbläschen und die Augen beschrieben. 4) Beim Verdauungsapparat haben besonders die Zungenknorpel des Verf. Aufmerksamkeit in Anspruch genommen, von denen er meint sie seien ebenso gut zum Zweck der Classification zu verwerthen wie die Reibmembran. Zunächst wird hervorgehoben, dass

Neritina, wie viele andere Schnecken, vier Knorpel besitzen; indem hinter dem Knorpel jederseits sich noch ein besonderer kleinerer Knorpel anfüge; dann aber wird besonderes Gewicht darauf gelegt, dass der mikroskopische Bau der Knorpel drei Formen zeige, nämlich erstens, dass er aus grossen Zellen besteht, die sich durch Scheidewände in Abtheilungen theilen, wie bei Neritina, Cyclostoma, Pomatias (und den allermeisten Schnecken, wenigstens allen bisher näher untersuchten), — zweitens, dass die Zellen kleiner und von abgeflachter Gestalt sind, wie bei Vitrina, — drittens, dass eine mit zahlreichen Knorpelkörperchen besäete Grundsubstanz vorhanden ist, wie bei vielen Pulmonaten, namentlich Heliceen. Interessant ist ferner die Angabe, dass bei allen vom Verf. untersuchten Pulmonaten nur ein einziges nach hinten gegabeltes Knorpelstück vorhanden sei. Von der Zungenscheide wird behauptet, dass ihrem Ende eine Papille angehöre, die die neuen Platten der Reibmembran bilde (ich muss dabei beharren, dass diese Papille mit der Radula aus der Zungenscheide, namentlich bei grossen Schnecken hervorgezogen wird, also nicht der Zungenscheide angehört, sondern der Radula selbst). 5) Bei den Circulationsorganen wurde es wahrscheinlich gemacht, dass ein vom Darne durchbohrtes Organ am Grunde der Kieme das Herz sei, jedoch lasse sich eine Vorkammer und eine Herzkammer nicht unterscheiden. — Die Neritinen sind getrennten Geschlechts; sowohl die männlichen Organe, die aus Hoden, Samenleiter, einer sogenannten männlichen Nebendrüse und Penis bestehen, als auch die weiblichen, Eierstock, Eileiter, weibliche Nebendrüse, Samentasche und Uterus, sind sehr sorgfältig untersucht und abgebildet worden. In der kugelförmigen Endanschwellung des Uterus werde ein Stoff gefunden, den Verf. für Myelin erklärt. Die Zoospermien bilden sich als Fäden ohne Knopf in einzelnen Bildungszellen, in welche die Mutterzellen vor der Bildung der Zoospermien zerfallen, so dass die sonst gewöhnlichen schopfartigen Büschel niemals gefunden werden. — Besonders wichtig ist der Abschnitt über die Entwicklungsgeschichte, da wir ja bisher nur durch die kurze Mittheilung von Lindström überhaupt etwas von der Entwicklung der Neritinen wissen. Ich finde in der Claparède'schen Schilderung keinen Widerspruch gegen die Lindström'schen Angaben, aber die Vorgänge sind detaillirter erforscht. Dass sich bis 60 Eier in jeder Eihülle finden, von denen sich immer nur eins zu einem Embryo entwickelt, wird bestätigt. Die Beobachtungen des Verf. sprechen gegen die Auffassung von Koren und Danielssen und durchaus für die von Carpenter, dass nämlich alle dem einen zur Nahrung dienen; es wurde beobachtet, dass der Embryo an den übrigen Eiern lecke, und die auf der Oberfläche befindlichen Dotterkörnchen in den Schlund einwandern. Dies geschieht bereits zu einer Zeit, wo noch keine Spur einer Schale

vorhanden ist. Die Larven haben Wimpersegel am Kopfe, machen aber die Entwicklung so weit in der Eikapsel durch, dass die provisorischen Organe bereits vor dem Ausschlüpfen aus derselben verschwinden. Mit dem Anfange des freien Lebens fällt etwa die Bildung des Herzens und der Kieme zusammen, während die Geschlechtsorgane erst viel später zur Entwicklung kommen.

Einen Auszug aus der eben besprochenen Arbeit, soweit sie die Entwicklung von *Neritina* betrifft, findet man in *Annals nat. hist.* XX. p. 196.

Neritina ruida und *emergens* von Java, *pulcherrima* von Celebes Mousson Journ. de Conchyl. 1857. p. 162. — *N. nucleolus* Morelet Test. nov. Austral. l. c. von Neu-Caledonien.

Navicella caledonica Morelet von Neu-Caledonien Test. nov. Austral. l. c.

Trochoidea. *Trochus (Euchele) alabastrum* Reeve *Annals nat. hist.* XX. p. 523 von Diego-Garcia bei Mauritius.

Arthur Adams hat eine Notiz über das Thier von *Turbo sarmaticus*, so wie über drei Arten der Gattung *Oxystele* und einige andere Schnecken des Cap veröffentlicht. *Annals nat. hist.* XX. p. 41.

Turbo Cailleti Fischer et Bernardi Journ. de Conchyl. 2. Sér. Tom. I. p. 294. pl. 10. fig. 10—11 von Guadeloupe.

Phasianella compta Gould Reports of explorations and surveys V. p. 333. pl. 11. fig. 25. 26 von San Diego.

Fissurellacea. Fischer hat mehrere Arten der Gattung *Fissurella* auf das Thier untersucht, und findet eine grosse Verschiedenheit in Beziehung auf den Rand des Mantels. Ob man diese als generische Differenzen anerkennen soll, will er davon abhängig machen, ob sich auch anatomische Differenzen finden möchten. Am ersten möchte er noch die Trennung in zwei Gattungen zulassen, je nachdem die Schale eine äussere ist (*Fissurella*), oder mehr oder weniger vom Mantel bedeckt wird (*Fissurellidae*). Journ. de Conchyl. 2. Sér. Tom. I. p. 233. — Vergl. ib. II. p. 115.

Fissurella Schrammii Fischer ib. II. p. 383 von Guadeloupe.

Fischer hat ferner die Gattung *Submarginula* anatomisch untersucht, und findet sie verwandt mit *Emarginula* und *Fissurella*. Thier und Zunge sind abgebildet, jedoch ist mir letztere unverständlich. Ib. Tome I. p. 224.

Emarginula Rollandii Fischer ib. p. 356 von Guadeloupe. — *E. Costae* Fischer ib. Tom. II. p. 38. pl. 2. fig. 5 von Neapel.

Fischer spricht sich ib. I. p. 237 gegen die Anwendung des Namens *Anatomus* Montf. anstatt *Scissurella* aus.

Cyclobranchiata.

Patellina. Murray bezeichnete eine Varietät von *Patella vulgata* als Var. *intermedia*. Edinburgh new phil. Journ. N. S. VI. 1857. p. 164; Annals nat. hist. XIX. p. 211.

Acmaea Hamillei Fischer Journ. de Conchyl. 2. Sér. I. p. 276 von Guadeloupe.

Gadinia excentrica Tiberi Journ. de Conchyl. 1857. p. 37. pl. 2. fig. 6 von Sardinien.

Chitonidae. Schiff hat Beiträge zur Anatomie von *Chiton piceus* geliefert, die als eine werthvolle Bereicherung der Kenntniss dieser interessanten Schnecken anzuerkennen sind. v. Siebold und Köl liker Zeitschr. f. wiss. Zool. IX. p. 12 mit zwei Tafeln.

Sehr ausführlich ist das Herz beschrieben, welches aus einer Herzkammer und zwei Vorkammern besteht, welche letzteren aber an ihrem Hinterende vereinigt sind, so dass sie gleichsam nur eine hufeisenförmige Vorkammer darstellen, die das Blut durch 4 Oeffnungen in die Herzkammer ergiesst. Von den Geschlechtsorganen sind nur die weiblichen beschrieben worden. Den Zweck der Zungenknorpel setzt Verf. in dem Festhalten der Radula, wenn dieselbe sich zurückbewegt; sie sollen verhindern, dass die Radula, welche bekanntlich ganz lose in der Zungenscheide steckt, sich nicht beim Fressen herauschiebe, und er möchte daher diese Knorpel, deren blasige Natur er bei *Chiton piceus* bestätigt, nicht mit Middendorff Bewegungsblasen, sondern vielmehr Fixirungsblasen nennen. Von der Reibplatte ist eine Abbildung gegeben, die ein hübsches Bild von dem Eindruck unter dem Mikroskop giebt, aber weder Beschreibung noch Abbildung sind für die Vergleichung mit verwandten Gattungen und Species berechnet. Ausserdem sind noch der Schlund mit seinen Blindsäcken, Magen, Darm, Leber, Nieren, die ihrer Function nach zweifelhaft sind, Nervensystem und Kiemen beschrieben.

Cirrobranchiata. Die schöne Arbeit von Lacaze-Duthiers über die Organisation und Entwicklung von *Dentalium*, verg. vor. Bericht p. 139, ist in den Annales des sciences nat. Tome VII und VIII fortgesetzt und beendet worden. Der zweite Theil Tome VII p. 170—255 handelt von den Geschlechtsorganen und der Embryogenie; der dritte Tome VIII. p. 18—28 von der Lebensweise; der vierte ib. p. 28—44 von den zoologischen Beziehungen.

Die Dentalien sind getrennten Geschlechts, aber Hoden und Eierstock sind in beiden Geschlechtern von gleicher Gestalt. Sie lie-

gen im hinteren Körpertheile am Rücken, und münden mittelst eines kurzen Ausführungsganges in die rechte Hälfte des Bojanus'schen Organes. Dieses letztere ist doppelt und umgiebt den After; jede Seite öffnet sich in einer Oeffnung nach aussen, und Verf. nimmt es für ein Absonderungsorgan, eine Niere. — Die Befruchtung findet ausserhalb des Mutterkörpers statt. Verf. hat zahlreiche Spermatozooiden aussen an den Eiern angeheftet, mehrere durch die Mikropyle in das Ei eingedrungen gesehen, und vermuthet, dass sie auch durch eine zweite Mikropyle in das Innere des Dotters eindringen. Nach Vollendung des Furchungsprocesses beginnt die zweite Periode der Entwicklung, in welcher der Embryo schwimmt. Etwa 16 Stunden nach der Befruchtung erscheinen auf der Oberfläche des Embryo Wimpern, der Körper verlängert sich ein wenig und trägt am Vorderende ein Büschel Wimpern, während sich auf dem Körper die Wimpern zu Reifen ordnen, die sich demnächst auf die Zahl vier vereinfachen; der Embryo erscheint ganz ähnlich einem Anneliden-Embryo. Die Reifen nähern sich und vereinigen sich zu einem breiten Reifen. Dahinter bildet sich eine ringförmige Wulst und am Hinterende entsteht eine Furche, in welcher einige Wimpern erscheinen. Schon nach 48 Stunden erscheint die Schale, mit ihr beginnt die dritte Periode. Der hintere Theil des Körpers verlängert sich, der vordere senkt sich ein, so dass der Wimperreifen die Bewegungsscheibe darstellt. Auch in dieser Periode schwimmt der Embryo noch, die Scheibe nach oben. Die vierte Periode beginnt am 5. oder 6. Tage, indem nun das Thierchen kriecht. Der Fuss entwickelt sich und wird zum einzigen Bewegungsorgan. Verf. hat sie bis zum 40. Tage beobachtet, wo der Embryo schon die grösste Analogie mit dem vollständigen Thier hat. Die Ausbildung der einzelnen Organe wird hierauf ausführlich geschildert. — Bei einer ausführlichen Besprechung der zoologischen Beziehungen kommt Verf. zu dem Resultate, Dentalium müsse wegen der Symmetrie des Körpers, wegen des Nervensystems, des Fusses, des Mundes, Lage des Afters, wegen der Bojanus'schen Organe, der Geschlechtsorgane und wegen der Embryonen zu den Acephalen gestellt werden, während die Gattung durch den Embryo und die Zunge mit Chiton, wegen der Zunge und der Struktur der Schale mit Patella Verwandtschaft zeige. Ref. für seinen Theil, muss gestehen, dass ihm ein Acephale mit Zunge, ein Widerspruch zu sein scheint. Da nun Dentalium natürlich nicht geradezu in die Ordnung der Lamellibranchen und Brachiopoden gesetzt werden kann, so bildet Verf. für dasselbe eine eigene neue Ordnung, die er *Solenocoencha* nennt.

Ueber das Nervensystem von *Dentalium entalis* von Lacaze-Duthiers vergl. Comptes rendus 1857. p. 864; Annals nat. hist. XX. p. 236.

Pulmonata.

Fischer hat Studien über die Spermatophoren der Lungenschnecken bekannt gemacht. Annales des sciences nat. Tome VII. p. 367.

Nach einer historischen Einleitung werden die Spermatophoren (Lister's Capreolus) von folgenden Arten beschrieben: *Arion rufus*, *Parmacella Deshayesii* und *Valenciennii*, *Limax maximus*, *Peltella palliolum*, *Helix aspersa*, *pomatia*, *nemoralis*, *arbustorum*, *Bulimus acutus*. Ganz ohne Spermatophore sollen sein: *Helix pisana*, *rotundata*, *lenticula*, *fruticum*. — Unter den bisher beobachteten Formen ergeben sich folgende Verschiedenheiten: die Erweiterung (nodus) liegt in der Mitte (*Helix*), oder vorn (*Parmacella*, *Peltella*?), oder es ist kein deutlicher Nodus vorhanden, aber eine Reihe dorsaler Zähnelungen (*Arion*, *Bulimus*). — Die Spermatophoren bestehen aus coagulirtem Eiweiss mit etwas kohlensaurem Kalk. — Die Bedeutung dieses Organs wird darin gesetzt, dass es die plötzliche Lösung der Individuen bei der Begattung hindere und den Samen in die Samentasche befördere. Die Bildung der Spermatophoren ist Verf. geneigt der sogenannten Eiweissdrüse zuzuschreiben.

Limacea. *Limax (Megapelta) semitectus* Moersch aus Centralamerika Meddelelser nat. Forening 1857. p. 340; Journ. de Conchyl. 1857. p. 282.

Philomycus (Tebennophorus) costaricensis Moersch Meddelelser nat. Forening 1857. p. 341 von Costa rica.

Nachdem Deshayes in Journ. de Conchyl. 2. Sér. I. p. 283 eine neue *Limax*-artige Gattung *Viqueneslia* nach fossilen Stücken aus Rumelien aufgestellt hatte, deren Schalenrudiment mit einem ziemlich dicken senkrecht umgeschlagenen Rande versehen ist, und an welchem sich zwei Windungen an der oberen Seite erkennen lassen, während die ventrale Seite schwierig und ohne Spur einer Windung ist, — beschreibt Fischer in einem Anhang auch eine lebende Art dieser Gattung, die zwischen *Limax* und *Parmacella* stehen soll. Dieselbe heisst *V. Dussumieri* und stammt von Mahé.

Eine „Monographie du genre Testacelle, von Gassies und Fischer,“ Abdruck aus den Actes de la soc. Linn. de Bordeaux. Tome XXI. 1856 mit 2 Tafeln ist nachträglich zu erwähnen. Vergl. die Anzeige von Pfeiffer in den Malak. Bl. p. 74.

Helicea. Gundlach hat die Thiere von dreissig Heliceen-Arten, besonders in Beziehung auf die Farbe beschrieben. Die Arten gehören den Gattungen *Succinea*, *Helix*, *Bulimus*, *Stenogyra*, *Subulina*, *Achatina*, *Spiraxis*, *Pupa* und *Cylindrella* an. Malak. Bl. p. 42.

In einem Berichte von Pfeiffer ib. p. 100 über Dr. Gundlach's Reise nach Trinidad auf Cuba sind 43 Arten dort lebender Schnecken aufgezählt, und Notizen über die Thiere beigelegt. Die neuen Arten sind unten namhaft gemacht.

Fischer giebt einige Notizen über *Daudebardia sicula*; er stellt diese Gattung in die Familie der Testacellidae. Journ. de Conchyl. 1857. p. 28.

Auf *Vitrina praestans* Gould gründete Theobald Journ. Asiat. soc. 1857. p. 252 eine neue Gattung *Cryptosoma*, testa Vitrinae simile, sed robustiore; peristomate obtuso hand tenue; animal penitus intra testam retractile, et in aestivationis tempore, solido epiphragmate oblecto. Verf. hat die Art generisch von *Vitrina* getrennt, weil das Thier sich vollständig in die Schale verbergen kann, und weil der Mundsau dicker als bei *Vitrina* ist.

Succinea lineata W. G. Binney Proc. Boston Soc. VI. p. 155; Proc. Philadelphia 1857. p. 19 aus der Nähe von Fort Union. — *S. guamensis* von Guam, *chinensis* von China, *Bermudensis* von Bermuda Pfeiffer Proc. zool. soc. 1857. p. 110.

Anostoma Deshayesianum Fischer aus Brasilien und *A. Verreauxianum* Hupé vom Amazonenflusse sind zwei neue Arten, wodurch die Zahl der Arten dieser Gattung auf fünf erhoben wird. Journ. de Conchyl. 2. Sér. Tom. I. p. 350. Letztere ist in Castelnau's Reise-werk p. 22. pl. 3. fig. 5 abgebildet.

Nanina cycloidea Albers aus Ostindien Malakoz. Bl. p. 89, bei welcher Gelegenheit eine neue Diagnose von *N. splendens* gegeben ist. — *N. Waandersiana*, *Baliensis*, *sparsa*, *clypeus*, *corrosa*, *menadensis* Mousson von Java, Balie und Celebes Journ. de Conchyl. 1857. p. 154.

Indem Albers Malak. Bl. p. 91 sich nur insofern für die Annahme der Gattung *Zonites* ausspricht, als dieselbe auf *H. verticillus*, *algius* und verwandte zu beschränken sei, erhebt er die Gruppe *Hyalina* zur eigenen Gattung, die er folgendermassen charakterisirt: Testa umbilicata vel perforata, depressa, tenuis, nitens, vitrea vel fusco-cornea; anfractus 5—7 regulariter accrescentes, ultimus non descendens, saepe antice dilatatus; spira depressa, rarissime orbiculato-conica; apertura rotundato-lunaris; peristoma tenue, acutum rectum. Maxilla simplex, (nec sulcata nec dentata) arcuata, margine inferiori acuta, medio prominente; apertura respiratoria latere dextro supra collare, genitalis ad basin colli; systema sexuale simplex, bursa hastae amatoriae et hasta ipsa, flagellum et folliculi mucosi omnino desunt; musculus retractor penis brevissimus; saccus communis sexualis glandulis mucosis obsitus. Die Gattung zerfällt in drei Gruppen: *Euhyalina*, Typus *H. cellaria*; *Mesomphix*: Typus *H. oliveto-*

rum; *Gastrodonta*, Typus *H. interna* Say. — Zur ersteren Gruppe gehört eine neue Art *H. natolia* von Sputari.

Zonites deilus Bourguignat Revue de zoologie 1857. p. 9 von Sebastopol. — *Z. micula* Mousson von der Insel Balie Journ. de Conchyl. 1857. p. 158.

Helicella Steenstrupii Moersch in Rink's Grönland Anh. p. 75. (*Helix nitida* Fabr., *Helix alliaria* Forbes.)

Anatomische Bemerkungen über *Helix retirugis* und *Moquiniana* machte Fischer Journ. de Conchyl. 1857. p. 26 und p. 29. — Dasselbst p. 31 beschreibt derselbe die Spermatophoren von *H. nemoralis*.

Ueber die Varietäten der *Helix nemoralis* L. und *hortensis* Müll. hat Reibisch geschrieben. In Betreff der linksgewundenen Arten stellt er die Hypothese auf, sie entstanden dadurch, dass zwei Dotter in einem Ei vorhanden seien, und dass dann, wenn der eine sich zu drehen beginnt, der andere gezwungen würde, sich in entgegengesetzter Richtung zu drehen. Allg. Deutsche Naturh. Zeitung I. 1855. p. 283.

W. G. Binney hält Proc. Boston soc. VI. p. 128 *Helix thyroidus* Say für eine Bewohnerin aller Staaten im Osten der Rocky mountains, vielleicht mit Ausnahme der Halbinsel Florida. Er sieht *H. bucculenta* Gould als Varietät und Repräsentanten in den südwestlichen Staaten an.

Thienemann weist nach, dass die Linné'sche *Helix albella* der Jugendzustand von *H. crystallina* Müll. sei, und giebt dem letzteren Namen den Vorzug. Malak. Bl. p. 214.

Redfield beschrieb *Helix Elliotti* aus den Gebirgen von Georgia und Nordcarolina und *H. barbiger* aus Georgia. Annals Lyceum New-York VI. p. 170.

Helix stenogyra ist Taf. 25. Fig. 20—22, *H. Arcibensis* Taf. 28. Fig. 22—24 bei Pfeiffer Novit. conchol. beschrieben und abgebildet.

v. Martens machte eine nachträgliche Bemerkung über *Helix olivetorum* Malak. Bl. p. 213.

Bourguignat hat in der Revue de zoologie 1857. p. 1 von der echten *Helix Codringtoni* Jan eine neue Beschreibung gegeben, ihre Synonymie zusammengetragen und einige neue oder bisher mit ihr verwechselte Arten aufgestellt, nämlich: *H. parnassia*, *eucineta*, *eupaecilia*, *euchromia*.

Ebenda p. 8 *H. sphaerostoma* aus Thessalien und *H. Grelloisii* von den Inseln des Griechischen Archipels.

Ebenda p. 545 *H. Dschulfensii* Dubois aus Armenien und *H. Comephora* Bourguignat (*septipila* Bourg. olim) von der Krim.

Helix asteriscus Morse Proc. Boston soc. VI. p. 128 von Bethel Me. — *H. intercisa* W. G. Binney (*H. Nickliniana* Lea var. Binney Terrest. Moll. II. p. 120) von Oregon, Proc. Boston Soc. VI. p. 156; Proc. Philadelphia 1857. p. 18.

Pfeiffer stellte Proc. zool. soc. 1857. p. 107 auf: *H. subdecussata* Bombay, *granum* Neuseeland, *fatua* Neuseeland, *birmana* Mergui, *decidua* Neuseeland, *venulata* Neuseeland, *sciadium* Neuseeland, *niphias* Azoren, *lutacea* — ?, *exarata* Californien?, *mormonum* Mormon-Insel in Californien, *propinqua* Bombay, *bicruris* Mexiko. — *H. Langi* Parreiss vom Parnass ist von Rossmäessler Malak. Bl. p. 41 charakterisirt worden. — *H. Schotti* Zelebor aus Syrien, *infecta* Parr. aus Canada, *luteata* Parr. aus Portugal, *corax* Parr. vom Taurus, *reticulata* Pfr. aus Californien ib. p. 85. — *H. rubra* von Arrow-Inland, *prospera* von Ceylon, *Tollini* vom Cap, *platygyra* aus Columbien sind neue Arten von Albers ib. p. 93; die beiden ersteren sind abgebildet. — *Helix suavis* Gundlach und *Letranensis* Pfeiffer aus der Nähe von Trinidad auf Cuba ib. p. 105. — *H. monolacca* Pfeiffer ib. p. 155 von Surinam. — *H. comta* Gundlach von Cabo de Cruz auf Cuba ib. p. 172. — *H. Fricki* Pfr. ib. p. 229 von den Sandwichinseln. — *H. Boyerii* Fischer et Bernardi Journ. de Conchyl. 2. Sér. Tom. I. p. 297. pl. 70. fig. 8—9 von den Admiralitäts-Inseln. — *H. hierroensis*, *Perraudierei* und *Guamartemes* Grasset von den Canarischen Inseln ib. p. 345. — *H. Berlieri* Morelet von Algerien ib. Tom. II. p. 39. — *H. pascalia* Cailliaud ib. p. 102. pl. 2. fig. 3 aus Brasilien. — *H. Vidaliana*, *atlantica*, *brumalis*, *horripila*, *caldeirarum* Morelet et Drouet ib. p. 148 von den Azoren. — *H. transversalis* Mousson von der Insel Balie ib. p. 158. — *H. tigris* Fischer ib. p. 189. pl. 6. fig. 3 von Oran. — *H. Fischeri* und *multisulcata* Gassies von Neu-Caledonien ib. p. 271. — *H. cespitoides* Fischer ib. p. 278 von Neu-Caledonien. — *H. Cazenavettii* Fischer et Bernardi von Madagaskar ib. p. 280. — *H. modica* und *hipponensis* Morelet ib. p. 373 von Algerien. — *H. squamulosa* Mousson Vierteljahrsschr. der Ges. zu Zürich p. 396 von Trapezunt.

Streptaxis intermedia Albers aus Brasilien, zwischen *candida* Spix und *Wagneri* Pfr. Malakoz. Bl. p. 95. — *St. Rollandii* Bernardi Journ. de Conchyl. p. 187. pl. 6. fig. 2 aus Brasilien.

Pupa caucasica Parr. vom Caucasus Malak. Bl. p. 88. — *P. Moreletiana* Grasset von Teneriffa Journ. de Conchyl. 2. Sér. I. p. 348. — *P. Schaefflii* und *triflaris* Mousson von Reduktaleh Vierteljahrsschr. Ges. Zürich 1856. p. 398.

Von dem echten *Bulimus pudicus* Müll. gab Pfeiffer Malak. Bl. p. 179. Taf. 4. Fig. 1. 2 eine Beschreibung und Abbildung. Sie ist von der in den Sammlungen unter diesem Namen häufigen Art, die nun *Bul. Almeida* Spix heissen muss, verschieden.

Benson beschrieb folgende Arten der Gattung *Bulimus* aus Indien, Burma und Mauritius in *Annals nat. hist.* XIX. p. 327: *B. Dominica* aus Caschmir, *salsicola* von den Salzbergen von Pentepotamien, *Estellus* und *Pertica* aus dem Sind-Staate, *sanguineus* Barclay MS. von Mauritius, *Physalis* vom Nilgherri-Gebirge, *pleurophorus* vom Khasia-Gebirge, *Theobaldianus* von Tenasserim, *Putus* von Tavoy.

Unter den 250 Arten *Bulimus*, welche in dem Castelnau'schen Werke aufgezählt sind, sind folgende Arten neu: *B. Castelnaudi* Peru, *regalis* (*Achatina perversa* Spix, *regina* Var. auct.) Brasilien, *Larosiensis*, *incisus* (*regina* d'Orb. pl. 29. fig. 4. 5) Bolivia, *Boussingaultii* (*regina* Reeve Icon. 168b.), *alanda* (*thamnoicus* d'Orb. pl. 37. fig. 6. 7) Peru, *revinctus* (*thamnoicus* d'Orb. pl. 37. fig. 8. 9) Peru, *Weddellii* See Titicaca, *Beyerleanus* Peru, *simplex* Peru.

An sonstigen neuen Arten sind zu nennen: *Bulimus Fairbanki* Pfeiffer Proc. Zool. soc. 1857. p. 109 von Ahmednugger in Indien. — *B. episomus* und *pseudoepisomus* aus Syrien, so wie *B. Humberti* von Sebastopol Bourguignat *Revue de zoologie* 1857. p. 10. — *B. eximius* von Neu-Caledonien, *tripictus* von Costa rica, *asperatus* von den Gallapagos-Inseln sind von Albers aufgestellt. Malak. Bl. p. 96. — *Bulimus angulosus* Gundlach von Trinidad auf Cuba ib. p. 107. — *B. micans* von Natal, *B. malabaricus* von Malabar, *B. acervatus* aus Brasilien, *B. Hector* ebendaher, *B. sarcochilus* ebendaher, *B. eques* von Cochinchina Pfeiffer l. c. p. 156. — *B. (Melaniella) Manzanillensis* Gundlach von Manzanillo auf Cuba ib. p. 172. — *B. Binneyanus* von den Anden der Provinz Patas in Peru und *Mejillonensis* aus der Wüste Atacama Pfeiffer ib. p. 229. — *B. Gruereanus*, *anaga* und *Tarnieranus* Grasset von den Canarischen Inseln *Journ. de Conchyl.* 2. Sér. Tom. I. p. 347. — *B. Cirtanus* Morelet aus Algerien ib. p. 349. — *B. Lherminieri* Fischer ib. p. 355. pl. 12. fig. 6—7 von Guadeloupe. — *B. todillus* Morelet ib. Tom. II. p. 40 von Algerien. — *B. Sanctae-Mariae*, *vulgaris*, *Hartungi*, *delibutus*, *Forbesianus* Morelet et Drouet ib. p. 150 von den Azoren. — *B. acutissimus* und *densespiratus* Mousson ib. p. 159 von Java. — *B. Souvillei* und *singularis* Morelet von Neu-Caledonien Test. nov. Australiae. — *B. tremulans* Mousson Vierteljahrsschr. der Ges. zu Zürich III. p. 167 von den Azoren.

Bulimus coarctatus Pfr. ist bei Pfeiffer Novit. conchol. Taf. 22. fig. 22. 23 abgebildet.

Partula Mastersi Pfeiffer Proc. zool. soc. 1857. p. 110 von Guam. — *P. cinerea* Albers Malak. Bl. von den Salomons-Inseln, wobei zur Vergl. eine Diagnose von *P. grisea* Lesson gegeben ist.

Cylindrella macrostoma Pfeiffer Proc. zool. soc. 1857. p. 111 von Jamaica. — *C. producta* Gundlach Malak. Bl. p. 110 von Trinidad

auf Cuba. — *C. ventricosa* und *interrupta* Gundlach von Manzanillo auf Cuba ib. p. 175. — *C. eximia* Pfr. ib. p. 232.

Nach de Sauley werden die grossen Achatinen (*A. bicarinata*) von der Prinzeninsel im Busen von Guinea nach England versandt, als Mittel gegen die Schwindsucht. *Revue et mag. de zoologie* 1857. p. 542. — Bei Pfeiffer *Nov. conchol.* sind *A. Darnaudi*, *Shiplayi*, *Wallacei* und *Texasiana* auf Taf. XXII. fig. 7—14, so wie *A. Rodatzi* Dkr. auf Taf. XXVII abgebildet. — *A. Poeyana* Pfr. Mal. Bl. p. 173.

Subulina elata Gundlach von Cuba Mal. Bl. p. 173.

An dem Thier von *Achatina* (*Stenogyra*) *octona*, welches einen Kiefer und die Zunge einer herbivoren *Helicee* besitzt, zeigt Fischer die Schwierigkeit, unter den Landschnecken sichere Gattungen festzustellen. *Journ. de Conchyl.* 2. Sér. Tom. I. p. 239. Vergl. ebenda p. 241 eine Bemerkung über das Thier von *Achatina lamellata*, welche Art Pfeiffer zur Gattung *Tornatellina* gestellt hatte. Petit de la Saussaye macht Prioritätsansprüche auf seinen Namen *Elasmatina* geltend ib. p. 329.

Oleacina cyanozoaria, *trinitaria* und *regularis* Gundlach sind neue Arten von Trinidad auf Cuba. Malak. Bl. p. 108.

Glandina saturata Gundlach Mal. Bl. p. 174 von Cuba. — *G. gracilentata* Morelet. *Journ. de Conchyl.* 1857. p. 41 von Algerien. — *G. Pazensis* Arcas von Cuba ib. p. 282. pl. 10. fig. 8—9.

Bourguignat beschrieb die ihm in seiner früheren Monographie der Gattung *Caecilianella* noch unbekannte *C. aciculoides* (*Columna aciculoides* Jan), und eine neue Art *C. aglena* aus Frankreich. *Revue de zoologie* 1857. p. 13.

Von Gulick wurden 49 neue Arten der Gattung *Achatinella* von den Hawaischen Inseln in den *Annals Lyc. New-York* VI. p. 173 beschrieben und auf 2 Tafeln abgebildet. Ihre Namen sind: *A. leucochila*, *resinula*, *lagenata*, *lacrimata*, *costulata*, *striatella*, *marginata*, *fuscata*, *fumida*, *gummea*, *fragilis*, *triticea*, *granifera*, *crystallina*, *saxatilis*, *exilis*, *petita*, *octogyrata*, *subula*, *turrita*, *terebralis*, *stiria*, *vitrea*, *parvula*, *platystyla*, *peza*, *lactea*, *eburnea*, *ampulla*, *fasciata*, *Baileyana*, *pyramidalis*, *undosa*, *induta*, *lignaria*, *crocea*, *ustulata*, *talpina*, *plumbea*, *phaeozona*, *plumata*, *diversa*, *varia*, *versipellis*, *cucumis*, *trilineata*, *analogata*, *papyracea*, *juncata*. Auch Pfeiffer stellte eine neue Art *A. Philippiana* von den Sandwichinseln auf. Malak. Bl. p. 89. — Ebenso *A. cinnamomea*, *gemma*, *sulcata*, *minuscule* ib. p. 230. — *A. Deshayesi* Morelet von den Sandwichinseln *Test. nov. Austral.* I. c.

Bourguignat hat in *Revue de zool.* 1857. p. 548 eine Art Monographie der Gattung *Balia* geliefert. Er zählt dahin nur die Ar-

ten, welche bei Pfeiffer die Section Baleastra bilden, nämlich: *B. perversa*, *pyrenaica* n. sp. und *Rayana* n. sp., welche einen Höcker auf der Mündungswand haben, und *B. Sarsii* Phil., *Deshayesiana*, *lucifuga* Leach MS., *Fischeriana*, *Tristensis* Leach, *ventricosa* Leach. — Die übrigen zu Balia gezogenen Arten werden den Gattungen *Temesa* Adams, *Megaspira*, *Paxillus*, *Clausilia*, *Cylindrella*, *Bulimus* und *Tornatellina* zugewiesen.

Balea? Canteroiana Gundlach aus der Nähe von Trinidad auf Cuba, Malak. Bl. p. 107. — *B. nitida* Mousson Vierteljahrsschr. Ges. zu Zürich III. p. 168 von den Azoren.

Die Grenze zwischen der Gattung *Balea* und *Clausilia* fand A. Schmidt, Zeitschr. für die gesammten Naturw. von Giebel und Heintz VIII. p. 407 nicht mehr haltbar, indem er die Charaktere bei Varietäten einer und derselben Art so verwischt fand, das diese Varietäten in verschiedene Gattungen zu stellen sein würden, wenn man an deren bisherigen Charakteren festhalten wollte. Er ordnet nun die siebenbürger baleenartigen Clausilien folgendermassen. A. rechtsgewundene: *Cl. Bielzi* Parr., *Madensis* Fuss, *Lischkeana* Parr., *pruinosa* Parr., *livida* Mke. B. linksgewundene: *Cl. glorifica* Parr., *glauca* Bielz, *canescens* Parr., *elegans* Bielz, *intercedens* A. Schmidt n. sp., *regalis* Parr., *straminicollis* Parr., *plumbéa* Rossm.

Clausilia bogatensis Bielz Verhandl. des siebenbürgischen Vereins für Naturw. 1856. No. 12 aus dem bogater Thale im Geisterwalde. — *Cl. Blandiana* Pfr., *Cl. Cyclostoma* Pfr. und *Cl. thermopylarum* Roth sind bei Pfeiffer Novit. conchol. Taf. XXII abgebildet. — *Cl. bitorquata* Friv. MS., *vesicalis* Friv., *porrecta* Friv., *fauciata* sämmtlich aus Syrien, *Cl. clathrata* Friv. aus Ungarn und *Cl. clandestina* Parr. aus Böötien hat Rossmäessler Malak. Bl. p. 38 beschrieben. — *Cl. colchica* Parr. ib. p. 88. — *Cl. mitylena* Albers von Lesbos ib. p. 99. — *Cl. Lanzai* Dunker ib. p. 232. — *Cl. funiculum* von Trapezunt, *unilamellata* von Chysirkaleh, *multilamellata* und *firmata* von Reduktaleh sind neue Arten von Mousson Vierteljahrsschr. Ges. in Zürich 1856. p. 396. — *Cl. nana* Küster Conchyl. Cab. p. 150 aus dem südlichen Frankreich, *ochracea* (rugicollis Var. Rossm. Pfr.) ib. p. 170 aus dem Banat, *hasta* (rugicollis Var. Rossm.) ib. aus dem südlichen Ungarn.

Auriculacea. Im Journ. de Conchyl. 1857. p. 310 findet sich eine posthume Abhandlung von Mitre über die Lebensweise und die Athmungsorgane der *Auricula myosotis*. Nach den Beobachtungen des Verf. ist sie eine wahre Lungenschnecke, hat auch einstülpbare Fühler. Ueber die Gruppe *Conovulus* hat Verf. keine Beobachtungen gemacht.

Die Gattung *Blauneria* Shuttl. erklärt Fischer nach Untersuchung des Thieres für der Familie der Auriculaceen angehörig, und

stimmt also der Pfeiffer'schen Ansicht bei. Journ. de Conchyl. 2. Sér. Tom. I. p. 231.

Bourguignat hat eine Monographie der Gattung *Carychium* in Revue de zoologie 1857. p. 209 geliefert. Er nimmt 16 Arten an, von denen 1 in Asien, 3 in Amerika, 12 in Europa vorkommen, und von denen 6 nur fossil sind. Neu sind darunter folgende lebende Arten: *C. striolatum* aus Frankreich (Aube), *Rayanum* ebenda, *existelium* aus Nordamerika, *euphaeum* aus Nordamerika. Den Beschluss macht ein ziemlich grosses Verzeichniss von Arten, welche als Carychien beschrieben sind, aber anderen Gattungen angehören.

Linnaeacea. *Physa auriculata* und *Ph. kanakina* Gassies von Neu-Caledonien. Journ. de Conchyl. 1857. p. 274. pl. 9. — *Ph. nasuta*, *obtusa*, *hispida*, *caledonica*, *tetrica*, *circumlineata* Morelet von Neu-Caledonien Test. nov. Austr. I. c.

Planorbis ingenuus Morelet von Neu-Caledonien ib.

Notobranchiata.

Aeolidine. Moser hat mit dem Schleppnetze an der Küste von Morecambe - Bay Aeolis *Landsburgii* gefangen. Annals nat. hist. XIX. p. 498.

Aeolis Olrikii Mörch in Rink's Grönland Anh. p. 78.

Rud. Bergh hat anatomische Untersuchungen an *Fiona atlantica* angestellt, und dieselben in Meddelelser fra den naturhist. Forening i Kjöbenhavn 1857. p. 273—337 veröffentlicht.

Die Gattung war ursprünglich von Hancock und Embleton *Oithona* genannt, später in *Fiona* umgetauft worden. Sie ist besonders kenntlich an den durch eine Membran gleichsam geflügelten Kiemenpapillen, und gehört in die Gruppe der Aeolidier, welche den After auf dem Rücken haben; die Radula besteht aus einer Reihe gezählter Platten. Verf. zieht hierher drei Arten: *F. nobilis* Hanck. Emb., *atlantica* n. sp. aus dem atlantischen Ocean südlich von Neufundland, wo sie massenhaft an einer leeren Tonne sitzend aufgefischt waren, und *pinnata* Eschsch. Von der genannten neuen Art ist dann eine sehr ausführliche Anatomie gegeben, wovon hier ein Auszug nicht füglich gegeben werden kann, auf die aber als auf eine gründliche und sehr schätzbare Arbeit hingewiesen werden muss. Zwei Tafeln erläutern den Text.

Acera. Nach der Beobachtung von Madame Jeanette Power in Messina, Annals nat. hist. XX. p. 334 besteht die Nahrung von *Bulla lignaria* vorzüglich in *Dentalium entale*, welche schnell verdaut werden.

Bulla scalpta, *nucleola* und *semen* hat Lovell Reeve l. c. p. 392 von Beechey's-Insel beschrieben und pl. 32. fig. 2—4 abgebildet. — *B. (Tornatina) inculta* und *B. (Haminea) vesicula* Gould Reports of explorations and surveys V. p. 334. pl. 11. fig. 27—29 von San Diego.

Fischer gründete eine neue Gattung *Cylindrobulla* in der Familie der Bullaceen. Testa cylindrica, bullata, tenuis, fragilis; spira minutissima; sutura incisa, margine columellari postice reflexo et producto, spiram tegente; margine dextro involuto, aperturam includente. Die Gattung würde sich vorzüglich durch die völlige Verschlussung von $\frac{2}{3}$ der Schalenöffnung auszeichnen. Die Art *C. Beauii* ist von Guadeloupe. Journ. de Conchyl. 2. Sér. I. p. 275. pl. 8. fig. 8. 9.

Lobiger Sourerbii Fischer von Guadeloupe ib. p. 273. pl. 11. fig. 7—10.

Monopleurobranchiata.

Ancyloidea. *Ancylus Sallei* Bourguignat Revue de zoologie 1857. p. 16 aus Mexiko.

Pteropoda.

J. Müller hat seine Aufmerksamkeit nochmals der Entwicklungsgeschichte der Pteropoden zugewendet, namentlich um einige Punkte, in denen seine früheren Angaben mit denen Gegenbaur's nicht übereinstimmten, zur Entscheidung zu bringen. Monatsberichte der Berliner Acad. 1857. p. 180.

Der erste Punkt betrifft die poche pyriforme und die Athmungsorgane, welchen letzteren das Wimperschild der Hyalacaceen zugerechnet wird, wozu der triftigste Grund in dem Verhalten der Blutgefäße gefunden wird. — Der zweite Punkt behandelt die Entwicklung der Leber bei *Crescis acicula*. Gegenbaur's Ansicht, der Blinddarm sei die Leber, wird widerlegt, vielmehr entwickelt sich die Leber am Grunde des Blinddarms; auch ist M. nicht geneigt, den Blinddarm als Gallenblase zu deuten. — Drittens wird nochmals hervorgehoben, dass die Wimpersegel keinerlei Antheil an der Bildung der Flossen haben. — Viertens endlich spricht M. über die Pneumodermonlarven, ihre Zungenbewaffnung, ihre Wimperkränze u. s. w.

Die fortgesetzten Beobachtungen von Krohn über die Entwicklungsgeschichte der Pteropoden, Müller's Archiv 1857. p. 459 beziehen sich auf die Cymbuliaden und Clioiden.

Von *Tiedemannia* ist namentlich die Entwicklung des Rüssels geschildert. Die *T. Scyllae* und *Charybdis* des Ref. erklärt Verf. für noch nicht völlig ausgebildete Individuen der *T. neapolitana*. — Von nackten Pteropoden wurden fünf verschiedene Larven beobachtet und beschrieben, ohne dass deren Zugehörigkeit festgestellt werden konnte.

Acephala.

Brachiopoda.

Albany Hancock gab einige Bemerkungen zur Anatomie der Brachiopoden (Report of the 26. meeting of the british association for the advancement of science held at Cheltenham p. 94.

Die sogenannten Herzen, deren die Terebratuliden zwei, *Rhynchonella* nach Huxley vier besitzen, sieht Verf. als Oviducte an und ist der Huxley'schen Ansicht, dass sie auch als Nieren fungiren, nicht abhold. Bei *Waldheimia*, *Terebratulina* und *Rhynchonella* endet der Darm blind, ohne Afteröffnung. Die birnförmigen Bläschen, welche Huxley beschrieben hat, und deren *Waldheimia australis* fünf hat, während andere Arten sie in geringerer Zahl besitzen und deren wenigstens eine vorhanden ist, betrachtet Verf. als dem Circulations-Apparate angehörig, und die grösste an der dorsalen Oberfläche des Magens angeheftete als das Herz. Nach Beobachtungen an *Waldheimia australis* und *Lingula* hält Verf. diese Thiere für zwitterig, indem die Geschlechtsdrüsen aus zwei verschiedenen Theilen bestehen, in deren einem er bei *Waldheimia* Eier, in dem anderen bei *Lingula* Spermatophoren mit Spermatozoen gefüllt gefunden haben will. Eine ausführlichere Arbeit über diesen Gegenstand mit Abbildungen ist in Aussicht gestellt.

Derselbe Verf. giebt in Proc. Royal society May, Annals nat. hist. XX. p. 141 eine fernere Darstellung der Organisation der Brachiopoden, die auf der Section der folgenden Arten beruht: *Waldheimia australis*, *Waldh. Cranium*, *Terebratulina caput serpentis*, *Rhynchonella psittacea* und *Lingula anatina*.

Gratiolet hat im Journ. de Conchyl. 1857. p. 209—258 eine Arbeit über die Anatomie der *Terebratula australis* bekannt gemacht, die durch Holzschnitte im Texte und eine Tafel erläutert ist. Schale, Muskeln, Stiel, Mantel, Arme, Verdauungsapparat, Leber, Geschlechtsorgane, Gefäss- und Nervensystem sind geschildert.

Carpenter behauptet bestimmt gegen King, die Schale von *Rhynchonella Geinitziana* sei nicht durchbohrt. *Annals* XIX. p. 214.

Lamellibranchiata.

In Emile Blanchard's grossem Werke, „l'Organisation du règne animal,“ welches seit 1852 erscheint, aber mir noch nicht zugänglich geworden war, sind die 1. 9. und 15. Lieferung den Muscheln gewidmet. In denselben ist das Haut-, Muskel- und Nervensystem der Pholaden abgehandelt und an *Pholas dactylus* erläutert. Die Tafeln sind vom Verf. selbst gezeichnet und sehr sauber ausgeführt.

O. Schmidt weist das Vorhandensein eines Körperchens in der Mikropyle der Najadeneier nach, und giebt also in diesem Punkte Keber Recht. *Wiener Sitzungsberichte* XXIII. p. 314 und durch Abbildungen erläutert.

Semper hat sich in einem Briefe an van Beneden dahin ausgesprochen, *Cyphonautes compressus* Ehrbg. sei die Larve einer Muschel. Er hatte die Absicht weitere Mittheilungen in unserem Archiv zu machen, dieselben aber zurückgenommen. *Bulletin de l'acad. de Belgique*. 2. Sér. III. p. 353.

Schlossberger untersuchte die chemische Beschaffenheit der Muschelschalen. Er fand an den Austernschalen die innerste Perlmutterschicht, die braunen harten Schuppen, und die kreideweisse Masse verschieden zusammengesetzt. Die organische Substanz der Muschelschalen ist nach Schlossberger nicht Chitin, wie Kost gemeint hat. Auch den Byssus von *Pinna nobilis* hat er untersucht; ebenso zwei Steinchen aus dem Bojanus'schen Organ von *Pinna nobilis*. *Württembergische naturw. Jahreshfte* 1857. p. 29.

Ein Aufsatz über Perlen und die Anfertigung derselben in China von Macgowan ist durch Van der Hoeven im *Album der Natuur* 1857. p. 244 mitgetheilt worden. Verf. hat in Gemeinschaft mit Hague die durch Einschieben von Körpern zwischen Mantel und Schale der Muscheln erzeugten Perlen untersucht und beschreibt sie in Uebereinstimmung mit den bekannten Mittheilungen von Hague. Beachtung verdienen die interessanten Notizen von den ältesten

Nachrichten über Perlen bei den Chinesen, so wie über die grössten Perlen, deren von den ältesten Schriftstellern Erwähnung gethan ist, u. dgl. mehr.

Mit deutscher Gründlichkeit und umfassender Gelehrsamkeit schrieb Möbius über die Perlen im Michaelis-Programm der Realschule in Hamburg und im 4. Bande der Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins zu Hamburg. „Die echten Perlen, ein Beitrag zur Luxus-, Handels- und Naturgeschichte derselben.“ Mit einer Kupfertafel.

Der erste Abschnitt handelt von den Beispielen von Perlenluxus in verschiedenen Ländern und Zeiten; der zweite von der Perlenfischerei und vom Perlenhandel; der dritte von den chemischen und optischen Eigenschaften, der Structur und Entstehung der Perlen. Verf. hat mehrfach Entozoen in Perlen gefunden; alle bisherigen Versuche, die Perlenbildung künstlich zu vermehren, werden für unvollkommen und namentlich bei Seemuscheln für unanwendbar erklärt.

Ostracea. Eyton berechnete den Laich von drei Austern auf 3 Millionen Junge. Sie scheinen je nach der Tiefe des Wassers zu verschiedener Zeit zu laichen. *Annual of scientific discovery* 1857. p. 365.

Derselbe hat sich mit der Untersuchung der Austernbänke an den britischen Küsten beschäftigt, und über sie wie über die Austern selbst beabsichtigt er nach einem vorläufigen Berichte in Report of the 26. meeting of the british association of the advancement of science p. 368, *Edinburgh new phil. Journ.* N. S. IV. 1856. p. 354. weitere Beobachtungen anzustellen.

Ostrea triangularis Holmes von der Mündung des Edisto-River an der Küste von Südcarolina, soll sich von *O. edulis* durch die regelmässig dreieckige Form und grossen Muskeleindruck unterscheiden. *Elliot Society in Charleston* 1856. June p. 29.

Pectinea. *Pecten inaequisculptus* Tiberi l. c. ist nach Fischer *Journ. de Conchyl.* p. 291 = *Pecten Actoni*.

Aviculacea. In Reeve's *Conchologia iconica* Lief. 165 und 168 ist die Gattung *Avicula* auf 18 Tafeln in 75 Arten dargestellt. Als neue Arten werden angesehen: *A. flexuosa* Nordaustralien, *lata* Australien, *Cumingii* Lord Hood's-Insel, *flabellum* Venezuela, *barbata* Panama, *ala perdicis* Westindien, *imbricata* Philippinen, *muricata* Philippinen, *lentiginosa* Molukken, *praetexta* Philippinen, *tegulata* Australien, *hystrix*, *rutila* Australien, *perriridis* Australien, *pulchella* Philippinen, *radula*, *occa* Rothes Meer, *sinbriata* Australien, *anomioides*, *sugillata* Nordaustralien, *cetra*, *lacunata* Australien, *irrasa*, *aerata* Australien, *irradians* Australien, *zebra* Australien,

flammata Philippinen, *scalpta* Australien, *pernoides*, *assula* Westindien, *chamoides*, *punctulata*, *electrina* Molukken, *smaragdina* Molukken, *malloides* Australien, *iridescens* Molukken, *castanea* Philippinen, *fibrosa* Philippinen, *trochilus* Philippinen, *aquatilis* Molukken, *peruviana* Peru, *scabriuacula* Australien, *producta* Rothes Meer, *signata*, *marmorata*, *spectrum* Philippinen, *formosa*, *inquinata* Singapore, *eximia*, *gregata* Samoa-Inseln, *argentea*, *placunoides* Australien, *libella* China, *rexillum* Ceylon, *maura* Sidney, *cornea* Jamaica, *vitrea* Westindien, *reticulata* Australien.

Arcacea. Als Fortsetzung seiner Revision der Gattungen einiger Muschelfamilien hat Gray in den *Annals nat. hist.* XIX. p. 366 die Familie der Archen behandelt.

Er unterscheidet zwei Tribus: 1. *Arcaina* mit den Gattungen *Litharca* Gray, *Arca* Gray, *Trisis* Oken, *Barbatia* Gray, *Cucullaea* Lam., *Scaphula* Bens., *Senilia* Gray, *Anadara* Gray, *Scapharca* Gray, *Noetia* Gray, *Argina* Gray, *Lunarca* Gray; 2. *Pectunculina* mit den Gattungen *Axinea* = *Pectunculus* Lam., *Limopsis*, *Limaea*. Diese 15 Gattungen sind characterisirt und bei jeder eine oder einige typische Arten angeführt.

Arca mosambicana Bianconi Mem. acc. Bologna VII. tab. 23. (*Encycl.* pl. 306. fig. 1. a, b) von *antiquata* verschieden aus Mosambique.

Nuculacea. *Nucula siliqua*, *sulcifera*, *expansa* Lovell Reeve von Beechey's-Insel l. c. p. 396. pl. 33. fig. 1, 2 und 4.

Najades. Den zweiten Theil von Drouet *Etudes sur les Nayades de la France*, avec neuf planches noires. Troyes 1857 kenne ich nur aus den Anzeigen von Rossmäessler in den *Malak. Bl.* p. 225 und von Fischer in dem *Journ. de Conchyl.* p. 195.

Lea beobachtete, dass einige Unionen, namentlich *Unio radiatus* Zeichen von Lichtempfindung gäben, und dass die weiblichen Exemplare hierin empfindlicher wären, als die männlichen. Er vermuthet die Augen in den abgerundeten Spitzen der Tentakelchen, welche die Oeffnungen der Siphonen umgeben. *Proc. Philadelphia* 1857. p. 17. Vgl. auch *Journ. de Conchyl.* 1857. p. 203.

Nachdem schon vor längeren Jahren Kirtland bei einigen Arten der Gattung *Unio* im jugendlichen Alter einen Byssus beobachtet hatte, fand nun Lea auch bei zwei erwachsenen Arten dieser Gattung, *U. acutissimus* und *U. conradicus* Byssus-Fäden. *Proc. Philadelphia* VIII. p. 213.

Isaac Lea charakterisirte Proc. Philadelphia VIII. p. 262 elf neue Unionen von Georgia: *Unio Elliottii*, *gracilior*, *pullatis*, *favosus*, *rutilans*, *errans*, *vicinus*, *subellipsis*, *geminus*, *rostraeformis*, *Blandianus*. — Ferner ebendaher ib. 1857. p. 31: *Unio concestator*, *extensus*, *pyriformis*, *Columbensis*, *fallax*, *intercedens*, *excavatus*, *radicans*, *rubellinus*, *umbrosus*, *apicinus*, *Othcaloogensis*. — Ferner 6 Arten von Alabama ib. p. 83: *U. propinquus*, *florentinus*, *bimarginatus*, *mundus*, *Thorntoni*, *Mooresianus*. — Ib. p. 84 fünf Arten aus verschiedenen Theilen der vereinigten Staaten: *U. pinguis* St. Peters-River, *Higginsii* von Iowa, *Abbevilensis* Südcarolina, *Jamesianus* Mississippi, *Texasianus* Texas. — Ib. p. 85 zwei exotische Arten: *U. Poeyinus* aus Mexiko und *Canadensis* aus dem St. Lawrence-River bei Montreal. — Ib. p. 85 elf Arten aus Nordcarolina: *U. Wheatleyi*, *percoarctatus*, *gracilentus*, *micans*, *Genthii*, *Emmonsii*, *spadiceus*, *insulsus*, *striatulus*, *macer*, *contractus*.

Unio Gontierii Bourguignat Revue de zoologie 1857. p. 16 aus der Krim. — *U. Churchillianus*, *eucyphus* und *eucirrus* ib. p. 18 aus Anatolien. — Bourguignat bezeichnet ib. p. 21 Küster's *Unio naticus* als identisch mit seinem ein Jahr früher beschriebenen *U. Hueti*.

Folgende Anodonten stellte Lea Proc. Philadelphia 1857 auf: p. 84 *A. Lewisii* aus dem Erie-Kanal und Mohawk-River, *lacustris* von New-York, *modesta* von Michigan, — p. 85 *A. Holtonis* aus der Provinz Popayan, — p. 86 *A. virgulata* aus dem Roanoke-River in Nordcarolina. — *A. Vescoiana* Bourguignat Revue de Zoologie 1857. p. 18 aus Anatolien.

Castelnau hat in seinem Reisewerke aus der Najadenfamilie folgende südamerikanische Arten erwähnt:

7 Castalia, worunter als neu angesehen werden: *C. retusa* pl. 14. fig. 2 aus Guyana, *multisulcata* ib. fig. 4, *turgida* fig. 1, *acuticosta* fig. 3, die drei letzteren aus Brasilien.

7 Hyria, worunter neu: *H. transversa* pl. 15. fig. 1 aus Brasilien, *complanata* pl. 15. fig. 2 aus Guyana, *Castelnaudi* pl. 16. fig. 1 aus Brasilien, (Meine *H. humilis* ist dem Verf. nicht bekannt; sie wird wohl mit *Castelnaudi* zusammenfallen, so wie leicht diese mit *complanata* identisch sein könnte, da die Formen der Schalen sehr zu variiren scheinen.)

16 Unionen, worunter neu: *U. (Alasmodonta) jaspidea* aus dem Amazonenflusse pl. 17.

1 Monocondylea.

19 Anodonta, worunter neu: *A. obtusula* aus Bolivia, *Weddellii* aus Brasilien, *Castelnaudii* aus dem Amazonenflusse, *lingulata* von Corumba, Paraguay.

6 Leila Gray, einer Gattung, deren Arten früher mit Anodonta und Iridina verwechselt waren, und die sich durch die Gegenwart einer Mantelbucht und durch ein Klaffen am Vorderende auszeichnet; darunter neu: *L. pulvinata* pl. 20. fig. 1 von Rio-Janeiro, *L. Castelnaudi* pl. 19. fig. 1 von Paraguay.

5 Mycetopus, worunter neu: *M. Weddellii* pl. 20. fig. 2 von Santa Anna de Chiquitos und *pygmaeus* (Anodon pygmaeum Spix) pl. 19. fig. 2 von Brasilien.

Mytilacea. Bei Lovell Reeve Iconographia icon. Lief. 168 und 169 ist die Gattung Mytilus auf 7 Tafeln in 29 Arten abgebildet. Neue Arten darunter sind: *M. compressus* Philippi MS., *atropurpureus* Dunker Guinea, *rostratus* Dkr. Tasmania, *sinuatus* Dkr. Philippinen, *Dunkeri* Philippinen, *cuneiformis* Guayaquil, *pallio-punctatus* Dkr. Californien, *Grunerianus* Dkr. Island.

Der Gattung Modiola sind ebenda Lief. 169 und 170 acht Tafeln gewidmet mit 48 Arten, unter denen neu: *Modiola nitida* Port Es-sington, *arata* Dkr. MS. Nordaustralien, *Traillii* Malacca, *Senhausii* Chusan, *speciosa* Dkr. Peru, *rexillum* Australien, *magellanica* Dkr. Magellanstrasse.

Die Gattung Lithodomus ist bei Lovell Reeve Lief. 170 mit 4 Tafeln begonnen. Darauf finden sich an neuen Arten: *L. Cumingianus* Dkr. Nordaustralien, Mazatlan, *stramineus* Dkr. Westindien, *Gruneri* Philippi MS. Neu-Seeland, *coarctata* Dkr. Gallapagos, *castaneus* Dkr., *rugiferus* Dkr., *Hanleyanus* Dkr. Suez, *Malaccanus* Malacca, *bis excavatus* St. Thomas, *pessulatus*, *subula*.

Nachträglich müssen wir einer Abhandlung von Dunker „de Septiferis genere Mytilaceorum et de Dreisseniiis“ erwähnen, die freilich schon 1855 als academische Gelegenheitsschrift zu Marburg erschienen, uns aber in dem damaligen Berichte entgangen war.

Aus der Gattung Septifer beschrieb Verf. fünf Arten ohne Borsten mit einem Randzahne, 6 Arten mit Borsten, ohne Randzahn. Unter ersteren sind *S. furcatus* von China und *S. Grayanus* von den Molukken, unter letzteren *S. Cumingii* Recluz von Panama und *S. Forskalii* aus dem rothen Meere als neu beschrieben. — Aus der Gattung Dreissena kennt Verf. 28 Arten, von denen 8 (3 lebende und 5 fossile) ein einfaches Septum, 20 (11 lebende und 9 fossile) ein mit einer kleinen Lamelle versehenes Septum besitzen. Aus der ersten Gruppe ist *D. Cumingiana* aus dem Mississippi, aus der zweiten sind *D. Küsteri*, *Gundlachii* von Cuba, *Mörchiana* von St. Thomas als neu beschrieben.

Dreissena caspia Eichwald Mém. de Moscou X. tab. 10. fig. 19—21.

Chamacea. Macdonald hat der Royal Society of London, Proc. June 1857 eine Mittheilung über die Anatomie von *Tridacna* gemacht. Vergl. auch Annals nat. hist. XX. p. 302.

Tridacna elongatissima Bianconi Mem. Acc. Bologna VII. tab. 25. fig. 2 von Mosambique.

Cardiacea. *Cardium Guichardi* Bernardi Journ. de Conchyl. 1857. p. 53. pl. 2. fig. 4 von Neu-Caledonien. — *C. ornatum* Eichwald Mém. de Moscou tab. 10. fig. 5—7 aus dem Caspischen Meere. — *C. cruentatum* Gould Reports of explorations and surveys V. p. 334. pl. 11. fig. 21. 22 von San Pedro. — *C. Fornasinianum* Bianconi Mem. Acc. Bologna VII. tab. 25. fig. 1 von Mosambique wird mit *apertum* Chemn. verglichen.

Cycladea. Essai monographique sur les Pisidies françaises par Baudon. Paris 1857. 56 pag. 5 pl. — ist mir nur aus einer Anzeige im Journ. de Conchyl. p. 296 bekannt geworden. Danach hat sich Verf. auch mit der Anatomie des Thiers befasst. Er nimmt im Ganzen nur 8 französische Arten an, unter denen eine *P. conicum* neu.

Cyrena caledonica Gassies von Neu-Caledonien. Journ. de Conchyl. 1857. p. 277.

Cyrena eximia Dkr. ist bei Pfeiffer Novit. Conchol. Taf. 24 abgebildet.

Galatea Bernardii Dunker Journ. de Conchyl. 2. Sér. Tom. I. p. 338. pl. 12. fig. 3 von Cap Lopez. — Ebenda p. 339 zählt Fischer die Arten der Gattung *Galatea* auf, deren Zahl sich auf 8 beläuft.

Astarte Richardsoni, *fabula*, *globosa* Lovell Reeve Beechey's-Insel l. c. p. 398. pl. 33.

Lucinacea. *Lucina Voorhoevei* Deshayes Journ. de Conchyl. 1857. p. 106. pl. 2. fig. 1 wird mit der fossilen *L. Defrancei* verglichen.

Recluz beschrieb ib. p. 340. pl. 12. fig. 4. 5 eine neue Art *Kellia Cailliaudi* von der französischen Küste nach Schale und Thier.

Conchae. In einer besonderen kleinen Schrift „Kritische Untersuchung der Arten des Molluskengeschlechts *Venus* bei Linné und Gmelin mit Berücksichtigung der später beschriebenen Arten. Cassel 1857. 8. 135 Seiten“ hat E. Römer einen werthvollen Beitrag zur Kenntniss der Gattung *Venus* im weiteren Sinne geliefert.

Verf. theilt die Gattung *Venus* in acht Subgenera und diese wieder in Familien, wobei also den Familien eine andere Bedeutung beigelegt wird, als es in den beschreibenden Naturwissenschaften sonst allgemein zu geschehen pflegt. Es werden dann 145 Arten von Linné und Gmelin kritisch behandelt, meist auch mit ausführlichen

Diagnosen versehen. Da mehrere Familien vom Verf. neu gegründet sind, so erscheint es angemessen, um diese unseren Lesern verständlich zu machen, hier das ganze Schema des Verf. mitzuthellen:

A. Dentibus 3 in valva dextra, quatuor in sinistra.

I. Subgenus: *Cytherea* Lam.

1. Fam. *Meretrix* Lam. T. cordata laevigata, sinu palliari minimo, rotundato; margine interno laevi, dente postico crenulato. C. meretrix L.

2. Fam. *Tivela* Link (Trigona Mühlf.) T. trigona, laevigata, sinu palliari mediocri, rotundato; margine interno laevi; dente laterali remoto, postico crenulato. C. tripla L.

3. Fam. *Callista* Poli. T. cordato-ovata; sinu palliari trapeziali, mediocri, margine interno laevi. C. erycina L., C. Chione L.

4. Fam. *Pitar* Römer. T. trigono-cordata, transversim striata; sinu palliari profundo, obtuso-triangulari; dente laterali papilliformi; margine interno laevi. C. tumens Gmel. (le Pitar Adans.)

5. Fam. *Lioconcha* Mörch. T. rotundato-cordata, laevigata vel subtiliter transversim striata; sinu palliari eximie parvo, margine interno laevi. C. castrensis L.

6. Fam. *Dione* Gray. T. cordata, lamellis transversis instructa; sinu palliari mediocri, triangulari; dentibus mediis lamelliformibus; margine interno laevi. C. dione L.

7. Fam. *Circe* Schum. T. rotundata vel trigono-rotundata, compressa, lentiformi; natibus complanatis, angustis; rugis transversis; sinu palliari rudimentario; dentibus cardinalibus linearibus, compressis, dente laterali remoto, lato; margine interno laevi. C. scripta L.

8. Fam. *Crista* Römer. T. ovata, striis longitudinalibus; sinu palliari minimo; dente laterali cardinibus proximo, papilliformi; margine interno crenulato. C. pectinata L.

II. Subgenus: *Sunetta* Link (Cuneus Mühlf.) V. Meroe L.

B. Dentibus tribus in utraque valva.

III. Subgenus: *Tapes* Mühlf. (Pullastra Sow.).

1. Fam. *Textrix* Römer. T. ovato-oblonga, utrinque rotundata; sinu palliari mediocri, trapeziali vel ovato; margine interno glaberrimo. V. textrix Chemn. (textile Gmel.).

2. Fam. *Parembola* Römer. T. ovata, antice rotundata, postice angulata; sinu palliari parvo, triangulari; margine interno glaberrimo. V. litterata L.

3. Fam. *Amygdala* Römer. T. oblongo-cordata, antice rotundata, postice angulata; sinu palliari magno, ovato; margine interno integro. V. decussata L.

IV. Subgenus: *Mercenaria* Schum. V. mercenaria L.

V. Subgenus: *Gomphina* Mörch. V. undulosa Lam.

VI. Subgenus: *Anaitis* Römer.

1. Fam. *Clausina* Brown. T. subcordata vel trigono-cordata, calcarea; sinu palliari parvo, triangulari. V. tiara Dillw.

2. Fam. *Chiona* Mühlf. T. cordata; sinu palliari parvo, rotundato-trigona. V. plicata Gmel.

VII. Subgenus: *Cyclina* Desh. V. chinensis Chemn.VIII. Subgenus: *Murcia* Römer.

1. Fam. *Antigona* Schum. T. cordata vel rotundato-cordata, lamellis vel sulcis transversis; sinu palliari mediocri, acute triangulari; margine interno crenulato. V. puerpera L.

2. Fam. *Chamelea* Klein. T. cordato-trigona, liris transversis; sinu palliari minimo; margine interno crenulato. V. gallina L.

3. Fam. *Leucoma* Römer. T. cordata vel cordato-rotundata, decussatim striata; sinu palliari parvo, obtuse triangulari; margine interno crenulato. V. granulata Gmel., V. marica L.

4. Fam. *Anomalocardia* Schum. T. cordato-trigona, area magna, subplana, marginem dorsalem posticum totum occupante; rugis transversis; dente cardinali postico areae parallelo; sinu palliari vix signato; margine interno denticulato. V. flexuosa L.

5. Fam. *Katelysia* Römer. T. ovata, complanata, sulcis transversis; sinu palliari mediocri, ovato-triangulari; margine interno laevi. V. scalarina Lam., V. exalbida Chemn.

Circe Robillardii Bernardi Journ. de Conchyl. 1857. p. 387. pl. 11. fig. 9.

Tapes gracilis Gould Reports of explorations and surveys V. p. 335. pl. 11. fig. 19. 20 von San Pedro.

Venus Deshayesiana Bianconi Mem. Acc. Bologna VII. tab. 24 von Mosambique.

Tellinacea. Bei Lovell Reeve Conchol. icon. ist Lief. 163 die Gattung Soletellina auf 4 Tafeln in 21 Arten abgehandelt. Neu sind: *S. consobrina* Desh. MS. Philippinen, *nymphalis* Desh. Australien, *epidermia* D. Adelaide, *Cumingiana* D. Philippinen, *Adamsii* D. Philippinen, *nitida* Gray Neuseeland, *truncata* Molukken, *siliqua* Neuseeland, *donacioides* Adelaide, *acuminata* Desh. Philippinen, *incerta* D. Neuseeland, *atrata* D. Philippinen, *planulata* Molukken, *japonica* D. Japan, *reversa* Malacca, *tumens* D. Philippinen, *obscurata* D.

Die Gattung Capsula Desh. besteht ib. auf 2 Tafeln aus 16 Arten, darunter neu: *C. solida* Malacca, *violacea* Manila, *candida* Philippinen.

Als Schluss von Psammobia sind ib. noch die Tafeln 6—8 erschienen. Die Gattung enthält daselbst im Ganzen 60 Arten. Neu: *Ps. eburnea* Malacca, *malaccana* Malacca, *Menkeana* Australien, *suf-*

fusa Malacca, *casta* Guatemala, *parvula*, *vaginoides*, *lineolata* Gray MS. Neuseeland, *convexa*.

In den Lief. 164. 165 ist ib. die Gattung *Sanguinolaria* auf einer Tafel mit 5 Arten enthalten, worunter *S. oralis* von Centralamerika neu.

Desgleichen eine neue Gattung *Psammotella* Deshayes testa ovato-transversa, convexiuscula, subaequilateralis, utrinque hians, antice rotundata, postice longior, truncata vel subrostrata, concentrice striata, aut lutea aut violacea, epidermide tenui decidua cornea; cardo dentibus parvis centralibus erectis in valva sinistra, in valva dextra unica, callositate oblonga in ambabus; ligamentum externum; impressio muscularis pallii sinu oblongo peramplo. Sieben neue Arten von Deshayes: *Ps. philippinensis* Philippinen, *malaccensis* Malacca, *Skinneri* Ceylon, *Rüppelliana* Rothes Meer, *ambigua*, *subradiata* Philippinen, *oblonga*.

Die Gattung *Capsa* gehört nach den anatomischen Untersuchungen von Fischer Journ. de Conchyl. 1857. p. 327 in die Familie der Psammobien.

Lithophaga. Recluz sucht nachzuweisen, dass die Familie Lithophages von Lamarck keine natürliche sei, und bildet eine eigene Gruppe Pullastridae aus den Gattungen Petricola und Tapes, mit welchen letzteren er Venerupis generisch vereinigt wissen will. Journ. de Conchyl. p. 15.

Fischer hat ib. 2. Sér. I. p. 321 anatomische Bemerkungen über mehrere Petricola-Arten gemacht, und findet die Gattung Choristodon Jonas gerechtfertigt.

Mactracea. Deshayes hat das Thier von Cumingia untersucht und gefunden, dass die Gattung in die Familie der Lavignons gehört. Er beschreibt zugleich eine neue Art *C. grandis* von Chile. Journ. de Conchyl. 2. Sér. I. p. 278. — *C. parthenopaea* Tiberi l. c.

Das Thier von Amphidesma hat Fischer Journ. de Conchyl. 1857. p. 334 beschrieben.

Anatinacea. *Osteodesma Orbigny* Fischer Journ. de Conchyl. 1857. p. 382. pl. 11. fig. 7–8 von Martinique.

Cochlodesma Cumingiana Fischer ib. p. 384. pl. 10. fig. 3–5.

Corbulacea. *Neaera renorata* Tiberi l. c.

Pholadea. In Folge einer kritischen Anzeige der von der Holländischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Harlem gekrönten Schrift Cailliaud's über die bohrenden Mollusken, welche Fischer im Journ. de Conchyl. 2. Sér. I. p. 395 veröffentlicht hatte, vertheidigt Cailliaud in derselben Zeitschrift II. p. 130 seine Ansichten gegen die dort gemachten Ausstellungen.

Cailliaud, der sich schon so grosses Verdienst um die Kenntniss von der Art und Weise erworben hat, wie die Muscheln in das Gestein bohren, hat nun auch das Bohren der lebenden Pholaden wirklich beobachtet. *Revue de zoologie* 1857. p. 64. Es geschieht durch Raspeln mit der Schale, indem sie sich mit dem Fusse im Grunde der Höhlung festheften, und mit der Schale bald nach links bald nach rechts drehen. Sie arbeiten nur bei Tage nicht bei Nacht. Sie bohren ziemlich schnell.

Jarvis hat seit 1849 Beobachtungen über die Verwüstungen des Bohrwurms (*Teredo*) in den amerikanischen Gewässern angestellt; ein Auszug seiner im National-Institut zu Washington gelesenen Abhandlung findet sich in *Wells Annual or scientific discovery or year-book of facts in science and art for 1857*. Boston 1857. p. 359.

Die Thiere können das Holz des Schiffes nur erreichen, wo es nackt ist, aber ein kleiner Riss in dem Ueberzuge, ein ausgefallener Nagel oder dergl. sind hinreichend den Feind eindringen zu lassen, was zu bestimmter Jahreszeit geschieht. Ein guter Ueberzug von Kupfer verdient den Vorzug vor Allem, nächstdem hält Verf. einen dreifachen Anstrich von weisser Zinkfarbe für das Beste.

Das Verzeichniss der Arten der Gattung *Teredo* (vergl. den vor. Bericht p. 164) ist von Fischer *Journ. de Conchyl.* 2. Sér. Tom. I. p. 254 beschlossen und enthält 18 Arten, von denen 10 im atlantischen, 8 im indischen Ocean leben.

